

# **Intervento ambulatoriale nelle problematiche di dipendenza**

## **Risultati dell'indagine presso gli utenti 2010**

### **Raccolta di tabelle statistiche**

Luca Notari, Mariana Astudillo, Etienne Maffli

## Ringraziamenti

Ringraziamo vivamente sia i collaboratori e le collaboratrici che i pazienti delle istituzioni che hanno partecipato e che hanno gentilmente accettato di riempire i questionari del monitoraggio act-info. Ringraziamo ugualmente i collaboratori e le collaboratrici dei servizi di consultazione che hanno effettuato i lavori di logistica e di registrazione dei dati. I nostri migliori ringraziamenti vanno anche all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) che finanzia l'insieme della rete act-info. Grazie anche a Edith Bacher e Christiane Gmel per la grafica e l'impaginazione di questo rapporto come pure a Marina Delgrande Jordan per la sua preziosa collaborazione nell'elaborazione delle procedure d'analisi.

---

**Complementi d'informazione:** Etienne Maffli, tel. 021 321 29 54, fax 021 321 29 40,  
e-mail [emaffli@addiction-info.ch](mailto:emaffli@addiction-info.ch)

**Realizzazione:** Luca Notari, Mariana Astudillo & Etienne Maffli  
Dipendenze Info Svizzera

**Diffusione:** Ricerca, Dipendenze Info Svizzera, casella postale 870, 1001  
Losanna,  
tel. 021 321 29 46, fax 021 321 29 40,  
e-mail [ebacher@addiction-info.ch](mailto:ebacher@addiction-info.ch)

**Prezzo:** Fr. 10.–

**Lingua del testo originale :** tedesco

**Grafica/impaginazione:** Dipendenze Info Svizzera

**Copyright:** © Dipendenze Info Svizzera, Losanna 2011

**Citazione raccomandata:** Notari, L., Astudillo, M. & Maffli, E (2011). Intervento ambulatoriale nelle problematiche di dipendenza. Risultati dell'indagine presso gli utenti 2010 – Raccolta di tabelle statistiche. Losanna: Dipendenze Info Svizzera.

---

## Indice

<b>act-info –addiction care and therapy information .....</b>	<b>7</b>
<b>act-info nel settore ambulatoriale dell’aiuto psicosociale nel campo delle dipendenze .....</b>	<b>7</b>

### ENTRATA

T1	Sesso e età dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2010)
T2	Stato civile e nazionalità dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2010)
T3	Grado di urbanizzazione del domicilio, tipo di nucleo familiare e situazione di domicilio dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2010)
T4	Tipo di relazione di coppia, numero di figli, e numero di figli che vivono nel nucleo familiare all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2010)
T5	Più alta formazione portata a termine e statuto professionale dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2010)
T6	Fonte di reddito principale e attività dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2010)
T7	Reddito mensile netto e debiti dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2010)
T8	Incarcerazione o detenzione preventiva prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2010)
T9	Istanza d'invio principale e secondaria dei pazienti (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2010)
T10	Tipo di aiuto atteso dai pazienti (in rapporto al problema principale) e dai parenti o conoscenti all'entrata e base legale dell'intervento (2010)
T11	Trattamenti/accompagnamenti dei pazienti prima dell'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2010)
T12	Trattamento sostitutivo e altri interventi all'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2010)
T13a	Entrata in seguito a una cura di disintossicazione, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2010)
T13b	Frequenza delle cure di disintossicazione senza aiuto professionale prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2010)
T14	Problema principale all'entrata (solamente pazienti) (2010)
T15.1a	Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata (2010), uomini

- T15.1b Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata (2010), uomini
- T15.2a Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata (2010), donne
- T15.2b Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata (2010), donne
- T15.3a Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata (2010), uomini e donne
- T15.3b Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata (2010), uomini e donne
- T16.1a Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2010), uomini
- T16.1b Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2010), donne
- T16.1c Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2010), uomini e donne
- T16.2a Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2010), uomini
- T16.2b Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2010), donne
- T16.2c Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2010), uomini e donne
- T17 Modo di amministrazione della principale sostanza problematica nel corso dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata (2010)
- T18 Prevalenza a vita delle iniezioni, nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata, scambio di materiale d'iniezione nel corso degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata e età all'epoca della prima iniezione, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2010)
- T19.1a Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2010), uomini
- T19.1b Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2010), donne
- T19.1c Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2010), uomini e donne
- T19.2a Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2010), uomini
- T19.2b Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2010), donne

- T19.2c Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2010), uomini e donne
- T20 Frequenza del consumo di alcol, numero di "bicchieri standard" al giorno e frequenza di forti consumi di alcol prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti ) (2010)
- T21 Frequenza del consumo di tabacco e numero di sigarette al giorno nel corso dei 30 ultimi giorni prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2010)
- T22a Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2010), uomini
- T22b Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2010), donne
- T22c Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2010), uomini e donne
- T23a Problemi psichici nel corso della vita (2010), uomini
- T23b Problemi psichici nel corso della vita (2010), donne
- T23c Problemi psichici nel corso della vita (2010), uomini e donne
- T24 Parenti/conoscenti: legame tra l'utente e la persona sintomatica (2010)
- T25 Parenti/conoscenti: problema principale e altri problemi della persona sintomatica (2010)
- T26 Parenti/conoscenti: Problemi della persona di contatto legati ai problemi della persona sintomatica (2010)

## USCITA

- T27 Sesso e età dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2010)
- T28 Stato civile e grado di urbanizzazione del domicilio dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2010)
- T29 Tipo di nucleo familiare, situazione di domicilio e tipo di relazione di coppia dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2010)
- T30 Più alta formazione portata a termine, fonte di reddito principale e attività principale dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2010)
- T31 Statuto professionale e reddito mensile netto dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2010)
- T32a Ragione principale della fine del trattamento/accompagnamento dei pazienti (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2010)
- T32b Destinazione dei trasferimenti dei pazienti (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2010)
- T32c Causa di decesso dei pazienti (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2010)

- T33 Durata dell'intervento sui pazienti (in rapporto al problema principale) e sui parenti o conoscenti (2010)
- T34 Trattamento sostitutivo durante e immediatamente dopo l'intervento, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2010)
- T35 Postassistenza prevista e preparata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2010)
- T36 Problemi di dipendenza all'uscita, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2010)
- T37 Frequenza delle ricadute, sostanza o comportamento implicato e durata delle ricadute nel corso dell'intervento, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2010)
- T38 Frequenza del consumo di tabacco e numero di sigarette al giorno nel corso dei 30 giorni precedenti l'uscita, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2010)
- T39 Obiettivo di consumo all'uscita e pronostico, in rapporto alla principale sostanza problematica (solamente pazienti) (2010)

## Allegati

Dati di base delle istituzioni che non partecipano al monitoraggio *act-info*

- A1 Sesso e età all'entrata, in funzione del problema principale (2010)
- A2 Problema principale all'entrata (2010)

## **act-info - addiction care and therapy information**

La Rete di monitoraggio degli interventi e dei trattamenti delle dipendenze in Svizzera (*act-info*) raccoglie nel suo seno i cinque sistemi statistici che erano realizzati in materia di intervento e di trattamento della dipendenza in Svizzera. Tali sistemi sono:

- SAMBAD (Statistica del settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale in materia di dipendenza)
- Residalc (Statistica dei trattamenti residenziali della dipendenza all'alcol in Svizzera)
- FOS (Statistica della Lega per la valutazione dei trattamenti residenziali della tossicomania)
- HeGeBe (Statistica dei trattamenti con prescrizione di eroina)
- Metadone (Statistica nazionale dei trattamenti con prescrizione di metadone)

Dal 2004 queste cinque statistiche dispongono di strumenti armonizzati e ottimizzati. I dati comuni sono integrati in una banca dati centralizzata che permette di procedere ad analisi concernenti l'insieme dei settori. L'adozione degli standard europei (Treatment Demande Indicator) permette di garantire anche la comparabilità dei dati al livello internazionale.

*act-info* è finanziato dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e l'analisi e la raccolta dei dati nei differenti campi di trattamento sono affidate a Dipendenze Info Svizzera di Losanna e all'Istituto di ricerca sulla salute pubblica e sulle dipendenze affiliato all'Università di Zurigo (ISGF).

### **act-info nel settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale in materia di dipendenza (SAMBAD)**

Gli strumenti di monitoraggio *act-info* sono stati introdotti a partire dal 2004 nel settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale in materia di dipendenza e hanno rimpiazzato i vecchi questionari in vigore dal 1994. La realizzazione di *act-info* in questo settore è affidata a Dipendenze Info Svizzera.

La statistica *act-info* SAMBAD dà una visione dell'utenza e delle attività di aiuto ambulatoriale in materia di dipendenza in Svizzera. I dati sono raccolti all'inizio e alla fine dell'intervento. Le informazioni rilevate al momento dell'entrata permettono di valutare in particolare le caratteristiche socio-demografiche degli utenti, l'eventuale presenza di trattamenti precedenti, le modalità di consumo e la presenza di problemi psicosociali precedenti l'intervento. Le informazioni finali rilevate al termine dell'intervento evidenziano in particolare le caratteristiche socio-demografiche dell'utenza in quel preciso momento, le misure prese dalle persone curanti durante la presa in carico e le circostanze della fine di quest'ultima.

Nel 2010, 80 tra le 206 istituzioni registrate nel settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale in materia di dipendenza hanno partecipato al monitoraggio *act-info*. Queste istituzioni sono sia servizi deputati alla consultazione specialistica dei problemi inerenti all'alcol e/o alle droghe illegali, sia servizi polivalenti offrenti ugualmente un aiuto per i problemi di dipendenza.

## Qualche spiegazione riguardo alle tabelle

La presente statistica descrittiva dei dati dell'indagine act-info presso gli utenti del settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale in materia di dipendenza si basa su due tipi di tabelle:

- quando la domanda contiene delle categorie di risposte predefinite o ricodificate in parti distinte (per esempio « stato civile » o « età »), la tabella indica le percentuali delle differenti categorie di risposte
- quando la domanda non contiene delle categorie predefinite, ma richiede un valore numerico (per esempio « età all'inizio del consumo problematico »), la tabella presenta dei parametri di posizione (media, mediana) e dei parametri di dispersione (deviazione standard, 1° quartile, 3° quartile)

La maggior parte delle tabelle presenta i risultati in maniera distinta per i sottogruppi di pazienti che hanno menzionato l'**alcol**, un **oppiaceo** (eroina in particolare), la **cocaina** (e derivati) o la **canapa** come problema principale al momento dell'entrata. I **parenti o conoscenti** che consultano per i problemi di un terzo sono ugualmente oggetto di analisi separate per gli aspetti socio-demografici. Invece, gli utenti (poco numerosi) che hanno menzionato altre sostanze come problema principale (per esempio un stimolante o le sostanze volatili) o un problema di dipendenza non inerente a una sostanza (per esempio gioco patologico), non sono differenziati nei risultati (eccetto nei temi direttamente inerenti ai modi di consumo o alle forme di comportamenti additivi non inerenti alle sostanze). Queste persone sono tuttavia incluse nelle analisi relative all'insieme degli interventi che figurano nei blocchi a destra delle tabelle rispettive. Tutte le analisi sono effettuate separatamente per gli uomini, per le donne e per i sessi riuniti (nel caso in cui ci fossero persone il cui sesso non è conosciuto, queste saranno comprese nella colonna « Totale »).

Solo le risposte valide sono considerate nelle analisi. Cioè, le risposte « non noto » e le informazioni mancanti (missings) sono escluse dalle analisi. Il numero di risposte valide **N** rappresenta il numero esatto di casi sui quali sono calcolati le percentuali o altri parametri; esso viene indicato per ogni gruppo o sottogruppo. In basso alla tabella viene anche indicato il numero corrispondente di dati mancanti. La presenza di numerosi dati mancanti costringe a interpretare i risultati con particolare prudenza.

Le note in basso alla tabella danno informazioni sulle eventuali particolarità dei gruppi di riferimento e sul tipo di domanda. Quando sono possibili più risposte a una stessa domanda (per esempio nelle tabelle del tema T19, « altri problemi di dipendenza ») le percentuali ottenute non si possono addizionare.

Le istituzioni che non partecipano al monitoraggio act-info sono state invitate a fornire i dati di base (età, sesso e problema principale all'entrata). Tra queste istituzioni, 17 hanno risposto e i dati di 12 di queste si sono rivelati compatibili con la definizione del problema principale. I dati di queste 12 istituzioni sono stati analizzati separatamente e i risultati sono presenti in allegato.

## T1 Sesso e età dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2010)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Sesso*</b>																			
uomini			70.7			75.6			77.8			85.4			20.9			65.5	4'853
donne			29.3			24.4			22.2			14.6			79.0			34.5	2'552
sex non noto			0.0			0.0			0.0			0.0			0.1			0.0	1
<b>N**</b>	<b>2'772</b>	<b>1'148</b>	<b>3'920</b>	<b>476</b>	<b>154</b>	<b>630</b>	<b>224</b>	<b>64</b>	<b>288</b>	<b>879</b>	<b>150</b>	<b>1'029</b>	<b>209</b>	<b>788</b>	<b>998</b>	<b>4'853</b>	<b>2'552</b>	<b>7'406</b>	<b>7'406</b>
<b>Età (in anni)*</b>																			
fino a 14	0.4	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.3	9.0	10.0	9.1	2.4	1.3	1.5	2.3	1.5	2.0	149
15-19	3.2	2.3	2.9	2.5	9.1	4.1	4.5	14.1	6.6	58.4	50.0	57.1	11.0	4.3	5.7	14.4	7.9	12.2	898
20-24	5.2	3.7	4.8	8.4	21.4	11.6	13.4	37.5	18.8	13.4	14.7	13.6	4.8	4.7	4.7	7.7	7.2	7.5	554
25-29	8.2	5.5	7.4	20.4	16.2	19.4	25.0	25.0	25.0	8.8	9.3	8.8	5.7	6.9	6.6	10.6	7.8	9.6	711
30-34	10.2	7.4	9.4	18.1	11.0	16.4	21.4	7.8	18.4	4.4	4.7	4.5	8.6	9.4	9.3	10.3	8.1	9.6	706
35-39	11.5	9.9	11.0	20.2	12.3	18.3	14.7	3.1	12.2	2.8	1.3	2.6	7.2	9.9	9.4	10.8	9.4	10.3	759
40-44	14.3	16.4	14.9	16.4	18.2	16.9	13.8	3.1	11.5	1.1	5.3	1.7	11.5	13.8	13.3	11.7	14.1	12.5	924
45-49	13.8	16.0	14.4	7.8	7.8	7.8	4.9	4.7	4.9	1.4	2.0	1.5	10.0	19.6	17.6	10.0	14.9	11.7	863
50-54	12.6	16.8	13.8	4.8	2.6	4.3	2.2	1.6	2.1	0.6	1.3	0.7	13.4	12.5	12.7	8.7	12.5	10.0	740
55-59	9.9	9.7	9.9	1.1	0.6	1.0	0.0	1.6	0.3	0.1	1.3	0.3	11.0	9.1	9.5	6.5	7.8	6.9	513
60-64	5.4	5.3	5.3	0.2	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	4.6	4.5	3.4	4.2	3.7	270
65-69	3.0	4.9	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	1.8	2.3	2.0	3.0	2.3	171
70-74	1.7	1.3	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	1.5	1.8	1.2	1.3	1.2	89
75 e più	0.8	0.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.5	1.0	0.6	0.4	0.5	39
<b>N**</b>	<b>2'763</b>	<b>1'144</b>	<b>3'907</b>	<b>475</b>	<b>154</b>	<b>629</b>	<b>224</b>	<b>64</b>	<b>288</b>	<b>879</b>	<b>150</b>	<b>1'029</b>	<b>209</b>	<b>784</b>	<b>993</b>	<b>4'843</b>	<b>2'543</b>	<b>7'386</b>	<b>7'386</b>
<i>dati mancanti</i>	9	4	13	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	5	10	9	20	20
<b>Età</b>																			
media	43.7	45.8	44.3	35.3	32.7	34.6	32.4	26.8	31.2	20.5	22.4	20.8	43.1	43.2	43.2	37.5	41.5	38.8	
deviazione standard	13.3	12.4	13.1	8.8	10.1	9.2	8.1	8.7	8.5	7.3	9.7	7.7	16.6	13.0	13.9	14.9	14.3	14.8	
1° quartile	33.8	38.2	35.1	28.3	24.1	27.4	26.9	21.2	24.9	16.1	16.4	16.1	31.1	34.0	33.3	25.3	30.4	26.9	
mediana	43.9	46.4	44.8	35.0	31.4	34.5	31.2	24.8	29.6	17.5	18.0	17.5	44.5	44.9	44.9	37.2	43.0	39.4	
3° quartile	53.1	53.8	53.3	41.7	41.5	41.6	38.41	28.8	37.2	22.6	25.0	22.9	55.1	51.7	52.3	48.5	51.5	49.8	
<b>N**</b>	<b>2'763</b>	<b>1'144</b>	<b>3'907</b>	<b>475</b>	<b>154</b>	<b>629</b>	<b>224</b>	<b>64</b>	<b>288</b>	<b>879</b>	<b>150</b>	<b>1'029</b>	<b>209</b>	<b>784</b>	<b>993</b>	<b>4'843</b>	<b>2'543</b>	<b>7'386</b>	
<i>dati mancanti</i>	9	4	13	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	5	10	9	20	

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

## T2 Stato civile e nazionalità dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2010)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Stato civile*</b>																			
celibe/nubile	42.1	31.6	39.0	70.4	66.4	69.5	67.3	82.0	70.5	93.1	86.2	92.1	36.5	26.9	28.9	56.1	38.8	50.1	3'496
sposato-a	32.3	30.5	31.8	17.1	11.0	15.6	19.4	8.2	16.9	4.7	4.3	4.6	49.0	51.2	50.7	25.5	33.0	28.1	1'961
separato-a	5.7	6.3	5.9	2.9	6.2	3.7	4.6	4.9	4.7	0.5	2.9	0.8	4.7	4.6	4.6	4.3	5.3	4.6	322
divorziato-a	17.6	27.2	20.4	8.7	12.3	9.6	8.3	4.9	7.6	1.7	5.8	2.3	8.9	13.0	12.2	12.6	18.9	14.8	1'032
vedovo-a	1.6	4.0	2.3	0.0	2.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.1	0.5	3.5	2.9	1.0	3.4	1.8	126
unione registrata	0.6	0.5	0.6	0.9	2.1	1.2	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.5	0.8	0.7	0.5	0.6	0.5	38
<b>N**</b>	<b>2'618</b>	<b>1'100</b>	<b>3'718</b>	<b>450</b>	<b>146</b>	<b>596</b>	<b>217</b>	<b>61</b>	<b>278</b>	<b>815</b>	<b>138</b>	<b>953</b>	<b>192</b>	<b>744</b>	<b>937</b>	<b>4'559</b>	<b>2'415</b>	<b>6'975</b>	<b>6'975</b>
<i>dati mancanti</i>	154	48	202	26	8	34	7	3	10	64	12	76	17	44	61	294	137	431	431
<b>Nazionalità*</b>																			
CH	80.3	84.9	81.7	70.4	83.5	73.7	63.5	86.5	68.4	85.5	91.7	86.4	85.7	89.0	88.3	79.5	86.5	81.9	5'394
EU	13.3	10.6	12.5	20.8	14.2	19.2	19.8	9.6	17.6	6.8	4.5	6.5	10.1	6.5	7.2	13.1	8.9	11.6	767
altra	6.4	4.5	5.9	8.7	2.4	7.1	16.7	3.8	13.9	7.6	3.8	7.1	4.2	4.5	4.4	7.4	4.6	6.4	424
<b>N**</b>	<b>2'505</b>	<b>1'033</b>	<b>3'538</b>	<b>379</b>	<b>127</b>	<b>506</b>	<b>192</b>	<b>52</b>	<b>244</b>	<b>774</b>	<b>133</b>	<b>907</b>	<b>189</b>	<b>712</b>	<b>901</b>	<b>4'305</b>	<b>2'280</b>	<b>6'585</b>	<b>6'585</b>
<i>dati mancanti</i>	267	115	382	97	27	124	32	12	44	105	17	122	20	76	97	548	272	821	821

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

## T3 Grado di urbanizzazione del domicilio, tipo di nucleo familiare e situazione di domicilio dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2010)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Grado di urbanizzazione*</b>																			
grandi centri urbani	6.3	9.5	7.3	5.1	0.7	4.0	2.3	4.8	2.9	0.7	0.7	0.7	6.5	8.4	8.0	4.6	7.1	5.5	391
periferia dei grandi centri	16.3	16.3	16.3	5.5	9.5	6.5	12.5	12.7	12.5	7.4	6.0	7.2	16.6	12.6	13.4	12.9	13.0	12.9	919
città di media importanza	15.3	14.5	15.1	22.7	25.7	23.5	20.8	22.2	21.1	25.6	30.7	26.3	18.1	17.4	17.5	18.9	18.4	18.7	1'331
piccole città	33.1	31.5	32.6	40.6	40.5	40.6	42.1	47.6	43.4	34.1	31.3	33.7	33.2	35.5	35.0	35.1	34.5	34.9	2'483
campagne	28.9	28.2	28.7	26.0	23.6	25.5	22.2	12.7	20.1	32.2	31.3	32.1	25.6	26.2	26.1	28.6	27.1	28.1	1'998
<b>N**</b>	<b>2'653</b>	<b>1'096</b>	<b>3'749</b>	<b>453</b>	<b>148</b>	<b>601</b>	<b>216</b>	<b>63</b>	<b>279</b>	<b>864</b>	<b>150</b>	<b>1'014</b>	<b>199</b>	<b>753</b>	<b>952</b>	<b>4'670</b>	<b>2'452</b>	<b>7'122</b>	<b>7'122</b>
dati mancanti	119	52	171	23	6	29	8	1	9	15	0	15	10	35	46	183	100	284	284
<b>Tipo di nucleo familiare (30 ultimi giorni)*</b>																			
da solo-a	37.9	35.0	37.0	36.7	34.1	36.0	28.0	28.3	28.0	10.1	12.9	10.5	15.4	12.4	12.9	30.2	25.5	28.6	1'646
con i genitori/un genitore	8.1	3.5	6.7	13.2	18.6	14.5	19.9	32.1	22.6	67.2	47.1	64.1	16.9	7.3	9.1	22.5	11.5	18.7	1'077
con figlio-a-i (senza partner)	1.8	12.2	4.9	2.1	8.5	3.7	1.1	1.9	1.3	0.4	5.7	1.2	6.2	14.5	12.9	1.6	11.4	5.0	288
con un-a partner (senza figli)	24.7	26.1	25.1	13.2	20.9	15.1	16.1	11.3	15.1	5.5	10.0	6.2	21.5	23.4	23.0	18.6	23.1	20.1	1'157
con un-a partner e figlio-a-i	18.5	16.4	17.8	11.6	3.9	9.7	16.1	0.0	12.6	3.9	5.7	4.2	32.3	40.4	38.8	15.1	21.0	17.1	984
con altri parenti/familiari	1.4	1.1	1.3	3.4	0.0	2.5	2.7	1.9	2.5	2.6	0.0	2.1	2.3	0.9	1.2	1.9	1.0	1.6	91
con amici (comunità abitativa)	2.4	1.5	2.1	3.6	3.9	3.7	5.4	9.4	6.3	2.8	5.0	3.2	0.0	0.5	0.4	2.7	2.0	2.5	142
altro	5.3	4.2	5.0	16.3	10.1	14.7	10.8	15.1	11.7	7.5	13.6	8.5	5.4	0.7	1.6	7.4	4.5	6.4	370
<b>N**</b>	<b>2'097</b>	<b>895</b>	<b>2'992</b>	<b>387</b>	<b>129</b>	<b>516</b>	<b>186</b>	<b>53</b>	<b>239</b>	<b>745</b>	<b>140</b>	<b>885</b>	<b>130</b>	<b>565</b>	<b>695</b>	<b>3'773</b>	<b>1'982</b>	<b>5'755</b>	<b>5'755</b>
dati mancanti	675	253	928	89	25	114	38	11	49	134	10	144	79	223	303	1'080	570	1'651	1'651
<b>Situazione di domicilio (30 ultimi giorni)*</b>																			
domicilio fisso	93.1	93.2	93.1	83.4	87.2	84.3	89.0	90.5	89.3	91.6	96.0	92.3	93.1	95.6	95.1	91.5	93.9	92.4	4'926
senza domicilio fisso	4.7	4.7	4.7	13.2	10.1	12.4	5.5	9.5	6.3	5.4	3.2	5.1	6.2	4.4	4.8	5.8	4.8	5.5	291
istituzione	2.2	2.2	2.2	3.4	2.8	3.3	5.5	0.0	4.4	3.0	0.8	2.7	0.8	0.0	0.1	2.6	1.4	2.2	117
<b>N**</b>	<b>1'996</b>	<b>834</b>	<b>2'830</b>	<b>319</b>	<b>109</b>	<b>428</b>	<b>163</b>	<b>42</b>	<b>205</b>	<b>667</b>	<b>125</b>	<b>792</b>	<b>130</b>	<b>543</b>	<b>673</b>	<b>3'488</b>	<b>1'846</b>	<b>5'334</b>	<b>5'334</b>
dati mancanti	776	314	1090	157	45	202	61	22	83	212	25	237	79	245	325	1365	706	2072	2'072

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

## T4 Tipo di relazione di coppia, numero di figli, di figli vivendo nel nucleo familiare dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2010)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Tipo di relazione di coppia*</b>																			
senza partner, sola-a	32.0	31.3	31.8	42.7	37.2	41.3	34.3	41.7	35.8	67.4	51.0	64.6	23.8	15.7	17.2	39.2	29.7	35.8	1'565
relazione-i saltuarie-e	4.1	5.5	4.5	6.7	9.6	7.5	10.5	22.2	12.8	8.1	8.3	8.1	1.9	1.3	1.4	5.5	4.8	5.3	230
relazione fissa, vivendo separato-a	12.7	15.1	13.4	16.5	25.5	18.8	18.9	22.2	19.6	12.1	22.9	13.9	11.4	11.7	11.6	13.3	14.6	13.8	603
relazione fissa, vivendo insieme	51.3	48.1	50.3	34.1	27.7	32.4	36.4	13.9	31.8	12.5	17.7	13.3	62.9	71.3	69.8	41.9	50.9	45.2	1'976
<b>N**</b>	<b>1'649</b>	<b>715</b>	<b>2'364</b>	<b>267</b>	<b>94</b>	<b>361</b>	<b>143</b>	<b>36</b>	<b>179</b>	<b>481</b>	<b>96</b>	<b>577</b>	<b>105</b>	<b>471</b>	<b>576</b>	<b>2'801</b>	<b>1'573</b>	<b>4'374</b>	<b>4'374</b>
<i>dati mancanti</i>	1'123	433	1'556	209	60	269	81	28	109	398	54	452	104	317	422	2'052	979	3'032	3'032
<b>Numero di figli*</b>																			
nessuno	41.3	35.4	39.5	61.3	50.9	58.7	64.4	66.0	64.8	90.2	81.0	88.8	37.8	22.9	25.6	54.3	38.0	48.4	2'654
1 figlio	18.7	23.3	20.1	24.0	26.7	24.7	17.8	22.0	18.8	5.4	8.3	5.9	14.8	19.0	18.2	16.4	20.7	18.0	985
2 figli	26.9	28.7	27.5	9.5	18.1	11.7	11.0	6.0	9.9	2.5	6.6	3.1	32.6	36.8	36.1	19.6	27.4	22.5	1'232
3 figli o più	13.1	12.6	13.0	5.2	4.3	5.0	6.7	6.0	6.6	1.9	4.1	2.2	14.8	21.3	20.1	9.7	13.9	11.2	616
<b>N**</b>	<b>2'001</b>	<b>902</b>	<b>2'903</b>	<b>346</b>	<b>116</b>	<b>462</b>	<b>163</b>	<b>50</b>	<b>213</b>	<b>646</b>	<b>121</b>	<b>767</b>	<b>135</b>	<b>611</b>	<b>746</b>	<b>3'493</b>	<b>1'994</b>	<b>5'487</b>	<b>5'487</b>
<i>dati mancanti</i>	771	246	1'017	130	38	168	61	14	75	233	29	262	74	177	252	1'360	558	1'919	1'919
<b>Numero dei figli vivendo nel nucleo familiare*</b>																			
nessuno	71.8	61.9	68.8	77.6	72.0	76.3	73.3	86.1	76.0	60.4	65.1	61.1	51.3	35.5	38.2	69.1	54.9	63.9	3'005
1 figlio	10.5	18.8	13.1	13.6	15.1	14.0	13.0	13.9	13.2	10.5	11.3	10.6	17.9	22.9	22.0	11.3	18.9	14.1	662
2 figli	12.4	15.2	13.2	6.6	9.7	7.4	11.5	0.0	9.0	19.2	17.0	18.9	23.9	29.6	28.6	13.5	19.1	15.5	731
3 figli o più	5.3	4.0	4.9	2.1	3.2	2.4	2.3	0.0	1.8	9.9	6.6	9.4	6.8	12.0	11.1	6.1	7.1	6.4	303
<b>N**</b>	<b>1'683</b>	<b>749</b>	<b>2'432</b>	<b>286</b>	<b>93</b>	<b>379</b>	<b>131</b>	<b>36</b>	<b>167</b>	<b>593</b>	<b>106</b>	<b>699</b>	<b>117</b>	<b>550</b>	<b>667</b>	<b>2'992</b>	<b>1'709</b>	<b>4'701</b>	<b>4'701</b>
<i>dati mancanti</i>	1'089	399	1'488	190	61	251	93	28	121	286	44	330	92	238	331	1'861	843	2'705	2'705

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

## T5 Più alta formazione portata a termine e statuto professionale dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2010)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Più alta formazione portata a termine*</b>																			
nessuna formazione terminata	5.0	5.1	5.0	14.4	15.6	14.7	7.6	2.5	6.6	21.8	24.0	22.1	7.6	4.8	5.4	9.5	7.8	9.0	482
scuola dell'obbligo	12.2	14.6	12.9	26.3	40.6	29.8	19.8	47.5	25.0	48.7	47.0	48.5	16.0	13.8	14.2	21.4	20.1	21.0	1'129
scolarità complementare	3.3	6.1	4.1	2.3	3.9	2.7	1.7	0.0	1.4	3.2	4.0	3.3	0.8	4.6	3.8	3.0	5.3	3.7	201
apprendistato/ scuola profes.	59.6	52.9	57.7	50.1	33.6	46.1	57.6	42.5	54.7	22.4	20.0	22.1	42.9	53.6	51.4	50.6	47.7	49.7	2'673
liceo/diploma	3.7	4.4	3.9	2.5	3.9	2.9	3.5	5.0	3.8	2.4	3.0	2.5	5.0	5.7	5.6	3.4	4.9	3.9	209
magistrale, scuola pedagogica	0.9	2.8	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.8	3.9	3.3	0.6	2.6	1.2	66
form. profession. superiore	6.7	7.5	6.9	1.8	1.6	1.7	5.2	2.5	4.7	1.1	0.0	1.0	17.6	5.7	8.2	5.4	5.7	5.5	297
scuola profession. superiore	1.9	1.1	1.7	1.0	0.8	1.0	3.5	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.8	1.3	1.2	1.4	1.0	1.3	69
alta scuola specializzata	1.9	1.2	1.7	0.3	0.0	0.2	0.6	0.0	0.5	0.2	2.0	0.4	1.7	1.1	1.2	1.3	1.0	1.2	65
università, politecnico	4.8	4.2	4.6	1.3	0.0	1.0	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	6.7	5.5	5.7	3.4	3.9	3.5	191
<b>N**</b>	<b>2'090</b>	<b>848</b>	<b>2'938</b>	<b>395</b>	<b>128</b>	<b>523</b>	<b>172</b>	<b>40</b>	<b>212</b>	<b>620</b>	<b>100</b>	<b>720</b>	<b>119</b>	<b>457</b>	<b>576</b>	<b>3'624</b>	<b>1'758</b>	<b>5'382</b>	<b>5'382</b>
<i>dati mancanti</i>	682	300	982	81	26	107	52	24	76	259	50	309	90	331	422	1'229	794	2'024	2'024
<b>Statuto professionale*</b>																			
senza attività professionale	29.8	44.9	34.2	52.1	60.0	54.1	26.4	50.0	29.0	25.5	37.0	26.7	38.1	28.0	29.8	31.3	40.2	34.1	872
apprendista, praticante	2.7	0.2	2.0	2.3	4.0	2.8	1.8	0.0	1.6	29.3	22.2	28.6	4.8	1.6	2.1	6.5	2.5	5.2	134
manovale, operaio-a ausiliare	3.3	4.2	3.6	4.7	6.7	5.2	6.4	0.0	5.6	3.8	0.0	3.4	0.0	5.2	4.3	3.8	4.3	4.0	102
operaio-a con formaz. pratica	4.9	6.3	5.3	9.8	5.3	8.6	6.4	0.0	5.6	0.8	0.0	0.8	4.8	4.7	4.7	5.2	5.2	5.2	133
oper. con formaz. certif. (AFC)	16.1	7.0	13.4	14.0	5.3	11.7	20.9	0.0	18.5	7.9	7.4	7.9	0.0	9.8	8.1	14.8	7.9	12.6	323
caposquadra	3.0	0.2	2.2	2.3	0.0	1.7	3.6	0.0	3.2	0.4	0.0	0.4	4.8	0.5	1.3	2.6	0.4	1.9	49
impiegato-a non qualificato-a	14.3	21.4	16.4	4.7	13.3	6.9	13.6	35.7	16.1	3.3	3.7	3.4	4.8	27.5	23.4	11.2	20.7	14.2	363
impieg. qualif., quadro medio	9.5	6.3	8.6	3.3	1.3	2.8	10.0	0.0	8.9	2.1	0.0	1.9	19.0	10.9	12.3	7.7	6.5	7.3	187
imp. funz. dirett., quadr. sup.	3.0	1.4	2.6	0.9	1.3	1.0	2.7	0.0	2.4	0.4	0.0	0.4	7.1	4.1	4.7	2.4	2.0	2.3	58
indipendente	10.5	5.8	9.1	3.7	1.3	3.1	4.5	0.0	4.0	2.1	0.0	1.9	14.3	5.2	6.8	8.0	4.8	7.0	178
scolaro-a, studente	1.7	1.4	1.6	1.9	0.0	1.4	1.8	14.3	3.2	23.8	29.6	24.4	2.4	1.6	1.7	5.4	4.4	5.1	131
altro statuto	1.1	0.9	1.1	0.5	1.3	0.7	1.8	0.0	1.6	0.4	0.0	0.4	0.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	25
<b>N**</b>	<b>1'050</b>	<b>430</b>	<b>1'480</b>	<b>215</b>	<b>75</b>	<b>290</b>	<b>110</b>	<b>14</b>	<b>124</b>	<b>239</b>	<b>27</b>	<b>266</b>	<b>42</b>	<b>193</b>	<b>235</b>	<b>1'745</b>	<b>810</b>	<b>2'555</b>	<b>2'555</b>
<i>dati mancanti</i>	1'722	718	2'440	261	79	340	114	50	164	640	123	763	167	595	763	3'108	1'742	4'851	4'851

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

## T6 Fonte di reddito principale e attività dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2010)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Fonte di reddito principale (nel corso dei 30 ultimi giorni)*</b>																			
reddito da lavoro	55.5	38.5	50.4	32.5	19.5	29.3	59.5	28.3	52.9	25.4	25.9	25.5	66.7	60.8	62.0	47.6	42.3	45.8	3'021
risparmi	1.4	1.8	1.5	1.3	0.0	1.0	1.4	3.3	1.8	1.0	0.0	0.8	0.6	0.5	0.5	1.3	1.1	1.2	79
rendita (AVS/AI, ecc.)	14.0	20.8	16.0	15.8	20.8	17.1	4.5	11.7	6.1	2.1	4.9	2.5	10.5	9.1	9.4	11.1	15.7	12.7	837
assistenza/previdenza sociale	14.1	13.2	13.8	34.5	38.9	35.6	15.9	31.7	19.3	9.4	11.2	9.6	4.9	2.5	3.0	14.7	11.7	13.7	903
assicurazione disoccupazione	9.2	6.7	8.5	8.7	6.7	8.2	9.1	8.3	8.9	2.7	2.8	2.7	4.3	1.7	2.3	7.6	4.7	6.6	436
sostegno del/della partner	1.5	14.0	5.2	1.6	4.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.7	3.5	1.1	1.2	20.6	16.7	1.3	13.9	5.5	366
sosteg. genitori/familiari/amici	3.3	2.8	3.2	3.3	6.0	4.0	6.4	15.0	8.2	57.7	49.7	56.5	11.1	4.1	5.5	15.1	9.0	13.0	859
spacciando/tagliando	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.7	0.9	0.0	0.7	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	9
altre entrate illegali	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	7
prostituzione	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
altra-e	1.0	2.2	1.3	0.9	3.4	1.5	2.3	1.7	2.1	0.7	1.4	0.8	0.6	0.5	0.5	1.0	1.6	1.2	81
<b>N**</b>	<b>2'434</b>	<b>1'019</b>	<b>3'453</b>	<b>449</b>	<b>149</b>	<b>598</b>	<b>220</b>	<b>60</b>	<b>280</b>	<b>823</b>	<b>143</b>	<b>966</b>	<b>162</b>	<b>636</b>	<b>798</b>	<b>4'357</b>	<b>2'241</b>	<b>6'598</b>	<b>6'598</b>
<i>dati mancanti</i>	338	129	467	27	5	32	4	4	8	56	7	63	47	152	200	496	311	808	808
<b>Attività principale (nel corso dei 30 ultimi giorni)*</b>																			
att. a tempo pieno (70% o più)	50.6	26.6	43.5	28.2	13.0	24.4	53.0	21.3	46.0	19.0	13.5	18.2	62.6	37.3	42.6	42.4	27.0	37.3	2'371
attività a tempo parziale	4.6	17.6	8.4	3.6	8.2	4.7	6.5	6.6	6.5	1.5	7.1	2.3	2.0	29.4	23.7	3.8	18.6	8.8	557
varie attività occas.	0.9	1.2	1.0	2.3	0.7	1.9	0.9	0.0	0.7	1.0	0.0	0.8	0.0	1.8	1.4	1.1	1.1	1.1	69
in formazione	3.6	1.9	3.1	2.7	4.1	3.1	3.7	9.8	5.0	57.0	50.4	56.0	10.2	4.6	5.8	14.9	8.9	12.9	821
inattivo sul mercat. del lavoro	17.3	31.6	21.5	26.4	36.3	28.8	12.9	14.8	13.3	4.7	11.3	5.7	10.9	21.8	19.5	15.1	26.9	19.0	1'211
disoccup., ricerc. di un lavoro	15.3	14.4	15.0	21.6	19.2	21.0	16.6	26.2	18.7	10.6	6.4	9.9	9.5	3.4	4.6	14.7	10.8	13.4	852
disoccup., lav. futuro garantito	0.4	0.6	0.5	0.5	1.4	0.7	0.9	0.0	0.7	0.6	2.1	0.8	0.7	0.0	0.1	0.5	0.6	0.5	32
altra	7.3	6.1	7.0	14.9	17.1	15.4	5.5	21.3	9.0	5.7	9.2	6.2	4.1	1.8	2.2	7.5	6.1	7.0	445
<b>N**</b>	<b>2'347</b>	<b>982</b>	<b>3'329</b>	<b>444</b>	<b>146</b>	<b>590</b>	<b>217</b>	<b>61</b>	<b>278</b>	<b>814</b>	<b>141</b>	<b>955</b>	<b>147</b>	<b>565</b>	<b>712</b>	<b>4'231</b>	<b>2'127</b>	<b>6'358</b>	<b>6'358</b>
<i>dati mancanti</i>	425	166	591	32	8	40	7	3	10	65	9	74	62	223	286	622	425	1'048	1'048

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

## T7 Reddito mensile netto e debiti dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2010)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi				N
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale		
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale								
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
<b>Reddito mensile netto (6 ultimi mesi)*</b>																				
nessun reddito	24.8	36.4	27.9	27.3	30.0	27.9	12.1	37.5	14.9	48.9	56.3	50.0	44.4	20.2	24.5	29.3	33.9	30.6	484	
fino a 1000 fr.	4.3	5.0	4.5	9.7	14.0	10.7	12.1	0.0	10.8	24.7	25.0	24.8	5.6	7.1	6.9	9.0	8.1	8.7	138	
da 1001 a 2000 fr.	6.7	10.9	7.8	21.8	32.0	24.2	9.1	12.5	9.5	5.3	6.3	5.4	0.0	11.9	9.8	8.3	12.6	9.5	151	
da 2001 a 3000 fr.	9.6	17.6	11.8	14.5	20.0	15.8	12.1	25.0	13.5	4.7	6.3	5.0	5.6	16.7	14.7	9.8	17.1	11.9	188	
da 3001 a 4000 fr.	12.4	10.9	12.0	10.3	4.0	8.8	22.7	12.5	21.6	8.4	0.0	7.2	5.6	13.1	11.8	12.0	10.1	11.5	182	
da 4001 a 5000 fr.	17.5	6.7	14.6	8.5	0.0	6.5	16.7	12.5	16.2	5.3	0.0	4.5	22.2	6.0	8.8	14.0	4.9	11.4	181	
da 5001 a 6000 fr.	11.3	7.9	10.4	4.8	0.0	3.7	10.6	0.0	9.5	1.6	6.3	2.3	5.6	14.3	12.7	8.4	8.1	8.3	132	
da 6001 a 8000 fr.	9.3	3.8	7.8	1.2	0.0	0.9	3.0	0.0	2.7	1.1	0.0	0.9	11.1	9.5	9.8	6.2	4.0	5.6	89	
da 8001 a 10 000 fr.	2.0	0.4	1.6	1.2	0.0	0.9	1.5	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.0	1.6	0.7	1.3	21	
da 10 001 a 15 000 fr.	1.4	0.4	1.1	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.2	0.7	11	
più di 15 000 fr.	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.4	6	
<b>N**</b>	<b>646</b>	<b>239</b>	<b>885</b>	<b>165</b>	<b>50</b>	<b>215</b>	<b>66</b>	<b>8</b>	<b>74</b>	<b>190</b>	<b>32</b>	<b>222</b>	<b>18</b>	<b>84</b>	<b>102</b>	<b>1'138</b>	<b>445</b>	<b>1'583</b>	<b>1'583</b>	
<i>dati mancanti</i>	2'126	909	3'035	311	104	415	158	56	214	689	118	807	191	704	896	3'715	2'107	5'823	5'823	
<b>Debiti*</b>																				
nessun debito	64.0	81.8	69.1	34.9	50.0	38.7	49.6	51.4	50.0	85.2	84.3	85.1	79.2	90.4	88.3	65.5	79.6	69.7	2'082	
fino a 5000 fr.	5.3	2.7	4.6	11.1	8.8	10.5	7.0	14.3	8.5	4.9	5.6	5.0	0.0	1.4	1.2	6.0	3.8	5.4	160	
da 5001 a 10 000 fr.	6.2	4.0	5.6	10.2	15.0	11.4	13.2	8.6	12.2	2.8	4.5	3.1	6.3	3.8	4.3	6.2	5.3	5.9	177	
da 10 001 a 25 000 fr.	8.6	5.5	7.7	20.0	11.3	17.8	15.5	11.4	14.6	3.2	3.4	3.2	6.3	1.9	2.7	8.8	5.1	7.7	230	
da 25 001 a 50 000 fr.	6.4	3.0	5.4	11.5	10.0	11.1	8.5	11.4	9.1	2.7	1.1	2.4	4.2	1.0	1.6	6.0	3.5	5.3	157	
da 50 001 a 100 000 fr.	4.3	1.2	3.4	6.8	5.0	6.3	4.7	2.9	4.3	0.9	1.1	1.0	4.2	0.5	1.2	3.9	1.6	3.2	95	
più di 100 000 fr.	5.2	1.7	4.2	5.5	0.0	4.1	1.6	0.0	1.2	0.2	0.0	0.2	0.0	1.0	0.8	3.5	1.2	2.8	85	
<b>N**</b>	<b>1'020</b>	<b>402</b>	<b>1'422</b>	<b>235</b>	<b>80</b>	<b>315</b>	<b>129</b>	<b>35</b>	<b>164</b>	<b>527</b>	<b>89</b>	<b>616</b>	<b>48</b>	<b>209</b>	<b>257</b>	<b>2'091</b>	<b>895</b>	<b>2'986</b>	<b>2'986</b>	
<i>dati mancanti</i>	1'752	746	2'498	241	74	315	95	29	124	352	61	413	161	579	741	2'762	1'657	4'420	4'420	

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

## T8 Incarcerazione o detenzione preventiva prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2010)

	Pazienti: problema principale												Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Incarcerazione o detenzione preventiva*</b>																
nessuna	86.3	97.2	89.5	48.2	72.7	54.3	53.9	100.0	59.3	87.8	90.5	88.1	80.0	94.4	83.8	1'538
in prigione	6.4	1.4	5.0	23.2	16.4	21.5	19.7	0.0	17.4	5.3	9.5	5.7	9.0	3.3	7.5	138
in detenzione preventiva	4.8	0.8	3.7	12.2	9.1	11.4	15.8	0.0	14.0	3.2	0.0	2.9	6.0	1.7	4.9	90
in prigione e in detenzione preventiva	2.4	0.6	1.9	16.5	1.8	12.8	10.5	0.0	9.3	3.7	0.0	3.3	4.9	0.6	3.8	70
<b>N**</b>	<b>869</b>	<b>355</b>	<b>1'224</b>	<b>164</b>	<b>55</b>	<b>219</b>	<b>76</b>	<b>10</b>	<b>86</b>	<b>189</b>	<b>21</b>	<b>210</b>	<b>1'358</b>	<b>478</b>	<b>1'836</b>	<b>1'836</b>
<i>dati mancanti</i>	1'903	793	2'696	312	99	411	148	54	202	690	129	819	3'286	1'286	4'572	4'572
<b>Durata totale di detenzione***</b>																
fino a 1 mese	25.9	25.0	25.8	29.0	33.3	29.6	16.0	.	16.0	50.0	50.0	50.0	28.1	31.8	28.4	62
> 1 a 2 mesi	18.5	25.0	19.1	8.7	16.7	9.9	4.0	.	4.0	6.3	50.0	11.1	11.7	22.7	12.8	28
> 2 a 6 mesi	33.3	12.5	31.5	26.1	25.0	25.9	28.0	.	28.0	25.0	0.0	22.2	29.1	18.2	28.0	60
> 6 a 12 mesi	7.4	12.5	7.9	10.1	16.7	11.1	16.0	.	16.0	6.3	0.0	5.6	9.2	13.6	9.6	21
più di un anno	14.8	25.0	15.7	26.1	8.3	23.5	36.0	.	36.0	12.5	0.0	11.1	21.9	13.6	21.1	46
<b>N**</b>	<b>80</b>	<b>8</b>	<b>88</b>	<b>69</b>	<b>12</b>	<b>81</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>195</b>	<b>22</b>	<b>217</b>	<b>217</b>
<i>dati mancanti</i>	39	2	41	16	3	19	10	0	10	7	0	7	76	5	81	81

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti che hanno vissuto un'esperienza di detenzione. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

## T9 Istanza d'invio principale e secondaria dei pazienti (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2010)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			N
	Alcol			Oppiacei			Coacaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Istanza d'invio principale*</b>																			
propria iniziativa	31.5	39.2	33.8	45.0	44.3	44.8	36.2	34.9	35.9	18.3	28.7	19.8	62.4	73.6	71.3	32.5	49.8	38.5	2'685
coniuge/partner	4.7	2.8	4.1	3.4	3.4	3.4	2.7	1.6	2.5	1.8	1.4	1.7	4.3	2.1	2.5	4.0	2.5	3.5	245
famiglia	3.7	4.3	3.9	2.4	5.4	3.1	8.1	14.3	9.5	10.0	7.7	9.7	9.1	4.0	5.1	5.6	5.2	5.5	381
amici/collegghi/conoscenti	1.5	3.0	1.9	1.7	5.4	2.6	5.4	7.9	6.0	0.8	1.4	0.9	1.1	5.1	4.3	1.5	3.8	2.3	163
istituto ambulatoriale specializ.	1.5	3.3	2.1	4.1	4.7	4.2	0.9	4.8	1.8	0.8	2.1	1.0	4.3	1.7	2.2	1.7	2.6	2.0	142
istituto residenziale specializ.	5.7	5.6	5.6	6.2	2.7	5.4	4.1	4.8	4.2	0.7	2.1	0.9	1.1	0.3	0.4	4.3	3.1	3.9	271
studio medico	8.5	11.2	9.3	9.4	10.1	9.6	3.6	6.3	4.2	2.1	2.8	2.2	1.6	4.4	3.9	6.6	8.0	7.1	494
ospedale/clinica	13.3	15.2	13.9	3.9	8.1	4.9	6.3	6.3	6.3	1.9	4.2	2.2	0.0	1.4	1.1	8.8	9.0	8.9	618
servizi sociali	5.9	5.5	5.8	6.4	6.7	6.5	3.2	6.3	3.9	4.0	3.5	3.9	6.5	4.0	4.5	5.4	5.0	5.3	368
prov. penale/amministrativo	16.0	4.3	12.5	13.3	6.0	11.5	22.2	3.2	18.0	50.4	32.9	47.9	2.7	0.7	1.1	21.3	4.9	15.7	1'096
datore di lavoro	4.3	2.0	3.7	1.5	0.7	1.3	0.0	0.0	0.0	2.1	2.1	2.1	3.2	0.6	1.1	3.2	1.4	2.6	181
insegnante	0.0	0.2	0.1	0.4	0.7	0.5	0.0	0.0	0.0	2.1	4.9	2.5	0.5	0.6	0.6	0.7	1.2	0.9	62
altra	3.4	3.6	3.5	2.4	2.0	2.3	7.2	9.5	7.7	4.9	6.3	5.1	3.2	1.7	2.0	4.1	3.4	3.9	272
<b>N**</b>	<b>2'575</b>	<b>1'081</b>	<b>3'656</b>	<b>467</b>	<b>149</b>	<b>616</b>	<b>221</b>	<b>63</b>	<b>284</b>	<b>851</b>	<b>143</b>	<b>994</b>	<b>186</b>	<b>723</b>	<b>909</b>	<b>4'582</b>	<b>2'396</b>	<b>6'978</b>	<b>6'978</b>
<i>dati mancanti</i>	197	67	264	9	5	14	3	1	4	28	7	35	23	65	89	271	156	428	428
<b>Istanza d'invio secondaria***</b>																			
propria iniziativa	25.4	23.3	24.9	21.3	18.3	20.6	26.8	26.1	26.7	13.4	24.4	14.9	6.5	10.9	10.0	22.3	19.6	21.5	658
coniuge/partner	10.6	5.6	9.2	7.4	5.6	7.0	6.3	0.0	5.2	4.7	4.4	4.7	11.3	3.4	4.9	8.9	4.8	7.6	234
famiglia	3.9	8.0	5.0	6.6	11.3	7.6	8.9	8.7	8.9	8.3	8.9	8.4	11.3	4.1	5.5	5.5	7.1	6.0	183
amici/collegghi/conoscenti	1.9	1.8	1.8	2.9	4.2	3.2	2.7	13.0	4.4	0.4	6.7	1.2	3.2	4.9	4.6	1.8	3.3	2.3	70
istituto ambulatoriale specializ.	1.5	1.6	1.5	2.9	4.2	3.2	1.8	0.0	1.5	0.4	0.0	0.3	1.6	1.1	1.2	1.4	1.6	1.5	46
istituto residenziale specializ.	1.9	3.0	2.2	2.5	7.0	3.5	0.0	4.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	2.3	1.7	52
studio medico	4.1	5.2	4.4	9.8	9.9	9.8	8.0	4.3	7.4	1.8	4.4	2.2	6.5	1.5	2.4	4.7	4.5	4.6	142
ospedale/clinica	3.6	6.4	4.4	3.3	1.4	2.9	3.6	4.3	3.7	1.1	0.0	0.9	3.2	0.4	0.9	3.2	3.8	3.4	104
servizi sociali	2.3	2.0	2.2	2.9	2.8	2.9	3.6	0.0	3.0	2.2	0.0	1.9	1.6	1.1	1.2	2.5	1.8	2.3	70
prov. penale/amministrativo	3.6	1.8	3.1	3.3	1.4	2.9	6.3	4.3	5.9	1.4	0.0	1.2	1.6	0.4	0.6	3.2	1.2	2.6	79
datore di lavoro	2.8	1.2	2.4	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.4	0.3	1.8	0.8	1.5	46
insegnante	0.2	0.2	0.2	0.4	0.0	0.3	0.0	4.3	0.7	0.7	0.0	0.6	1.6	1.1	1.2	0.3	0.7	0.5	14
altra	2.4	2.6	2.5	4.1	4.2	4.1	2.7	0.0	2.2	5.4	4.4	5.3	4.8	1.5	2.1	3.3	2.7	3.1	94
nessuna	43.7	44.3	43.8	41.4	36.6	40.3	45.5	34.8	43.7	63.5	48.9	61.5	51.6	70.8	67.2	47.0	50.9	48.3	1'478
<b>N**</b>	<b>1'289</b>	<b>497</b>	<b>1'786</b>	<b>244</b>	<b>71</b>	<b>315</b>	<b>112</b>	<b>23</b>	<b>135</b>	<b>277</b>	<b>45</b>	<b>322</b>	<b>62</b>	<b>267</b>	<b>329</b>	<b>2'090</b>	<b>973</b>	<b>3'063</b>	<b>3'063</b>
<i>dati mancanti</i>	1'483	651	2'134	232	83	315	112	41	153	602	105	707	147	521	669	2'763	1'579	4'343	4'343

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

\*\*\* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili)

## T10 Tipo di aiuto atteso dai pazienti (in rapporto al problema principale) e dai parenti o conoscenti all'entrata e base legale dell'intervento (2010)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Tipo di aiuto atteso*</b>																			
problemi di dipendenza	83.4	88.8	84.9	92.3	82.1	89.9	85.4	85.0	85.3	69.9	67.4	69.6	58.0	57.3	57.5	81.0	77.6	79.9	2'635
problemi somatici	2.3	3.9	2.7	3.9	5.1	4.2	0.8	5.0	1.4	1.4	0.0	1.2	0.0	1.0	0.8	2.1	3.0	2.4	78
problemi psichici	12.3	25.1	16.1	12.0	21.8	14.2	14.6	25.0	16.1	6.1	17.4	7.6	10.1	16.1	14.9	11.5	21.4	14.7	485
problemi relazionali	11.3	20.0	13.8	7.7	15.4	9.5	15.4	10.0	14.7	6.4	10.9	7.0	24.6	39.2	36.3	10.8	23.1	14.8	487
problemi familiari	7.2	11.2	8.4	7.7	12.8	8.9	8.1	15.0	9.1	11.5	15.2	12.0	47.8	47.9	47.9	9.2	21.3	13.1	433
problemi finanziari	5.8	6.4	6.0	14.7	25.6	17.2	11.4	5.0	10.5	6.4	4.3	6.1	8.7	6.3	6.8	7.8	8.1	7.9	259
problemi professionali o di formazione	12.5	14.6	13.1	15.1	16.7	15.4	7.3	10.0	7.7	11.1	13.0	11.4	2.9	7.0	6.2	11.8	11.7	11.8	389
problemi di alloggio	3.4	4.1	3.6	7.7	14.1	9.2	5.7	10.0	6.3	3.4	4.3	3.5	8.7	3.8	4.8	4.2	4.9	4.4	145
problemi di violenza	1.2	1.6	1.3	0.4	2.6	0.9	1.6	0.0	1.4	0.7	4.3	1.2	2.9	3.5	3.4	1.2	2.2	1.5	50
problemi giuridici	9.7	3.7	8.0	10.8	9.0	10.4	10.6	15.0	11.2	12.8	6.5	12.0	8.7	2.8	3.9	10.0	3.9	8.0	265
altro-i	2.0	1.1	1.8	1.9	1.3	1.8	1.6	0.0	1.4	1.0	0.0	0.9	0.0	1.4	1.1	2.4	1.7	2.2	71
nessuna richiesta	9.3	6.4	8.4	1.9	6.4	3.0	8.9	5.0	8.4	21.3	19.6	21.1	1.4	0.7	0.8	9.8	5.5	8.4	278
<b>N**</b>	<b>1'370</b>	<b>561</b>	<b>1'931</b>	<b>259</b>	<b>78</b>	<b>337</b>	<b>123</b>	<b>20</b>	<b>143</b>	<b>296</b>	<b>46</b>	<b>342</b>	<b>69</b>	<b>286</b>	<b>355</b>	<b>2'231</b>	<b>1'068</b>	<b>3'299</b>	<b>3'299</b>
<i>dati mancanti</i>	<i>1'402</i>	<i>587</i>	<i>1'989</i>	<i>217</i>	<i>76</i>	<i>293</i>	<i>101</i>	<i>44</i>	<i>145</i>	<i>583</i>	<i>104</i>	<i>687</i>	<i>140</i>	<i>502</i>	<i>643</i>	<i>2'622</i>	<i>1'484</i>	<i>4'107</i>	<i>4'107</i>
<b>Base legale dell'intervento*</b>																			
Sospensione della procedura, rinuncia a infliggere una pena o un avvertimento (art. 19a cifra 2 Lstup)	0.6	0.0	0.4	1.4	0.0	1.0	1.9	0.0	1.6	6.0	5.0	5.8	0.0	0.0	0.0	1.4	0.2	1.0	30
abbandono del perseguimento penale nel caso di un trattamento sotto sorveglianza medica (art. 19a cifra 3 Lstup)	0.2	0.0	0.1	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	3
misure concernenti delinquenti mentalmente anormali (art. 43 CPS)	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1
trattamento delle persone dipendenti dall'alcol o dalle droghe (art. 44 CPS)	2.3	0.6	1.8	1.4	1.5	1.4	3.8	0.0	3.3	1.6	0.0	1.4	1.8	0.0	0.4	2.0	0.4	1.5	44
irresponsabilità (art. 10 CPS)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
responsabilità limitata (art. 11 CPS)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1
esecuzione di misure per tossicodipend. in un'istituzione di educazione al lavoro (art. 2a ord. 3 rel. al CPS SR 311.03)	0.4	0.0	0.3	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	6.7	2.5	6.2	0.0	0.0	0.0	1.2	0.1	0.8	24
altra	13.0	5.7	10.9	6.3	1.5	5.2	19.2	0.0	16.3	21.8	15.0	20.9	0.0	0.0	0.0	13.2	4.3	10.4	298
nessuna misura (trattamento volontario)	83.5	93.5	86.4	90.0	97.0	91.7	74.0	100.0	78.0	63.9	77.5	65.8	98.2	100.0	99.6	81.9	94.8	86.0	2'457
<b>N**</b>	<b>1'214</b>	<b>489</b>	<b>1'703</b>	<b>221</b>	<b>67</b>	<b>288</b>	<b>104</b>	<b>19</b>	<b>123</b>	<b>252</b>	<b>40</b>	<b>292</b>	<b>57</b>	<b>228</b>	<b>285</b>	<b>1'955</b>	<b>903</b>	<b>2'858</b>	<b>2'858</b>
<i>dati mancanti</i>	<i>1'558</i>	<i>659</i>	<i>2'217</i>	<i>255</i>	<i>87</i>	<i>342</i>	<i>120</i>	<i>45</i>	<i>165</i>	<i>627</i>	<i>110</i>	<i>737</i>	<i>152</i>	<i>560</i>	<i>713</i>	<i>2'898</i>	<i>1'649</i>	<i>4'548</i>	<i>4'548</i>

\* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

## T11 Trattamenti/accompagnamenti dei pazienti prima dell'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2010)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			N
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Interventi precedenti*</b>																			
no	46.5	38.5	44.1	16.1	19.8	17.0	51.8	55.7	52.8	78.6	71.2	77.5	69.9	67.3	67.8	51.7	50.4	51.3	3'147
si	53.5	61.5	55.9	83.9	80.2	83.0	48.2	44.3	47.2	21.4	28.8	22.5	30.1	32.7	32.2	48.3	49.6	48.7	2'992
<b>N**</b>	<b>2'275</b>	<b>957</b>	<b>3'232</b>	<b>403</b>	<b>131</b>	<b>534</b>	<b>193</b>	<b>61</b>	<b>254</b>	<b>758</b>	<b>139</b>	<b>897</b>	<b>156</b>	<b>620</b>	<b>776</b>	<b>4'032</b>	<b>2'107</b>	<b>6'139</b>	<b>6'139</b>
<i>dati mancanti</i>	497	191	688	73	23	96	31	3	34	121	11	132	53	168	222	821	445	1'267	1'267
<b>Tipo di intervento***</b>																			
trattamento con prescriz. di eroina	0.9	1.7	1.2	4.8	7.4	5.5	1.8	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.8	1.6	36
terapia sostitut. (metadone, subutex)	3.7	4.6	4.0	69.1	79.0	71.7	17.5	0.0	14.9	3.1	4.3	3.3	6.3	0.9	2.0	14.7	11.7	13.7	309
altro tratt. medicam. delle dipendenze	10.6	9.1	10.2	7.4	17.3	10.0	7.0	10.0	7.5	3.1	8.7	4.1	0.0	0.9	0.7	9.1	8.6	8.9	201
consulenza ambulatoriale	68.4	70.1	68.9	62.6	64.2	63.0	66.7	60.0	65.7	84.7	78.3	83.5	78.1	84.5	83.1	68.9	72.4	70.1	1'583
terapia residenziale	51.7	57.6	53.6	39.6	50.6	42.4	40.4	70.0	44.8	18.4	30.4	20.7	31.3	10.3	14.9	45.6	47.2	46.2	1'043
cura di disintossicazione	45.0	50.5	46.8	54.8	54.3	54.7	40.4	60.0	43.3	10.2	17.4	11.6	12.5	4.3	6.1	41.8	40.2	41.3	932
gruppo di aiuto reciproco/ autosost.	5.9	9.4	7.0	4.8	4.9	4.8	1.8	0.0	1.5	1.0	4.3	1.7	3.1	4.3	4.1	5.2	7.7	6.1	137
altro-i	2.5	2.1	2.4	2.2	6.2	3.2	5.3	0.0	4.5	3.1	4.3	3.3	0.0	4.3	3.4	2.6	3.3	2.9	65
<b>N**</b>	<b>996</b>	<b>481</b>	<b>1'477</b>	<b>230</b>	<b>81</b>	<b>311</b>	<b>57</b>	<b>10</b>	<b>67</b>	<b>98</b>	<b>23</b>	<b>121</b>	<b>32</b>	<b>116</b>	<b>148</b>	<b>1'480</b>	<b>779</b>	<b>2'259</b>	<b>2'259</b>
<i>dati mancanti</i>	220	106	326	89	22	111	21	11	32	47	6	53	15	85	100	411	241	652	652

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti che sono già stati presi in carico in precedenza. Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

## T12 Trattamento sostitutivo e altri interventi all'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2010)

	Pazienti: problema principale												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Sostituzione o prescrizione di eroina*</b>																
no	98.6	97.8	98.4	56.9	50.5	55.3	93.1	95.3	93.6	99.5	99.2	99.5	94.2	93.8	94.1	4'180
sì	1.4	2.2	1.6	43.1	49.5	44.7	6.9	4.7	6.4	0.5	0.8	0.5	5.8	6.2	5.9	263
<b>N**</b>	<b>1'866</b>	<b>789</b>	<b>2'655</b>	<b>318</b>	<b>105</b>	<b>423</b>	<b>159</b>	<b>43</b>	<b>202</b>	<b>664</b>	<b>124</b>	<b>788</b>	<b>3'209</b>	<b>1'234</b>	<b>4'443</b>	<b>4'443</b>
<i>dati mancanti</i>	906	359	1'265	158	49	207	65	21	86	215	26	241	1'435	530	1'965	1'965
<b>Tipo di sostituzione***</b>																
eroina	8.0	0.0	4.8	3.0	7.7	4.3	9.1	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	3.8	5.3	4.2	11
metadone	72.0	82.4	76.2	91.1	86.5	89.8	54.5	100.0	61.5	100.0	100.0	100.0	86.3	85.5	86.1	223
altri oppiacei	16.0	11.8	14.3	5.9	5.8	5.9	18.2	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	8.2	6.6	7.7	20
altre sostanze	4.0	5.9	4.8	0.0	0.0	0.0	18.2	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	1.6	2.6	1.9	5
<b>N**</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>42</b>	<b>135</b>	<b>52</b>	<b>187</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>183</b>	<b>76</b>	<b>259</b>	<b>259</b>
<i>dati mancanti</i>	1	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4
<b>Altro intervento parallelo*</b>																
no	90.3	84.0	88.5	80.2	76.5	79.3	82.9	68.4	80.8	94.8	95.1	94.8	89.3	83.9	87.9	2'351
sì	9.7	16.0	11.5	19.8	23.5	20.7	17.1	31.6	19.2	5.2	4.9	5.2	10.7	16.1	12.1	325
<b>N**</b>	<b>1'267</b>	<b>514</b>	<b>1'781</b>	<b>222</b>	<b>68</b>	<b>290</b>	<b>111</b>	<b>19</b>	<b>130</b>	<b>268</b>	<b>41</b>	<b>309</b>	<b>1'975</b>	<b>701</b>	<b>2'676</b>	<b>2'676</b>
<i>dati mancanti</i>	1'505	634	2'139	254	86	340	113	45	158	611	109	720	2'669	1'063	3'732	3'732
<b>Tipo di intervento parallelo****</b>																
trattamento o consulenza ambulatoriale	61.3	69.6	64.6	77.3	68.8	75.0	41.2	40.0	40.9	71.4	50.0	68.8	64.4	67.9	65.6	206
terapia residenziale	5.9	5.1	5.6	15.9	18.8	16.7	23.5	40.0	27.3	0.0	0.0	0.0	9.3	9.2	9.2	29
gruppo di aiuto reciproco o di autosostegno	5.0	6.3	5.6	2.3	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	4.6	3.8	12
altro-i	28.6	22.8	26.3	11.4	12.5	11.7	35.3	20.0	31.8	28.6	50.0	31.3	24.9	21.1	23.6	74
<b>N**</b>	<b>119</b>	<b>79</b>	<b>198</b>	<b>44</b>	<b>16</b>	<b>60</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>205</b>	<b>109</b>	<b>314</b>	<b>314</b>
<i>dati mancanti</i>	4	3	7	0	0	0	2	1	3	0	0	0	7	4	11	11

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti che seguono un programma di sostituzione. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti presi in carico parallelamente. Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

## T13a Entrata in seguito a una cura di disintossicazione, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2010)

	Pazienti: problema principale												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Entrata in seguito a una cura di disintossicazione*</b>																
no	79.3	72.5	77.3	87.1	83.6	86.3	90.5	90.0	90.4	97.3	97.5	97.3	84.2	77.3	82.4	2'100
disintossicazione nella stessa istituzione	1.2	1.6	1.3	0.4	1.5	0.7	1.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.9	1.3	1.0	25
disintossicazione in un'altra istituzione	19.5	25.9	21.4	12.5	14.9	13.1	8.6	10.0	8.8	2.7	2.5	2.7	15.0	21.4	16.7	425
<b>N**</b>	<b>1'191</b>	<b>495</b>	<b>1'686</b>	<b>224</b>	<b>67</b>	<b>291</b>	<b>105</b>	<b>20</b>	<b>125</b>	<b>257</b>	<b>40</b>	<b>297</b>	<b>1'871</b>	<b>679</b>	<b>2'550</b>	<b>2'550</b>
<i>dati mancanti</i>	1'581	653	2'234	252	87	339	119	44	163	622	110	732	2'773	1'085	3'858	3'858

## T13b Frequenza delle cure di disintossicazione senza aiuto professionale prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2010)

Freq. disintossicazioni senza accompagnamento*																
mai	63.6	52.0	60.3	19.4	18.4	19.1	57.1	62.5	57.7	72.3	80.0	72.9	59.1	49.4	56.6	785
una volta	8.0	6.7	7.6	10.5	12.2	11.0	7.1	25.0	9.0	12.9	6.7	12.4	9.0	8.7	8.9	124
due o tre volte	9.3	14.7	10.8	16.9	20.4	17.9	11.4	0.0	10.3	5.2	0.0	4.7	9.8	14.0	10.9	151
più di tre volte	19.2	26.6	21.3	53.2	49.0	52.0	24.3	12.5	23.1	9.7	13.3	10.0	22.1	27.8	23.6	327
<b>N**</b>	<b>637</b>	<b>252</b>	<b>889</b>	<b>124</b>	<b>49</b>	<b>173</b>	<b>70</b>	<b>8</b>	<b>78</b>	<b>155</b>	<b>15</b>	<b>170</b>	<b>1'031</b>	<b>356</b>	<b>1'387</b>	<b>1'387</b>
<i>dati mancanti</i>	2'135	896	3'031	352	105	457	154	56	210	724	135	859	3'613	1'408	5'021	5'021

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

**T14 Problema principale all'entrata (solamente pazienti) (2010)**

Tutti i pazienti									
	Uomini	Donne	Totale	N		Uomini	Donne	Totale	N
	%	%	%			%	%	%	
<b>Problema principale</b>									
alcol	59.7	65.1	61.2	3'920	alcol	59.7	65.1	61.2	3'920
cocktail (eroina e cocaina)	0.3	0.3	0.3	19	cocktail	0.3	0.3	0.3	19
eroina	8.5	6.6	8.0	512	oppiacei	10.0	8.4	9.5	611
metadone	1.1	1.1	1.1	70					
altri oppiacei	0.4	0.6	0.5	29	cocaina e derivati	4.8	3.6	4.5	288
cocaina	4.7	3.6	4.4	283					
crack, freebase	0.1	0.0	0.1	5	stimolanti	0.5	1.1	0.7	43
amfetamine	0.4	0.5	0.4	26					
MDMA e affini (ecstasy)	0.1	0.5	0.2	15	medicamenti	0.5	1.9	0.9	58
altri stimolanti (per es., khat)	0.0	0.1	0.0	2					
barbiturici	0.0	0.1	0.0	2	allucinogeni	0.1	0.1	0.1	6
benzodiazepine	0.5	1.4	0.7	47					
altri sonniferi e tranquillanti	0.0	0.4	0.1	9	canapa	18.9	8.5	16.1	1'029
LSD	0.0	0.1	0.0	3					
altri allucinogeni	0.1	0.0	0.0	3	tabacco	1.4	3.5	2.0	125
canapa	18.9	8.5	16.1	1'029					
tabacco	1.4	3.5	2.0	125	altra/e sostanza/e	0.5	0.9	0.6	40
sostanze volatili (per es., solventi)	0.0	0.1	0.0	2					
altra/e sostanza/e	0.5	0.8	0.6	38	problemi assimilabili a una dipendenza	3.3	6.6	4.2	268
gioco patologico	1.9	1.6	1.8	118					
disturbi alimentari	0.1	3.3	1.0	64	altri problemi assimilabili a una dipendenza	1.2	1.7	1.3	86
altri problemi assimilabili a una dipendenza	1.2	1.7	1.3	86					
<b>N**</b>	<b>4'644</b>	<b>1'763</b>	<b>6'407</b>	<b>6'407</b>		<b>4'644</b>	<b>1'763</b>	<b>6'407</b>	<b>6'407</b>
<i>dati mancanti</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>		<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

## T15.1a Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata (2010), uomini

Pazienti: principale sostanza problematica										
Uomini	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Coacaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
<b>Frequenza di consumo 30 ultimi giorni (%)*</b>										
mai	28.1	37.5	30.3	40.1	37.5	6.7	.	29.7	9.1	0.0
un giorno alla settimana o meno	8.4	12.5	8.5	20.4	6.3	6.7	.	18.9	1.8	25.0
2 a 3 giorni alla settimana	14.0	12.5	11.1	17.4	31.3	13.3	.	16.3	5.5	0.0
4 a 6 giorni alla settimana	10.2	12.5	6.7	10.8	18.8	6.7	.	9.0	7.3	25.0
una volta al giorno	12.0	0.0	26.8	3.6	0.0	20.0	.	9.4	1.8	50.0
più volte al giorno	27.3	25.0	16.6	7.8	6.3	46.7	.	16.7	74.5	0.0
<b>N**</b>	<b>1'891</b>	<b>8</b>	<b>343</b>	<b>167</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>55</b>	<b>4</b>
<i>dati mancanti</i>	881	5	120	57	8	10	5	179	8	21
<b>Frequenza di consumo 6 ultimi mesi (%)*</b>										
mai	7.9	0.0	14.9	21.5	12.5	7.1	.	7.3	1.8	0.0
un giorno alla settimana o meno	8.2	12.5	11.6	29.7	31.3	7.1	.	27.6	3.6	22.2
2 a 3 giorni alla settimana	16.8	12.5	9.5	20.3	18.8	7.1	.	18.9	7.3	0.0
4 a 6 giorni alla settimana	12.9	25.0	8.5	11.0	18.8	0.0	.	10.1	7.3	22.2
una volta al giorno	13.9	0.0	30.2	5.2	6.3	21.4	.	11.6	1.8	33.3
più volte al giorno	40.3	50.0	25.3	12.2	12.5	57.1	.	24.4	78.2	22.2
<b>N**</b>	<b>1'877</b>	<b>8</b>	<b>328</b>	<b>172</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>671</b>	<b>55</b>	<b>9</b>
<i>dati mancanti</i>	895	5	135	52	8	11	5	208	8	16

## T15.1b Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata (2010), uomini

Uomini	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
<b>Frequenza di manifestazione 30 ultimi giorni (%)*</b>			
mai	44.6	0.0	20.0
1 giorno alla settimana o meno	23.2	0.0	15.0
2 a 3 giorni alla settimana	5.4	0.0	12.5
4 a 6 giorni alla settimana	7.1	0.0	7.5
una volta al giorno	5.4	0.0	12.5
più volte al giorno	14.3	100.0	32.5
<b>N**</b>	<b>56</b>	<b>3</b>	<b>40</b>
<i>dati mancanti</i>	34	2	16
<b>Frequenza di manifestazione 6 ultimi mesi (%)*</b>			
mai	12.2	0.0	5.6
1 giorno alla settimana o meno	36.6	0.0	5.6
2 a 3 giorni alla settimana	14.6	0.0	16.7
4 a 6 giorni alla settimana	9.8	0.0	13.9
una volta al giorno	7.3	0.0	11.1
più volte al giorno	19.5	100.0	47.2
<b>N**</b>	<b>41</b>	<b>3</b>	<b>36</b>
<i>dati mancanti</i>	49	2	20

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

## T15.2a Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata (2010), donne

Pazienti: principale sostanza problematica										
Donne	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Coacaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
<b>Frequenza di consumo 30 ultimi giorni (%)*</b>										
mai	21.2	33.3	20.5	26.1	45.5	26.9	.	21.7	8.9	0.0
un giorno alla settimana o meno	11.5	33.3	14.3	21.7	27.3	7.7	.	19.4	0.0	40.0
2 a 3 giorni alla settimana	14.8	33.3	8.0	13.0	18.2	0.0	.	15.5	3.6	0.0
4 a 6 giorni alla settimana	11.4	0.0	5.4	13.0	9.1	3.8	.	7.8	1.8	0.0
una volta al giorno	10.5	0.0	29.5	10.9	0.0	30.8	.	11.6	1.8	20.0
più volte al giorno	30.7	0.0	22.3	15.2	0.0	30.8	.	24.0	83.9	40.0
<b>N**</b>	<b>784</b>	<b>3</b>	<b>112</b>	<b>46</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>129</b>	<b>56</b>	<b>5</b>
<i>dati mancanti</i>	364	3	36	18	8	7	1	21	6	10
<b>Frequenza di consumo 6 ultimi mesi (%)*</b>										
mai	6.6	0.0	15.0	8.7	9.1	12.5	.	3.1	1.8	0.0
un giorno alla settimana o meno	9.1	66.7	15.0	23.9	45.5	8.3	.	22.0	0.0	14.3
2 a 3 giorni alla settimana	16.7	0.0	10.3	23.9	18.2	4.2	.	15.7	0.0	0.0
4 a 6 giorni alla settimana	12.7	0.0	8.4	13.0	0.0	0.0	.	7.9	5.5	0.0
una volta al giorno	13.5	0.0	27.1	10.9	9.1	29.2	.	15.7	1.8	14.3
più volte al giorno	41.4	33.3	24.3	19.6	18.2	45.8	.	35.4	90.9	71.4
<b>N**</b>	<b>778</b>	<b>3</b>	<b>107</b>	<b>46</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>55</b>	<b>7</b>
<i>dati mancanti</i>	370	3	41	18	8	9	1	23	7	8

## T15.2b Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata (2010), donne

Pazienti: problema principale			
Donne	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
<b>Frequenza di manifestazione 30 ultimi giorni (%)*</b>			
mai	85.7	6.7	5.3
1 giorno alla settimana o meno	0.0	3.3	26.3
2 a 3 giorni alla settimana	7.1	10.0	15.8
4 a 6 giorni alla settimana	0.0	6.7	10.5
una volta al giorno	7.1	10.0	5.3
più volte al giorno	0.0	63.3	36.8
<b>N**</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>19</b>
<i>dati mancanti</i>	14	29	11
<b>Frequenza di manifestazione 6 ultimi mesi (%)*</b>			
mai	66.7	0.0	0.0
1 giorno alla settimana o meno	11.1	6.9	31.6
2 a 3 giorni alla settimana	11.1	13.8	15.8
4 a 6 giorni alla settimana	11.1	3.4	5.3
una volta al giorno	0.0	6.9	10.5
più volte al giorno	0.0	69.0	36.8
<b>N**</b>	<b>9</b>	<b>29</b>	<b>19</b>
<i>dati mancanti</i>	19	30	11

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

## T15.3a Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata (2010), uomini e donne

Pazienti: principale sostanza problematica										
Uomini e donne	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Coacaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
<b>Frequenza di consumo 30 ultimi giorni (%)*</b>										
mai	26.1	36.4	27.9	37.1	40.7	19.5	.	28.5	9.0	0.0
un giorno alla settimana o meno	9.3	18.2	9.9	20.7	14.8	7.3	.	18.9	0.9	33.3
2 a 3 giorni alla settimana	14.2	18.2	10.3	16.4	25.9	4.9	.	16.2	4.5	0.0
4 a 6 giorni alla settimana	10.5	9.1	6.4	11.3	14.8	4.9	.	8.8	4.5	11.1
una volta al giorno	11.5	0.0	27.5	5.2	0.0	26.8	.	9.8	1.8	33.3
più volte al giorno	28.3	18.2	18.0	9.4	3.7	36.6	.	17.9	79.3	22.2
<b>N**</b>	<b>2'675</b>	<b>11</b>	<b>455</b>	<b>213</b>	<b>27</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>829</b>	<b>111</b>	<b>9</b>
<i>dati mancanti</i>	1'245	8	156	75	16	17	6	200	14	31
<b>Frequenza di consumo 6 ultimi mesi (%)*</b>										
mai	7.5	0.0	14.9	18.8	11.1	10.5	.	6.6	1.8	0.0
un giorno alla settimana o meno	8.4	27.3	12.4	28.4	37.0	7.9	.	26.7	1.8	18.8
2 a 3 giorni alla settimana	16.8	9.1	9.7	21.1	18.5	5.3	.	18.4	3.6	0.0
4 a 6 giorni alla settimana	12.9	18.2	8.5	11.5	11.1	0.0	.	9.8	6.4	12.5
una volta al giorno	13.7	0.0	29.4	6.4	7.4	26.3	.	12.3	1.8	25.0
più volte al giorno	40.6	45.5	25.1	13.8	14.8	50.0	.	26.2	84.5	43.8
<b>N**</b>	<b>2'655</b>	<b>11</b>	<b>435</b>	<b>218</b>	<b>27</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>798</b>	<b>110</b>	<b>16</b>
<i>dati mancanti</i>	1'265	8	176	70	16	20	6	231	15	24

## T15.3b Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata (2010), uomini e donne

Pazienti: problema principale			
Uomini e donne	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
<b>Frequenza di manifestazione 30 ultimi giorni (%)*</b>			
mai	52.9	6.1	15.3
1 giorno alla settimana o meno	18.6	3.0	18.6
2 a 3 giorni alla settimana	5.7	9.1	13.6
4 a 6 giorni alla settimana	5.7	6.1	8.5
una volta al giorno	5.7	9.1	10.2
più volte al giorno	11.4	66.7	33.9
<b>N**</b>	<b>70</b>	<b>33</b>	<b>59</b>
<i>dati mancanti</i>	48	31	27
<b>Frequenza di manifestazione 6 ultimi mesi (%)*</b>			
mai	22.0	0.0	3.6
1 giorno alla settimana o meno	32.0	6.3	14.5
2 a 3 giorni alla settimana	14.0	12.5	16.4
4 a 6 giorni alla settimana	10.0	3.1	10.9
una volta al giorno	6.0	6.3	10.9
più volte al giorno	16.0	71.9	43.6
<b>N**</b>	<b>50</b>	<b>32</b>	<b>55</b>
<i>dati mancanti</i>	68	32	31

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

## T16.1a Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2010), uomini

Pazienti: principale sostanza problematica										
Uomini	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Coacaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
<b>Età all'epoca del primo consumo</b>										
media	16.2	18.9	21.5	22.2	19.7	26.7	.	14.8	15.7	14.0
deviazione standard	4.0	5.3	6.3	7.0	4.3	8.1	.	2.5	7.7	0.0
1° quartile	14.0	15.0	17.0	17.0	16.0	20.0	.	14.0	13.0	14.0
mediana	16.0	16.0	20.0	20.0	17.0	26.0	.	15.0	15.0	14.0
3° quartile	17.0	25.0	25.0	25.0	25.0	28.0	.	16.0	17.0	14.0
<b>N*</b>	<b>1'216</b>	<b>7</b>	<b>307</b>	<b>151</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>654</b>	<b>34</b>	<b>4</b>
<i>dati mancanti</i>	1'556	6	156	73	9	16	5	225	29	21
<b>Età all'inizio del consumo regolare</b>										
media	21.9	20.1	22.9	24.7	20.9	25.1	.	15.9	15.8	.
deviazione standard	7.7	7.4	6.5	7.7	3.9	5.4	.	3.0	3.3	.
1° quartile	17.0	15.0	18.0	19.0	18.0	19.0	.	14.0	14.0	.
mediana	20.0	16.0	21.0	23.0	20.0	26.0	.	15.0	15.0	.
3° quartile	24.0	27.0	27.0	29.5	25.0	30.0	.	16.0	17.0	.
<b>N*</b>	<b>1'114</b>	<b>7</b>	<b>236</b>	<b>124</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>514</b>	<b>32</b>	<b>0</b>
<i>dati mancanti</i>	1'658	6	227	100	9	18	5	365	31	25
<b>Età all'inizio del consumo problematico</b>										
media	31.0	21.1	24.4	26.3	21.1	28.8	.	16.6	18.1	15.5
deviazione standard	12.3	8.3	7.6	7.7	4.4	9.5	.	3.9	7.6	2.1
1° quartile	21.0	16.0	19.0	20.0	18.5	20.0	.	15.0	15.0	14.0
mediana	29.0	17.5	23.0	25.0	19.5	28.0	.	16.0	15.5	15.5
3° quartile	40.0	27.0	28.0	31.0	24.5	33.0	.	17.0	18.0	17.0
<b>N*</b>	<b>1'076</b>	<b>8</b>	<b>249</b>	<b>136</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>481</b>	<b>30</b>	<b>2</b>
<i>dati mancanti</i>	1'696	5	214	88	12	14	5	398	33	23
<b>Periodo di latenza (in anni)**</b>										
media	24.0	.	7.2	8.6	5.7	5.9	.	4.6	10.6	7.0
deviazione standard	13.8	.	7.2	6.1	4.2	2.9	.	5.8	12.0	7.9
1° quartile	13.0	.	2.3	3.5	2.8	3.8	.	1.3	1.3	2.1
mediana	22.9	.	4.6	7.6	4.0	5.9	.	2.2	4.0	4.6
3° quartile	33.9	.	10.0	11.6	9.0	7.9	.	5.5	21.2	11.9
<b>N*</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>76</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>507</b>	<b>25</b>	<b>4</b>
<i>dati mancanti</i>	498	0	14	24	3	2	1	89	20	7

\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

\*\* Lasso di tempo tra il primo consumo della sostanza problematica e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

## T16.1b Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2010), donne

Pazienti: principale sostanza problematica										
Donne	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Coacaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
<b>Età all'epoca del primo consumo</b>										
media	18.2	16.5	20.7	19.5	20.6	28.5	.	14.6	16.2	23.0
deviazione standard	6.0	0.7	6.2	6.2	11.6	11.3	.	2.5	4.0	8.3
1° quartile	15.0	16.0	16.0	16.0	14.0	18.0	.	13.0	14.0	17.0
mediana	17.0	16.5	19.0	18.0	16.0	30.0	.	14.0	15.0	24.0
3° quartile	20.0	17.0	23.0	20.0	26.0	38.0	.	16.0	17.0	27.0
<b>N*</b>	<b>459</b>	<b>2</b>	<b>93</b>	<b>41</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>31</b>	<b>5</b>
<i>dati mancanti</i>	689	4	55	23	8	21	1	30	31	10
<b>Età all'inizio del consumo regolare</b>										
media	27.7	17.5	22.4	20.8	24.4	32.3	.	16.0	18.1	24.3
deviazione standard	11.5	0.7	6.9	5.4	13.4	12.1	.	4.3	5.1	10.6
1° quartile	19.0	17.0	18.0	17.0	17.0	19.0	.	14.0	15.0	13.0
mediana	25.0	17.5	21.0	19.0	17.0	38.5	.	16.0	17.0	26.0
3° quartile	35.0	18.0	25.0	22.0	26.0	41.0	.	16.0	20.0	34.0
<b>N*</b>	<b>440</b>	<b>2</b>	<b>71</b>	<b>33</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>38</b>	<b>3</b>
<i>dati mancanti</i>	708	4	77	31	12	23	1	59	24	12
<b>Età all'inizio del consumo problematico</b>										
media	35.0	17.0	22.7	21.5	21.4	30.5	.	17.1	19.9	28.5
deviazione standard	12.4	.	7.0	6.9	11.3	13.7	.	5.1	8.1	4.4
1° quartile	25.0	17.0	18.0	18.0	16.0	17.0	.	14.0	15.0	25.0
mediana	34.0	17.0	21.0	20.0	17.0	30.0	.	16.0	17.0	28.0
3° quartile	43.0	17.0	26.0	24.0	26.0	41.0	.	18.0	20.0	32.0
<b>N*</b>	<b>481</b>	<b>1</b>	<b>81</b>	<b>40</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>34</b>	<b>4</b>
<i>dati mancanti</i>	667	5	67	24	8	20	1	55	28	11
<b>Periodo di latenza (in anni)**</b>										
media	25.2	6.0	5.8	5.1	2.2	27.1	.	6.7	17.3	5.0
deviazione standard	12.0	.	7.2	5.3	1.3	37.2	.	9.3	14.1	5.6
1° quartile	15.7	6.0	1.6	1.6	0.9	0.8	.	1.1	2.1	1.0
mediana	26.3	6.0	3.6	2.9	2.1	27.1	.	2.7	18.8	5.0
3° quartile	33.4	6.0	6.1	6.8	2.9	53.4	.	7.7	28.7	8.9
<b>N*</b>	<b>181</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>24</b>	<b>2</b>
<i>dati mancanti</i>	187	1	1	9	4	7	0	13	16	1

\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

\*\* Lasso di tempo tra il primo consumo della sostanza problematica e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

## T16.1c Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2010), uomini e donne

Pazienti: principale sostanza problematica										
Uomini e donne	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Coacaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
<b>Età all'epoca del primo consumo</b>										
media	16.7	18.3	21.4	21.6	20.1	27.7	.	14.7	15.9	19.0
deviazione standard	4.7	4.7	6.3	6.9	8.0	9.9	.	2.5	6.2	7.5
1° quartile	15.0	16.0	17.0	17.0	16.0	19.0	.	14.0	13.0	14.0
mediana	16.0	16.0	20.0	20.0	17.0	28.0	.	15.0	15.0	14.0
3° quartile	18.0	20.0	24.0	24.5	25.0	35.0	.	16.0	17.0	24.0
<b>N*</b>	<b>1'675</b>	<b>9</b>	<b>400</b>	<b>192</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>774</b>	<b>65</b>	<b>9</b>
<i>dati mancanti</i>	2'245	10	211	96	17	37	6	255	60	31
<b>Età all'inizio del consumo regolare</b>										
media	23.5	19.6	22.8	23.9	22.0	29.4	.	15.9	17.0	24.3
deviazione standard	9.3	6.5	6.6	7.4	8.0	10.3	.	3.2	4.5	10.6
1° quartile	18.0	16.0	18.0	19.0	17.0	19.0	.	14.0	14.0	13.0
mediana	20.0	17.0	21.0	21.0	19.5	30.0	.	15.0	16.0	26.0
3° quartile	26.0	21.0	26.0	28.0	26.0	39.0	.	16.0	18.0	34.0
<b>N*</b>	<b>1'554</b>	<b>9</b>	<b>307</b>	<b>157</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>605</b>	<b>70</b>	<b>3</b>
<i>dati mancanti</i>	2'366	10	304	131	21	41	6	424	55	37
<b>Età all'inizio del consumo problematico</b>										
media	32.3	20.7	24.0	25.2	21.2	29.7	.	16.6	19.0	24.2
deviazione standard	12.5	7.9	7.5	7.8	8.3	11.7	.	4.1	7.9	7.6
1° quartile	22.0	16.0	18.0	19.0	17.0	19.0	.	15.0	15.0	17.0
mediana	30.0	17.0	22.0	24.0	19.0	28.0	.	16.0	16.5	25.0
3° quartile	40.0	21.0	28.0	30.0	25.0	40.5	.	17.0	20.0	30.0
<b>N*</b>	<b>1'557</b>	<b>9</b>	<b>330</b>	<b>176</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>576</b>	<b>64</b>	<b>6</b>
<i>dati mancanti</i>	2'363	10	281	112	20	34	6	453	61	34
<b>Periodo di latenza (in anni)**</b>										
media	24.3	6.0	6.8	7.7	4.0	16.5	.	4.9	13.8	6.3
deviazione standard	13.4	.	7.2	6.1	3.5	24.8	.	6.5	13.4	6.7
1° quartile	13.7	6.0	2.1	2.8	1.7	2.3	.	1.3	1.4	1.0
mediana	24.2	6.0	3.8	6.4	2.8	5.9	.	2.3	7.0	4.6
3° quartile	33.8	6.0	8.7	10.7	4.7	30.7	.	5.8	26.1	8.9
<b>N*</b>	<b>741</b>	<b>1</b>	<b>74</b>	<b>101</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>593</b>	<b>49</b>	<b>6</b>
<i>dati mancanti</i>	685	1	15	33	7	9	1	102	36	8

\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

\*\* Lasso di tempo tra il primo consumo della sostanza problematica e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

## T16.2a Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2010), uomini

Pazienti: problema principale			
<i>Uomini</i>	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
<b>Età all'epoca della prima manifestazione</b>			
media	22.3	14.0	15.4
deviazione standard	12.6	5.7	5.3
1° quartile	16.0	10.0	14.0
mediana	20.0	14.0	14.0
3° quartile	25.0	18.0	16.0
<b>N*</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>17</b>
<i>dati mancanti</i>	67	3	39
<b>Età all'inizio della manifestazione regolare</b>			
media	25.7	19.0	19.5
deviazione standard	12.5	1.4	10.1
1° quartile	20.0	18.0	15.0
mediana	22.0	19.0	17.0
3° quartile	27.0	20.0	18.0
<b>N*</b>	<b>25</b>	<b>2</b>	<b>22</b>
<i>dati mancanti</i>	65	3	34
<b>Età all'inizio della manifestazione problematica</b>			
media	29.8	33.3	22.2
deviazione standard	12.4	17.2	10.7
1° quartile	21.0	18.0	17.0
mediana	26.0	30.0	18.0
3° quartile	36.0	52.0	24.0
<b>N*</b>	<b>31</b>	<b>3</b>	<b>21</b>
<i>dati mancanti</i>	59	2	35
<b>Periodo di latenza (in anni)**</b>			
media	15.0	23.6	12.0
deviazione standard	12.2	32.1	8.8
1° quartile	4.0	0.9	5.0
mediana	13.3	23.6	10.3
3° quartile	24.4	46.2	15.4
<b>N*</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>17</b>
<i>dati mancanti</i>	67	3	39

\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

\*\* Lasso di tempo tra la prima manifestazione del comportamento problematico e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

## T16.2b Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2010), donne

Pazienti: problema principale			
Donne	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
<b>Età all'epoca della prima manifestazione</b>			
media	42.0	17.3	19.0
deviazione standard	21.3	5.7	9.1
1° quartile	23.0	14.0	15.0
mediana	38.0	16.0	18.0
3° quartile	65.0	19.0	20.0
<b>N*</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>11</b>
<i>dati mancanti</i>	25	34	19
<b>Età all'inizio della manifestazione regolare</b>			
media	42.4	18.6	25.6
deviazione standard	15.5	6.4	13.9
1° quartile	38.0	15.0	17.0
mediana	40.0	17.0	19.5
3° quartile	45.0	21.0	37.5
<b>N*</b>	<b>5</b>	<b>26</b>	<b>12</b>
<i>dati mancanti</i>	23	33	18
<b>Età all'inizio della manifestazione problematica</b>			
media	42.3	20.3	30.0
deviazione standard	16.3	9.2	14.9
1° quartile	30.0	15.0	19.0
mediana	40.0	17.0	24.0
3° quartile	55.0	21.0	45.0
<b>N*</b>	<b>6</b>	<b>27</b>	<b>15</b>
<i>dati mancanti</i>	22	32	15
<b>Periodo di latenza (in anni)**</b>			
media	13.0	7.5	11.6
deviazione standard	15.0	8.5	10.7
1° quartile	2.4	1.8	2.7
mediana	6.5	3.9	8.1
3° quartile	30.1	11.3	22.5
<b>N*</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>11</b>
<i>dati mancanti</i>	25	34	19

\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

\*\* Lasso di tempo tra la prima manifestazione del comportamento problematico e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

### T16.2c Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2010), uomini e donne

Pazienti: problema principale			
<i>Uomini e donne</i>	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
<b>Età all'epoca della prima manifestazione</b>			
media	24.5	17.0	16.8
deviazione standard	14.8	5.6	7.1
1° quartile	16.0	14.0	14.0
mediana	20.0	16.0	16.0
3° quartile	25.0	19.0	18.0
<b>N*</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>
<i>dati mancanti</i>	92	37	58
<b>Età all'inizio della manifestazione regolare</b>			
media	28.5	18.6	21.6
deviazione standard	14.3	6.2	11.8
1° quartile	20.0	15.0	16.0
mediana	23.5	17.0	18.0
3° quartile	38.0	20.5	24.0
<b>N*</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>34</b>
<i>dati mancanti</i>	88	36	52
<b>Età all'inizio della manifestazione problematica</b>			
media	31.9	21.6	25.4
deviazione standard	13.6	10.6	13.0
1° quartile	23.0	15.0	17.0
mediana	28.0	17.5	20.0
3° quartile	38.0	22.0	30.0
<b>N*</b>	<b>37</b>	<b>30</b>	<b>36</b>
<i>dati mancanti</i>	81	34	50
<b>Periodo di latenza (in anni)**</b>			
media	14.8	8.7	11.8
deviazione standard	12.2	11.2	9.4
1° quartile	4.0	1.6	4.7
mediana	13.0	3.9	8.4
3° quartile	24.4	12.7	17.5
<b>N*</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>
<i>dati mancanti</i>	92	37	58

\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

\*\* Lasso di tempo tra la prima manifestazione del comportamento problematico e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

## T17 Modo di amministrazione della principale sostanza problematica nel corso dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata (2010)

Pazienti: principale sostanza problematica															
Modo di amministrazione*	Eroina			Cocaina			Amfetamine			Canapa			Benzodiazepine		
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
iniettato	23.5	23.3	23.5	5.6	3.4	5.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	9.1	0.0	4.0
fumato/inalato	47.5	43.3	46.5	16.7	17.2	16.8	16.7	0.0	12.5	98.8	100.0	98.9	0.0	0.0	0.0
ingerito /bevuto	0.5	0.0	0.4	1.9	0.0	1.5	50.0	0.0	37.5	0.7	0.0	0.6	72.7	92.9	84.0
sniffato	27.9	33.3	29.2	75.9	79.3	76.6	33.3	100.0	50.0	0.2	0.0	0.2	18.2	7.1	12.0
altro	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>N**</b>	<b>183</b>	<b>60</b>	<b>243</b>	<b>108</b>	<b>29</b>	<b>137</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>561</b>	<b>101</b>	<b>662</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>25</b>
<i>dati mancanti</i>	<i>212</i>	<i>57</i>	<i>269</i>	<i>111</i>	<i>35</i>	<i>146</i>	<i>11</i>	<i>7</i>	<i>18</i>	<i>318</i>	<i>49</i>	<i>367</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>22</i>

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

**T18 Prevalenza a vita delle iniezioni, nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata, scambio di materiale d'iniezione nel corso degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata e età all'epoca della prima iniezione, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2010)**

	Pazienti: principale sostanza problematica												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Iniezioni nel corso della vita*</b>																
sì	4.2	5.5	4.6	56.3	69.1	59.5	13.1	12.2	12.9	4.4	7.9	4.9	10.5	11.7	10.8	455
no	95.8	94.5	95.4	43.7	30.9	40.5	86.9	87.8	87.1	95.6	92.1	95.1	89.5	88.3	89.2	3'740
<b>N**</b>	<b>1'711</b>	<b>721</b>	<b>2'432</b>	<b>334</b>	<b>110</b>	<b>444</b>	<b>145</b>	<b>41</b>	<b>186</b>	<b>688</b>	<b>127</b>	<b>815</b>	<b>3'046</b>	<b>1'149</b>	<b>4'195</b>	<b>4'195</b>
<i>dati mancanti</i>	1'061	427	1'488	142	44	186	79	23	102	191	23	214	1'598	615	2'213	2'213
<b>Iniezioni nel corso dei 6 ultimi mesi*</b>																
sì	0.3	0.8	0.5	35.9	38.7	36.5	7.5	7.3	7.5	2.8	1.6	2.6	5.0	4.3	4.8	199
no	99.7	99.2	99.5	64.1	61.3	63.5	92.5	92.7	92.5	97.2	98.4	97.4	95.0	95.7	95.2	3'957
<b>N**</b>	<b>1'713</b>	<b>730</b>	<b>2'443</b>	<b>301</b>	<b>93</b>	<b>394</b>	<b>146</b>	<b>41</b>	<b>187</b>	<b>687</b>	<b>127</b>	<b>814</b>	<b>3'014</b>	<b>1'142</b>	<b>4'156</b>	<b>4'156</b>
<i>dati mancanti</i>	1'059	418	1'477	175	61	236	78	23	101	192	23	215	1'630	622	2'252	2'252
<b>Iniezioni nel corso dei 30 ultimi giorni*</b>																
sì	0.1	0.1	0.1	27.5	29.2	27.9	6.3	7.3	6.5	0.0	0.0	0.0	3.0	2.5	2.8	123
no	99.9	99.9	99.9	72.5	70.8	72.1	93.8	92.7	93.5	100.0	100.0	100.0	97.0	97.5	97.2	4'203
<b>N**</b>	<b>1'821</b>	<b>771</b>	<b>2'592</b>	<b>287</b>	<b>89</b>	<b>376</b>	<b>144</b>	<b>41</b>	<b>185</b>	<b>692</b>	<b>125</b>	<b>817</b>	<b>3'131</b>	<b>1'195</b>	<b>4'326</b>	<b>4'326</b>
<i>dati mancanti</i>	951	377	1'328	189	65	254	80	23	103	187	25	212	1'513	569	2'082	2'082
<b>Scambio di materiale d'iniezione nel corso dei 6 ultimi mesi***</b>																
sì	0.0	0.0	0.0	10.2	12.5	10.7	14.3	100.0	25.0	0.0	0.0	0.0	8.3	13.0	9.3	10
no	100.0	100.0	100.0	89.8	87.5	89.3	85.7	0.0	75.0	100.0	100.0	100.0	91.7	87.0	90.7	97
<b>N**</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>59</b>	<b>16</b>	<b>75</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>84</b>	<b>23</b>	<b>107</b>	<b>107</b>
<i>dati mancanti</i>	4	3	7	42	19	61	2	2	4	3	1	4	56	25	81	81
<b>Età all'epoca della prima iniezione****</b>																
fino a 14 anni	3.4	5.6	4.3	2.9	9.8	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	6.9	4.0	9
da 15 a 16 anni	10.3	22.2	14.9	6.9	2.4	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	12.5	6.5	12.5	8.4	19
da 17 a 18 anni	10.3	27.8	17.0	21.6	22.0	21.7	50.0	0.0	40.0	0.0	42.9	18.8	20.6	23.6	21.6	49
da 19 a 20 anni	24.1	11.1	19.1	23.5	19.5	22.4	16.7	0.0	13.3	33.3	14.3	25.0	23.9	15.3	21.1	48
da 21 a 25 anni	41.4	11.1	29.8	23.5	26.8	24.5	16.7	33.3	20.0	11.1	0.0	6.3	25.8	19.4	23.8	54
da 26 a 30 anni	3.4	16.7	8.5	12.7	14.6	13.3	0.0	0.0	0.0	33.3	14.3	25.0	11.0	13.9	11.9	27
da 31 a 39 anni	3.4	5.6	4.3	7.8	2.4	6.3	8.3	66.7	20.0	22.2	0.0	12.5	7.7	6.9	7.5	17
dai 40 anni in su	3.4	0.0	2.1	1.0	2.4	1.4	8.3	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	1.9	1.4	1.8	4
<b>N**</b>	<b>29</b>	<b>18</b>	<b>47</b>	<b>102</b>	<b>41</b>	<b>143</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>155</b>	<b>72</b>	<b>227</b>	<b>227</b>
<i>dati mancanti</i>	43	22	65	86	35	121	7	2	9	21	3	24	165	63	228	228

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti che si sono iniettati una sostanza illegale nel corso dei 6 ultimi mesi. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti che si sono iniettati una sostanza illegale nel corso della loro vita. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

## T19.1a Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2010), uomini

## Uomini

	Pazienti: principale sostanza problematica									
	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Altri problemi*</b>										
alcol		62.5	29.9	38.0	38.5	50.0	.	20.0	5.3	31.3
cocktail (eroina e cocaina)	0.3		6.3	1.3	0.0	7.1	.	0.4	0.0	0.0
eroina	2.1	12.5	6.0	12.0	0.0	42.9	.	1.6	0.0	25.0
metadone	0.9	37.5	23.3	1.3	0.0	21.4	.	0.5	0.0	12.5
altri oppiacei	0.5	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	.	0.4	0.0	0.0
cocaina	6.1	12.5	29.3	0.7	38.5	35.7	.	7.2	0.0	31.3
crack, freebase	0.0	0.0	2.1	2.0	0.0	0.0	.	0.2	0.0	0.0
amfetamine	1.0	0.0	6.3	8.7	0.0	0.0	.	2.3	0.0	12.5
MDMA e affini (ecstasy)	1.1	12.5	6.3	11.3	15.4	0.0	.	2.5	0.0	0.0
altri stimolanti	0.2	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	.	0.2	0.0	0.0
barbiturici	0.2	12.5	0.9	0.0	7.7	0.0	.	0.2	0.0	0.0
benzodiazepine	2.8	37.5	21.8	4.7	7.7	0.0	.	0.7	2.6	12.5
altri sonniferi e tranquillanti	0.5	25.0	1.5	0.0	0.0	0.0	.	0.2	0.0	6.3
LSD	0.4	25.0	5.4	6.7	23.1	0.0	.	1.4	0.0	6.3
altri allucinogeni	0.1	0.0	3.0	2.0	7.7	0.0	.	0.9	0.0	0.0
sostanze volatili (per es., solventi)	0.0	0.0	0.3	0.7	0.0	0.0	.	0.0	0.0	0.0
canapa	10.3	37.5	39.0	31.3	46.2	28.6	.		13.2	25.0
tabacco	30.3	37.5	39.6	34.0	30.8	35.7	.	28.1		25.0
altra/e sostanza/e	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	0.7	0.0	
gioco patologico	0.2	0.0	0.3	2.7	0.0	0.0	.	0.9	0.0	0.0
disturbi alimentari	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	0.0	0.0	0.0
altri problemi assimilabili a una dipendenza	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	0.7	0.0	0.0
nessun altro problema di dipendenza	57.9	0.0	21.8	31.3	15.4	7.1	.	56.7	78.9	43.8
<b>N**</b>	<b>1'751</b>	<b>8</b>	<b>331</b>	<b>150</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>570</b>	<b>38</b>	<b>16</b>
<i>dati mancanti</i>	<i>1'016</i>	<i>4</i>	<i>106</i>	<i>53</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>5</i>	<i>205</i>	<i>24</i>	<i>9</i>

\* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

## T19.1b Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2010), donne

Donne

	Pazienti: principale sostanza problematica									
	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Altri problemi*</b>										
alcol		0.0	28.3	34.2	33.3	36.4	.	21.2	7.8	14.3
cocktail (eroina e cocaina)	0.3		5.7	0.0	0.0	4.5	.	0.0	0.0	0.0
eroina	2.8	33.3	4.7	15.8	0.0	4.5	.	3.0	0.0	0.0
metadone	2.1	0.0	26.4	5.3	0.0	0.0	.	0.0	2.0	0.0
altri oppiacei	0.6	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	.	1.0	0.0	0.0
cocaina	5.4	33.3	38.7	0.0	33.3	4.5	.	10.1	0.0	0.0
crack, freebase	0.0	0.0	0.9	2.6	0.0	0.0	.	0.0	0.0	0.0
amfetamine	0.7	0.0	5.7	21.1	8.3	0.0	.	4.0	0.0	0.0
MDMA e affini (ecstasy)	0.8	33.3	5.7	23.7	25.0	0.0	.	3.0	0.0	0.0
altri stimolanti	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	0.0	0.0	0.0
barbiturici	0.3	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	.	0.0	0.0	0.0
benzodiazepine	5.1	0.0	32.1	10.5	8.3	0.0	.	1.0	0.0	0.0
altri sonniferi e tranquillanti	1.4	0.0	2.8	2.6	0.0	4.5	.	3.0	2.0	14.3
LSD	0.7	0.0	2.8	5.3	8.3	0.0	.	4.0	0.0	0.0
altri allucinogeni	0.1	0.0	1.9	5.3	0.0	0.0	.	0.0	0.0	0.0
sostanze volatili (per es., solventi)	0.3	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	.	0.0	0.0	0.0
canapa	8.6	33.3	35.8	52.6	58.3	18.2	.		9.8	0.0
tabacco	28.9	66.7	37.7	34.2	25.0	31.8	.	32.3		42.9
altra/e sostanza/e	0.7	0.0	0.9	0.0	0.0	4.5	.	0.0	0.0	
gioco patologico	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	0.0	0.0	0.0
disturbi alimentari	4.1	0.0	0.9	2.6	0.0	0.0	.	1.0	7.8	0.0
altri problemi assimilabili a una dipendenza	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	.	0.0	0.0	0.0
nessun altro problema di dipendenza	57.5	0.0	21.7	26.3	33.3	31.8	.	48.5	72.5	42.9
<b>N**</b>	<b>724</b>	<b>3</b>	<b>106</b>	<b>38</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>51</b>	<b>7</b>
<i>dati mancanti</i>	<i>421</i>	<i>3</i>	<i>35</i>	<i>16</i>	<i>6</i>	<i>11</i>	<i>1</i>	<i>24</i>	<i>11</i>	<i>8</i>

\* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

## T19.1c Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2010), uomini e donne

## Uomini e donne

	Pazienti: principale sostanza problematica									
	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Altri problemi*</b>										
alcol		45.5	29.5	37.2	36.0	41.7	.	20.2	6.7	26.1
cocktail (eroina e cocaina)	0.3		6.2	1.1	0.0	5.6	.	0.3	0.0	0.0
eroina	2.3	18.2	5.7	12.8	0.0	19.4	.	1.8	0.0	17.4
metadone	1.3	27.3	24.0	2.1	0.0	8.3	.	0.4	1.1	8.7
altri oppiacei	0.5	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	.	0.4	0.0	0.0
cocaina	5.9	18.2	31.6	0.5	36.0	16.7	.	7.6	0.0	21.7
crack, freebase	0.0	0.0	1.8	2.1	0.0	0.0	.	0.1	0.0	0.0
amfetamine	0.9	0.0	6.2	11.2	4.0	0.0	.	2.5	0.0	8.7
MDMA e affini (ecstasy)	1.0	18.2	6.2	13.8	20.0	0.0	.	2.5	0.0	0.0
altri stimolanti	0.2	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	.	0.1	0.0	0.0
barbiturici	0.2	9.1	1.1	0.0	4.0	0.0	.	0.1	0.0	0.0
benzodiazepine	3.5	27.3	24.3	5.9	8.0	0.0	.	0.7	1.1	8.7
altri sonniferi e tranquillanti	0.7	18.2	1.8	0.5	0.0	2.8	.	0.6	1.1	8.7
LSD	0.5	18.2	4.8	6.4	16.0	0.0	.	1.8	0.0	4.3
altri allucinogeni	0.1	0.0	2.7	2.7	4.0	0.0	.	0.7	0.0	0.0
sostanze volatili (per es., solventi)	0.1	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	.	0.0	0.0	0.0
canapa	9.8	36.4	38.2	35.6	52.0	22.2	.		11.2	17.4
tabacco	29.9	45.5	39.1	34.0	28.0	33.3	.	28.7		30.4
altra/e sostanza/e	0.6	0.0	0.2	0.0	0.0	2.8	.	0.6	0.0	
gioco patologico	0.1	0.0	0.2	2.1	0.0	0.0	.	0.7	0.0	0.0
disturbi alimentari	1.5	0.0	0.2	0.5	0.0	0.0	.	0.1	4.5	0.0
altri problemi assimilabili a una dipendenza	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	.	0.6	0.0	0.0
nessun altro problema di dipendenza	57.8	0.0	21.7	30.3	24.0	22.2	.	55.5	75.3	43.5
<b>N**</b>	<b>2'475</b>	<b>11</b>	<b>437</b>	<b>188</b>	<b>25</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>669</b>	<b>89</b>	<b>23</b>
<i>dati mancanti</i>	<i>1'437</i>	<i>7</i>	<i>141</i>	<i>69</i>	<i>15</i>	<i>20</i>	<i>6</i>	<i>229</i>	<i>35</i>	<i>17</i>

\* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

## T19.2a Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2010), uomini

## Uomini

Pazienti: problema principale			
	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
	%	%	%
<b>Altri problemi*</b>			
alcol	3.6	0.0	2.8
cocktail (eroina e cocaina)	0.0	0.0	0.0
eroina	0.0	0.0	0.0
metadone	0.0	0.0	0.0
altri oppiacei	0.0	0.0	0.0
cocaina	0.0	0.0	0.0
crack, freebase	0.0	0.0	0.0
amfetamine	0.0	0.0	0.0
MDMA e affini (ecstasy)	0.0	0.0	0.0
altri stimolanti	0.0	0.0	0.0
barbiturici	0.0	0.0	0.0
benzodiazepine	0.0	0.0	0.0
altri sonniferi e tranquillanti	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0
altri allucinogeni	0.0	0.0	0.0
sostanze volatili (per es., solventi)	0.0	0.0	0.0
canapa	0.0	0.0	2.8
tabacco	7.3	0.0	16.7
altra/e sostanza/e	0.0	0.0	0.0
gioco patologico		0.0	0.0
disturbi alimentari	1.8		2.8
altri problemi assimilabili a una dipendenza	1.8	0.0	
nessun altro problema di dipendenza	87.3	100.0	75.0
<b>N**</b>	<b>55</b>	<b>3</b>	<b>36</b>
<i>dati mancanti</i>	35	2	19

\* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

## T19.2b Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2010), donne

Donne

Pazienti: problema principale			
	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
	%	%	%
<b>Altri problemi*</b>			
alcol	0.0	2.9	5.6
cocktail (eroina e cocaina)	0.0	0.0	0.0
eroina	0.0	0.0	0.0
metadone	0.0	0.0	0.0
altri oppiacei	0.0	0.0	0.0
cocaina	0.0	0.0	0.0
crack, freebase	0.0	0.0	0.0
amfetamine	0.0	0.0	0.0
MDMA e affini (ecstasy)	0.0	0.0	0.0
altri stimolanti	0.0	0.0	0.0
barbiturici	0.0	0.0	0.0
benzodiazepine	0.0	0.0	0.0
altri sonniferi e tranquillanti	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0
altri allucinogeni	0.0	0.0	0.0
sostanze volatili (per es., solventi)	0.0	0.0	0.0
canapa	0.0	0.0	5.6
tabacco	20.0	8.8	16.7
altra/e sostanza/e	0.0	0.0	0.0
gioco patologico		0.0	5.6
disturbi alimentari	0.0		5.6
altri problemi assimilabili a una dipendenza	0.0	5.9	
nessun altro problema di dipendenza	80.0	85.3	77.8
<b>N**</b>	<b>15</b>	<b>34</b>	<b>18</b>
<i>dati mancanti</i>	13	25	12

\* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

### T19.2c Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2010), uomini e donne

#### Uomini e donne

Pazienti: problema principale			
	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
	%	%	%
<b>Altri problemi*</b>			
alcol	2.9	2.7	3.7
cocktail (eroina e cocaina)	0.0	0.0	0.0
eroina	0.0	0.0	0.0
metadone	0.0	0.0	0.0
altri oppiacei	0.0	0.0	0.0
cocaina	0.0	0.0	0.0
crack, freebase	0.0	0.0	0.0
amfetamine	0.0	0.0	0.0
MDMA e affini (ecstasy)	0.0	0.0	0.0
altri stimolanti	0.0	0.0	0.0
barbiturici	0.0	0.0	0.0
benzodiazepine	0.0	0.0	0.0
altri sonniferi e tranquillanti	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0
altri allucinogeni	0.0	0.0	0.0
sostanze volatili (per es., solventi)	0.0	0.0	0.0
canapa	0.0	0.0	3.7
tabacco	10.0	8.1	16.7
altra/e sostanza/e	0.0	0.0	0.0
gioco patologico		0.0	1.9
disturbi alimentari	1.4		3.7
altri problemi assimilabili a una dipendenza	1.4	5.4	
nessun altro problema di dipendenza	85.7	86.5	75.9
<b>N**</b>	<b>70</b>	<b>37</b>	<b>54</b>
<i>dati mancanti</i>	48	27	31

\* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

**T20 Frequenza del consumo di alcol, numero di "bicchieri standard" al giorno e frequenza di forti consumi di alcol prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti ) (2010)**

	Pazienti: problema principale												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Frequenza del consumo di alcol*</b>																
mai	12.0	10.0	11.4	16.5	18.5	16.9	7.9	12.5	8.9	14.9	15.4	14.9	13.5	13.4	13.5	505
1 volta al mese o meno	3.1	4.5	3.5	12.2	20.0	13.9	13.5	18.8	14.6	27.0	36.3	28.3	10.0	10.3	10.1	378
2 a 4 volte al mese	8.2	7.4	8.0	22.2	21.5	22.0	30.2	31.3	30.4	38.4	33.0	37.6	17.0	12.9	15.9	596
2 a 3 volte alla settimana	17.7	16.6	17.4	23.0	24.6	23.4	27.0	21.9	25.9	13.4	11.0	13.1	17.5	16.3	17.2	644
4 volte alla settimana o più	59.0	61.6	59.8	26.1	15.4	23.7	21.4	15.6	20.3	6.3	4.4	6.1	42.1	47.1	43.4	1'629
<b>N**</b>	<b>1'730</b>	<b>719</b>	<b>2'449</b>	<b>230</b>	<b>65</b>	<b>295</b>	<b>126</b>	<b>32</b>	<b>158</b>	<b>552</b>	<b>91</b>	<b>643</b>	<b>2'752</b>	<b>1'000</b>	<b>3'752</b>	<b>3'752</b>
<i>dati mancanti</i>	1'042	429	1'471	246	89	335	98	32	130	327	59	386	1'892	764	2'656	2'656
<b>Numero di "bicchieri standard" al giorno***</b>																
1 o 2	8.2	8.3	8.2	44.6	50.9	46.1	48.2	50.0	48.5	55.2	65.7	56.7	23.8	21.1	23.1	711
3 o 4	20.2	16.5	19.1	29.9	30.2	30.0	33.6	26.9	32.4	29.5	21.4	28.3	23.7	18.3	22.2	686
5 o 6	24.7	24.5	24.7	11.3	3.8	9.6	6.4	11.5	7.4	9.3	5.7	8.8	19.2	19.9	19.4	598
7 o 9	19.6	26.9	21.8	6.2	3.8	5.7	5.5	0.0	4.4	2.6	2.9	2.6	14.0	21.3	16.0	492
10 o più	27.3	23.8	26.2	7.9	11.3	8.7	6.4	11.5	7.4	3.5	4.3	3.6	19.3	19.4	19.4	597
<b>N**</b>	<b>1'460</b>	<b>625</b>	<b>2'085</b>	<b>177</b>	<b>53</b>	<b>230</b>	<b>110</b>	<b>26</b>	<b>136</b>	<b>431</b>	<b>70</b>	<b>501</b>	<b>2'254</b>	<b>830</b>	<b>3'084</b>	<b>3'084</b>
<i>dati mancanti</i>	1'312	523	1'835	299	101	400	114	38	152	448	80	528	2'390	934	3'324	3'324
<b>Frequenza di forti consumi di alcol***</b>																
mai	14.2	15.1	14.5	39.5	43.6	40.4	34.7	43.3	36.5	55.6	58.2	55.9	27.5	27.3	27.5	924
meno di una volta al mese	10.8	12.2	11.2	25.6	34.5	27.6	28.0	23.3	27.0	25.4	29.1	25.9	16.0	15.2	15.8	531
1 volta al mese	11.2	12.0	11.5	10.3	5.5	9.2	16.9	6.7	14.9	8.9	7.6	8.7	10.7	10.5	10.7	359
1 volta alla settimana	27.4	22.2	25.9	10.3	5.5	9.2	13.6	20.0	14.9	7.5	5.1	7.2	20.5	17.9	19.8	667
quasi ogni giorno	36.4	38.4	37.0	14.4	10.9	13.6	6.8	6.7	6.8	2.6	0.0	2.3	25.2	29.1	26.2	883
<b>N**</b>	<b>1'568</b>	<b>648</b>	<b>2'216</b>	<b>195</b>	<b>55</b>	<b>250</b>	<b>118</b>	<b>30</b>	<b>148</b>	<b>493</b>	<b>79</b>	<b>572</b>	<b>2'470</b>	<b>894</b>	<b>3'364</b>	<b>3'364</b>
<i>dati mancanti</i>	1'204	500	1'704	281	99	380	106	34	140	386	71	457	2'174	870	3'044	3'044

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti che hanno indicato un consumo d'alcol. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

## T21 Frequenza del consumo di tabacco e numero di sigarette al giorno nel corso dei 30 ultimi giorni prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2010)

	Pazienti: problema principale												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Frequenza del consumo di tabacco*</b>																
mai	32.3	38.0	34.0	4.4	7.9	5.3	9.7	23.1	12.2	22.2	14.3	21.0	25.8	30.2	27.0	771
1 giorno alla settimana o meno	1.0	0.6	0.9	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.4	4.2	6.6	4.6	1.8	1.4	1.7	48
2 a 3 giorni alla settimana	0.8	0.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7	5.0	3.3	4.8	1.9	1.0	1.6	47
4 a 6 giorni alla settimana	0.6	1.1	0.8	0.5	2.6	1.1	0.9	3.8	1.4	1.3	2.2	1.5	0.9	1.4	1.0	30
1 volta al giorno	1.9	1.7	1.8	1.0	1.3	1.1	0.9	0.0	0.7	2.9	2.2	2.8	2.1	1.7	2.0	56
più volte al giorno	63.4	58.0	61.8	94.1	88.2	92.5	85.8	73.1	83.5	64.4	71.4	65.4	67.6	64.3	66.7	1'906
<b>N**</b>	<b>1'112</b>	<b>476</b>	<b>1'588</b>	<b>205</b>	<b>76</b>	<b>281</b>	<b>113</b>	<b>26</b>	<b>139</b>	<b>519</b>	<b>91</b>	<b>610</b>	<b>2'082</b>	<b>776</b>	<b>2'858</b>	<b>2'858</b>
<i>dati mancanti</i>	1'660	672	2'332	271	78	349	111	38	149	360	59	419	2'562	988	3'550	3'550
<b>Numero di sigarette al giorno***</b>																
0 a 10	16.0	19.8	17.1	11.0	15.0	12.0	17.2	20.0	17.7	54.6	54.1	54.5	26.2	25.9	26.2	486
11 a 20	40.7	46.4	42.3	57.2	48.3	54.9	57.0	55.0	56.6	37.1	36.5	37.0	43.0	44.4	43.4	806
21 a 30	29.8	27.0	29.0	20.8	25.0	21.9	20.4	15.0	19.5	6.9	6.8	6.9	21.6	22.8	21.9	407
31 o più	13.5	6.7	11.6	11.0	11.7	11.2	5.4	10.0	6.2	1.4	2.7	1.6	9.1	6.9	8.6	159
<b>N**</b>	<b>668</b>	<b>252</b>	<b>920</b>	<b>173</b>	<b>60</b>	<b>233</b>	<b>93</b>	<b>20</b>	<b>113</b>	<b>361</b>	<b>74</b>	<b>435</b>	<b>1'380</b>	<b>478</b>	<b>1'858</b>	<b>1'858</b>
<i>dati mancanti</i>	85	43	128	23	10	33	9	0	9	43	4	47	165	64	229	229

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti che hanno indicato un consumo di tabacco. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

## T22a Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2010), uomini

Pazienti: principale sostanza problematica										
	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Obiettivo di consumo*</b>										
astinenza definitiva	33.4	75.0	77.9	85.1	91.7	50.0	.	54.7	46.2	33.3
astinenza limitata nel tempo	25.0	0.0	1.0	4.0	0.0	0.0	.	8.4	0.0	0.0
consumo controllato	27.4	0.0	10.8	2.0	8.3	25.0	.	20.6	23.1	0.0
non è prevista nessuna limitazione	1.3	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	.	2.3	7.7	66.7
nessuna decisione finora	12.4	25.0	7.8	6.9	0.0	25.0	.	13.6	23.1	0.0
altro	0.4	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	.	0.5	0.0	0.0
<b>N*</b>	<b>1'123</b>	<b>4</b>	<b>204</b>	<b>101</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>214</b>	<b>13</b>	<b>3</b>
<i>dati mancanti</i>	1'649	9	259	123	12	21	5	665	50	22

## T22b Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2010), donne

<b>Obiettivo di consumo*</b>										
astinenza definitiva	36.3	100.0	69.5	64.7	75.0	30.0	.	50.0	77.8	80.0
astinenza limitata nel tempo	16.1	0.0	1.7	5.9	0.0	0.0	.	3.6	11.1	0.0
consumo controllato	28.5	0.0	11.9	11.8	25.0	10.0	.	25.0	11.1	0.0
non è prevista nessuna limitazione	2.5	0.0	1.7	0.0	0.0	10.0	.	0.0	0.0	0.0
nessuna decisione finora	16.4	0.0	10.2	17.6	0.0	50.0	.	21.4	0.0	20.0
altro	0.2	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	.	0.0	0.0	0.0
<b>N*</b>	<b>446</b>	<b>3</b>	<b>59</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>9</b>	<b>5</b>
<i>dati mancanti</i>	702	3	89	47	15	23	1	122	53	10

## T22c Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2010), uomini e donne

<b>Obiettivo di consumo*</b>										
astinenza definitiva	34.2	85.7	76.0	82.2	87.5	35.7	.	54.1	59.1	62.5
astinenza limitata nel tempo	22.5	0.0	1.1	4.2	0.0	0.0	.	7.9	4.5	0.0
consumo controllato	27.7	0.0	11.0	3.4	12.5	14.3	.	21.1	18.2	0.0
non è prevista nessuna limitazione	1.7	0.0	1.9	1.7	0.0	7.1	.	2.1	4.5	25.0
nessuna decisione finora	13.5	14.3	8.4	8.5	0.0	42.9	.	14.5	13.6	12.5
altro	0.4	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	.	0.4	0.0	0.0
<b>N*</b>	<b>1'569</b>	<b>7</b>	<b>263</b>	<b>118</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>242</b>	<b>22</b>	<b>8</b>
<i>dati mancanti</i>	2'351	12	348	170	27	44	6	787	103	32

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

## T23a Problemi psichici nel corso della vita (2010), uomini

## Uomini

	Pazienti: problema principale									
	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Problemi psichici*</b>										
depressione grave	30.4	100.0	36.0	23.1	44.4	33.3	.	20.5	20.0	33.3
stati ansiosi/tensione nervosa grave	23.2	0.0	35.4	33.3	11.1	66.7	.	24.6	0.0	50.0
diff. di compr./memoria/concentrazion.	11.8	0.0	16.5	17.9	44.4	0.0	.	22.1	20.0	50.0
allucinazioni	2.8	0.0	4.9	7.7	22.2	0.0	.	5.6	0.0	16.7
diff. a controllare comp. violenti	11.8	0.0	15.2	14.1	11.1	0.0	.	20.5	0.0	66.7
problemi psichici curati con medicine	11.1	50.0	23.8	16.7	0.0	33.3	.	8.7	20.0	0.0
pensieri suicidi seri	12.7	50.0	18.3	16.7	11.1	33.3	.	12.3	0.0	33.3
tentativi di suicidio	6.4	50.0	11.6	6.4	0.0	33.3	.	4.1	0.0	16.7
altro/i problema/i psichico/i	3.4	0.0	2.4	3.8	11.1	0.0	.	4.1	0.0	0.0
nessuno	43.7	0.0	34.8	41.0	22.2	0.0	.	46.7	60.0	16.7
<b>N**</b>	<b>865</b>	<b>2</b>	<b>164</b>	<b>78</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<i>dati mancanti</i>	<i>1'907</i>	<i>11</i>	<i>299</i>	<i>146</i>	<i>15</i>	<i>22</i>	<i>5</i>	<i>684</i>	<i>58</i>	<i>19</i>

\* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

## T23b Problemi psichici nel corso della vita (2010), donne

Donne

	Pazienti: problema principale									
	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Problemi psichici*</b>										
depressione grave	46.0	33.3	45.8	53.3	16.7	55.6	.	20.7	28.6	75.0
stati ansiosi/tensione nervosa grave	39.0	0.0	43.8	26.7	0.0	77.8	.	34.5	0.0	50.0
diff. di compr./memoria/concentrazion.	11.7	66.7	22.9	13.3	0.0	22.2	.	13.8	0.0	50.0
allucinazioni	2.7	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	.	3.4	0.0	25.0
diff. a controllare comp. violenti	7.4	0.0	12.5	13.3	0.0	0.0	.	31.0	0.0	25.0
problemi psichici curati con medicine	26.2	33.3	33.3	20.0	50.0	33.3	.	17.2	14.3	0.0
pensieri suicidi seri	20.4	33.3	29.2	33.3	16.7	44.4	.	41.4	0.0	75.0
tentativi di suicidio	12.3	0.0	22.9	26.7	0.0	44.4	.	24.1	0.0	25.0
altro/i problema/i psichico/i	7.6	0.0	2.1	0.0	16.7	0.0	.	0.0	0.0	0.0
nessuno	21.3	0.0	22.9	33.3	16.7	0.0	.	24.1	57.1	0.0
<b>N**</b>	<b>367</b>	<b>3</b>	<b>48</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>7</b>	<b>4</b>
<i>dati mancanti</i>	<i>781</i>	<i>3</i>	<i>100</i>	<i>49</i>	<i>13</i>	<i>24</i>	<i>1</i>	<i>121</i>	<i>55</i>	<i>11</i>

\* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

## T23c Problemi psichici nel corso della vita (2010), uomini e donne

## Uomini e donne

	Pazienti: problema principale									
	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Problemi psichici*</b>										
depressione grave	35.1	60.0	38.2	28.0	33.3	50.0	.	20.5	25.0	50.0
stati ansiosi/tensione nervosa grave	27.9	0.0	37.3	32.3	6.7	75.0	.	25.9	0.0	50.0
diff. di compr./memoria/concentrazion.	11.8	40.0	17.9	17.2	26.7	16.7	.	21.0	8.3	50.0
allucinazioni	2.8	0.0	3.8	7.5	13.3	0.0	.	5.4	0.0	20.0
diff. a controllare comp. violenti	10.5	0.0	14.6	14.0	6.7	0.0	.	21.9	0.0	50.0
problemi psichici curati con medicine	15.6	40.0	25.9	17.2	20.0	33.3	.	9.8	16.7	0.0
pensieri suicidi seri	15.0	40.0	20.8	19.4	13.3	41.7	.	16.1	0.0	50.0
tentativi di suicidio	8.1	20.0	14.2	9.7	0.0	41.7	.	6.7	0.0	20.0
altro/i problema/i psichico/i	4.6	0.0	2.4	3.2	13.3	0.0	.	3.6	0.0	0.0
nessuno	37.0	0.0	32.1	39.8	20.0	0.0	.	43.8	58.3	10.0
<b>N**</b>	<b>1'232</b>	<b>5</b>	<b>212</b>	<b>93</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>224</b>	<b>12</b>	<b>10</b>
<i>dati mancanti</i>	2'688	14	399	195	28	46	6	805	113	30

\* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

## T24 Parenti/conoscenti: legame tra l'utente e la persona sintomatica (2010)

Parenti o conoscenti				
	Uomini	Donne	Totale	
	%	%	%	N
<b>L'utente è... *</b>				
madre/padre	26.4	30.9	29.9	284
figlio/figlia	21.8	13.7	15.4	146
sorella/fratello	3.6	4.0	3.9	37
partner	27.4	45.6	41.8	397
altro parente	1.0	0.8	0.8	8
collega/amico/a	4.1	2.0	2.5	24
datore di lavoro/docente	5.6	0.8	1.8	17
tutore/curatore	0.0	0.0	0.0	0
altro	10.2	2.3	3.9	37
<b>N**</b>	<b>197</b>	<b>752</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
<i>dati mancanti</i>	12	36	48	48

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

## T25 Parenti/conoscenti: problema principale e altri problemi della persona sintomatica (2010)

Parenti o conoscenti					
	Totale			Totale	
	%	N		%	N
<b>Problema principale della persona sintomatica*</b>			<b>Altri problemi della persona sintomatica***</b>		
alcol	66.6	641	alcol	27.6	98
cocktail (eroina e cocaina)	0.6	6	cocktail (eroina e cocaina)	1.1	4
eroina	4.1	39	eroina	3.7	13
metadone	0.6	6	metadone	3.4	12
altri oppiacei	0.3	3	altri oppiacei	0.3	1
cocaina	3.6	35	cocaina	7.0	25
crack, freebase	0.1	1	crack, freebase	0.0	0
amfetamine	0.3	3	amfetamine	0.6	2
MDMA e affini (ecstasy)	0.1	1	MDMA e affini (ecstasy)	1.4	5
altri stimolanti	0.0	0	altri stimolanti	0.0	0
barbiturici	1.1	11	barbiturici	0.8	3
benzodiazepine	0.4	4	benzodiazepine	3.1	11
altri sonniferi e tranquillanti	0.1	1	altri sonniferi e tranquillanti	2.5	9
LSD	0.1	1	LSD	0.0	0
altri allucinogeni	0.8	8	altri allucinogeni	0.0	0
sostanze volatili (per es., solventi)	0.0	0	sostanze volatili (per es., solventi)	0.0	0
canapa	11.7	113	canapa	18.3	65
tabacco	1.1	11	tabacco	20.0	71
altra/e sostanza/e	0.6	6	altra/e sostanza/e	0.0	0
gioco patologico	1.6	15	gioco patologico	3.9	14
disturbi alimentari	1.8	17	disturbi alimentari	2.5	9
altri problemi assimilabili a una dipendenza	4.2	40	altri problemi assimilabili a una dipendenza	6.8	24
			nessun altro problema di dipendenza	26.8	95
<b>N**</b>	<b>962</b>	<b>962</b>	<b>N**</b>	<b>355</b>	<b>355</b>
<i>dati mancanti</i>	36	36	<i>dati mancanti</i>	638	638

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

\*\*\* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

## T26 Parenti/conoscenti: Problemi della persona di contatto legati ai problemi della persona sintomatica (2010)

Parenti o conoscenti				
	Uomini	Donne	Totale	
	%	%	%	N
<b>propri problemi*</b>				
propri problemi di consumo	8.8	8.1	8.3	27
propri comportamenti di dipendenza	1.8	1.1	1.2	4
propri problemi somatici	0.0	7.8	6.4	21
propri problemi psichici	22.8	34.1	32.1	105
problemi con il/la partner	33.3	44.1	42.2	138
problemi di famiglia	56.1	59.6	59.0	193
problemi finanziari	8.8	9.6	9.5	31
propri problemi prof./di formazione	8.8	4.4	5.2	17
problemi di alloggio	7.0	4.4	4.9	16
problemi di violenza (vittima)	10.5	10.0	10.1	33
problemi per controllare la violenza	0.0	0.7	0.6	2
problemi giuridici	8.8	4.1	4.9	16
altro/i	1.8	0.7	0.9	3
nessuno	15.8	13.0	13.5	44
<b>N**</b>	<b>57</b>	<b>270</b>	<b>327</b>	<b>327</b>
<i>dati mancanti</i>	<i>152</i>	<i>517</i>	<i>670</i>	<i>670</i>

\* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T27 Sesso e età dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale<sup>1</sup>) e dei parenti o conoscenti (2010)

	Pazienti: problema principale <sup>1</sup>												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Sesso*</b>																			
maschile			70.3			72.8			75.2			81.0			20.5			63.5	4'268
femminile			28.3			23.3			22.0			16.9			79.5			34.7	2'333
Sesso non noto			1.4			3.8			2.8			2.1			0.0			1.7	116
<b>N**</b>	<b>2'479</b>	<b>997</b>	<b>3'527</b>	<b>418</b>	<b>134</b>	<b>574</b>	<b>212</b>	<b>62</b>	<b>282</b>	<b>703</b>	<b>147</b>	<b>868</b>	<b>196</b>	<b>762</b>	<b>958</b>	<b>4'268</b>	<b>2'333</b>	<b>6'717</b>	<b>6'717</b>
<b>Età (in anni)*</b>																			
fino a 14 anni	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	4.8	6.1	5.1	2.1	0.8	1.0	1.2	1.1	1.2	76
15-19	2.7	1.7	2.4	1.9	8.2	3.4	3.3	8.1	4.4	62.2	52.4	60.5	6.2	3.4	4.0	13.5	7.4	11.4	748
20-24	4.5	3.4	4.2	9.4	26.1	13.4	12.7	19.4	14.2	13.1	12.2	12.9	3.6	4.0	3.9	6.9	6.7	6.8	450
25-29	7.8	4.3	6.8	14.9	24.6	17.2	25.5	22.6	24.8	9.0	11.6	9.4	4.1	7.1	6.5	9.7	7.9	9.1	598
30-34	8.8	9.2	8.9	19.7	9.7	17.2	19.3	25.8	20.8	6.4	7.5	6.6	8.2	8.7	8.6	10.2	9.5	10.0	656
35-39	10.9	8.4	10.2	22.1	6.0	18.1	17.5	6.5	15.0	2.4	2.0	2.4	9.2	9.9	9.8	11.0	8.5	10.1	665
40-44	13.4	14.3	13.6	18.7	16.4	18.1	13.7	11.3	13.1	1.3	4.8	1.9	12.8	14.6	14.3	11.7	13.5	12.3	812
45-49	14.5	16.3	15.0	9.4	6.0	8.5	4.2	6.5	4.7	0.7	1.4	0.8	11.8	18.3	17.0	10.7	14.3	12.0	788
50-54	13.7	16.1	14.3	2.9	1.5	2.5	2.8	0.0	2.2	0.0	2.0	0.4	13.8	14.8	14.6	9.3	12.7	10.5	693
55-59	10.0	11.1	10.3	1.0	1.5	1.1	0.5	0.0	0.4	0.1	0.0	0.1	12.8	7.3	8.4	6.8	7.7	7.1	468
60-64	7.8	7.4	7.7	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	5.1	4.8	4.9	5.3	5.1	333
65-69	3.3	5.1	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	2.6	3.1	2.3	3.3	2.6	172
70-74	1.8	1.9	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	2.4	2.6	1.2	1.7	1.4	91
75 e più	0.8	0.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.9	1.4	0.6	0.6	0.6	40
<b>N**</b>	<b>2'475</b>	<b>996</b>	<b>3'471</b>	<b>417</b>	<b>134</b>	<b>551</b>	<b>212</b>	<b>62</b>	<b>274</b>	<b>703</b>	<b>147</b>	<b>850</b>	<b>195</b>	<b>758</b>	<b>953</b>	<b>4'262</b>	<b>2'328</b>	<b>6'590</b>	<b>6'590</b>
<i>dati mancanti</i>	4	1	56	1	0	23	0	0	8	0	0	18	1	4	5	6	5	127	127
<b>Età</b>																			
media	45.0	46.9	45.5	35.8	31.2	34.7	32.9	30.7	32.4	20.7	22.9	21.0	45.7	44.4	44.6	38.9	42.2	40.0	
deviazione standard	13.3	12.5	13.1	8.4	9.7	8.9	8.2	7.8	8.2	6.5	9.0	7.0	15.7	13.1	13.7	15.0	14.4	14.9	
1° quartile	35.5	38.6	36.4	29.7	23.3	27.6	27.2	24.5	26.5	16.6	16.9	16.7	35.6	35.7	35.7	26.8	31.0	28.2	
mediana	45.6	47.3	46.1	36.3	28.9	34.4	31.9	30.0	31.2	18.0	18.5	18.1	47.6	45.4	45.6	38.9	43.4	40.6	
3° quartile	54.4	55.6	54.7	41.7	40.3	41.2	39.1	34.8	38.9	22.6	26.6	23.7	56.1	52.3	52.9	50.0	52.2	51.0	
<b>N**</b>	<b>2'475</b>	<b>996</b>	<b>3'471</b>	<b>417</b>	<b>134</b>	<b>551</b>	<b>212</b>	<b>62</b>	<b>274</b>	<b>703</b>	<b>147</b>	<b>850</b>	<b>195</b>	<b>758</b>	<b>953</b>	<b>4'262</b>	<b>2'328</b>	<b>6'590</b>	
<i>dati mancanti</i>	4	1	56	1	0	23	0	0	8	0	0	18	1	4	5	6	5	127	

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

**T28 Stato civile e grado di urbanizzazione del domicilio dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale<sup>1</sup>) e dei parenti o conoscenti (2010)**

	Pazienti: problema principale <sup>1</sup>												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			N
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Stato civile*</b>																			
celibe/nubile	42.3	32.3	39.4	68.3	71.7	69.2	73.5	75.4	74.0	95.0	90.0	94.2	29.4	22.8	24.1	55.4	38.3	49.3	2'938
sposato	31.7	28.5	30.8	16.0	11.7	14.9	15.3	7.0	13.4	3.3	3.1	3.2	58.8	54.7	55.5	25.7	33.5	28.4	1'696
separato-a (giuridicamente)	5.4	5.1	5.4	2.2	2.5	2.3	2.1	3.5	2.4	0.3	3.1	0.8	4.1	4.2	4.2	4.0	4.4	4.1	246
divorziato-a	18.1	28.3	21.0	11.5	10.0	11.1	8.5	10.5	8.9	1.1	3.1	1.4	6.5	14.4	12.9	13.1	19.5	15.4	916
vedovo-a	2.0	5.3	2.9	0.3	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	2.7	2.4	1.3	3.4	2.1	123
unione registrata	0.5	0.4	0.5	1.7	3.3	2.1	0.5	3.5	1.2	0.3	0.8	0.4	0.0	1.1	0.9	0.6	0.9	0.7	43
<b>N**</b>	<b>2'241</b>	<b>898</b>	<b>3'139</b>	<b>357</b>	<b>120</b>	<b>477</b>	<b>189</b>	<b>57</b>	<b>246</b>	<b>641</b>	<b>130</b>	<b>771</b>	<b>170</b>	<b>707</b>	<b>877</b>	<b>3'837</b>	<b>2'125</b>	<b>5'962</b>	<b>5'962</b>
<i>dati mancanti</i>	238	99	388	61	14	97	23	5	36	62	17	97	26	55	81	431	208	755	755
<b>Grado di urbanizzazione*</b>																			
grandi centri urbani	7.6	10.7	8.4	3.1	0.0	2.4	1.5	0.0	1.1	0.4	1.4	0.6	9.9	8.3	8.7	5.3	7.4	6.0	388
periferia dei grandi centri	16.1	15.9	16.9	2.6	1.6	4.8	7.4	5.1	8.5	5.6	4.9	7.4	15.1	13.6	13.9	11.9	12.4	13.1	849
città di media importanza	14.4	13.4	13.9	26.8	30.6	26.8	24.5	20.3	22.9	28.9	33.1	29.0	19.8	17.9	18.3	19.4	18.9	18.9	1'223
piccole città	34.3	33.1	33.6	43.4	34.7	40.0	41.7	54.2	43.2	35.8	31.7	34.5	33.9	33.5	33.5	36.2	34.2	35.0	2'263
campagna	27.7	26.9	27.2	24.2	33.1	26.0	25.0	20.3	24.4	29.2	28.9	28.5	21.4	26.7	25.6	27.3	27.1	27.0	1'747
<b>N**</b>	<b>2'378</b>	<b>943</b>	<b>3'371</b>	<b>392</b>	<b>124</b>	<b>538</b>	<b>204</b>	<b>59</b>	<b>271</b>	<b>695</b>	<b>142</b>	<b>855</b>	<b>192</b>	<b>744</b>	<b>936</b>	<b>4'118</b>	<b>2'237</b>	<b>6'470</b>	<b>6'470</b>
<i>dati mancanti</i>	101	54	156	26	10	36	8	3	11	8	5	13	4	18	22	150	96	247	247

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T29 Tipo di nucleo familiare, situazione di domicilio e tipo di relazione di coppia dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale<sup>1</sup>) e dei parenti o conoscenti (2010)

	Pazienti: problema principale <sup>1</sup>												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			N
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Tipo di nucleo familiare*</b>																			
da solo-a	42.6	41.5	42.3	42.5	28.6	39.3	41.1	38.5	40.6	12.2	10.0	11.9	17.5	15.8	16.1	35.0	29.3	33.0	1'402
con i genitori/un genitore	6.8	2.0	5.5	12.3	12.9	12.4	9.9	17.9	11.7	70.9	49.0	67.4	9.3	5.6	6.2	20.8	9.3	16.7	712
con figlio-a-i	1.8	11.3	4.5	0.0	11.4	2.7	1.4	10.3	3.3	0.2	6.0	1.1	3.1	16.6	14.4	1.3	12.3	5.2	220
con un-a partner (senza figli)	24.3	25.1	24.5	14.9	20.0	16.1	14.2	25.6	16.7	3.6	11.0	4.8	29.9	23.5	24.6	18.9	23.3	20.4	869
con un-a partner e figlio-a-i	17.2	12.5	15.9	13.2	8.6	12.1	16.3	0.0	12.8	2.9	3.0	2.9	37.1	35.6	35.8	15.0	18.6	16.3	692
con altri parenti-familiari	1.1	1.6	1.3	1.8	1.4	1.7	1.4	2.6	1.7	1.9	1.0	1.8	1.0	1.0	1.0	1.3	1.4	1.3	57
con amici (comunità abitativa)	1.8	1.6	1.7	2.6	2.9	2.7	7.8	2.6	6.7	1.9	3.0	2.1	0.0	1.0	0.9	2.2	1.6	2.0	84
altro	4.3	4.4	4.3	12.7	14.3	13.1	7.8	2.6	6.7	6.3	17.0	8.0	2.1	0.8	1.0	5.6	4.2	5.1	218
<b>N**</b>	<b>1'582</b>	<b>638</b>	<b>2'220</b>	<b>228</b>	<b>70</b>	<b>298</b>	<b>141</b>	<b>39</b>	<b>180</b>	<b>523</b>	<b>100</b>	<b>623</b>	<b>97</b>	<b>481</b>	<b>578</b>	<b>2'757</b>	<b>1'497</b>	<b>4'254</b>	<b>4'254</b>
<i>dati mancanti</i>	897	359	1'307	190	64	276	71	23	102	180	47	245	99	281	380	1'511	836	2'463	2'463
<b>Situazione di domicilio*</b>																			
domicilio fisso	92.9	92.7	92.8	78.2	79.7	79.5	89.7	85.7	89.2	92.9	90.0	92.0	98.3	97.0	97.2	91.8	93.6	92.4	4'341
senza domicilio fisso	4.5	5.8	4.8	13.5	16.5	13.4	8.2	11.9	8.7	4.0	6.4	4.6	1.7	2.8	2.6	5.1	5.2	5.1	239
istituzione	2.7	1.6	2.4	8.3	3.8	7.1	2.1	2.4	2.1	3.1	3.6	3.4	0.0	0.2	0.2	3.1	1.3	2.5	118
<b>N**</b>	<b>1'707</b>	<b>695</b>	<b>2'448</b>	<b>252</b>	<b>79</b>	<b>351</b>	<b>146</b>	<b>42</b>	<b>195</b>	<b>552</b>	<b>110</b>	<b>679</b>	<b>115</b>	<b>530</b>	<b>645</b>	<b>2'965</b>	<b>1'630</b>	<b>4'698</b>	<b>4'698</b>
<i>dati mancanti</i>	772	302	1'079	166	55	223	66	20	87	151	37	189	81	232	313	1'303	703	2'019	2'019
<b>Tipo di relazione di coppia*</b>																			
senza partner, sola-a	32.2	37.3	33.7	41.0	21.1	36.1	34.9	37.5	35.4	68.6	45.6	64.5	17.4	21.6	20.9	38.9	31.3	36.2	1'217
relazione-i saltuaria-e	6.0	4.4	5.5	6.9	7.0	7.0	4.8	12.5	6.3	8.0	11.4	8.6	1.2	1.7	1.6	5.9	4.1	5.2	176
relazione fissa, vivendo separat.	10.4	12.8	11.1	11.6	33.3	17.0	22.2	18.8	21.5	12.9	25.3	15.2	8.1	8.7	8.6	11.4	13.7	12.2	411
relazione fissa, vivendo insieme	51.4	45.5	49.7	40.5	38.6	40.0	38.1	31.3	36.7	10.5	17.7	11.8	73.3	68.0	68.9	43.8	50.9	46.4	1'562
<b>N**</b>	<b>1'264</b>	<b>523</b>	<b>1'787</b>	<b>173</b>	<b>57</b>	<b>230</b>	<b>126</b>	<b>32</b>	<b>158</b>	<b>363</b>	<b>79</b>	<b>442</b>	<b>86</b>	<b>416</b>	<b>502</b>	<b>2'139</b>	<b>1'227</b>	<b>3'366</b>	<b>3'366</b>
<i>dati mancanti</i>	1'215	474	1'740	245	77	344	86	30	124	340	68	426	110	346	456	2'129	1'106	3'351	3'351

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

### T30 Più alta formazione portata a termine, fonte di reddito principale e attività principale dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale<sup>1</sup>) e dei parenti o conoscenti (2010)

	Pazienti: problema principale <sup>1</sup>												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Più alta formazione portata a termine**</b>																			
nessuna form. terminata	7.0	6.5	6.9	6.8	9.9	7.6	6.1	7.1	6.3	23.3	23.8	23.4	15.5	3.2	5.5	11.0	8.1	10.0	403
scuola dell'obbligo	14.4	17.6	15.3	33.2	40.7	35.0	19.0	35.7	22.8	50.4	56.2	51.3	10.3	15.4	14.4	24.4	22.4	23.7	952
scolarità complementare	3.4	6.3	4.2	4.0	7.4	4.8	2.7	4.8	3.2	3.9	2.9	3.7	0.0	4.6	3.8	3.4	5.7	4.2	168
apprendistato/ scuola profes.	54.9	52.9	54.3	50.0	33.3	45.9	58.5	45.2	55.6	18.7	15.2	18.1	40.2	48.9	47.2	45.8	45.3	45.6	1'832
liceo/diploma	4.2	4.5	4.3	1.2	6.2	2.4	2.0	2.4	2.1	2.4	0.0	2.0	1.0	6.1	5.1	3.4	5.0	3.9	158
magistrale, scuola pedagogic.	1.2	2.4	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	0.3	1.0	3.9	3.4	0.8	2.5	1.4	55
form. profession. superiore	6.4	4.7	6.0	2.0	2.5	2.1	7.5	2.4	6.3	0.7	0.0	0.6	9.3	7.8	8.1	5.0	5.0	5.0	199
scuola profession. superiore	2.0	1.6	1.9	0.4	0.0	0.3	0.0	2.4	0.5	0.0	0.0	0.0	4.1	2.2	2.6	1.3	1.7	1.5	59
alta scuola specializzata	2.0	1.1	1.8	1.2	0.0	0.9	1.4	0.0	1.1	0.2	1.0	0.3	4.1	1.7	2.2	1.6	1.1	1.4	56
università, politecnico	4.4	2.4	3.9	1.2	0.0	0.9	2.7	0.0	2.1	0.2	0.0	0.2	14.4	6.1	7.7	3.4	3.3	3.4	135
<b>N**</b>	<b>1'491</b>	<b>552</b>	<b>2'043</b>	<b>250</b>	<b>81</b>	<b>331</b>	<b>147</b>	<b>42</b>	<b>189</b>	<b>540</b>	<b>105</b>	<b>645</b>	<b>97</b>	<b>409</b>	<b>506</b>	<b>2'685</b>	<b>1'332</b>	<b>4'017</b>	<b>4'017</b>
<i>dati mancanti</i>	988	445	1'484	168	53	243	65	20	93	163	42	223	99	353	452	1'583	1'001	2'700	2'700
<b>Fonte di reddito principale*</b>																			
reddito da lavoro	56.7	39.5	51.8	29.8	22.1	27.7	62.3	38.3	56.5	26.0	25.6	25.9	68.2	64.1	64.9	49.6	45.9	48.2	2'392
risparmi	0.6	1.5	0.8	0.4	0.0	0.3	0.0	2.1	0.5	0.5	0.0	0.4	0.8	0.4	0.4	0.5	0.9	0.6	31
rendita (AVS/AI, ecc.)	17.8	25.2	20.0	13.6	16.3	14.8	6.3	14.9	7.9	1.9	4.3	2.6	13.6	10.5	11.1	13.6	17.5	15.0	747
assistenze/previdenza sociale	11.6	13.2	12.0	37.9	48.8	39.8	18.9	21.3	20.1	6.0	16.2	7.8	2.3	2.4	2.4	12.4	11.2	12.0	598
assicurazione disoccupazione	6.7	4.8	6.1	8.1	3.5	6.9	6.3	10.6	7.0	3.0	1.7	2.7	3.0	2.0	2.2	5.9	3.4	5.0	248
sostegno del/della partner	1.3	11.3	4.2	1.8	2.3	2.1	0.0	2.1	0.5	0.2	3.4	0.7	0.8	13.8	11.3	1.0	10.7	4.4	219
sosteg. genitori/familiari/amici	3.0	2.9	3.0	2.2	3.5	2.6	4.4	10.6	6.1	60.7	43.6	57.5	9.8	4.6	5.6	14.5	8.4	12.3	612
spacciando/tagliando	0.1	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	0.6	0.0	0.5	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	5
altre entrate illegali	0.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	4
prostituzione	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
altra-e	2.1	1.5	2.0	5.1	3.5	5.0	1.3	0.0	0.9	1.6	4.3	2.0	1.5	2.2	2.1	2.2	2.1	2.2	108
<b>N**</b>	<b>1'818</b>	<b>726</b>	<b>2'591</b>	<b>272</b>	<b>86</b>	<b>379</b>	<b>159</b>	<b>47</b>	<b>214</b>	<b>570</b>	<b>117</b>	<b>702</b>	<b>132</b>	<b>543</b>	<b>675</b>	<b>3'151</b>	<b>1'707</b>	<b>4'964</b>	<b>4'964</b>
<i>dati mancanti</i>	661	271	936	146	48	195	53	15	68	133	30	166	64	219	283	1'117	626	1'753	1'753
<b>Attività principale (nel corso dei 30 ultimi giorni)*</b>																			
att. a tempo pieno (70% o più)	53.7	27.2	46.2	29.3	11.0	24.9	55.2	33.3	50.3	19.5	14.7	18.7	54.9	40.7	43.3	45.1	30.5	40.0	1'705
attività a tempo parziale	4.1	20.6	8.8	3.0	15.1	5.9	6.3	9.5	7.0	1.3	9.2	2.6	6.9	29.3	25.2	3.7	20.9	9.6	410
varie attività occas.	1.6	1.3	1.5	4.3	1.4	3.6	0.7	0.0	0.5	0.9	0.9	0.9	0.0	1.5	1.3	1.5	1.3	1.4	61
in formazione	2.8	2.2	2.7	1.3	4.1	2.0	2.1	7.1	3.2	62.5	58.7	61.8	13.7	4.4	6.1	15.5	9.7	13.5	574
inattivo sul mercat. del lavor.	20.9	33.9	24.5	22.8	26.0	23.6	15.4	19.0	16.2	3.2	4.6	3.4	14.7	17.0	16.5	16.7	24.5	19.4	826
disoccup., ricerc. di un lavoro	9.5	8.2	9.1	20.7	19.2	20.3	10.5	16.7	11.9	4.7	3.7	4.5	2.9	3.1	3.1	9.1	6.4	8.2	349
disoccupato, lav. fut. garant.	0.3	0.8	0.5	0.0	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.6	0.9	0.6	2.0	0.2	0.5	0.4	0.5	0.4	18
altra	7.2	5.8	6.8	18.5	21.9	19.3	9.8	14.3	10.8	7.3	7.3	7.3	4.9	3.7	4.0	8.0	6.2	7.4	315
<b>N**</b>	<b>1'587</b>	<b>625</b>	<b>2'212</b>	<b>232</b>	<b>73</b>	<b>305</b>	<b>143</b>	<b>42</b>	<b>185</b>	<b>533</b>	<b>109</b>	<b>642</b>	<b>102</b>	<b>454</b>	<b>556</b>	<b>2'784</b>	<b>1'474</b>	<b>4'258</b>	<b>4'258</b>
<i>dati mancanti</i>	892	372	1'315	186	61	269	69	20	97	170	38	226	94	308	402	1'484	859	2'459	2'459

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T31 Statuto professionale e reddito mensile netto dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale<sup>1</sup>) e dei parenti o conoscenti (2010)

	Pazienti: problema principale <sup>1</sup>												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Statuto professionale*</b>																			
senza attività professionale	30.4	39.9	33.1	58.3	65.8	60.3	23.1	58.8	29.5	11.7	15.4	12.2	18.6	23.1	22.3	28.6	34.8	30.7	542
apprendista, praticante	1.3	1.0	1.2	1.0	5.3	2.1	2.6	0.0	2.1	36.8	38.5	37.0	7.0	1.5	2.5	6.7	3.5	5.6	99
manovale, operaio-a ausiliar.	3.8	6.9	4.7	7.8	10.5	8.5	7.7	0.0	6.3	1.2	3.8	1.6	2.3	3.6	3.4	4.1	5.6	4.6	82
operaio-a con formaz. pratica	5.5	7.2	6.0	5.8	2.6	5.0	7.7	0.0	6.3	3.7	3.8	3.7	0.0	4.6	3.8	5.7	5.6	5.7	100
oper. con form. certif. (AFC)	12.0	2.7	9.4	13.6	2.6	10.6	16.7	11.8	15.8	8.6	3.8	7.9	7.0	9.2	8.8	11.6	5.1	9.4	166
caposquadra	2.1	0.0	1.5	1.0	0.0	0.7	6.4	5.9	6.3	2.5	0.0	2.1	0.0	2.1	1.7	2.2	0.8	1.7	30
impiegato-a non qualificato-a	19.7	24.4	21.1	7.8	10.5	8.5	17.9	17.6	17.9	1.8	11.5	3.2	23.3	27.2	26.5	15.9	23.1	18.4	324
impieg. qualif., quadro medio	11.2	8.9	10.5	1.9	0.0	1.4	10.3	0.0	8.4	3.1	7.7	3.7	9.3	14.9	13.9	9.4	9.6	9.5	167
imp. funz. dirett., quadr. sup.	3.1	1.0	2.5	1.0	2.6	1.4	2.6	0.0	2.1	1.8	0.0	1.6	9.3	2.1	3.4	2.8	1.5	2.4	42
indipendente	9.1	6.5	8.4	1.9	0.0	1.4	2.6	0.0	2.1	1.2	0.0	1.1	9.3	8.7	8.8	6.5	6.3	6.5	114
scolaro-a, studente	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.3	5.9	2.1	26.4	15.4	24.9	11.6	2.6	4.2	5.6	3.5	4.9	86
altro statuto	0.8	0.3	0.7	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.1	1.2	0.0	1.1	2.3	0.5	0.8	0.9	0.5	0.7	13
<b>N**</b>	<b>714</b>	<b>291</b>	<b>1'005</b>	<b>103</b>	<b>38</b>	<b>141</b>	<b>78</b>	<b>17</b>	<b>95</b>	<b>163</b>	<b>26</b>	<b>189</b>	<b>43</b>	<b>195</b>	<b>238</b>	<b>1'162</b>	<b>603</b>	<b>1'765</b>	<b>1'765</b>
<i>dati mancanti</i>	1'765	706	2'522	315	96	433	134	45	187	540	121	679	153	567	720	3'106	1'730	4'952	4'952
<b>Reddito mensile netto*</b>																			
nessun reddito	26.0	34.6	28.1	28.6	26.7	28.1	17.5	27.3	19.6	48.8	27.3	45.7	41.2	21.1	25.0	30.4	30.5	30.4	340
fino a 1000 fr.	6.2	6.5	6.3	16.7	16.7	16.7	2.5	0.0	2.0	28.7	36.4	29.8	5.9	9.9	9.1	10.9	10.1	10.6	119
da 1001 a 2000 fr.	4.9	11.1	6.4	19.0	30.0	21.9	17.5	18.2	17.6	8.5	13.6	9.3	0.0	8.5	6.8	7.3	12.9	8.9	99
da 2001 a 3000 fr.	10.2	15.7	11.6	13.1	23.3	15.8	10.0	27.3	13.7	0.8	4.5	1.3	0.0	15.5	12.5	8.4	16.4	10.6	119
da 3001 a 4000 fr.	13.4	11.1	12.9	10.7	3.3	8.8	15.0	9.1	13.7	2.3	13.6	4.0	11.8	11.3	11.4	11.5	10.1	11.1	124
da 4001 a 5000 fr.	16.0	12.4	15.1	8.3	0.0	6.1	20.0	18.2	19.6	7.8	0.0	6.6	17.6	14.1	14.8	14.1	10.1	13.0	145
da 5001 a 6000 fr.	11.3	5.9	10.0	2.4	0.0	1.8	15.0	0.0	11.8	1.6	4.5	2.0	0.0	5.6	4.5	9.1	4.7	7.9	88
da 6001 a 8000 fr.	7.9	2.0	6.4	1.2	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.7	23.5	11.3	13.6	5.5	3.8	5.0	56
da 8001 a 10 000 fr.	2.1	0.7	1.8	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	2.0	0.8	0.0	0.7	0.0	2.8	2.3	1.8	1.3	1.6	18
da 10 001 a 15 000 fr.	1.1	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.4	5
più di 15 000 fr.	0.9	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.3	0.4	5
<b>N**</b>	<b>469</b>	<b>153</b>	<b>622</b>	<b>84</b>	<b>30</b>	<b>114</b>	<b>40</b>	<b>11</b>	<b>51</b>	<b>129</b>	<b>22</b>	<b>151</b>	<b>17</b>	<b>71</b>	<b>88</b>	<b>800</b>	<b>318</b>	<b>1'118</b>	<b>1'118</b>
<i>dati mancanti</i>	2'010	844	2'905	334	104	460	172	51	231	574	125	717	179	691	870	3'468	2'015	5'599	5'599

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T32a Ragione principale della fine del trattamento/accompagnamento dei pazienti (in rapporto al problema principale<sup>1</sup>) e dei parenti o conoscenti (2010)

Ragione principale*	Pazienti: problema principale <sup>1</sup>												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			N
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
conclus. pianific. senza passag.	49.4	47.7	48.8	21.4	22.1	21.5	34.4	25.8	32.6	65.8	62.7	64.7	65.3	67.0	66.7	50.1	53.7	51.1	3'410
conclus. pianific. con passag.	5.4	7.8	6.1	14.8	14.5	15.4	5.7	25.8	10.3	3.0	4.2	3.6	2.0	2.6	2.5	5.8	6.9	6.4	424
cambio di domicilio	2.9	3.3	3.0	4.9	9.9	6.7	8.0	3.2	6.7	1.9	2.8	2.0	0.0	0.9	0.7	2.9	2.6	2.9	192
ospedalizzazione	0.6	1.0	0.8	0.5	0.8	0.5	1.9	1.6	1.8	0.3	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.6	0.6	0.6	38
incarcerazione	0.1	0.1	0.1	2.2	0.8	1.8	1.4	1.6	1.4	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.3	20
perdita di contatto	26.8	24.9	26.3	35.5	32.1	33.9	32.1	27.4	31.6	17.2	18.3	17.9	20.9	19.9	20.1	25.7	22.3	24.6	1'641
conclusione esplicita	10.1	11.1	10.6	15.3	15.3	15.1	10.8	11.3	10.6	7.9	9.9	8.1	6.1	5.1	5.3	10.0	9.5	9.9	661
decesso	1.9	1.5	1.8	1.9	0.8	1.8	3.3	0.0	2.5	0.4	0.0	0.4	0.0	0.1	0.1	1.5	0.9	1.3	88
altre cause	2.7	2.6	2.6	3.4	3.8	3.4	2.4	3.2	2.5	3.0	2.1	2.8	5.6	4.1	4.4	2.9	3.3	3.0	200
<b>N**</b>	<b>2'469</b>	<b>992</b>	<b>3'512</b>	<b>411</b>	<b>131</b>	<b>564</b>	<b>212</b>	<b>62</b>	<b>282</b>	<b>696</b>	<b>142</b>	<b>856</b>	<b>196</b>	<b>758</b>	<b>954</b>	<b>4'243</b>	<b>2'315</b>	<b>6'674</b>	<b>6'674</b>
dati mancanti	10	5	15	7	3	10	0	0	0	7	5	12	0	4	4	25	18	43	43

T32b Destinazione dei trasferimenti dei pazienti (in rapporto al problema principale<sup>1</sup>) e dei parenti o conoscenti (2010)

Destinazione dei trasferimenti***	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%							
terapia residenziale	34.2	42.0	36.5	25.6	43.8	27.3	28.6	23.1	28.6	27.3	0.0	21.1	0.0	15.4	13.3	28.8	35.1	30.3	83
consulenza ambulatoriale	42.5	42.0	42.1	41.9	43.8	40.9	42.9	76.9	61.9	45.5	100.0	52.6	50.0	69.2	66.7	44.5	54.1	47.4	130
appartamento protetto	2.7	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	1.1	3
altra istituzione specializzata	20.5	16.0	19.8	32.6	12.5	31.8	28.6	0.0	9.5	18.2	0.0	21.1	50.0	15.4	20.0	24.7	10.8	21.2	58
<b>N**</b>	<b>73</b>	<b>50</b>	<b>126</b>	<b>43</b>	<b>16</b>	<b>66</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>146</b>	<b>111</b>	<b>274</b>	<b>274</b>
dati mancanti	61	27	88	18	3	21	5	3	8	10	2	12	2	7	9	102	48	150	150

T32c Causa di decesso dei pazienti (in rapporto al problema principale<sup>1</sup>) e dei parenti o conoscenti (2010)

Cause di decesso****	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%							
suicidio	12.5	42.9	20.0	20.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	100.0	.	100.0	.	0.0	0.0	14.0	27.3	17.5	10
infornio	15.6	14.3	15.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	.	0.0	.	0.0	0.0	14.0	9.1	12.3	7
malattia	50.0	14.3	42.5	20.0	100.0	42.9	20.0	0.0	20.0	0.0	.	0.0	.	100.0	100.0	41.9	45.5	43.9	25
overdose o intossicazione acuta	9.4	14.3	10.0	60.0	0.0	42.9	40.0	0.0	40.0	0.0	.	0.0	.	0.0	0.0	18.6	9.1	15.8	9
altre cause di decesso	12.5	14.3	12.5	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	.	0.0	.	0.0	0.0	11.6	9.1	10.5	6
<b>N**</b>	<b>32</b>	<b>7</b>	<b>40</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>43</b>	<b>11</b>	<b>57</b>	<b>57</b>
dati mancanti	15	8	23	3	0	3	2	0	2	2	0	2	0	0	0	22	9	31	31

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti trasferiti. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti deceduti durante l'intervento. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T33 Durata dell'intervento sui pazienti (in rapporto al problema principale<sup>1</sup>) e sui parenti o conoscenti (2010)

	Pazienti: problema principale <sup>1</sup>												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
<b>Durata della presa in carico* (%)</b>																			
1 settimana o meno	4.5	4.1	4.3	3.8	2.2	3.3	1.9	1.6	1.8	4.7	6.1	4.8	12.2	8.1	9.0	4.8	5.3	4.9	326
> 1 settimana a 1 mese	3.4	2.8	3.2	3.4	3.0	3.1	1.9	4.8	2.5	8.3	7.5	8.0	4.6	4.6	4.6	4.2	3.8	4.0	268
> 1 a 2 mesi	3.8	4.5	4.0	3.8	3.0	3.5	2.4	0.0	1.8	9.8	9.5	9.6	3.6	2.9	3.0	4.8	4.0	4.5	300
> 2 a 3 mesi	4.1	4.4	4.3	2.9	0.0	2.1	3.8	9.7	5.0	6.8	6.1	6.6	5.1	3.9	4.2	4.6	4.3	4.5	298
> 3 a 6 mesi	12.2	10.8	11.6	10.3	13.4	10.7	7.5	4.8	6.7	16.4	16.3	16.0	15.8	16.3	16.2	12.8	13.5	12.8	858
> 6 mesi a 1 anno	28.0	28.3	27.8	30.8	29.9	29.4	34.0	25.8	31.2	33.5	29.9	32.2	31.6	37.0	35.9	30.2	31.7	30.3	2'028
> 1 a 2 anni	23.0	24.5	23.8	22.8	23.9	22.6	25.5	25.8	24.8	15.1	17.7	15.7	19.9	16.8	17.4	21.6	21.6	21.7	1'453
> 2 a 3 anni	9.1	9.3	9.3	9.4	11.2	9.4	11.3	9.7	12.4	3.6	5.4	4.4	4.6	5.8	5.5	7.8	7.8	8.0	539
> 3 a 5 anni	8.1	7.4	7.8	9.1	9.7	9.8	8.0	12.9	9.2	1.6	0.7	1.8	2.6	4.2	3.9	6.5	5.8	6.4	426
> 5 a 10 anni	3.4	3.3	3.3	3.4	2.2	4.7	2.8	4.8	3.9	0.3	0.7	0.6	0.0	0.4	0.3	2.5	1.9	2.5	168
più di 10 anni	0.4	0.5	0.4	0.2	1.5	1.4	0.9	0.0	0.7	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.5	32
<b>N**</b>	<b>2'466</b>	<b>992</b>	<b>3'509</b>	<b>416</b>	<b>134</b>	<b>572</b>	<b>212</b>	<b>62</b>	<b>282</b>	<b>702</b>	<b>147</b>	<b>867</b>	<b>196</b>	<b>762</b>	<b>958</b>	<b>4'252</b>	<b>2'328</b>	<b>6'696</b>	<b>6'696</b>
<i>dati mancanti</i>	13	5	18	2	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	16	5	21	21
<b>Durata (in settimane)</b>																			
media	71.5	71.8	71.8	75.4	82.3	89.3	78.5	88.9	84.2	35.3	38.7	40.4	39.4	46.0	44.6	63.1	60.1	64.8	
deviazione standard	83.7	83.4	83.9	89.0	105.0	118.1	90.0	88.1	92.8	39.0	44.8	58.0	38.9	48.7	46.9	76.9	71.5	82.3	
1° quartile	20.9	22.5	21.4	24.7	26.1	26.1	28.5	26.7	28.1	9.0	9.1	9.4	11.6	15.0	14.6	18.0	18.4	18.4	
mediana	44.2	46.7	45.9	46.9	50.1	49.1	50.7	55.5	53.1	26.7	26.4	27.6	29.9	31.9	31.4	39.0	38.6	39.7	
3° quartile	90.9	88.9	90.9	94.1	104.0	106.3	90.3	130.4	107.7	46.0	51.4	49.0	53.5	54.9	54.7	77.8	73.0	78.3	
<b>N**</b>	<b>2'466</b>	<b>992</b>	<b>3'509</b>	<b>416</b>	<b>134</b>	<b>572</b>	<b>212</b>	<b>62</b>	<b>282</b>	<b>702</b>	<b>147</b>	<b>867</b>	<b>196</b>	<b>762</b>	<b>958</b>	<b>4'252</b>	<b>2'328</b>	<b>6'696</b>	
<i>dati mancanti</i>	13	5	18	2	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	16	5	21	

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T34 Trattamento sostitutivo durante e immediatamente dopo l'intervento, in rapporto al problema principale<sup>1</sup> (solamente pazienti) (2010)

	Pazienti: problema principale <sup>1</sup>												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Sostituzione nel corso dell'intervento*</b>																
no	97.3	98.3	97.6	35.7	36.2	34.4	90.9	81.8	89.4	99.1	99.1	99.2	91.4	92.6	91.2	3'931
si	2.7	1.7	2.4	64.3	63.8	65.6	9.1	18.2	10.6	0.9	0.9	0.8	8.6	7.4	8.8	377
<b>N**</b>	<b>1'802</b>	<b>710</b>	<b>2'563</b>	<b>294</b>	<b>94</b>	<b>410</b>	<b>165</b>	<b>44</b>	<b>217</b>	<b>580</b>	<b>111</b>	<b>709</b>	<b>3'044</b>	<b>1'148</b>	<b>4'308</b>	<b>4'308</b>
<i>dati mancanti</i>	677	286	963	124	40	164	47	18	65	123	36	159	1'028	422	1'450	1'450
<b>Tipo di sostituzione***</b>																
eroina	2.3	0.0	1.9	1.9	1.8	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.3	1.6	5
metadone	58.1	27.3	51.9	86.2	92.9	87.9	84.6	75.0	81.0	60.0	100.0	66.7	80.0	81.3	80.3	244
altri oppiacei	0.0	0.0	0.0	8.8	3.6	7.4	15.4	12.5	14.3	20.0	0.0	16.7	8.0	3.8	6.9	21
altre sostanze	39.5	72.7	46.3	3.1	1.8	2.8	0.0	12.5	4.8	20.0	0.0	16.7	10.2	13.8	11.1	34
<b>N**</b>	<b>43</b>	<b>11</b>	<b>54</b>	<b>159</b>	<b>56</b>	<b>215</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>225</b>	<b>79</b>	<b>304</b>	<b>304</b>
<i>dati mancanti</i>	6	1	7	30	4	54	2	0	2	0	0	0	38	6	73	73
<b>Sostituzione dopo l'intervento*</b>																
no	99.0	99.5	99.2	61.3	62.2	61.5	94.6	87.2	93.0	99.6	99.0	99.5	95.7	96.3	95.8	3'623
si	1.0	0.5	0.8	38.7	37.8	38.5	5.4	12.8	7.0	0.4	1.0	0.5	4.3	3.7	4.2	157
<b>N**</b>	<b>1'641</b>	<b>645</b>	<b>2'286</b>	<b>225</b>	<b>74</b>	<b>299</b>	<b>148</b>	<b>39</b>	<b>187</b>	<b>535</b>	<b>105</b>	<b>640</b>	<b>2'739</b>	<b>1'041</b>	<b>3'780</b>	<b>3'780</b>
<i>dati mancanti</i>	838	351	1'240	193	60	275	64	23	95	168	42	228	1'333	529	1'978	1'978
<b>Tipo di sostituzione***</b>																
prescrizione di eroina	12.5	0.0	10.5	8.0	10.7	8.7	0.0	20.0	7.7	0.0	0.0	0.0	7.6	10.3	8.3	13
trattamento sostitutivo	87.5	100.0	89.5	92.0	89.3	91.3	100.0	80.0	92.3	100.0	100.0	100.0	92.4	89.7	91.7	144
<b>N**</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>87</b>	<b>28</b>	<b>115</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>118</b>	<b>39</b>	<b>157</b>	<b>157</b>
<i>dati mancanti</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti ai quali è stata prescritta una sostituzione durante l'intervento. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T35 Postassistenza prevista e preparata, in rapporto al problema principale<sup>1</sup> (solamente pazienti) (2010)

	Pazienti: problema principale <sup>1</sup>												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Postassistenza prevista e preparata*</b>																
no	86.9	82.3	85.6	76.9	60.0	72.6	89.9	61.9	84.5	96.2	82.9	94.2	87.4	79.1	85.2	1'877
si	13.1	17.7	14.4	23.1	40.0	27.4	10.1	38.1	15.5	3.8	17.1	5.8	12.6	20.9	14.8	325
<b>N**</b>	<b>1'045</b>	<b>401</b>	<b>1'446</b>	<b>160</b>	<b>55</b>	<b>215</b>	<b>89</b>	<b>21</b>	<b>110</b>	<b>234</b>	<b>41</b>	<b>275</b>	<b>1'623</b>	<b>579</b>	<b>2'202</b>	<b>2'202</b>
<i>dati mancanti</i>	1'434	595	2'080	258	79	359	123	41	172	469	106	593	2'449	991	3'556	3'556
<b>Tipo di postassistenza prevista***</b>																
appartamento protetto dell'istituzione	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	1
servizio di postassistenza dell'istituzione	4.0	1.8	3.3	18.9	14.3	17.2	0.0	28.6	13.3	0.0	0.0	0.0	6.3	6.7	6.4	19
appartamento protetto esterno	4.0	1.8	3.3	2.7	4.8	3.4	12.5	0.0	6.7	11.1	0.0	6.3	4.2	1.9	3.4	10
servizio di postassistenza esterno	8.0	12.5	9.4	5.4	9.5	6.9	25.0	14.3	20.0	11.1	14.3	12.5	8.4	12.5	9.8	29
centro di consulenza per problemi inerenti all'alcol	18.4	26.8	21.0	10.8	4.8	8.6	12.5	0.0	6.7	22.2	28.6	25.0	16.2	17.3	16.6	49
centro di consulenza per problemi inerenti alle droghe	2.4	1.8	2.2	8.1	23.8	13.8	37.5	14.3	26.7	0.0	0.0	0.0	5.2	7.7	6.1	18
altri centri di consulenza	12.0	16.1	13.3	21.6	14.3	19.0	12.5	42.9	26.7	22.2	28.6	25.0	16.2	18.3	16.9	50
gruppo di aiuto reciproco e di autosostegno	7.2	7.1	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	4.8	5.1	15
gruppo di precedenti utenti del centro/ dell'istituzione	1.6	7.1	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.8	2.0	6
altro-i	46.4	32.1	42.0	37.8	28.6	34.5	0.0	14.3	6.7	33.3	28.6	31.3	40.8	32.7	38.0	112
<b>N**</b>	<b>125</b>	<b>56</b>	<b>181</b>	<b>37</b>	<b>21</b>	<b>58</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>191</b>	<b>104</b>	<b>295</b>	<b>295</b>
<i>dati mancanti</i>	12	15	27	0	1	1	1	1	2	0	0	0	13	17	30	30

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti per i quali una postassistenza è prevista. Le categorie non sono esclusive (molte risposte possibili)

T36 Problemi di dipendenza all'uscita, in rapporto al problema principale<sup>1</sup> (solamente pazienti) (2010)

Problemi di dipendenza*	Pazienti: problema principale <sup>1</sup>												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
alcol	55.2	63.1	57.5	25.9	13.0	22.6	27.4	26.3	27.2	9.2	17.8	10.7	38.8	43.8	40.2	1'360
cocktail (eroina e cocaina)	0.3	0.2	0.2	4.5	5.8	4.8	3.0	0.0	2.3	0.2	0.0	0.2	0.8	0.5	0.7	24
eroina	0.8	0.9	0.8	61.7	52.2	59.3	9.6	5.3	8.7	0.4	0.0	0.3	6.4	4.5	5.9	198
metadone	0.9	0.5	0.8	25.4	26.1	25.6	3.0	7.9	4.0	0.2	0.0	0.2	2.9	2.6	2.8	96
altri oppiacei	0.2	0.0	0.1	4.0	5.8	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	0.4	15
cocaina	1.9	1.5	1.8	10.0	11.6	10.4	40.7	47.4	42.2	1.5	6.9	2.4	4.7	4.5	4.6	157
crack, freebase	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	2
amfetamine	0.1	0.2	0.1	0.5	1.4	0.7	0.0	5.3	1.2	0.8	2.0	1.0	0.4	0.9	0.5	18
MDMA e affini (ecstasy)	0.1	0.0	0.1	0.0	1.4	0.4	1.5	7.9	2.9	0.0	3.0	0.5	0.2	0.7	0.4	13
altri stimolanti	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	2
barbiturici	0.1	0.2	0.1	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	3
benzodiazepine	0.8	2.2	1.2	19.9	17.4	19.3	3.0	7.9	4.0	0.0	0.0	0.0	2.6	3.5	2.8	96
altri sonniferi e tranquillanti	0.1	0.3	0.2	1.0	1.4	1.1	0.0	2.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.4	13
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.3	0.0	0.3	0.1	4
altri allucinogeni	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
sostanze volatili (per es., solventi)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
canapa	3.6	2.1	3.1	12.4	10.1	11.9	9.6	10.5	9.8	48.5	57.4	50.1	13.4	9.1	12.2	413
tabacco	12.7	10.6	12.1	16.9	24.6	18.9	17.8	13.2	16.8	16.8	22.8	17.9	15.6	15.5	15.6	526
altra/e sostanza/e	0.5	0.0	0.3	1.5	0.0	1.1	0.7	0.0	0.6	0.2	0.0	0.2	0.5	0.2	0.4	15
gioco patologico	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	1.4	0.7	1.2	42
disturbi alimentari	0.1	0.7	0.3	0.5	2.9	1.1	0.0	2.6	0.6	0.0	1.0	0.2	0.2	5.7	1.8	60
altri problemi assimilabili a una dipendenza	0.1	0.2	0.1	0.0	1.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	0.6	19
nessuno	39.2	34.2	37.8	17.9	26.1	20.0	35.6	34.2	35.3	43.9	34.7	42.3	37.9	32.5	36.3	1'229
<b>N**</b>	<b>1'452</b>	<b>585</b>	<b>2'037</b>	<b>201</b>	<b>69</b>	<b>270</b>	<b>135</b>	<b>38</b>	<b>173</b>	<b>476</b>	<b>101</b>	<b>577</b>	<b>2'430</b>	<b>952</b>	<b>3'382</b>	<b>3'382</b>
<i>dati mancanti</i>	<i>1'027</i>	<i>411</i>	<i>1'489</i>	<i>216</i>	<i>65</i>	<i>303</i>	<i>77</i>	<i>24</i>	<i>109</i>	<i>227</i>	<i>46</i>	<i>291</i>	<i>1'641</i>	<i>617</i>	<i>2'374</i>	<i>2'374</i>

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T37 Frequenza delle ricadute, sostanza o comportamento implicato e durata delle ricadute nel corso dell'intervento, in rapporto al problema principale<sup>1</sup> (solamente pazienti) (2010)

	Pazienti: problema principale <sup>1</sup>												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Frequenza delle ricadute*</b>																
nessuna	53.8	41.6	50.4	22.7	28.1	24.3	53.1	42.1	50.6	76.6	60.0	74.1	55.0	43.2	51.9	741
1 volta	10.8	10.4	10.7	6.7	12.5	8.4	10.9	21.1	13.3	5.5	12.0	6.5	9.6	10.7	9.9	141
2 volte	6.4	10.0	7.4	8.0	6.3	7.5	9.4	5.3	8.4	6.2	0.0	5.3	6.5	8.6	7.1	101
3 o 4 volte	14.0	16.5	14.7	25.3	21.9	24.3	7.8	15.8	9.6	5.5	20.0	7.6	13.5	17.2	14.5	207
5 volte o più	15.0	21.5	16.9	37.3	31.3	35.5	18.8	15.8	18.1	6.2	8.0	6.5	15.4	20.3	16.7	239
<b>N**</b>	<b>706</b>	<b>279</b>	<b>985</b>	<b>75</b>	<b>32</b>	<b>107</b>	<b>64</b>	<b>19</b>	<b>83</b>	<b>145</b>	<b>25</b>	<b>170</b>	<b>1'045</b>	<b>384</b>	<b>1'429</b>	<b>1'429</b>
<i>dati mancanti</i>	1'773	717	2'541	343	102	467	148	43	199	558	122	698	3'027	1'186	4'329	4'329
<b>Sostanza/comportamento comparabile a una dipendenza al momento delle ricadute***</b>																
alcol	97.7	97.5	97.6	29.3	9.5	24.1	37.9	20.0	33.3	12.5	33.3	17.1	75.4	78.8	76.5	502
cocktail (eroina e cocaina)	0.6	0.0	0.4	1.7	4.8	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.5	0.8	5
oppiacei	4.2	0.6	3.0	81.0	95.2	84.8	27.6	30.0	28.2	6.3	0.0	4.9	15.8	12.0	14.6	96
cocaina e derivati	4.9	2.5	4.1	24.1	23.8	24.1	75.9	90.0	79.5	9.4	0.0	7.3	12.3	8.7	11.1	73
stimolanti	1.0	0.0	0.6	1.7	0.0	1.3	3.4	0.0	2.6	3.1	0.0	2.4	1.3	0.0	0.9	6
medicamenti	1.9	2.5	2.1	31.0	33.3	31.6	3.4	30.0	10.3	0.0	0.0	0.0	6.0	8.2	6.7	44
allucinogeni	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
canapa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	1
tabacco	5.2	1.3	3.9	22.4	19.0	21.5	13.8	10.0	12.8	81.3	77.8	80.5	14.1	6.7	11.7	77
sostanze volatili	2.3	0.6	1.7	5.2	9.5	6.3	3.4	10.0	5.1	9.4	0.0	7.3	4.0	2.4	3.5	23
altra/e sostanza/e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	1
gioco patologico	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	1.7	11
disturbi alimentari	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.2	1.9	0.8	5
altri problemi assimilabili a una dipendenza	0.3	0.0	0.2	0.0	4.8	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.5	0.8	5
<b>N**</b>	<b>308</b>	<b>159</b>	<b>467</b>	<b>58</b>	<b>21</b>	<b>79</b>	<b>29</b>	<b>10</b>	<b>39</b>	<b>32</b>	<b>9</b>	<b>41</b>	<b>448</b>	<b>208</b>	<b>656</b>	<b>656</b>
<i>dati mancanti</i>	18	4	22	0	2	2	1	1	2	2	1	3	22	10	32	32
<b>Durata delle ricadute****</b>																
1 a 2 giorni	30.2	21.2	27.3	7.7	22.2	13.6	35.3	71.4	45.8	45.0	50.0	45.5	31.3	25.3	29.5	84
3 a 6 giorni	23.7	30.3	25.9	23.1	22.2	22.7	17.6	0.0	12.5	20.0	50.0	22.7	21.7	28.7	23.9	68
7 a 10 giorni	10.1	6.1	8.8	15.4	11.1	13.6	17.6	0.0	12.5	15.0	0.0	13.6	12.1	5.7	10.2	29
>10 giorni a 2 settimane	0.7	6.1	2.4	7.7	0.0	4.5	5.9	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	1.5	4.6	2.5	7
> 2 a 4 settimane	12.9	9.1	11.7	7.7	11.1	9.1	0.0	14.3	4.2	10.0	0.0	9.1	11.6	10.3	11.2	32
>4 a 6 settimane	5.8	16.7	9.3	0.0	11.1	4.5	11.8	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	5.6	13.8	8.1	23
>6 a 8 settimane	4.3	1.5	3.4	7.7	0.0	4.5	5.9	0.0	4.2	5.0	0.0	4.5	4.5	1.1	3.5	10
> 2 mesi	12.2	9.1	11.2	30.8	22.2	27.3	5.9	14.3	8.3	5.0	0.0	4.5	11.6	10.3	11.2	32
<b>N**</b>	<b>139</b>	<b>66</b>	<b>205</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>24</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>198</b>	<b>87</b>	<b>285</b>	<b>285</b>
<i>dati mancanti</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti che hanno indicato una o più ricadute. Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

\*\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti che hanno indicato una o più ricadute. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

## T38 Frequenza del consumo di tabacco e numero di sigarette al giorno nel corso dei 30 giorni precedenti l'uscita, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2010)

	Pazienti: problema principale <sup>1</sup>												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Frequenza del consumo di tabacco*</b>																
mai	34.9	41.7	37.0	6.1	9.4	7.0	9.8	35.7	14.7	17.5	18.2	17.6	28.4	37.6	31.0	390
1 giorno alla settimana o meno	1.0	2.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	4.2	1.5	1.4	1.5	19
2 a 3 giorni alla settimana	0.3	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.3	4.2	0.0	3.5	0.9	0.9	0.9	11
4 a 6 giorni alla settimana	0.7	1.6	0.9	1.2	0.0	0.9	1.6	0.0	1.3	0.8	4.5	1.4	1.0	1.4	1.1	14
una volta al giorno	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	4.5	2.8	1.0	0.3	0.8	10
più volte al giorno	62.2	53.9	59.8	92.7	90.6	92.1	86.9	64.3	82.7	70.0	72.7	70.4	67.2	58.3	64.8	816
<b>N**</b>	<b>601</b>	<b>254</b>	<b>855</b>	<b>82</b>	<b>32</b>	<b>114</b>	<b>61</b>	<b>14</b>	<b>75</b>	<b>120</b>	<b>22</b>	<b>142</b>	<b>912</b>	<b>348</b>	<b>1'260</b>	<b>1'260</b>
<i>dati mancanti</i>	1'878	742	2'671	336	102	460	151	48	207	583	125	726	3'160	1'222	4'498	4'498
<b>Numero di sigarette al giorno***</b>																
0 a 10 sigarette al giorno	20.2	24.3	21.3	6.7	14.3	9.1	15.0	14.3	14.9	55.7	38.5	53.0	24.2	23.8	24.1	145
11 a 20 sigarette al giorno	41.1	44.7	42.1	57.8	33.3	50.0	40.0	57.1	42.6	27.1	46.2	30.1	40.7	42.9	41.3	248
21 a 30 sigarette al giorno	28.4	21.4	26.5	31.1	47.6	36.4	35.0	28.6	34.0	15.7	15.4	15.7	26.4	25.9	26.3	158
31 sigarette al giorno o più	10.3	9.7	10.1	4.4	4.8	4.5	10.0	0.0	8.5	1.4	0.0	1.2	8.6	7.5	8.3	50
<b>N**</b>	<b>282</b>	<b>103</b>	<b>385</b>	<b>45</b>	<b>21</b>	<b>66</b>	<b>40</b>	<b>7</b>	<b>47</b>	<b>70</b>	<b>13</b>	<b>83</b>	<b>454</b>	<b>147</b>	<b>601</b>	<b>601</b>
<i>dati mancanti</i>	109	45	154	32	8	40	15	2	17	29	5	34	199	70	269	269

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti che hanno indicato un consumo di tabacco. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T39 Obiettivo di consumo all'uscita e pronostico, in rapporto alla principale sostanza problematica<sup>1</sup> (solamente pazienti) (2010)

	Pazienti: sostanza problematica <sup>1</sup>												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Obiettivo di consumo*</b>																
astinenza definitiva	36.4	39.1	37.2	57.5	65.0	59.4	67.5	71.4	68.4	47.4	47.1	47.3	41.4	44.2	42.1	773
astinenza limitata nel tempo	15.7	11.7	14.6	4.2	2.5	3.8	6.5	0.0	5.1	10.5	2.9	9.4	12.6	9.2	11.7	214
consumo controllato	33.3	32.6	33.1	14.2	12.5	13.8	11.7	14.3	12.2	16.8	32.4	19.2	29.1	29.3	29.2	535
nessuna limitazione nel consumo prevista	4.5	2.9	4.0	5.0	7.5	5.6	2.6	0.0	2.0	7.4	0.0	6.3	4.9	2.9	4.4	80
nessuna decisione per il momento	9.4	13.4	10.5	16.7	10.0	15.0	9.1	9.5	9.2	17.9	17.6	17.9	11.1	13.4	11.7	215
altro	0.7	0.3	0.6	2.5	2.5	2.5	2.6	4.8	3.1	0.0	0.0	0.0	0.9	1.0	0.9	17
<b>N**</b>	<b>873</b>	<b>350</b>	<b>1'223</b>	<b>120</b>	<b>40</b>	<b>160</b>	<b>77</b>	<b>21</b>	<b>98</b>	<b>190</b>	<b>34</b>	<b>224</b>	<b>1'343</b>	<b>491</b>	<b>1'834</b>	<b>1'834</b>
<i>dati mancanti</i>	<i>1'606</i>	<i>646</i>	<i>2'303</i>	<i>298</i>	<i>94</i>	<i>414</i>	<i>135</i>	<i>41</i>	<i>184</i>	<i>513</i>	<i>113</i>	<i>644</i>	<i>2'729</i>	<i>1'079</i>	<i>3'924</i>	<i>3'924</i>
<b>Pronostico*</b>																
pronostico molto positivo	13.2	14.2	13.5	7.9	7.8	7.9	11.8	8.7	11.1	20.1	21.9	20.4	13.4	14.3	13.6	259
pronostico positivo	48.1	40.2	45.9	17.3	41.2	23.7	44.7	65.2	49.5	54.0	56.3	54.3	46.3	42.8	45.3	861
pronostico piuttosto sfavorevole	29.1	36.6	31.2	51.1	25.5	44.2	26.3	21.7	25.3	21.7	18.8	21.3	29.8	32.6	30.6	581
pronostico negativo	9.6	8.9	9.4	23.7	25.5	24.2	17.1	4.3	14.1	4.2	3.1	4.1	10.5	10.4	10.5	199
<b>N**</b>	<b>912</b>	<b>358</b>	<b>1'270</b>	<b>139</b>	<b>51</b>	<b>190</b>	<b>76</b>	<b>23</b>	<b>99</b>	<b>189</b>	<b>32</b>	<b>221</b>	<b>1'388</b>	<b>512</b>	<b>1'900</b>	<b>1'900</b>
<i>dati mancanti</i>	<i>1'567</i>	<i>638</i>	<i>2'256</i>	<i>279</i>	<i>83</i>	<i>384</i>	<i>136</i>	<i>39</i>	<i>183</i>	<i>514</i>	<i>115</i>	<i>647</i>	<i>2'684</i>	<i>1'058</i>	<i>3'858</i>	<i>3'858</i>

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto



## ALLEGATI

## A1 Dati di base delle istituzioni non partecipanti: Sesso e età all'entrata, in funzione del problema principale (2010)

	Pazienti: problema principale												Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Sesso*</b>																
uomini			66.1			68.6			82.1			72.9			68.1	1'419
donne			33.9			31.4			17.9			27.1			31.9	664
Sesso non noto			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	0
<b>N**</b>	<b>676</b>	<b>346</b>	<b>1'022</b>	<b>205</b>	<b>94</b>	<b>299</b>	<b>78</b>	<b>17</b>	<b>95</b>	<b>218</b>	<b>81</b>	<b>299</b>	<b>1'419</b>	<b>664</b>	<b>2'083</b>	<b>2'083</b>
<b>Età (in anni)*</b>																
fino a 14	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	4.9	3.3	0.5	0.8	0.6	12
15-19	1.9	2.3	2.1	3.4	3.3	3.4	2.6	0.0	2.1	40.4	46.9	42.1	8.9	9.0	8.9	185
20-24	3.7	5.5	4.3	14.7	27.2	18.6	15.6	23.5	17.0	14.2	14.8	14.4	8.8	10.5	9.4	194
25-29	8.6	5.0	7.4	10.8	13.0	11.5	20.8	35.3	23.4	13.8	11.1	13.0	11.0	8.8	10.3	213
30-34	10.5	8.7	9.9	18.6	19.6	18.9	24.7	17.6	23.4	14.2	2.5	11.0	13.0	10.0	12.1	250
35-39	11.9	11.4	11.7	21.1	19.6	20.6	13.0	5.9	11.7	6.9	6.2	6.7	12.0	11.2	11.7	243
40-44	15.6	15.2	15.4	18.6	7.6	15.2	14.3	17.6	14.9	4.6	3.7	4.3	14.1	13.1	13.7	285
45-49	14.1	10.8	13.0	9.3	8.7	9.1	9.1	0.0	7.4	0.9	4.9	2.0	10.6	10.5	10.6	219
50-54	11.3	13.1	11.9	3.4	1.1	2.7	0.0	0.0	0.0	1.8	4.9	2.7	7.9	9.6	8.4	174
55-59	11.9	9.6	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	5.9	6.6	136
60-64	5.6	7.3	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	3.3	4.4	3.7	76
65-69	2.4	6.1	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	3.6	2.2	46
70-74	1.8	2.6	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.4	1.2	24
75 e più	0.7	2.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.4	0.8	16
<b>N**</b>	<b>674</b>	<b>343</b>	<b>1'017</b>	<b>204</b>	<b>92</b>	<b>296</b>	<b>77</b>	<b>17</b>	<b>94</b>	<b>218</b>	<b>81</b>	<b>299</b>	<b>1'414</b>	<b>659</b>	<b>2'073</b>	<b>2'073</b>
<i>dati mancanti</i>	2	3	5	1	2	3	1	0	1	0	0	0	5	5	10	10
<b>Età</b>																
media	44.3	46.1	44.9	34.9	31.8	33.9	32.8	30.7	32.4	25.0	24.6	24.9	38.6	40.0	39.0	
deviazione standard	12.5	14.1	13.1	8.6	8.9	8.8	7.9	7.3	7.8	9.3	10.9	9.8	13.6	15.0	14.1	
1° quartile	35.0	36.7	35.2	27.8	23.9	26.4	26.7	26.0	26.0	17.4	17.0	17.2	28.1	27.3	28.0	
mediana	44.0	45.7	44.4	35.4	31.2	34.3	31.0	28.0	30.8	22.0	19.6	21.0	38.0	39.9	38.5	
3° quartile	53.6	56.0	54.1	41.4	38.3	40.6	38.94	34.5	38.9	30.9	28.6	30.7	48.0	50.2	48.9	
<b>N**</b>	<b>674</b>	<b>343</b>	<b>1'017</b>	<b>204</b>	<b>92</b>	<b>296</b>	<b>77</b>	<b>17</b>	<b>94</b>	<b>218</b>	<b>81</b>	<b>299</b>	<b>1'414</b>	<b>659</b>	<b>2'073</b>	
<i>dati mancanti</i>	2	3	5	1	2	3	1	0	1	0	0	0	5	5	10	

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

## A2 Dati di base delle istituzioni non partecipanti: Problema principale all'entrata (pazienti) (2010)

Tutti i pazienti				
	Uomini	Donne	Totale	N
	%	%	%	
<b>Problema principale*</b>				
alcol	56.0	58.9	56.9	1'186
oppiacei	16.6	17.0	16.8	349
cocaina	6.1	3.3	5.2	109
stimolanti	0.5	0.5	0.5	10
sonniferi e tranquillanti	0.9	4.1	1.9	40
allucinogeni	0.0	0.2	0.0	1
sostanze volatili	0.0	0.0	0.0	0
canapa	13.7	13.1	13.5	282
tabacco	0.3	0.2	0.2	5
altra/e sostanza/e	4.3	2.0	3.6	74
altri problemi assimilabili a una dipendenza	1.5	0.9	1.3	27
<b>N**</b>	<b>1'419</b>	<b>664</b>	<b>2'083</b>	<b>2'083</b>
<i>dati mancanti</i>	0	0	0	0

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

## A1 Dati di base delle istituzioni non partecipanti: Sesso e età all'entrata, in funzione del problema principale (2010)

	Pazienti: problema principale												Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Sesso*</b>																
uomini			66.1			68.6			82.1			72.9			68.1	1'419
donne			33.9			31.4			17.9			27.1			31.9	664
sex non noto			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	0
<b>N**</b>	<b>676</b>	<b>346</b>	<b>1'022</b>	<b>205</b>	<b>94</b>	<b>299</b>	<b>78</b>	<b>17</b>	<b>95</b>	<b>218</b>	<b>81</b>	<b>299</b>	<b>1'419</b>	<b>664</b>	<b>2'083</b>	<b>2'083</b>
<b>Età (in anni)*</b>																
fino a 14	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	4.9	3.3	0.5	0.8	0.6	12
15-19	1.9	2.3	2.1	3.4	3.3	3.4	2.6	0.0	2.1	40.4	46.9	42.1	8.9	9.0	8.9	185
20-24	3.7	5.5	4.3	14.7	27.2	18.6	15.6	23.5	17.0	14.2	14.8	14.4	8.8	10.5	9.4	194
25-29	8.6	5.0	7.4	10.8	13.0	11.5	20.8	35.3	23.4	13.8	11.1	13.0	11.0	8.8	10.3	213
30-34	10.5	8.7	9.9	18.6	19.6	18.9	24.7	17.6	23.4	14.2	2.5	11.0	13.0	10.0	12.1	250
35-39	11.9	11.4	11.7	21.1	19.6	20.6	13.0	5.9	11.7	6.9	6.2	6.7	12.0	11.2	11.7	243
40-44	15.6	15.2	15.4	18.6	7.6	15.2	14.3	17.6	14.9	4.6	3.7	4.3	14.1	13.1	13.7	285
45-49	14.1	10.8	13.0	9.3	8.7	9.1	9.1	0.0	7.4	0.9	4.9	2.0	10.6	10.5	10.6	219
50-54	11.3	13.1	11.9	3.4	1.1	2.7	0.0	0.0	0.0	1.8	4.9	2.7	7.9	9.6	8.4	174
55-59	11.9	9.6	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	5.9	6.6	136
60-64	5.6	7.3	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	3.3	4.4	3.7	76
65-69	2.4	6.1	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	3.6	2.2	46
70-74	1.8	2.6	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.4	1.2	24
75 e più	0.7	2.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.4	0.8	16
<b>N**</b>	<b>674</b>	<b>343</b>	<b>1'017</b>	<b>204</b>	<b>92</b>	<b>296</b>	<b>77</b>	<b>17</b>	<b>94</b>	<b>218</b>	<b>81</b>	<b>299</b>	<b>1'414</b>	<b>659</b>	<b>2'073</b>	<b>2'073</b>
<i>dati mancanti</i>	2	3	5	1	2	3	1	0	1	0	0	0	5	5	10	10
<b>Età</b>																
media	44.3	46.1	44.9	34.9	31.8	33.9	32.8	30.7	32.4	25.0	24.6	24.9	38.6	40.0	39.0	
deviazione standard	12.5	14.1	13.1	8.6	8.9	8.8	7.9	7.3	7.8	9.3	10.9	9.8	13.6	15.0	14.1	
1° quartile	35.0	36.7	35.2	27.8	23.9	26.4	26.7	26.0	26.0	17.4	17.0	17.2	28.1	27.3	28.0	
mediana	44.0	45.7	44.4	35.4	31.2	34.3	31.0	28.0	30.8	22.0	19.6	21.0	38.0	39.9	38.5	
3° quartile	53.6	56.0	54.1	41.4	38.3	40.6	38.94	34.5	38.9	30.9	28.6	30.7	48.0	50.2	48.9	
<b>N**</b>	<b>674</b>	<b>343</b>	<b>1'017</b>	<b>204</b>	<b>92</b>	<b>296</b>	<b>77</b>	<b>17</b>	<b>94</b>	<b>218</b>	<b>81</b>	<b>299</b>	<b>1'414</b>	<b>659</b>	<b>2'073</b>	
<i>dati mancanti</i>	2	3	5	1	2	3	1	0	1	0	0	0	5	5	10	

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

## A2 Dati di base delle istituzioni non partecipanti: Problema principale all'entrata (pazienti) (2010)

Tutti i pazienti				
	Uomini	Donne	Totale	N
	%	%	%	
<b>Problema principale*</b>				
alcol	56.0	58.9	56.9	1'186
oppiacei	16.6	17.0	16.8	349
cocaina	6.1	3.3	5.2	109
stimolanti	0.5	0.5	0.5	10
sonniferi e tranquillanti	0.9	4.1	1.9	40
allucinogeni	0.0	0.2	0.0	1
sostanze volatili	0.0	0.0	0.0	0
canapa	13.7	13.1	13.5	282
tabacco	0.3	0.2	0.2	5
altra/e sostanza/e	4.3	2.0	3.6	74
altri problemi assimilabili a una dipendenza	1.5	0.9	1.3	27
<b>N**</b>	<b>1'419</b>	<b>664</b>	<b>2'083</b>	<b>2'083</b>
<i>dati mancanti</i>	0	0	0	0

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto