

act-info - SAMBAD

Intervento ambulatoriale nelle
problematiche di dipendenza

Risultati del monitoraggio dei utenti 2021



Jeanne Vorlet & Etienne Maffli

Losanna, novembre 2022



Ringraziamenti

Ringraziamo vivamente sia i collaboratori e le collaboratrici che i pazienti delle istituzioni che hanno partecipato e che hanno gentilmente accettato di riempire i questionari del monitoraggio *act-info*. Ringraziamo ugualmente i collaboratori e le collaboratrici dei servizi di consultazione che hanno effettuato i lavori di logistica e di registrazione dei dati. I nostri migliori ringraziamenti vanno anche all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) che finanzia l'insieme della rete *act-info*. Grazie anche a Edith Bacher e Diane Jaccard per l'impaginazione di questo rapporto.

Complementi d'informazione: Jeanne Vorlet, Tel. 021 321 29 46,
e-mail jvorlet@suchtschweiz.ch

Realizzazione: Jeanne Vorlet & Etienne Maffli
Dipendenze Svizzera

Diffusione: Ricerca, Dipendenze Svizzera, Av. Louis-Ruchonnet 14,
1003 Losanna, tel. 021/321 29 46, fax 021 321 29 40,
e-mail rbischof@addictionsuisse.ch

Lingua del testo originale: tedesco

Grafica/impaginazione: Dipendenze Svizzera

Copyright: © Dipendenze Svizzera, Losanna 2022

Citazione raccomandata: Vorlet, J., Maffli, E. (2022). Intervento ambulatoriale nelle problematiche di dipendenza. Risultati del monitoraggio dei utenti 2021.
Losanna: Dipendenze Svizzera.

Indice

act-info – addiction care and therapy <i>information</i>	6
act-info nel settore ambulatoriale dell’aiuto nel campo delle dipendenze (SAMBAD)	7
Spiegazioni dei grafici e delle tabelle	8

TRENDS

G1	Evoluzione della domanda di trattamento nel campo delle sostanze: trend 2013-2021
G2	Evoluzione della domanda di trattamento nel campo dei comportamenti: trend 2013-2021
G3	Evoluzione della domanda di trattamento in base al problema principale (trend indicizzato 2013-2021)
G4	Problema principale all'entrata alcol: evoluzione 2013-2021
G5	Problema principale all'entrata oppioidi: evoluzione 2013-2021
G6	Problema principale all'entrata cocaina e derivati: evoluzione 2013-2021
G7	Problema principale all'entrata altri stimolanti: evoluzione 2013-2021
G8	Problema principale all'entrata canapa: evoluzione 2013-2021
G9	Problema principale all'entrata ipnotici/sedativi: evoluzione 2013-2021
G10	Problema principale all'entrata tabacco: evoluzione 2013-2021
G11	Problema principale all'entrata gioco d’azzardo: evoluzione 2013-2021
G12	Problema principale all'entrata disturbi alimentari: evoluzione 2013-2021
G13	Problema principale all'entrata dipendenze da computer/internet: evoluzione 2013-2021

ENTRATA

T1	Sesso e età dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2021)
T2	Stato civile e nazionalità dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2021)
T3	Grado di urbanizzazione del domicilio, tipo di nucleo familiare e situazione di domicilio dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2021)
T4	Tipo di relazione di coppia, numero di figli, di figli che vivono nel nucleo familiare dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2021)
T5	Più alta formazione portata a termine e statuto professionale dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2021)
T6	Fonte di reddito principale e attività dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2021)
T7	Reddito mensile netto e debiti dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2021)
T8	Incarcerazione o detenzione preventiva prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2021)

T9	Istanza d'invio principale, secondo il problema principale e per i parenti o conoscenti (2021)
T10	Intervento in seguito ad una misura giudiziaria e tipo di misura, secondo il problema principale (solo pazienti) (2021)
T11	Trattamenti/accompagnamenti anteriori l'ammissione e tipi di intervento, secondo il problema principale e per parenti o conoscenti (2021)
T12	Trattamento sostitutivo o prescrizione di eroina al momento dell'ammissione, secondo il problema principale (solo pazienti) (2021)
T13	Problema principale all'entrata (solamente pazienti) (2021)
T14	Uso di sostanze multiple e combinazioni di sostanze (2021)
T15.1a	Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata (2021), uomini
T15.1b	Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata (2021), donne
T15.1c	Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata (2021), uomini e donne
T15.2a	Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata (2021), uomini
T15.2b	Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata (2021), donne
T15.2c	Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata (2021), uomini e donne
T16.1a	Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2021), uomini
T16.1b	Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2021), donne
T16.1c	Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2021), uomini e donne
T16.2a	Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2021), uomini
T16.2b	Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2021), donne
T16.2c	Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2021), uomini e donne
T17	Modo di amministrazione della principale sostanza problematica prima dell'entrata (2021)
T18.1	Prevalenza a vita delle iniezioni, nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 12 mesi prima dell'entrata, scambio di materiale d'iniezione, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2021)
T18.2	Età all'epoca della prima iniezione, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2021)
T19.1a	Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2021), uomini
T19.1b	Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2021), donne
T19.1c	Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2021), uomini e donne

T19.2a	Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2021), uomini
T19.2b	Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2021), donne
T19.2c	Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2021), uomini e donne
T20a	Frequenza del consumo delle sostanze secondarie secondo il problema principale (solo pazienti) (2021)
T20b	Frequenza del consumo delle sostanze secondarie secondo il problema principale (solo pazienti) (2021)
T21	Frequenza del consumo di alcol, numero di "bicchieri standard" al giorno e frequenza di forti consumi di alcol prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2021)
T22	Frequenza del consumo di tabacco e numero di sigarette al giorno nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2021)
T23a	Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2021), uomini
T23b	Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2021), donne
T23c	Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2021), uomini e donne
T24a	Problemi psichici nel corso di ultimi 12 mesi (2021), uomini
T24b	Problemi psichici nel corso di ultimi 12 mesi (2021), donne
T24c	Problemi psichici nel corso di ultimi 12 mesi (2021), uomini e donne
T25	Parenti/conoscenti: legame tra l'utente e la persona sintomatica (2021)
T26	Parenti/conoscenti: problema principale della persona sintomatica (2021)

USCITA

T27	Sesso e età dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2021)
T28	Stato civile e grado di urbanizzazione del domicilio dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2021)
T29	Tipo di nucleo familiare, situazione di domicilio e tipo di relazione di coppia dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2021)
T30	Fonte di reddito principale e attività principale all'uscita, secondo il problema principale e per i parenti o conoscenti (2015) e dei parenti o conoscenti (2021)
T31	Statuto professionale dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2021)
T32a	Ragione principale della fine del trattamento/accompagnamento dei pazienti (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2021)
T32b	Destinazione dei trasferimenti dei pazienti (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2021)
T32c	Causa di decesso dei pazienti (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2017)

- T33 Durata dell'intervento sui pazienti (in rapporto al problema principale) e sui parenti o conoscenti (2021)
- T34 Trattamento sostitutivo durante e immediatamente dopo l'intervento, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2021)
- T35 Postassistenza prevista e preparata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2021)
- T36 Problemi di dipendenza all'uscita, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2021)
- T37 Frequenza delle ricadute e sostanza o comportamento implicato nel corso dell'intervento, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2021)
- T38 Frequenza del consumo di tabacco e numero di sigarette al giorno nel corso dei 30 giorni precedenti l'uscita, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2021)
- T39 Obiettivo di consumo all'uscita e pronostico, in rapporto alla principale sostanza problematica (solamente pazienti) (2021)

act-info - addiction care and therapy information

La Rete di monitoraggio degli interventi e dei trattamenti delle dipendenze in Svizzera (*act-info*) raccoglie nel suo seno i cinque sistemi statistici che sono realizzati in materia di intervento e di trattamento della dipendenza in Svizzera. Tali sistemi sono:

- SAMBAD (Statistica del settore ambulatoriale dell'aiuto in materia di dipendenza senza trattamenti di sostituzione o con prescrizione di eroina)
- Residalc (Statistica dei trattamenti residenziali della dipendenza all'alcol in Svizzera)
- FOS (Statistica della Lega per la valutazione dei trattamenti residenziali della tossicomania)
- HeGeBe (Statistica dei trattamenti con prescrizione di eroina)
- Sostituzione (Statistica nazionale dei trattamenti sostitutivi con agonisti oppioidi)

Dal 2004 queste cinque statistiche dispongono di strumenti armonizzati e ottimizzati. I dati comuni sono integrati in una banca dati centralizzata che permette di procedere ad analisi concernenti l'insieme dei settori. L'adozione degli standard europei (Treatment Demande Indicator) permette di garantire anche la comparabilità dei dati al livello internazionale.

act-info è finanziato dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). A partire dal 2018, Dipendenze Svizzera effettua tutte le indagini statistiche in tutti i settori di trattamento).

act-info nel settore ambulatoriale dell'aiuto in materia di dipendenza (SAMBAD)

Gli strumenti di monitoraggio *act-info* sono stati introdotti a partire dal 2004 nel settore ambulatoriale dell'aiuto in materia di dipendenza (senza terapie con antagonisti oppioidi (TAO)) e hanno rimpiazzato i vecchi questionari in vigore dal 1994. Dopo diversi anni di utilizzo, una revisione di questi strumenti ha avuto luogo e i rivisti questionari sono stati introdotti nel 2013. Questo processo è stato armonizzato con la revisione delle norme europee. Tuttavia, non tutte le istituzioni sono state in grado di implementare i questionari rivisti. Inoltre, è disponibile anche una versione ridotta in campo ambulatoriale per soddisfare le diverse esigenze. Queste particolarità spiegano in parte perché per alcune domande manca un numero relativamente elevato di valori.

La statistica *act-info* SAMBAD dà una visione dell'utenza dell'aiuto ambulatoriale in materia di dipendenza (senza TAO) in Svizzera. I dati sono raccolti all'inizio e alla fine dell'intervento. Le informazioni rilevate al momento dell'entrata permettono di valutare in particolare le caratteristiche socio-demografiche degli utenti, l'eventuale presenza di trattamenti precedenti, le modalità di consumo e la presenza di problemi psicosociali precedenti l'intervento. Le informazioni finali rilevate al termine dell'intervento evidenziano in particolare le circostanze dell'uscita e le caratteristiche socio-demografiche dell'utenza in quel preciso momento.

Tutte le istituzioni che offrono aiuto ambulatoriale individuale in materia di dipendenza sono state invitate a partecipare al monitoraggio dei clienti all'inizio delle indagini nel settore ambulatoriale. Questo invito viene loro rinnovato ogni anno nell'ambito dell'indagine *act-info* sulle istituzioni (vedi sotto). Non sono incluse le offerte a bassa soglia, i foyers, gli appartamenti protetti e le istituzioni che non offrono una presa a carico individuale mirata. Inoltre, i numerosi istituti che trattano unicamente il tabacco non sono inclusi nel monitoraggio a causa delle loro diverse modalità di trattamento (spesso corsi senza presa a carico individuale). Per quanto riguarda SAMBAD, la partecipazione delle istituzioni non è obbligatoria, quindi esistono lacune, soprattutto in campo medico. Il piccolo numero di istituzioni mediche partecipanti è spiegato dalla loro partecipazione ad altre statistiche. Nel 2021, 54 istituzioni del settore ambulatoriale dell'aiuto in materia di dipendenza (senza TAO) hanno partecipato al monitoraggio *act-info*. Queste istituzioni sono principalmente sia servizi deputati alla consultazione specialistica dei problemi inerenti all'alcol e/o alle droghe illegali, sia servizi polivalenti che offrono in aggiunta ad altri servizi ugualmente un aiuto

per i problemi di dipendenza. Le istituzioni che non partecipano al monitoraggio di *act-info* sono state interrogate nell'ambito di una vasta indagine volta a stimare la domanda complessiva in materia di trattamento delle dipendenze (indagine istituzionale). I risultati di questo sondaggio sono riportati nel rapporto globale *act-info* (rapporto annuale 2021) pubblicato anch'esso alla fine del 2022.

Spiegazioni dei grafici e delle tabelle

La prima parte presenta in forma grafica le tendenze di base del monitoraggio *act-info* nel campo dell'aiuto ambulatoriale per la dipendenza (senza TAO) (2013-2021). I temi includono aspetti della domanda di trattamento, della distribuzione per sesso e per età, della frequenza di consumo per i più comuni problemi principali (alcol, oppioidi, cocaina o derivati, altri stimolanti, canape, ipnotici/sedativi, tabacco, gioco d'azzardo, disturbi alimentari e dipendenze da computer/internet).

La seconda parte presenta i risultati dettagliati per i ricoveri nell'anno di riferimento 2021 (colore di sfondo verde) e la terza parte presenta i risultati per le dimissioni (colore di sfondo blu). Queste statistiche descrittive prendono in considerazione tutte le domande degli strumenti di indagine. Si devono distinguere due tipi di tabelle:


- Per le domande in cui le categorie di risposta sono codificate separatamente su una scala nominale (ad esempio, "stato civile") o per i dati numerici ricodificati in categorie come per esempio i gruppi di età, la tabella mostra le frequenze (percentuali) delle categorie di risposta corrispondenti
- Per le domande che comportano dei dati numerici su delle scale metriche (per esempio « età all'inizio del consumo problematico »), la tabella presenta dei parametri di posizione (media, mediana) e dei parametri di dispersione (deviazione standard, quartili inferiori e superiori)

La maggior parte delle tabelle presenta i risultati in maniera distinta per i sottogruppi di pazienti che hanno menzionato l'**alcol**, un **oppioidi** (eroina in particolare), la **cocaina** (e derivati) o la **canapa** come problema principale al momento dell'entrata. I **parenti o conoscenti** che consultano per i problemi di un terzo sono ugualmente oggetto di analisi separate per gli aspetti socio-demografici. Invece, gli utenti (poco numerosi) che hanno menzionato altre sostanze come problema principale (per esempio un stimolante o le sostanze volatili) o un problema di dipendenza non inerente a una sostanza (per esempio gioco d'azzardo), non sono differenziati nei risultati (eccetto nei temi direttamente inerenti ai modi di consumo o alle forme di comportamenti additivi non inerenti alle sostanze). Queste persone sono tuttavia incluse nelle analisi relative all'insieme degli interventi che figurano nei blocchi a destra delle tabelle rispettive. Tutte le analisi sono effettuate separatamente per gli uomini, per le donne e per i sessi riuniti (nel caso in cui ci fossero persone il cui sesso non è conosciuto o indeterminato, queste saranno comprese nella colonna « Totale »).


Solo le risposte valide sono considerate nelle analisi. Cioè, le risposte « non noto » e le informazioni mancanti sono escluse dalle analisi. Il numero di risposte valide **N** rappresenta il numero esatto di casi sui quali sono calcolati le percentuali o altri parametri; esso viene indicato per ogni gruppo o sottogruppo. In basso alla tabella viene anche indicato il numero corrispondente di dati mancanti. La presenza di numerosi dati mancanti costringe a interpretare i risultati con particolare prudenza.

Le note in basso alla tabella danno informazioni sulle eventuali particolarità dei gruppi di riferimento e sul tipo di domanda. Quando sono possibili più risposte a una stessa domanda (per esempio nelle tabelle del tema T19, « altri problemi di dipendenza ») le percentuali ottenute non si possono addizionare.

G1 Evoluzione della domanda di trattamento nel campo delle sostanze: trend 2013-2021




Numero di ammissioni registrate da istituzioni con una partecipazione costante




Il numero di prime ammissioni è stato adeguato al numero totale di ammissioni al fine di ottenere una comparabilità diretta (dati mancanti estrapolati).

G2 Evoluzione della domanda di trattamento nel campo dei comportamenti: trend 2013-2021







Numero di ammissioni registrate da istituzioni con una partecipazione costante




Il numero di prime ammissioni è stato adeguato al numero totale di ammissioni al fine di ottenere una comparabilità diretta (dati mancanti estrapolati).

G3 Evoluzione della domanda di trattamento per problema principale (trend indicizzato 2013-2021)





Trend indicizzato del numero di ammissioni registrate da istituzioni con una partecipazione costante (2013=100%)


G4 Problema principale all'entrata alcol: evoluzione 2013-2021


Numero di ammissioni registrate da istituzioni con una partecipazione costante


Il numero di prime ammissioni è stato adeguato al numero totale di ammissioni al fine di ottenere una comparabilità diretta (dati mancanti estrapolati).



Frequenza di consumo durante i 30 giorni precedenti l'ammissione





G5 Problema principale all'entrata oppioidi: evoluzione 2013-2021




Numero di ammissioni registrate da istituzioni con una partecipazione costante


Il numero di prime ammissioni è stato adeguato al numero totale di ammissioni al fine di ottenere una comparabilità diretta (dati mancanti estrapolati).



Frequenza di consumo durante i 30 giorni precedenti l'ammissione





G7 Problema principale all'entrata altri stimolanti: evoluzione 2013-2021




Numero di ammissioni registrate da istituzioni con una partecipazione costante


Il numero di prime ammissioni è stato adeguato al numero totale di ammissioni al fine di ottenere una comparabilità diretta (dati mancanti estrapolati).



Frequenza di consumo durante i 30 giorni precedenti l'ammissione





G8 Problema principale all'entrata canapa: evoluzione 2013-2021




Numero di ammissioni registrate da istituzioni con una partecipazione costante


Il numero di prime ammissioni è stato adeguato al numero totale di ammissioni al fine di ottenere una comparabilità diretta (dati mancanti estrapolati).



Frequenza di consumo durante i 30 giorni precedenti l'ammissione





G10 Problema principale all'entrata tabacco: evoluzione 2013-2021




Numero di ammissioni registrate da istituzioni con una partecipazione costante


Il numero di prime ammissioni è stato adeguato al numero totale di ammissioni al fine di ottenere una comparabilità diretta (dati mancanti estrapolati).



Quantità di sigarette fumate al giorno durante i 30 giorni precedenti l'ammissione





G11 Problema principale all'entrata gioco d'azzardo: evoluzione 2013-2021




Numero di ammissioni registrate da istituzioni con una partecipazione costante


Il numero di prime ammissioni è stato adeguato al numero totale di ammissioni al fine di ottenere una comparabilità diretta (dati mancanti estrapolati).



Frequenza di manifestazione durante i 30 giorni precedenti l'ammissione





G12 Problema principale all'entrata disturbi alimentari: evoluzione 2013-2021




Numero di ammissioni registrate da istituzioni con una partecipazione costante


Il numero di prime ammissioni è stato adeguato al numero totale di ammissioni al fine di ottenere una comparabilità diretta (dati mancanti estrapolati).



Frequenza di manifestazione durante i 30 giorni precedenti l'ammissione





G13 Problema principale all'entrata dipendenza al computer o a Internet: evoluzione 2013-2021




Numero di ammissioni registrate da istituzioni con una partecipazione costante

Il numero di prime ammissioni è stato adeguato al numero totale di ammissioni al fine di ottenere una comparabilità diretta (dati mancanti estrapolati).



Frequenza di manifestazione durante i 30 giorni precedenti l'ammissione



T1 Sesso e età dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2021)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Sesso*																			
uomini			67.6			72.2			81.6			79.1			23.7			63.5	3926
donne			32.4			27.8			18.4			20.9			76.3			36.5	2260
nesso non noto			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	0
N**	1691	812	2503	109	42	151	418	94	512	869	229	1098	238	766	1004	3926	2260	6186	6186
Età (in anni)*																			
fino a 14	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	6.1	4.6	1.8	1.6	1.6	2.0	2.5	2.2	133
15-19	1.9	2.0	1.9	0.9	2.4	1.3	3.1	16.0	5.5	51.1	55.0	51.9	4.0	1.5	2.1	15.6	10.3	13.6	839
20-24	3.7	3.8	3.8	9.3	11.9	10.0	10.0	11.7	10.4	14.2	12.7	13.8	1.8	4.3	3.7	8.2	6.4	7.5	463
25-29	7.2	5.8	6.8	6.5	9.5	7.3	22.7	16.0	21.5	12.3	8.7	11.6	7.6	5.8	6.2	11.2	7.5	9.8	603
30-34	12.1	7.3	10.5	9.3	16.7	11.3	22.2	20.2	21.9	7.4	5.7	7.0	5.8	9.2	8.5	11.9	8.7	10.7	659
35-39	13.3	13.5	13.3	16.7	16.7	16.7	18.2	16.0	17.8	5.1	5.7	5.2	9.0	11.1	10.6	11.6	10.8	11.3	695
40-44	14.0	11.5	13.2	15.7	4.8	12.7	12.9	13.8	13.1	2.4	3.5	2.6	7.6	12.6	11.4	10.2	10.7	10.4	637
45-49	11.1	14.0	12.0	17.6	16.7	17.3	6.2	1.1	5.3	1.7	0.4	1.5	11.7	13.8	13.3	7.6	10.9	8.8	539
50-54	12.9	15.7	13.8	11.1	9.5	10.7	2.6	1.1	2.3	0.8	1.3	0.9	17.9	15.3	15.9	8.2	12.1	9.6	591
55-59	10.5	9.1	10.0	10.2	9.5	10.0	0.5	4.3	1.2	0.7	0.4	0.6	13.9	11.2	11.9	6.1	8.2	6.9	424
60-64	6.6	7.8	7.0	1.9	0.0	1.3	1.2	0.0	1.0	0.1	0.0	0.1	9.0	4.8	5.8	3.9	5.0	4.3	262
65-69	3.5	5.2	4.0	0.0	2.4	0.7	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	4.5	4.7	4.6	1.9	3.8	2.6	159
70-74	2.0	2.1	2.0	0.9	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	2.4	2.7	1.2	1.9	1.4	87
75 e più	1.1	2.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	1.8	1.7	1.8	0.6	1.4	0.9	56
N**	1690	809	2499	108	42	150	418	94	512	869	229	1098	223	747	970	3909	2238	6147	6147
<i>dati mancanti</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15</i>	<i>19</i>	<i>34</i>	<i>17</i>	<i>22</i>	<i>39</i>	<i>39</i>
Età																			
media	44.8	46.8	45.4	41.8	39.1	41.0	34.1	31.8	33.7	22.9	22.4	22.8	45.2	45.6	45.5	36.7	41.3	38.4	
deviazione standard	13.2	13.5	13.3	11.2	12.0	11.5	8.7	10.2	9.0	8.9	9.6	9.1	17.0	14.1	14.8	15.1	15.9	15.6	
1° quartile	34.9	37.2	35.9	34.3	30.8	32.6	27.7	23.5	27.3	16.7	16.3	16.7	34.2	36.5	36.3	24.5	29.1	25.9	
mediana	44.3	47.5	45.1	42.4	37.7	41.7	33.5	31.9	33.2	18.6	17.8	18.3	49.3	46.3	46.8	35.5	41.6	37.5	
3° quartile	54.4	55.6	54.7	49.8	47.3	49.8	39.4	38.3	39.1	27.0	25.8	26.9	56.6	54.9	55.3	48.1	53.1	50.3	
N**	1690	809	2499	108	42	150	418	94	512	869	229	1098	235	751	986	3921	2242	6163	
<i>dati mancanti</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>15</i>	<i>18</i>	<i>5</i>	<i>18</i>	<i>23</i>	

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T2 Stato civile e nazionalità dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2021)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Stato civile*																			
celibe/nubile	49.8	38.9	46.3	72.0	56.8	67.9	73.8	76.9	74.3	90.5	90.0	90.4	30.0	28.4	28.7	64.4	46.9	58.1	3366
sposato-a	29.1	27.9	28.7	12.0	13.5	12.4	12.5	4.4	11.0	5.3	3.3	4.9	54.8	48.2	49.8	21.2	28.8	23.9	1386
separato-a	3.8	4.3	4.0	2.0	5.4	2.9	3.0	1.1	2.6	0.8	1.4	1.0	1.8	3.7	3.2	2.7	3.5	3.0	171
divorziato-a	15.1	23.0	17.6	12.0	18.9	13.9	8.0	15.4	9.4	2.1	3.3	2.3	12.0	17.4	16.1	9.8	17.1	12.4	718
vedovo-a	1.1	4.1	2.1	1.0	5.4	2.2	0.3	0.0	0.2	0.0	0.9	0.2	0.5	1.8	1.5	0.6	2.6	1.3	78
unione registrata	1.1	1.8	1.4	1.0	0.0	0.7	2.5	2.2	2.4	1.3	0.9	1.3	0.9	0.6	0.7	1.3	1.2	1.2	72
N**	1600	761	2361	100	37	137	400	91	491	828	211	1039	217	677	894	3717	2074	5791	5791
dati mancanti	91	51	142	9	5	14	18	3	21	41	18	59	21	89	110	209	186	395	395
Nazionalità*																			
CH	75.7	79.5	76.9	74.7	79.4	76.1	72.9	76.7	73.7	79.8	84.3	80.7	82.9	81.8	82.1	77.0	81.8	78.7	4249
EU	13.8	13.2	13.6	14.5	11.8	13.7	14.9	14.4	14.8	9.0	7.6	8.7	8.3	7.4	7.6	12.2	9.3	11.1	599
altra	10.6	7.4	9.5	10.8	8.8	10.3	12.2	8.9	11.6	11.2	8.1	10.6	8.8	10.8	10.3	10.9	9.0	10.2	548
N**	1468	707	2175	83	34	117	377	90	467	747	197	944	216	693	909	3385	2011	5396	5396
dati mancanti	223	105	328	26	8	34	41	4	45	122	32	154	22	73	95	541	249	790	790

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T3 Grado di urbanizzazione del domicilio, tipo di nucleo familiare e situazione di domicilio dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2021)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			N
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Grado di urbanizzazione*																			
grandi centri urbani	9.5	8.2	9.1	1.0	2.6	1.4	8.9	7.6	8.7	4.9	3.2	4.5	13.8	10.6	11.4	7.6	7.7	7.6	462
periferia dei grandi centri	20.3	17.4	19.3	13.5	7.7	11.9	22.9	16.3	21.7	12.0	11.4	11.9	27.6	20.3	22.0	17.5	15.9	16.9	1024
città di media importanza	12.3	14.9	13.1	11.5	5.1	9.8	13.5	12.0	13.2	23.2	25.5	23.7	12.1	14.9	14.2	15.7	17.1	16.2	982
piccole città	31.3	32.5	31.7	51.9	46.2	50.3	39.6	39.1	39.5	32.7	35.5	33.3	23.3	31.4	29.5	33.5	32.7	33.2	2007
campagne	26.6	27.0	26.7	22.1	38.5	26.6	15.0	25.0	16.8	27.2	24.5	26.6	23.3	22.8	22.9	25.7	26.5	26.0	1573
N**	1663	797	2460	104	39	143	414	92	506	865	220	1085	232	725	957	3865	2183	6048	6048
<i>dati mancanti</i>	28	15	43	5	3	8	4	2	6	4	9	13	6	41	47	61	77	138	138
Tipo di nucleo familiare (30 ultimi giorni)*																			
da solo-a	40.1	35.6	38.6	39.5	32.4	37.5	35.6	32.1	34.9	14.3	13.6	14.2	12.1	11.3	11.4	30.0	26.6	28.9	1403
con famiglia d'origine (genitori,ecc.)	8.8	4.8	7.5	18.6	8.8	15.8	17.8	26.2	19.4	61.3	56.8	60.4	17.2	3.9	6.6	26.7	17.7	23.8	1158
con partner e/o figli	42.6	51.6	45.5	25.6	44.1	30.8	35.9	26.2	34.0	11.2	12.1	11.4	70.7	82.3	79.9	32.8	46.3	37.1	1804
con amici o altre persone	4.3	3.4	4.0	3.5	2.9	3.3	5.1	2.4	4.6	4.2	5.3	4.4	0.0	0.9	0.7	4.2	3.7	4.1	197
in prigione	0.4	0.0	0.3	1.2	0.0	0.8	0.8	1.2	0.9	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.3	16
istituzione terapeutica/foyer	2.4	2.6	2.4	5.8	5.9	5.8	3.1	10.7	4.6	4.6	8.3	5.3	0.0	0.4	0.3	3.4	3.2	3.3	162
ospedale/clinica	0.1	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	8
altro	1.3	1.4	1.4	5.8	5.9	5.8	1.4	1.2	1.4	4.3	3.4	4.1	0.0	1.3	1.0	2.3	2.1	2.2	109
N**	1500	705	2205	86	34	120	354	84	438	788	206	994	58	231	289	3307	1550	4857	4857
<i>dati mancanti</i>	191	107	298	23	8	31	64	10	74	81	23	104	180	535	715	619	710	1329	1329
Situazione di domicilio (30 ultimi giorni)*																			
situazione abitativa stabile	94.3	94.1	94.2	83.5	85.3	84.0	90.7	88.0	90.1	93.1	92.2	92.9	98.3	95.7	96.2	93.2	94.2	93.5	4550
situazione abitativa instabile/senza	2.6	2.5	2.6	9.4	5.9	8.4	5.4	6.0	5.5	2.9	1.9	2.7	1.7	3.8	3.4	3.1	2.8	3.0	147
in prigione	0.4	0.0	0.3	1.2	0.0	0.8	0.6	0.0	0.5	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	14
istituzione/foyer/ospedale/altro	2.7	3.4	2.9	5.9	8.8	6.7	3.4	6.0	3.9	3.8	5.8	4.2	0.0	0.4	0.3	3.2	2.9	3.1	153
N**	1492	715	2207	85	34	119	353	83	436	786	206	992	59	234	293	3299	1565	4864	4864
<i>dati mancanti</i>	199	97	296	24	8	32	65	11	76	83	23	106	179	532	711	627	695	1322	1322

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T4 Tipo di relazione di coppia, numero di figli, di figli che vivono nel nucleo familiare dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2021)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Tipo di relazione di coppia*																			
senza partner, solo-a	42.8	40.7	42.1	52.2	50.0	51.7	41.9	55.9	44.4	72.9	63.4	71.0	20.0	20.2	20.1	51.6	41.3	48.1	1482
relazione-i saltuaria-e	3.3	2.3	3.0	2.2	0.0	1.7	1.3	0.0	1.1	3.0	6.3	3.6	1.8	1.4	1.5	2.7	2.4	2.6	79
relazione fissa, vivendo separato-a	11.5	13.6	12.2	10.9	0.0	8.6	18.1	23.5	19.0	13.0	23.2	15.0	9.1	14.1	13.1	12.0	15.7	13.3	409
relazione fissa, vivendo insieme	42.4	43.3	42.7	34.8	50.0	37.9	38.7	20.6	35.4	11.1	7.1	10.3	69.1	64.3	65.3	33.7	40.6	36.1	1112
N**	963	469	1432	46	12	58	155	34	189	468	112	580	55	213	268	2029	1053	3082	3082
<i>dati mancanti</i>	728	343	1071	63	30	93	263	60	323	401	117	518	183	553	736	1897	1207	3104	3104
Numero di figli*																			
nessuno	45.2	40.8	43.7	59.0	44.4	56.3	60.7	72.0	62.5	92.1	88.5	91.4	41.3	29.5	32.3	63.5	50.2	58.6	1656
1 figlio-a	18.1	23.1	19.9	25.6	11.1	22.9	21.5	16.0	20.6	3.1	6.6	3.8	20.0	12.1	14.0	13.1	15.1	13.8	390
2 figli	24.2	23.1	23.8	12.8	44.4	18.8	14.1	8.0	13.1	2.9	3.3	3.0	26.3	39.0	36.0	15.9	23.0	18.5	522
3 figli o più	12.4	12.9	12.6	2.6	0.0	2.1	3.7	4.0	3.8	1.9	1.6	1.8	12.5	19.3	17.7	7.5	11.8	9.1	256
N**	756	402	1158	39	9	48	135	25	160	480	122	602	80	264	344	1788	1036	2824	2824
<i>dati mancanti</i>	935	410	1345	70	33	103	283	69	352	389	107	496	158	502	660	2138	1224	3362	3362
Numero dei figli che vivono nel nucleo familiare*																			
nessuno	75.1	69.9	73.3	87.5	50.0	77.3	83.3	90.9	84.6	86.8	82.2	85.9	51.5	41.9	44.2	78.8	66.7	74.3	1756
1 figlio-a	10.2	16.9	12.5	6.3	50.0	18.2	8.3	9.1	8.5	2.6	4.7	3.0	14.7	16.7	16.3	7.3	13.5	9.6	228
2 figli	11.1	9.3	10.5	6.3	0.0	4.5	5.6	0.0	4.6	6.1	11.2	7.2	27.9	32.1	31.1	10.2	15.2	12.1	285
3 figli o più	3.6	3.9	3.7	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	2.3	4.5	1.9	4.0	5.9	9.3	8.5	3.6	4.5	4.0	94
N**	619	332	951	16	6	22	108	22	130	424	107	531	68	215	283	1483	880	2363	2363
<i>dati mancanti</i>	1072	480	1552	93	36	129	310	72	382	445	122	567	170	551	721	2443	1380	3823	3823

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T5 Più alta formazione portata a termine e statuto professionale dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2021)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			N
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Più alta formazione portata a termine*																			
nessuna formazione terminata	2.7	3.5	2.9	3.9	17.9	7.6	2.1	8.4	3.4	14.9	21.2	16.2	11.0	4.5	6.1	7.4	7.5	7.4	350
scuola dell'obbligo	11.6	10.9	11.4	23.4	25.0	23.8	12.7	26.5	15.4	50.8	47.8	50.2	6.8	6.9	6.9	22.4	17.3	20.6	974
formazione prof. preliminare	1.2	2.1	1.5	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	2.2	1.9	1.6	1.9	2.1	1.7	1.8	1.8	1.9	1.8	86
formazione generale senza maturità	0.7	1.0	0.8	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.0	0.1	0.5	0.2	0.0	1.9	1.5	0.5	1.2	0.7	35
formazione prof. di base/tirocinio	56.6	55.5	56.2	63.6	50.0	60.0	63.9	54.2	61.9	23.5	20.7	22.9	40.4	48.7	46.7	47.3	46.5	47.0	2221
maturità/scuola magistrale	3.4	4.6	3.8	1.3	3.6	1.9	2.1	3.6	2.4	3.9	3.3	3.7	4.8	6.7	6.2	3.6	5.8	4.4	206
formazione prof. superiore	10.3	9.7	10.1	3.9	3.6	3.8	10.2	3.6	8.9	2.1	1.1	1.9	13.0	11.0	11.5	7.6	8.0	7.7	366
scuola universitaria o università	13.3	11.9	12.8	3.9	0.0	2.9	5.1	3.6	4.8	2.8	3.8	3.0	20.5	18.1	18.7	9.1	11.4	9.9	469
dottorato o abilitazione	0.4	1.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.4	0.7	0.3	0.5	0.4	19
N**	1340	631	1971	77	28	105	332	83	415	723	184	907	146	464	610	3086	1640	4726	4726
<i>dati mancanti</i>	351	181	532	32	14	46	86	11	97	146	45	191	92	302	394	840	620	1460	1460
Statuto professionale*																			
senza attività professionale	13.0	22.2	15.8	31.4	42.9	34.7	22.2	29.8	23.8	16.5	20.6	17.3	-	0.0	0.0	15.5	24.8	18.0	363
apprendista, praticante	1.8	1.8	1.8	2.9	0.0	2.0	3.3	14.0	5.6	22.0	14.3	20.4	-	0.0	0.0	6.3	5.4	6.1	123
manovale, operaio-a ausiliare	5.1	1.8	4.2	2.9	0.0	2.0	4.7	5.3	4.8	5.1	0.0	4.1	-	0.0	0.0	4.6	2.2	4.0	80
operaio-a con formaz. pratica	5.8	5.7	5.8	2.9	7.1	4.1	4.7	3.5	4.5	4.7	3.2	4.4	-	0.0	0.0	5.5	5.6	5.5	111
oper. con formaz. certif. (AFC)	12.8	12.6	12.7	25.7	14.3	22.4	20.3	10.5	18.2	12.2	11.1	11.9	-	33.3	33.3	14.6	12.0	13.9	281
caposquadra	2.6	0.6	2.0	5.7	0.0	4.1	1.9	0.0	1.5	2.0	0.0	1.6	-	0.0	0.0	2.6	0.4	2.0	40
impiegato-a non qualificato-a	25.2	29.7	26.5	14.3	14.3	14.3	22.6	17.5	21.6	12.2	11.1	11.9	-	33.3	33.3	21.7	23.5	22.2	449
impieg. qualif., quadro medio	16.2	11.4	14.8	2.9	21.4	8.2	8.5	8.8	8.6	4.7	1.6	4.1	-	0.0	0.0	11.8	9.6	11.2	227
imp. funz. dirett., quadr. sup.	4.8	4.5	4.7	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	3.3	1.6	1.6	1.6	-	0.0	0.0	4.0	3.3	3.8	77
indipendente	11.0	8.1	10.2	8.6	0.0	6.1	7.1	1.8	5.9	3.1	4.8	3.5	-	33.3	33.3	8.2	6.3	7.7	156
scolaro-a, studente	1.3	1.5	1.3	2.9	0.0	2.0	0.5	8.8	2.2	15.3	30.2	18.2	-	0.0	0.0	4.7	6.1	5.0	102
altro statuto	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.6	0.9	-	0.0	0.0	0.5	0.7	0.6	12
N**	797	333	1130	35	14	49	212	57	269	255	63	318	0	3	3	1481	540	2021	2021
<i>dati mancanti</i>	894	479	1373	74	28	102	206	37	243	614	166	780	238	763	1001	2445	1720	4165	4165

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T6 Fonte di reddito principale e attività dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2021)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			N
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Fonte di reddito principale (nel corso dei 30 ultimi giorni)*																			
stipendio/salario	59.5	49.0	56.2	25.5	17.1	23.3	57.8	39.1	54.3	27.8	21.4	26.5	61.0	66.3	65.0	49.6	45.3	48.2	2467
risparmi	1.6	1.5	1.6	1.1	0.0	0.8	1.3	2.3	1.5	0.7	0.5	0.7	1.2	0.4	0.6	1.3	1.0	1.2	61
rendita (AVS/AI o altre)	14.7	22.0	17.1	16.0	34.3	20.9	6.9	9.2	7.3	4.2	5.3	4.4	9.8	11.1	10.8	10.5	16.8	12.5	640
assistenza sociale	11.3	9.7	10.8	34.0	22.9	31.0	14.5	21.8	15.9	12.5	13.1	12.6	4.9	2.8	3.3	11.9	9.4	11.1	568
assicurazione disoccupazione	5.4	4.7	5.2	12.8	8.6	11.6	9.0	6.9	8.6	3.1	2.4	3.0	2.4	0.8	1.2	5.3	3.5	4.7	241
sostegno del/della partner	0.8	6.9	2.8	1.1	11.4	3.9	1.3	3.4	1.7	0.7	1.0	0.8	0.0	11.9	9.0	0.8	6.0	2.5	127
sostegno dei genitori/conoscenti	2.9	3.1	3.0	4.3	2.9	3.9	4.2	11.5	5.6	49.4	52.9	50.1	20.7	6.3	9.9	17.6	15.3	16.9	864
spacciando, trafficando	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.1	0.9	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	5
altre entrate illegali	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	2
prostituzione	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1
assicurazione d'indennità giornalieri	2.4	1.3	2.0	2.1	0.0	1.6	2.1	2.3	2.1	0.1	2.4	0.6	0.0	0.0	0.0	1.5	1.2	1.4	72
altra	1.3	1.6	1.4	3.2	2.9	3.1	1.8	1.1	1.7	1.2	1.0	1.2	0.0	0.4	0.3	1.3	1.3	1.3	66
N**	1574	741	2315	94	35	129	379	87	466	808	206	1014	82	252	334	3492	1622	5114	5114
<i>dati mancanti</i>	117	71	188	15	7	22	39	7	46	61	23	84	156	514	670	434	638	1072	1072
Attività principale (nel corso dei 30 ultimi giorni)*																			
att. a tempo pieno (70% o più)	56.3	30.3	48.1	25.0	14.7	22.2	56.4	20.7	49.8	21.7	13.0	20.0	66.1	42.7	47.6	46.1	28.6	40.6	1977
attività a tempo parziale	5.0	21.3	10.1	3.3	2.9	3.2	3.9	12.6	5.6	3.1	6.0	3.7	0.0	30.0	23.8	3.8	17.8	8.2	397
lavori occasionali	0.9	0.9	0.9	2.2	0.0	1.6	0.8	1.1	0.9	1.0	0.5	0.9	0.0	0.0	0.0	1.0	0.8	0.9	44
in formazione	3.4	3.2	3.3	3.3	2.9	3.2	3.9	16.1	6.2	51.8	58.5	53.2	17.9	7.0	9.3	18.5	17.2	18.1	880
disoccup., ricerc. di un lavoro	8.7	8.0	8.5	16.3	11.8	15.1	13.1	18.4	14.1	7.5	6.5	7.3	1.8	1.4	1.5	8.9	7.0	8.3	404
disoccup., senza ricerc. di un lavorc	5.5	7.8	6.2	22.8	14.7	20.6	10.2	9.2	10.0	4.6	5.5	4.8	0.0	3.8	3.0	6.1	6.0	6.1	295
rendita	8.3	12.6	9.7	4.3	17.6	7.9	1.8	5.7	2.6	0.8	2.0	1.0	7.1	8.5	8.2	4.7	9.2	6.1	298
incapacità di lavoro	7.6	9.2	8.1	16.3	14.7	15.9	6.6	12.6	7.7	3.6	4.5	3.8	1.8	1.9	1.9	6.3	7.5	6.6	323
casalinga/casalingo	0.2	3.6	1.3	1.1	11.8	4.0	0.0	1.1	0.2	0.0	1.0	0.2	0.0	3.3	2.6	0.1	2.8	1.0	47
altra	4.2	3.2	3.9	5.4	8.8	6.3	3.1	2.3	3.0	5.9	2.5	5.2	5.4	1.4	2.2	4.6	3.1	4.1	200
N**	1509	696	2205	92	34	126	381	87	468	782	200	982	56	213	269	3357	1508	4865	4865
<i>dati mancanti</i>	182	116	298	17	8	25	37	7	44	87	29	116	182	553	735	569	752	1321	1321

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T7 Reddito mensile netto e debiti dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2021)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			N
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Reddito mensile netto (6 ultimi mesi)*																			
nessun reddito	27.8	21.6	26.1	35.7	14.3	28.6	33.3	11.1	28.4	40.9	58.3	42.9	44.4	43.2	43.5	32.6	26.5	30.9	253
fino a 1000 fr.	2.1	6.4	3.2	7.1	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	11.8	0.0	10.5	0.0	0.0	0.0	4.2	4.5	4.3	35
da 1001 a 2000 fr.	10.1	20.8	13.0	14.3	14.3	14.3	6.3	27.8	11.1	14.0	8.3	13.3	33.3	16.2	19.6	11.1	21.1	13.8	113
da 2001 a 3000 fr.	10.1	12.8	10.8	14.3	28.6	19.0	14.3	22.2	16.0	8.6	8.3	8.6	0.0	0.0	0.0	9.7	10.3	9.9	81
da 3001 a 4000 fr.	12.4	11.2	12.1	14.3	0.0	9.5	6.3	11.1	7.4	6.5	8.3	6.7	0.0	0.0	0.0	9.7	8.5	9.4	77
da 4001 a 5000 fr.	10.1	12.8	10.8	14.3	28.6	19.0	15.9	11.1	14.8	8.6	0.0	7.6	0.0	29.7	23.9	9.9	14.8	11.2	92
da 5001 a 6000 fr.	12.1	8.0	11.0	0.0	14.3	4.8	7.9	11.1	8.6	7.5	16.7	8.6	22.2	10.8	13.0	11.1	9.9	10.7	88
da 6001 a 8000 fr.	7.4	1.6	5.8	0.0	0.0	0.0	9.5	5.6	8.6	1.1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	5.9	1.8	4.8	39
da 8001 a 10 000 fr.	3.6	2.4	3.2	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	1.3	2.4	20
da 10 001 a 15 000 fr.	3.3	0.8	2.6	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.4	1.6	13
più di 15 000 fr.	1.2	1.6	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.9	1.0	8
N**	338	125	463	14	7	21	63	18	81	93	12	105	9	37	46	596	223	819	819
<i>dati mancanti</i>	1353	687	2040	95	35	130	355	76	431	776	217	993	229	729	958	3330	2037	5367	5367
Debiti*																			
nessun debito	60.2	68.2	62.8	21.2	27.3	22.7	51.3	61.3	53.4	81.7	80.3	81.4	88.5	93.7	92.6	63.8	75.1	67.4	1386
fino a 5000 fr.	4.1	3.5	3.9	3.0	9.1	4.5	8.7	19.4	11.0	1.4	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	4.1	2.9	3.7	76
da 5001 a 10 000 fr.	3.5	2.1	3.0	0.0	0.0	0.0	7.8	3.2	6.8	2.6	1.3	2.4	0.0	1.1	0.8	3.6	2.4	3.2	66
da 10 001 a 25 000 fr.	4.6	1.0	3.5	3.0	9.1	4.5	3.5	3.2	3.4	2.9	1.3	2.6	3.8	1.1	1.7	4.2	1.7	3.4	69
da 25 001 a 50 000 fr.	2.6	1.0	2.1	15.2	0.0	11.4	5.2	0.0	4.1	0.6	0.0	0.5	3.8	1.1	1.7	2.6	1.1	2.1	43
da 50 001 a 100 000 fr.	19.4	20.4	19.7	51.5	54.5	52.3	15.7	12.9	15.1	8.9	15.8	10.1	0.0	3.2	2.5	17.0	14.6	16.3	334
più di 100 000 fr.	2.5	1.0	2.0	3.0	0.0	2.3	1.7	0.0	1.4	0.6	0.0	0.5	3.8	0.0	0.8	1.8	0.8	1.5	30
importo sconosciuto	3.1	2.8	3.0	3.0	0.0	2.3	6.1	0.0	4.8	1.4	1.3	1.4	0.0	0.0	0.0	2.9	1.5	2.5	51
N**	608	289	897	33	11	44	115	31	146	349	76	425	26	95	121	1392	663	2055	2055
<i>dati mancanti</i>	1083	523	1606	76	31	107	303	63	366	520	153	673	212	671	883	2534	1597	4131	4131

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T8 Incarcerazione o detenzione preventiva prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2021)

	Pazienti: problema principale												Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Incarcerazione o detenzione preventiva*																
nessuna	87.1	99.0	90.7	28.6	100.0	44.4	65.5	70.0	66.7	83.3	100.0	85.5	84.0	96.9	87.5	407
in prigione	4.0	0.0	2.8	14.3	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	5.5	3.8	0.0	2.8	13
in detenzione preventiva	6.7	0.0	4.7	14.3	0.0	11.1	20.7	20.0	20.5	10.4	0.0	9.1	8.6	1.6	6.7	31
in prigione e in detenzione preventiva	2.2	1.0	1.9	42.9	0.0	33.3	13.8	10.0	12.8	0.0	0.0	0.0	3.6	1.6	3.0	14
N**	224	97	321	7	2	9	29	10	39	48	7	55	338	127	465	465
<i>dati mancanti</i>	1467	715	2182	102	40	142	389	84	473	821	222	1043	3350	1367	4717	4717
Durata totale di detenzione***																
fino a 1 mese	42.1	100.0	45.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	100.0	36.7	50.0	37.5	12
> 1 a 2 mesi	5.3	0.0	5.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	3.3	0.0	3.1	1
> 2 a 6 mesi	21.1	0.0	20.0	25.0	-	25.0	75.0	0.0	60.0	0.0	-	0.0	26.7	0.0	25.0	8
> 6 a 12 mesi	10.5	0.0	10.0	50.0	-	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	13.3	0.0	12.5	4
più di un anno	21.1	0.0	20.0	25.0	-	25.0	25.0	100.0	40.0	0.0	-	0.0	20.0	50.0	21.9	7
N**	19	1	20	4	0	4	4	1	5	2	0	2	30	2	32	32
<i>dati mancanti</i>	10	0	10	1	0	1	6	2	8	6	0	6	24	2	26	26

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che hanno vissuto un'esperienza di detenzione. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T9 Istanza d'invio principale, secondo il problema principale e per i parenti o conoscenti (2021)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			N
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Istanza d'invio principale*																			
condanna/misure	14.1	5.4	11.3	9.6	5.7	8.5	13.6	6.9	12.3	43.9	40.9	43.3	1.5	0.3	0.6	18.7	7.3	14.6	830
studio medico	10.0	11.8	10.6	11.7	17.1	13.2	2.9	12.6	4.8	3.5	4.8	3.8	2.5	4.5	4.0	7.0	8.6	7.5	427
istit. specializzata (dipendenze)	5.2	5.4	5.3	10.6	5.7	9.3	5.6	3.4	5.2	1.0	1.4	1.1	3.4	2.6	2.8	4.0	3.7	3.9	219
altro servizio medico/sociale/sanitario	16.4	17.8	16.8	20.2	20.0	20.2	11.2	12.6	11.4	8.6	13.9	9.7	7.4	4.0	4.8	12.9	12.9	12.9	729
istit. formatrice/educativa	0.6	0.5	0.6	1.1	0.0	0.8	0.0	2.3	0.4	3.0	3.8	3.2	2.0	2.0	2.0	1.5	2.0	1.7	96
datore di lavoro	2.8	1.5	2.4	0.0	0.0	0.0	1.1	2.3	1.3	1.5	0.0	1.2	0.5	0.8	0.7	2.0	1.1	1.6	93
propria iniziativa/famiglia/amici	49.2	55.6	51.3	44.7	48.6	45.7	64.6	57.5	63.3	36.0	34.6	35.7	81.8	85.4	84.6	51.3	62.8	55.4	3143
altra	1.8	1.9	1.8	2.1	2.9	2.3	1.1	2.3	1.3	2.5	0.5	2.1	1.0	0.3	0.5	2.7	1.6	2.3	132
N**	1577	753	2330	94	35	129	376	87	463	826	208	1034	203	646	849	3640	2029	5669	5669
dati mancanti	114	59	173	15	7	22	42	7	49	43	21	64	35	120	155	286	231	517	517

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T10 Intervento in seguito ad una misura giudiziaria e tipo di misura, secondo il problema principale (solo pazienti) (2021)

	Pazienti: problema principale												Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Intervento conseguente ad una misura giudiziaria*																
no, nessuna misura	92.7	95.8	93.7	98.5	95.8	97.8	95.9	98.3	96.4	84.4	84.6	84.4	92.5	94.7	93.1	2511
sosp./rinuncia/avvert.(art. 19a c.2 LStup)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.6	0.2	0.0	0.1	3
si, consecutiva ad una misura	7.3	4.2	6.3	1.5	4.2	2.2	4.1	1.7	3.6	14.8	15.4	14.9	7.4	5.3	6.8	184
N**	1001	452	1453	65	24	89	246	60	306	372	91	463	1978	720	2698	2698
<i>dati mancanti</i>	690	360	1050	44	18	62	172	34	206	497	138	635	1710	774	2484	2484
Tipo di misura giudiziaria***																
misure di prot. med. (art. 19a ch3 LStup)	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
misure terapeutiche stazionarie (art. 59 CP)	5.0	0.0	4.2	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	1.8	1
tratt. residenz. di tossicodipendenza (art. 60 CP)	5.0	0.0	4.2	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	1.8	1
presa in carico ambulatoriale	70.0	75.0	70.8	-	-	-	0.0	-	0.0	92.0	100.0	93.1	80.9	77.8	80.4	45
sistemazione in istituzione per giovani adulti	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
in attesa di giudizio	10.0	0.0	8.3	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	3.6	2
altro	10.0	25.0	12.5	-	-	-	100.0	-	100.0	8.0	0.0	6.9	10.6	22.2	12.5	7
N**	20	4	24	0	0	0	1	0	1	25	4	29	47	9	56	56
<i>dati mancanti</i>	53	15	68	1	1	2	9	1	10	33	10	43	102	29	131	131

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali possono comprendere ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T11 Trattamenti/accompagnamenti anteriori l'ammissione e tipi di intervento, secondo il problema principale e per parenti o conoscenti (2021)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			N	
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale		
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale								%
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Interventi precedenti*																				
no	41.7	38.6	40.7	20.7	13.8	18.9	49.2	44.4	48.3	69.7	71.3	70.0	70.8	68.6	69.0	52.8	51.0	52.3	2319	
si	58.3	61.4	59.3	79.3	86.2	81.1	50.8	55.6	51.7	30.3	28.7	30.0	29.2	31.4	31.0	47.2	49.0	47.7	2118	
N**	1402	660	2062	82	29	111	333	81	414	702	181	883	48	191	239	3022	1415	4437	4437	
<i>dati mancanti</i>	289	152	441	27	13	40	85	13	98	167	48	215	190	575	765	904	845	1749	1749	
Tipo di intervento***																				
trattamento con prescriz. di eroina	0.0	0.0	0.0	9.7	28.6	13.2	1.6	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	6	
terapia sostitut. (metadone, subutex)	4.5	2.6	3.9	71.0	85.7	73.7	7.9	36.4	12.2	0.8	0.0	0.7	7.1	1.8	2.9	7.5	4.3	6.4	73	
altro tratt. medicam. delle dipendenze	7.3	5.7	6.7	12.9	28.6	15.8	6.3	0.0	5.4	3.3	0.0	2.8	0.0	1.8	1.4	6.4	4.0	5.6	64	
consulenza ambulatoriale	72.5	77.7	74.3	71.0	85.7	73.7	76.2	72.7	75.7	85.0	86.4	85.2	71.4	85.5	82.6	76.2	80.6	77.7	891	
struttura di giorno/clinica di giorno	2.5	5.7	3.6	0.0	14.3	2.6	6.3	0.0	5.4	1.7	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	2.3	3.5	2.7	31	
terapia residenziale	59.3	58.1	58.9	48.4	71.4	52.6	57.1	63.6	58.1	25.0	13.6	23.2	21.4	16.4	17.4	49.1	45.5	47.9	549	
cura di disintossicazione	42.5	41.9	42.3	64.5	57.1	63.2	17.5	45.5	21.6	11.7	9.1	11.3	14.3	10.9	11.6	32.6	29.5	31.6	362	
gruppo di aiuto reciproco/ autosost.	6.8	7.9	7.2	0.0	14.3	2.6	3.2	0.0	2.7	1.7	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	4.9	4.8	4.9	56	
altro-i	1.1	0.4	0.9	3.2	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	2.5	4.5	2.8	7.1	0.0	1.4	1.6	0.8	1.3	15	
N**	440	229	669	31	7	38	63	11	74	120	22	142	14	55	69	751	396	1147	1147	
<i>dati mancanti</i>	383	176	559	34	18	52	106	34	140	96	31	127	1	5	6	685	299	984	984	

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che sono già stati presi in carico in precedenza. Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

T12 Trattamento sostitutivo o prescrizione di eroina al momento dell'ammissione, secondo il problema principale (solo pazienti) (2021)

	Pazienti: problema principale												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Sostituzione o prescrizione di eroina al momento dell'ammissione*																
no	98.2	98.5	98.3	30.6	46.7	34.4	96.8	91.7	96.0	100.0	100.0	100.0	96.7	97.7	97.0	2535
sì	1.8	1.5	1.7	69.4	53.3	65.6	3.2	8.3	4.0	0.0	0.0	0.0	3.3	2.3	3.0	78
N**	783	406	1189	49	15	64	125	24	149	535	126	661	1830	783	2613	2613
<i>dati mancanti</i>	908	406	1314	60	27	87	293	70	363	334	103	437	1858	711	2569	2569
Tipo di sostituzione/prescrizione***																
eroina	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	-	-	-	2.0	0.0	1.5	1
metadone	41.7	40.0	41.2	86.7	75.0	84.2	33.3	100.0	50.0	-	-	-	74.0	60.0	70.8	46
altri oppiacei	50.0	40.0	47.1	10.0	12.5	10.5	66.7	0.0	50.0	-	-	-	22.0	26.7	23.1	15
altre sostanze	8.3	20.0	11.8	0.0	12.5	2.6	0.0	0.0	0.0	-	-	-	2.0	13.3	4.6	3
N**	12	5	17	30	8	38	3	1	4	0	0	0	50	15	65	65
<i>dati mancanti</i>	2	1	3	4	0	4	1	1	2	0	0	0	10	3	13	13
Intervento di sostituzione nel corso della vita*																
no	96.4	97.3	96.7	25.6	22.2	24.8	93.4	85.9	91.9	99.3	99.1	99.3	94.1	94.3	94.1	3003
sì	3.6	2.7	3.3	74.4	77.8	75.2	6.6	14.1	8.1	0.7	0.9	0.7	5.9	5.7	5.9	187
N**	1172	552	1724	78	27	105	256	64	320	445	108	553	2284	906	3190	3190
<i>dati mancanti</i>	519	260	779	31	15	46	162	30	192	424	121	545	1404	588	1992	1992
Età all'inizio del primo trattamento di sostituzione****																
media	28.3	24.7	27.1	30.3	31.3	30.6	27.3	25.5	26.7	23.0	-	23.0	29.2	28.5	29.0	
deviazione standard	3.9	7.6	5.3	7.6	14.1	9.8	6.1	10.6	6.7	-	-	-	6.5	11.3	8.2	
1° quartile	27.0	18.0	23.0	25.0	20.0	25.0	22.5	18.0	20.0	-	-	-	25.0	20.0	23.0	
mediana	28.0	23.0	28.0	32.0	26.0	29.5	27.5	25.5	27.5	23.0	-	23.0	29.0	26.0	28.0	
3° quartile	32.0	33.0	32.0	35.0	40.0	35.0	32.0	33.0	33.0	-	-	-	33.0	33.0	33.0	
N**	6	3	9	15	7	22	4	2	6	1	0	1	27	13	40	
<i>dati mancanti</i>	36	12	48	43	14	57	13	7	20	2	1	3	108	39	147	

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che seguono un programma di sostituzione o di prescrizione di eroina al momento dell'ammissione. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T13 Problema principale all'entrata (solamente pazienti) (2021)

Tutti i pazienti									
Problema principale	Uomini	Donne	Totale	N		Uomini	Donne	Totale	N
	%	%	%			%	%	%	
alcol	45.9	54.4	48.3	2503	alcol	45.9	54.4	48.3	2503
eroina	2.3	2.0	2.2	115					
metadone	0.0	0.1	0.1	3					
buprenorfina	0.1	0.0	0.0	2	oppioidi	3.0	2.8	2.9	151
fentanyl	0.0	0.0	0.0	1					
altri oppioidi	0.5	0.7	0.6	30					
cocaina	11.0	6.1	9.6	495					
crack	0.4	0.1	0.3	16	cocaina e derivati	11.3	6.3	9.9	512
altra forma di cocaina	0.0	0.1	0.0	1					
anfetamine	1.0	0.5	0.9	46					
metanfetamine	0.2	0.1	0.2	10					
MDMA e affini (ecstasy)	0.3	0.9	0.4	23	altri stimolanti	1.8	1.5	1.7	88
catinoni sintetici	0.1	0.0	0.0	2					
altri stimolanti	0.2	0.1	0.1	7					
barbiturici	0.2	0.2	0.2	12					
benzodiazepina	0.9	1.6	1.1	58	ipnotici/sedativi	1.3	1.9	1.5	78
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0					
altri sonniferi e tranquillanti	0.2	0.1	0.2	8					
LSD	0.1	0.1	0.1	6					
ketamina	0.0	0.0	0.0	1	allucinogeni	0.2	0.1	0.2	10
altri allucinogeni	0.1	0.0	0.1	3					
canapa	23.6	15.3	21.2	1098	canapa	23.6	15.3	21.2	1 098
tabacco	1.3	2.5	1.6	85	tabacco	1.3	2.5	1.6	85
sostanze volatili	0.1	0.0	0.1	5					
altra sostanza	1.0	0.3	0.8	42	altra/e sostanza/e	1.1	0.3	0.9	47
gioco patologico	4.6	2.1	3.9	203					
dipendenza al computer/Internet	2.2	1.1	1.9	97	problemi assimilabili a una dipendenza	10.5	14.8	11.7	608
disturbi alimentari	0.4	8.4	2.7	138					
altro/i problema/i di dipendenza	3.3	3.1	3.3	170					
N**	3687	1493	5180	5180		3687	1493	5180	5 180
<i>dati mancanti</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>		<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T14 Uso di sostanze multiple e combinazioni di sostanze (2021)

Tutti i pazienti				
	Uomini	Donne	Totale	
	%	%	%	N
Problema legato all'uso di sostanze multiple secondo la CIM 10*				
sì	15.6	13.3	15.0	278
no	84.4	86.7	85.0	1574
N**	1349	503	1852	1852
<i>dati mancanti</i>	2339	991	3330	3330
Combinazioni più frequenti di sostanze***				
tab/alc	14.1	24.5	16.6	37
coc/alc	15.3	13.2	14.8	33
can/alc	8.8	7.5	8.5	19
can/coc/alc	4.7	3.8	4.5	9
tab/coc/alc	4.7	1.9	4.0	9
tab/can	4.1	3.8	4.0	9
tab/can/alc	3.5	3.8	3.6	8
coc/op	3.5	0.0	2.7	6
can/coc	3.5	0.0	2.7	6
med/alc	1.8	3.8	2.2	5
can/stim/coc/alc	1.8	3.8	2.2	5
op/alc	1.8	1.9	1.8	4
coc/op/alc	1.8	1.9	1.8	4
stim/alc	1.8	1.9	1.8	4
tab/can/coc/alc	1.8	1.9	1.8	4
stim/coc	1.8	0.0	1.3	3
stim/coc/alc	1.2	1.9	1.3	3
can/stim	0.6	3.8	1.3	3
med/op/alc	0.6	1.9	0.9	2
med/coc/alc	1.2	0.0	0.9	2
can/op/alc	0.0	3.8	0.9	2
can/stim/alc	1.2	0.0	0.9	2
can/stim/coc	1.2	0.0	0.9	2
can/med/alc	1.2	0.0	0.9	2
tab/coc	1.2	0.0	0.9	2
tab/stim/coc/alc	1.2	0.0	0.9	2
tab/med/alc	0.6	1.9	0.9	2
tab/can/coc	0.6	1.9	0.9	2
tab/can/stim/coc	1.2	0.0	0.9	2
altre combinazioni****	13.5	11.3	13.0	29
N**	168	53	221	221
<i>dati mancanti</i>	43	14	57	57

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

*** I risultati si basano solo sui clienti con un problema legato all'uso di sostanze multiple. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

**** Le altre combinazioni sono apparse solo una volta ciascuna

T15.1a Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata (2021), uomini

	Pazienti: principale sostanza problematica								
	Alcol	Oppioidi	Cocaina e derivati	Stimolanti	Ipnotici/sedativi	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
Frequenza di consumo 30 ultimi giorni (%)*									
ogni giorno	39.0	42.3	12.6	26.4	55.6	14.3	42.5	78.0	50.0
4-6 giorni a settimana	13.3	2.6	15.8	13.2	2.8	14.3	8.3	9.8	0.0
2-3 giorni a settimana	14.8	5.1	20.5	7.5	0.0	0.0	14.8	2.4	16.7
max. 1 giorno a settimana	8.3	9.0	24.9	22.6	11.1	42.9	14.3	7.3	16.7
nessun consumo	24.7	41.0	26.3	30.2	30.6	28.6	20.1	2.4	16.7
N**	1463	78	342	53	36	7	757	41	6
<i>dati mancanti</i>	228	31	76	12	13	2	112	7	36

T15.1b Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata (2021), donne

Frequenza di consumo 30 ultimi giorni (%)*									
ogni giorno	39.5	50.0	19.7	17.6	54.2	0.0	38.3	94.4	0.0
4-6 giorni a settimana	15.2	8.3	14.1	23.5	12.5	0.0	8.7	0.0	0.0
2-3 giorni a settimana	15.2	4.2	18.3	0.0	0.0	0.0	12.2	0.0	100.0
max. 1 giorno a settimana	8.5	0.0	26.8	41.2	12.5	0.0	15.8	5.6	0.0
nessun consumo	21.6	37.5	21.1	17.6	20.8	100.0	25.0	0.0	0.0
N**	684	24	71	17	24	1	196	36	1
<i>dati mancanti</i>	128	18	23	6	5	0	33	1	4

T15.1c Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata (2021), uomini e donne

Frequenza di consumo 30 ultimi giorni (%)*									
ogni giorno	39.2	44.1	13.8	24.3	55.0	12.5	41.7	85.7	42.9
4-6 giorni a settimana	13.9	3.9	15.5	15.7	6.7	12.5	8.4	5.2	0.0
2-3 giorni a settimana	14.9	4.9	20.1	5.7	0.0	0.0	14.3	1.3	28.6
max. 1 giorno a settimana	8.3	6.9	25.2	27.1	11.7	37.5	14.6	6.5	14.3
nessun consumo	23.7	40.2	25.4	27.1	26.7	37.5	21.1	1.3	14.3
N**	2147	102	413	70	60	8	953	77	7
<i>dati mancanti</i>	356	49	99	18	18	2	145	8	40

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T15.2a Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata (2021), uomini

	Patient-e-s: problème principal			
	Gioco patologico	Dipendenza al computer/Internet	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
Frequenza di manifestazione 30 ultimi giorni (%)*				
ogni giorno	22.2	75.6	77.8	60.7
4 a 6 giorni alla settimana	14.1	19.5	11.1	11.2
2 a 3 giorni alla settimana	11.1	2.4	11.1	12.1
1 giorno alla settimana o meno	15.2	2.4	0.0	5.6
nessuna manifestazione	37.4	0.0	0.0	10.3
N**	99	41	9	107
<i>dati mancanti</i>	72	39	4	16

T15.2b Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata (2021), donne

Frequenza di manifestazione 30 ultimi giorni (%)*				
ogni giorno	4.3	88.9	56.9	58.3
4 a 6 giorni alla settimana	21.7	0.0	15.7	11.1
2 a 3 giorni alla settimana	8.7	0.0	12.7	11.1
1 giorno alla settimana o meno	21.7	11.1	10.8	13.9
nessuna manifestazione	43.5	0.0	3.9	5.6
N**	23	9	102	36
<i>dati mancanti</i>	9	8	23	11

T15.2c Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata (2021), uomini e donne

Frequenza di manifestazione 30 ultimi giorni (%)*				
ogni giorno	18.9	78.0	58.6	60.1
4 a 6 giorni alla settimana	15.6	16.0	15.3	11.2
2 a 3 giorni alla settimana	10.7	2.0	12.6	11.9
1 giorno alla settimana o meno	16.4	4.0	9.9	7.7
nessuna manifestazione	38.5	0.0	3.6	9.1
N**	122	50	111	143
<i>dati mancanti</i>	81	47	27	27

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T16.1a Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2021), uomini

Pazienti: principale sostanza problematica									
<i>Uomini</i>	Alcol	Oppioidi	Cocaina e derivati	Stimolanti	Ipnotici/sedativi	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
Età all'epoca del primo consumo									
media	16.2	23.0	21.2	22.1	25.4	22.1	15.1	16.1	19.7
deviazione standard	4.2	9.4	6.4	9.7	10.0	7.4	3.0	3.8	8.1
1° quartile	14.0	17.0	17.0	16.0	18.0	18.0	14.0	14.0	14.0
mediana	16.0	20.0	20.0	18.0	22.0	20.0	15.0	15.0	15.5
3° quartile	17.0	25.0	23.0	25.0	31.0	24.0	16.0	18.0	29.0
N*	875	50	240	37	28	7	548	33	6
<i>dati mancanti</i>	816	59	178	28	21	2	321	15	36
Età all'inizio del consumo regolare									
media	23.3	25.1	25.1	24.4	29.9	21.3	15.8	17.3	18.0
deviazione standard	10.1	11.7	7.2	11.3	12.1	2.5	2.5	3.5	7.3
1° quartile	18.0	18.0	20.0	17.0	22.0	19.0	15.0	14.0	15.0
mediana	20.0	20.0	25.0	20.0	27.0	21.0	15.0	17.5	15.0
3° quartile	25.0	30.0	29.0	28.0	35.0	24.0	16.0	20.0	16.0
N*	416	25	87	21	15	3	336	20	5
<i>dati mancanti</i>	1275	84	331	44	34	6	533	28	37
Età all'inizio del consumo problematico									
media	32.2	26.6	27.4	25.1	29.7	26.5	17.4	20.1	19.0
deviazione standard	12.9	10.4	8.9	10.3	12.6	8.7	4.5	7.4	6.8
1° quartile	21.0	19.0	20.0	17.0	20.0	20.5	15.0	15.0	15.0
mediana	30.0	23.5	25.0	23.0	26.0	23.5	16.0	18.0	16.0
3° quartile	40.0	30.0	32.0	29.0	35.0	32.5	18.0	25.0	23.0
N*	728	38	199	32	23	4	441	26	6
<i>dati mancanti</i>	963	71	219	33	26	5	428	22	36
Periodo di latenza (in anni)**									
media	25.9	4.1	10.4	7.4	6.1	1.3	6.3	15.2	2.3
deviazione standard	13.2	5.3	7.9	7.1	3.8	1.7	7.2	13.9	1.4
1° quartile	15.9	1.4	4.6	1.1	1.9	0.1	1.8	3.2	0.8
mediana	23.9	2.5	8.9	5.9	7.4	1.3	3.2	13.0	2.8
3° quartile	36.0	4.8	12.6	10.5	9.3	2.5	8.5	21.3	3.2
N*	331	15	111	13	8	2	377	25	5
<i>dati mancanti</i>	253	2	53	15	4	1	112	10	1

* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

** Lasso di tempo tra il primo consumo della sostanza problematica e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

T16.1b Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2021), donne

Pazienti: principale sostanza problematica									
Donne	Alcol	Oppioidi	Cocaina e derivati	Stimolanti	Ipnocici/sedativi	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
Età all'epoca del primo consumo									
media	18.4	25.6	20.5	17.6	27.0	-	15.2	15.1	10.0
deviazione standard	7.1	13.8	5.1	5.4	15.8	-	2.6	2.0	-
1° quartile	15.0	16.0	17.0	15.0	16.0	-	14.0	14.0	-
mediana	16.0	20.0	19.0	16.0	20.0	-	15.0	15.0	10.0
3° quartile	20.0	35.0	24.0	18.0	35.0	-	16.0	16.0	-
N*	379	19	57	14	15	0	144	27	1
<i>dati mancanti</i>	433	23	37	9	14	1	85	10	4
Età all'inizio del consumo regolare									
media	26.8	24.5	22.2	19.1	33.7	-	15.5	18.5	11.0
deviazione standard	10.9	10.8	5.6	6.6	18.4	-	2.0	6.7	-
1° quartile	18.0	16.0	18.0	15.0	17.0	-	14.0	14.5	-
mediana	23.0	19.5	21.0	16.0	28.5	-	15.0	16.0	11.0
3° quartile	35.0	35.0	26.0	20.0	48.0	-	16.0	19.5	-
N*	231	6	20	9	10	0	78	20	1
<i>dati mancanti</i>	581	36	74	14	19	1	151	17	4
Età all'inizio del consumo problematico									
media	34.1	25.9	24.4	17.9	38.8	-	17.4	20.9	12.0
deviazione standard	13.5	11.8	8.0	5.6	20.4	-	5.6	8.3	-
1° quartile	24.0	18.0	18.0	15.0	17.0	-	15.0	15.0	-
mediana	32.0	22.0	23.5	15.5	40.0	-	16.0	18.0	12.0
3° quartile	43.0	30.0	28.0	20.0	50.0	-	17.0	29.0	-
N*	392	15	52	10	13	0	112	19	1
<i>dati mancanti</i>	420	27	42	13	16	1	117	18	4
Periodo di latenza (in anni)**									
media	22.9	2.2	7.1	2.2	10.6	-	5.3	19.4	-
deviazione standard	14.3	2.2	6.3	2.6	12.6	-	7.3	18.6	-
1° quartile	11.1	0.5	1.8	0.4	0.7	-	1.1	0.7	-
mediana	21.2	1.5	5.1	1.0	7.5	-	2.4	14.6	-
3° quartile	32.7	3.8	10.2	2.3	20.5	-	7.2	35.5	-
N*	126	4	30	9	4	0	100	18	0
<i>dati mancanti</i>	129	0	6	2	1	0	29	6	0

* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

** Lasso di tempo tra il primo consumo della sostanza problematica e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

T16.1c Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2021), uomini e donne

Pazienti: principale sostanza problematica									
<i>Uomini e donne</i>	Alcol	Oppioidi	Cocaina e derivati	Stimolanti	Ipnocici/sedativi	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
Età all'epoca del primo consumo									
media	16.9	23.7	21.0	20.9	25.9	22.1	15.1	15.7	18.3
deviazione standard	5.4	10.8	6.2	8.9	12.2	7.4	2.9	3.1	8.2
1° quartile	14.0	17.0	17.0	15.0	18.0	18.0	14.0	14.0	13.0
mediana	16.0	20.0	20.0	18.0	22.0	20.0	15.0	15.0	15.0
3° quartile	18.0	26.0	23.0	22.0	31.0	24.0	16.0	17.0	29.0
N*	1254	69	297	51	43	7	692	60	7
<i>dati mancanti</i>	1249	82	215	37	35	3	406	25	40
Età all'inizio del consumo regolare									
media	24.6	25.0	24.6	22.8	31.4	21.3	15.7	17.9	16.8
deviazione standard	10.5	11.3	7.0	10.3	14.7	2.5	2.4	5.3	7.2
1° quartile	18.0	18.0	19.0	15.0	22.0	19.0	15.0	14.0	13.0
mediana	20.0	20.0	24.0	19.0	27.0	21.0	15.0	16.5	15.0
3° quartile	30.0	32.0	28.0	26.0	35.0	24.0	16.0	20.0	16.0
N*	647	31	107	30	25	3	414	40	6
<i>dati mancanti</i>	1856	120	405	58	53	7	684	45	41
Età all'inizio del consumo problematico									
media	32.9	26.4	26.8	23.4	33.0	26.5	17.4	20.4	18.0
deviazione standard	13.1	10.7	8.8	9.9	16.2	8.7	4.8	7.7	6.7
1° quartile	22.0	18.0	20.0	16.0	20.0	20.5	15.0	15.0	13.0
mediana	30.0	23.0	25.0	20.5	28.0	23.5	16.0	18.0	16.0
3° quartile	40.0	30.0	32.0	27.0	40.5	32.5	18.0	25.0	23.0
N*	1120	53	251	42	36	4	553	45	7
<i>dati mancanti</i>	1383	98	261	46	42	6	545	40	40
Periodo di latenza (in anni)**									
media	25.1	3.7	9.7	5.3	7.6	1.3	6.1	17.0	2.3
deviazione standard	13.6	4.8	7.7	6.2	7.6	1.7	7.2	16.0	1.4
1° quartile	15.2	1.2	4.1	0.6	1.3	0.1	1.7	1.7	0.8
mediana	23.1	2.5	8.3	2.3	7.4	1.3	2.9	13.0	2.8
3° quartile	34.8	4.8	12.3	7.7	10.1	2.5	8.4	28.6	3.2
N*	457	19	141	22	12	2	477	43	5
<i>dati mancanti</i>	382	2	59	17	5	1	141	16	1

* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

** Lasso di tempo tra il primo consumo della sostanza problematica e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

T16.2a Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2021), uomini

Pazienti: problema principale				
<i>Uomini</i>	Gioco patologico	Dipendenza al computer/Internet	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
Età all'epoca della prima manifestazione				
media	22.9	14.3	11.0	15.7
deviazione standard	8.9	4.8	7.1	8.8
1° quartile	18.0	11.0	6.0	12.0
mediana	19.0	14.0	11.0	14.0
3° quartile	25.0	16.0	16.0	16.0
N*	71	26	2	64
<i>dati mancanti</i>	100	54	11	59
Età all'inizio della manifestazione regolare				
media	26.1	13.7	11.0	17.0
deviazione standard	8.2	0.6	7.1	9.1
1° quartile	19.0	13.0	6.0	13.0
mediana	24.0	14.0	11.0	15.0
3° quartile	33.0	14.0	16.0	17.0
N*	30	3	2	57
<i>dati mancanti</i>	141	77	11	66
Età all'inizio della manifestazione problematica				
media	28.8	18.8	18.3	20.4
deviazione standard	8.9	7.6	8.0	11.3
1° quartile	22.0	13.5	12.0	14.0
mediana	28.0	16.5	19.5	16.0
3° quartile	35.0	22.0	24.5	23.0
N*	71	24	4	72
<i>dati mancanti</i>	100	56	9	51
Periodo di latenza (in anni)**				
media	12.4	6.7	9.7	9.4
deviazione standard	9.2	4.4	11.2	10.4
1° quartile	5.7	3.7	1.7	2.5
mediana	10.3	6.4	9.7	5.2
3° quartile	18.6	9.5	17.6	11.8
N*	50	18	2	47
<i>dati mancanti</i>	45	16	7	39

* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

** Lasso di tempo tra la prima manifestazione del comportamento problematico e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

T16.2b Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2021), donne

Pazienti: problema principale				
<i>Donne</i>	Gioco patologico	Dipendenza al computer/Internet	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
Età all'epoca della prima manifestazione				
media	38.2	22.6	17.2	21.8
deviazione standard	15.2	23.0	6.5	13.8
1° quartile	25.0	9.0	14.0	12.5
mediana	40.0	14.0	15.0	15.5
3° quartile	48.0	25.5	18.0	28.0
N*	14	8	64	24
<i>dati mancanti</i>	18	9	61	23
Età all'inizio della manifestazione regolare				
media	31.0	16.0	17.8	23.2
deviazione standard	10.0	-	6.6	14.3
1° quartile	24.0	-	14.0	14.0
mediana	30.0	16.0	16.5	16.0
3° quartile	38.0	-	19.0	32.0
N*	4	1	64	21
<i>dati mancanti</i>	28	16	61	26
Età all'inizio della manifestazione problematica				
media	39.9	27.0	20.6	22.9
deviazione standard	14.0	20.8	9.7	12.7
1° quartile	29.0	15.0	15.0	14.0
mediana	38.0	19.5	18.0	16.0
3° quartile	50.0	29.0	23.0	31.0
N*	18	8	74	27
<i>dati mancanti</i>	14	9	51	20
Periodo di latenza (in anni)**				
media	9.0	13.4	7.9	6.5
deviazione standard	7.1	13.4	10.7	7.0
1° quartile	2.1	4.1	1.9	2.8
mediana	8.3	9.3	3.5	4.1
3° quartile	16.1	21.3	7.4	7.8
N*	10	7	34	21
<i>dati mancanti</i>	9	2	30	13

* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

** Lasso di tempo tra la prima manifestazione del comportamento problematico e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

T16.2c Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2021), uomini et donne

Pazienti: problema principale				
<i>Uomini et donne</i>	Gioco patologico	Dipendenza al computer/Internet	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
Età all'epoca della prima manifestazione				
media	25.4	16.2	17.0	17.3
deviazione standard	11.6	11.9	6.5	10.6
1° quartile	18.0	10.0	14.0	12.0
mediana	20.0	14.0	15.0	14.0
3° quartile	30.0	16.0	18.0	17.5
N*	85	34	66	88
<i>dati mancanti</i>	118	63	72	82
Età all'inizio della manifestazione regolare				
media	26.7	14.3	17.5	18.7
deviazione standard	8.4	1.3	6.6	11.0
1° quartile	20.0	13.5	14.0	13.0
mediana	25.0	14.0	16.0	15.0
3° quartile	33.0	15.0	19.0	20.0
N*	34	4	66	78
<i>dati mancanti</i>	169	93	72	92
Età all'inizio della manifestazione problematica				
media	31.1	20.8	20.4	21.1
deviazione standard	11.0	12.4	9.6	11.7
1° quartile	23.0	14.0	15.0	14.0
mediana	30.0	17.0	18.0	16.0
3° quartile	37.0	25.0	23.0	25.0
N*	89	32	78	99
<i>dati mancanti</i>	114	65	60	71
Periodo di latenza (in anni)**				
media	11.8	8.6	8.0	8.5
deviazione standard	8.9	8.2	10.5	9.5
1° quartile	4.9	4.0	1.8	2.7
mediana	10.3	6.5	3.5	4.9
3° quartile	17.8	10.6	7.6	9.2
N*	60	25	36	68
<i>dati mancanti</i>	54	18	37	52

* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

** Lasso di tempo tra la prima manifestazione del comportamento problematico e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

T17 Modo di amministrazione della principale sostanza problematica prima dell'entrata (2021)

Pazienti: principale sostanza problematica															
Modo di amministrazione*	Eroina			Cocaina			Amfetamine			Canapa			Benzodiazepine		
	Uomini %	Donne %	Totale %	Uomini %	Donne %	Totale %	Uomini %	Donne %	Totale %	Uomini %	Donne %	Totale %	Uomini %	Donne %	Totale %
iniettato	21.3	26.7	22.6	0.7	1.4	0.8	4.2	0.0	3.4	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
fumato/inalato	31.9	26.7	30.6	9.5	11.6	9.9	20.8	0.0	17.2	98.7	97.7	98.5	0.0	5.0	2.1
ingerito /bevuto	4.3	20.0	8.1	13.2	7.2	12.1	45.8	0.0	37.9	0.7	0.6	0.7	92.6	90.0	91.5
sniffato	42.6	26.7	38.7	76.6	79.7	77.2	29.2	100.0	41.4	0.3	1.7	0.6	7.4	0.0	4.3
altro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	5.0	2.1
N**	47	15	62	304	69	373	24	5	29	715	175	890	27	20	47
<i>dati mancanti</i>	38	15	53	100	22	122	14	3	17	154	54	208	7	4	11

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T18.1 Prevalenza a vita delle iniezioni, nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 12 mesi prima dell'entrata, scambio di materiale d'iniezione, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2021)

	Pazienti: principale sostanza problematica												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Iniezioni nel corso della vita*																
si	4.1	3.2	3.8	35.4	48.6	39.3	6.7	12.1	7.8	1.2	1.5	1.3	4.3	4.3	4.3	173
no	93.9	93.7	93.8	61.0	45.7	56.4	91.8	84.8	90.5	94.7	95.4	94.9	92.9	92.8	92.9	3743
non vuole rispondere	2.0	3.1	2.3	3.7	5.7	4.3	1.4	3.0	1.7	4.0	3.1	3.8	2.8	2.9	2.8	114
N**	1281	617	1898	82	35	117	282	66	348	742	194	936	2863	1167	4030	4030
<i>dati mancanti</i>	410	195	605	27	7	34	136	28	164	127	35	162	825	327	1152	1152
Iniezioni nel corso dei 12 ultimi mesi*																
si	0.7	0.5	0.7	8.7	8.7	8.7	2.9	1.7	2.7	0.4	0.0	0.3	1.2	0.5	1.0	38
no	99.3	99.5	99.3	91.3	91.3	91.3	97.1	98.3	97.3	99.6	100.0	99.7	98.8	99.5	99.0	3817
N**	1234	594	1828	69	23	92	275	59	334	711	187	898	2741	1114	3855	3855
<i>dati mancanti</i>	457	218	675	40	19	59	143	35	178	158	42	200	947	380	1327	1327
Iniezioni nel corso dei 30 ultimi giorni*																
si	0.6	0.5	0.5	7.0	4.0	6.3	2.2	0.0	1.8	0.4	0.0	0.3	0.9	0.4	0.7	28
no	99.4	99.5	99.5	93.0	96.0	93.8	97.8	100.0	98.2	99.6	100.0	99.7	99.1	99.6	99.3	3851
N**	1246	599	1845	71	25	96	275	61	336	711	187	898	2755	1124	3879	3879
<i>dati mancanti</i>	445	213	658	38	17	55	143	33	176	158	42	200	933	370	1303	1303
Scambio di materiale d'iniezione nel corso della vita***																
si	21.4	50.0	25.0	33.3	33.3	33.3	60.0	50.0	57.1	50.0	-	50.0	29.4	42.9	31.7	13
no	78.6	0.0	68.8	66.7	66.7	66.7	40.0	50.0	42.9	50.0	-	50.0	70.6	42.9	65.9	27
non vuole rispondere	0.0	50.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	14.3	2.4	1
N**	14	2	16	9	3	12	5	2	7	2	0	2	34	7	41	41
<i>dati mancanti</i>	39	18	57	20	14	34	14	6	20	7	3	10	89	43	132	132
Scambio di materiale d'iniezione nel corso dei 12 ultimi mesi****																
si	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	0
no	100.0	-	100.0	-	-	-	100.0	-	100.0	-	-	-	100.0	-	100.0	4
N**	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	4	0	4	4
<i>dati mancanti</i>	7	3	10	6	2	8	6	1	7	3	0	3	28	6	34	34
Scambio di materiale d'iniezione nel corso dei 30 ultimi giorni*****																
si	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
no	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>dati mancanti</i>	7	3	10	5	1	6	6	0	6	3	0	3	24	4	28	28

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che si sono iniettati una sostanza illegale nel corso della vita. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

**** I risultati si basano solamente sui clienti che si sono iniettati una sostanza illegale nel corso dei 12 ultimi mesi. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

***** I risultati si basano solamente sui clienti che si sono iniettati una sostanza illegale nel corso dei 30 ultimi giorni. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T18.2 Età all'epoca della prima iniezione, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2021)

	Pazienti: principale sostanza problematica												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Età all'epoca della prima iniezione*																
fino a 14 anni	0.0	25.0	5.9	0.0	14.3	4.8	9.1	20.0	12.5	0.0	50.0	14.3	1.6	21.7	7.0	6
da 15 a 16 anni	11.5	25.0	14.7	0.0	14.3	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	14.3	4.8	17.4	8.1	7
da 17 a 18 anni	23.1	12.5	20.6	35.7	0.0	23.8	18.2	20.0	18.8	0.0	0.0	0.0	25.4	13.0	22.1	19
da 19 a 20 anni	26.9	0.0	20.6	14.3	28.6	19.0	36.4	20.0	31.3	40.0	0.0	28.6	25.4	13.0	22.1	19
da 21 a 25 anni	23.1	25.0	23.5	21.4	42.9	28.6	18.2	0.0	12.5	60.0	0.0	42.9	23.8	21.7	23.3	20
da 26 a 30 anni	3.8	12.5	5.9	7.1	0.0	4.8	9.1	40.0	18.8	0.0	0.0	0.0	6.3	13.0	8.1	7
da 31 a 39 anni	11.5	0.0	8.8	21.4	0.0	14.3	9.1	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	12.7	0.0	9.3	8
dai 40 anni in su	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
N**	26	8	34	14	7	21	11	5	16	5	2	7	63	23	86	86
<i>dati mancanti</i>	27	12	39	15	10	25	8	3	11	4	1	5	60	27	87	87

* I risultati si basano solamente sui clienti che si sono iniettati una sostanza illegale nel corso della loro vita. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T19.1a Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2021), uomini

Uomini

	Pazienti: principale sostanza problematica								
	Alcol	Oppioidi	Cocaina e derivati	Stimolanti	Ipnotici/sedativi	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Altri problemi*									
alcol	-	27.6	38.4	39.7	33.3	88.9	26.5	15.9	73.8
eroina	2.2	6.7	6.6	4.8	8.9	11.1	4.1	0.0	33.3
metadone	0.9	8.6	1.7	1.6	2.2	11.1	0.5	0.0	28.6
buprenorfina	0.4	1.0	0.2	1.6	0.0	11.1	0.2	0.0	0.0
fentanyl	0.4	1.9	0.2	1.6	0.0	11.1	0.2	0.0	0.0
altri oppioidi	1.3	4.8	2.2	3.2	15.6	22.2	1.5	0.0	28.6
cocaina	12.4	37.1	1.5	19.0	8.9	44.4	13.4	2.3	61.9
crack	0.8	1.9	1.0	3.2	2.2	11.1	0.5	0.0	0.0
altra forma di cocaina	0.5	0.0	0.0	3.2	0.0	11.1	0.2	0.0	0.0
anfetamine	4.6	11.4	11.2	14.3	15.6	33.3	7.8	0.0	57.1
metanfetamine	0.7	1.9	1.5	4.8	2.2	11.1	0.8	0.0	7.1
MDMA e affini (ecstasy)	2.8	8.6	7.6	9.5	8.9	22.2	6.9	0.0	23.8
catinoni sintetici	0.5	1.0	0.5	3.2	2.2	11.1	0.2	0.0	0.0
altri stimolanti	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	11.1	0.4	2.3	0.0
barbiturici	2.5	3.8	3.2	3.2	2.2	11.1	3.5	0.0	21.4
benzodiazepina	5.4	23.8	6.4	7.9	15.6	22.2	6.1	2.3	35.7
GHB/GBL	0.5	0.0	0.2	3.2	4.4	11.1	0.2	0.0	2.4
altri sonniferi e tranquillanti	0.6	1.0	0.2	1.6	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
LSD	3.3	8.6	6.4	12.7	6.7	44.4	6.0	0.0	47.6
ketamina	0.8	1.0	0.5	4.8	4.4	22.2	1.1	0.0	2.4
altri allucinogeni	2.4	4.8	4.6	4.8	4.4	22.2	4.3	0.0	45.2
sostanze volatili	0.9	3.8	2.0	1.6	0.0	33.3	3.0	0.0	19.0
canapa	16.6	28.6	34.2	47.6	37.8	100.0	-	18.2	69.0
tabacco	19.4	15.2	20.0	22.2	15.6	22.2	20.3	-	0.0
altra sostanza	1.1	2.9	1.5	1.6	6.7	11.1	2.3	0.0	0.0
gioco patologico	0.8	0.0	2.0	1.6	0.0	22.2	0.8	2.3	0.0
dipendenza al computer/Internet	1.0	0.0	1.0	4.8	0.0	11.1	1.6	4.5	0.0
disturbi alimentari	0.9	0.0	0.5	1.6	0.0	11.1	0.4	2.3	0.0
altro/i problema/i di dipendenza	0.9	0.0	1.0	3.2	2.2	22.2	1.2	2.3	2.4
nessuno	61.2	28.6	40.8	25.4	31.1	0.0	52.7	61.4	16.7
N**	1659	105	409	63	45	9	857	44	42
<i>dati mancanti</i>	32	4	9	2	4	0	12	4	0

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T19.1b Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2021), donne
Donne

	Pazienti: principale sostanza problematica								
	Alcol	Oppioidi	Cocaina e derivati	Stimolanti	Ipnotici/sedativi	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Altri problemi*									
alcol	-	24.3	28.2	21.7	48.3	0.0	24.9	13.5	75.0
eroina	2.6	13.5	5.9	4.3	6.9	0.0	3.6	0.0	0.0
metadone	1.3	16.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
buprenorfina	0.6	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.6	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
altri oppioidi	1.9	5.4	0.0	4.3	3.4	0.0	0.5	0.0	0.0
cocaina	8.1	27.0	0.0	13.0	10.3	100.0	10.0	0.0	25.0
crack	1.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
altra forma di cocaina	0.8	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
anfetamine	3.8	8.1	10.6	8.7	6.9	100.0	10.0	0.0	0.0
metanfetamine	0.9	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
MDMA e affini (ecstasy)	2.5	0.0	11.8	4.3	6.9	100.0	12.2	0.0	0.0
catinoni sintetici	0.8	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
altri stimolanti	1.1	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
barbiturici	3.9	5.4	0.0	0.0	3.4	0.0	2.7	0.0	25.0
benzodiazepina	7.0	16.2	7.1	4.3	6.9	0.0	3.2	2.7	50.0
GHB/GBL	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
altri sonniferi e tranquillanti	1.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
LSD	2.8	2.7	2.4	13.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0
ketamina	0.9	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.5	0.0	0.0
altri allucinogeni	2.4	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0
sostanze volatili	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	25.0
canapa	10.4	21.6	29.4	47.8	13.8	100.0	-	8.1	50.0
tabacco	15.2	18.9	15.3	13.0	10.3	0.0	20.4	-	0.0
altra sostanza	1.3	2.7	1.2	4.3	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0
gioco patologico	0.8	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
dipendenza al computer/Internet	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
disturbi alimentari	2.8	2.7	2.4	0.0	3.4	0.0	1.8	0.0	25.0
altro/i problema/i di dipendenza	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
nessuno	67.8	37.8	42.4	17.4	27.6	0.0	53.8	78.4	0.0
N**	795	37	85	23	29	1	221	37	4
<i>dati mancanti</i>	<i>17</i>	<i>5</i>	<i>9</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8</i>	<i>0</i>	<i>1</i>

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T19.1c Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2021), uomini e donne

Uomini e donne

Altri problemi*	Pazienti: principale sostanza problematica									
	Alcol	Oppioidi	Cocaina e derivati	Stimolanti	Ipnotici/sedativi	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
alcol	-	26.8	36.6	34.9	39.2	80.0	26.2	14.8	73.9	
eroina	2.4	8.5	6.5	4.7	8.1	10.0	4.0	0.0	30.4	
metadone	1.0	10.6	1.6	1.2	1.4	10.0	0.5	0.0	26.1	
buprenorfina	0.5	2.1	0.2	1.2	0.0	10.0	0.2	0.0	0.0	
fentanyl	0.5	2.8	0.2	1.2	0.0	10.0	0.3	0.0	0.0	
altri oppioidi	1.5	4.9	1.8	3.5	10.8	20.0	1.3	0.0	26.1	
cocaina	11.0	34.5	1.2	17.4	9.5	50.0	12.7	1.2	58.7	
crack	0.9	1.4	1.0	2.3	1.4	10.0	0.5	0.0	0.0	
altra forma di cocaina	0.6	0.7	0.0	2.3	0.0	10.0	0.2	0.0	0.0	
anfetamine	4.3	10.6	11.1	12.8	12.2	40.0	8.3	0.0	52.2	
metanfetamine	0.8	2.8	1.2	3.5	1.4	10.0	0.7	0.0	6.5	
MDMA e affini (ecstasy)	2.7	6.3	8.3	8.1	8.1	30.0	8.0	0.0	21.7	
catinoni sintetici	0.6	0.7	0.6	2.3	1.4	10.0	0.2	0.0	0.0	
altri stimolanti	0.7	0.7	0.4	0.0	0.0	10.0	0.4	1.2	0.0	
barbiturici	3.0	4.2	2.6	2.3	2.7	10.0	3.3	0.0	21.7	
benzodiazepina	5.9	21.8	6.5	7.0	12.2	20.0	5.5	2.5	37.0	
GHB/GBL	0.6	0.0	0.2	2.3	2.7	10.0	0.2	0.0	2.2	
altri sonniferi e tranquillanti	0.7	1.4	0.2	1.2	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	
LSD	3.1	7.0	5.7	12.8	4.1	40.0	5.7	0.0	43.5	
ketamina	0.8	0.7	0.4	3.5	4.1	20.0	0.9	0.0	2.2	
altri allucinogeni	2.4	4.2	3.8	3.5	2.7	20.0	4.2	0.0	41.3	
sostanze volatili	1.0	2.8	1.6	1.2	0.0	30.0	3.0	0.0	19.6	
canapa	14.6	26.8	33.4	47.7	28.4	100.0	-	13.6	67.4	
tabacco	18.1	16.2	19.2	19.8	13.5	20.0	20.3	-	0.0	
altra sostanza	1.1	2.8	1.4	2.3	4.1	10.0	2.0	0.0	0.0	
gioco patologico	0.8	0.0	1.6	2.3	0.0	20.0	0.7	1.2	0.0	
dipendenza al computer/Internet	0.9	0.0	0.8	3.5	0.0	10.0	1.3	2.5	0.0	
disturbi alimentari	1.5	0.7	0.8	1.2	1.4	10.0	0.6	1.2	2.2	
altro/i problema/i di dipendenza	1.0	0.0	0.8	2.3	1.4	20.0	1.0	1.2	2.2	
nessuno	63.3	31.0	41.1	23.3	29.7	0.0	53.0	69.1	15.2	
N**	2454	142	494	86	74	10	1078	81	46	
<i>dati mancanti</i>	49	9	18	2	4	0	20	4	1	

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T19.2a Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2021), uomini
Uomini

Pazienti: problema principale				
	Gioco patologico	Dipendenza al computer/Internet	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
	%	%	%	%
Altri problemi*				
alcol	15.2	27.4	0.0	2.6
eroina	0.6	11.0	0.0	0.0
metadone	0.6	1.4	0.0	0.0
buprenorfina	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	1.4	0.0	0.0
altri oppioidi	0.6	1.4	0.0	0.0
cocaina	4.8	15.1	0.0	0.0
crack	0.0	1.4	0.0	0.0
altra forma di cocaina	0.0	1.4	0.0	0.0
anfetamine	2.4	15.1	0.0	0.0
metanfetamine	0.0	2.7	0.0	0.0
MDMA e affini (ecstasy)	0.6	11.0	0.0	0.0
catinoni sintetici	0.0	1.4	0.0	0.0
altri stimolanti	0.0	1.4	0.0	0.0
barbiturici	1.2	12.3	0.0	0.0
benzodiazepina	1.2	11.0	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	1.4	0.0	0.0
altri sonniferi e tranquillanti	0.0	1.4	0.0	0.0
LSD	0.6	12.3	0.0	0.0
ketamina	0.0	1.4	0.0	0.0
altri allucinogeni	0.6	11.0	0.0	0.0
sostanze volatili	0.6	11.0	0.0	0.0
canapa	10.3	20.5	0.0	2.6
tabacco	4.2	9.6	0.0	3.4
altra sostanza	6.1	2.7	0.0	0.0
gioco patologico	-	1.4	0.0	0.0
dipendenza al computer/Internet	4.2	-	0.0	2.6
disturbi alimentari	0.0	1.4	-	0.0
altro/i problema/i di dipendenza	0.6	4.1	18.2	-
nessuno	72.1	63.0	81.8	90.5
N**	165	73	11	116
<i>dati mancanti</i>	6	7	2	7

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T19.2b Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2021), donne

Donne

Pazienti: problema principale				
	Gioco patologico	Dipendenza al computer/Internet	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
	%	%	%	%
Altri problemi*				
alcol	9.7	18.8	2.5	4.7
eroina	0.0	6.3	0.8	0.0
metadone	0.0	0.0	0.0	0.0
buprenorfina	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0
altri oppioidi	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaina	0.0	6.3	0.0	0.0
crack	0.0	0.0	0.0	0.0
altra forma di cocaina	0.0	0.0	0.0	0.0
anfetamine	0.0	6.3	0.0	0.0
metanfetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA e affini (ecstasy)	0.0	6.3	0.8	0.0
catinoni sintetici	0.0	0.0	0.0	0.0
altri stimolanti	0.0	0.0	0.8	0.0
barbiturici	0.0	6.3	0.0	0.0
benzodiazepina	3.2	6.3	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
altri sonniferi e tranquillanti	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	6.3	0.0	0.0
ketamina	0.0	0.0	0.0	0.0
altri allucinogeni	0.0	6.3	0.0	0.0
sostanze volatili	0.0	6.3	0.0	0.0
canapa	0.0	6.3	1.7	9.3
tabacco	3.2	6.3	1.7	4.7
altra sostanza	9.7	6.3	0.0	0.0
gioco patologico	-	0.0	0.0	0.0
dipendenza al computer/Internet	0.0	-	0.0	0.0
disturbi alimentari	0.0	6.3	-	14.0
altro/i problema/i di dipendenza	0.0	6.3	2.5	-
nessuno	83.9	68.8	89.8	74.4
N**	31	16	118	43
<i>dati mancanti</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>7</i>	<i>4</i>

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T19.2c Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2021), uomini e donne

Uomini e donne

	Pazienti: problema principale			
	Gioco patologico	Dipendenza al computer/Internet	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
	%	%	%	%
Altri problemi*				
alcol	14.3	25.8	2.3	3.1
eroina	0.5	10.1	0.8	0.0
metadone	0.5	1.1	0.0	0.0
buprenorfina	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	1.1	0.0	0.0
altri oppioidi	0.5	1.1	0.0	0.0
cocaina	4.1	13.5	0.0	0.0
crack	0.0	1.1	0.0	0.0
altra forma di cocaina	0.0	1.1	0.0	0.0
anfetamine	2.0	13.5	0.0	0.0
metanfetamine	0.0	2.2	0.0	0.0
MDMA e affini (ecstasy)	0.5	10.1	0.8	0.0
catinoni sintetici	0.0	1.1	0.0	0.0
altri stimolanti	0.0	1.1	0.8	0.0
barbiturici	1.0	11.2	0.0	0.0
benzodiazepina	1.5	10.1	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	1.1	0.0	0.0
altri sonniferi e tranquillanti	0.0	1.1	0.0	0.0
LSD	0.5	11.2	0.0	0.0
ketamina	0.0	1.1	0.0	0.0
altri allucinogeni	0.5	10.1	0.0	0.0
sostanze volatili	0.5	10.1	0.0	0.0
canapa	8.7	18.0	1.6	4.4
tabacco	4.1	9.0	1.6	3.8
altra sostanza	6.6	3.4	0.0	0.0
gioco patologico	-	1.1	0.0	0.0
dipendenza al computer/Internet	3.6	-	0.0	1.9
disturbi alimentari	0.0	2.2	-	3.8
altro/i problema/i di dipendenza	0.5	4.5	3.9	-
nessuno	74.0	64.0	89.1	86.2
N**	196	89	129	159
<i>dati mancanti</i>	7	8	9	11

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T20a Frequenza del consumo delle sostanze secondarie secondo il problema principale (solo pazienti) (2021)

	Pazienti: problema principale												comportamenti comparabili ad una dipendenza			Tutti i problemi principali			
	Uomini			Donne			Totale			Uomini			Donne			Totale			N
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Alcol*	Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Ipnotici/sedativi			Comp. comparabili ad una dip.						
ogni giorno	22.7	0.0	17.9	11.8	13.3	11.9	4.5	6.1	4.7	0.0	11.1	4.5	2.6	12.5	4.3	8.5	10.0	8.7	42
4-6 giorni a settimana	13.6	0.0	10.7	20.2	20.0	20.1	4.5	3.0	4.2	15.4	0.0	9.1	2.6	0.0	2.2	11.0	6.3	10.2	49
2-3 giorni a settimana	4.5	0.0	3.6	25.2	33.3	26.1	22.3	24.2	22.6	7.7	33.3	18.2	15.8	12.5	15.2	20.9	22.5	21.2	102
max. 1 giorno a settimana	22.7	16.7	21.4	12.6	20.0	13.4	43.3	39.4	42.6	15.4	11.1	13.6	31.6	25.0	30.4	28.7	28.8	28.7	138
nessun consumo	36.4	83.3	46.4	30.3	13.3	28.4	25.5	27.3	25.8	61.5	44.4	54.5	47.4	50.0	47.8	30.9	32.5	31.2	150
N**	22	6	28	119	15	134	157	33	190	13	9	22	38	8	46	401	80	481	481
<i>dati mancanti</i>	87	36	123	299	79	378	712	196	908	36	20	56	349	213	562	3525	2180	5705	5705
Oppioidi*	Alcol			Cocaina e derivati			Canapa			Ipnotici/sedativi			Comp. comparabili ad una dip.						
ogni giorno	0.0	5.6	2.1	15.8	33.3	18.2	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	20.0	0.0	50.0	9.1	8.9	13.3	9.9	14
4-6 giorni a settimana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
2-3 giorni a settimana	0.0	5.6	2.1	5.3	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.3	1.4	2
max. 1 giorno a settimana	3.3	5.6	4.2	10.5	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.3	3.5	5
nessun consumo	96.7	83.3	91.7	68.4	66.7	68.2	100.0	100.0	100.0	75.0	100.0	80.0	100.0	50.0	90.9	86.6	80.0	85.2	121
N**	30	18	48	19	3	22	33	5	38	4	1	5	9	2	11	112	30	142	142
<i>dati mancanti</i>	1661	794	2455	399	91	490	836	224	1060	45	28	73	378	219	597	3814	2230	6044	6044
Cocaina e derivati*	Alcol			Oppioidi			Canapa			Ipnotici/sedativi			Comp. comparabili ad una dip.						
ogni giorno	2.4	6.0	3.3	16.0	0.0	13.3	2.4	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	5.9	4.0	3.8	3.9	16
4-6 giorni a settimana	5.5	2.0	4.7	4.0	0.0	3.3	2.4	6.3	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	2.6	3.4	14
2-3 giorni a settimana	5.5	8.0	6.0	4.0	0.0	3.3	2.4	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	5.1	4.7	19
max. 1 giorno a settimana	32.7	14.0	28.4	32.0	20.0	30.0	14.5	25.0	16.2	33.3	50.0	40.0	6.3	0.0	5.9	26.4	19.2	25.1	102
nessun consumo	53.9	70.0	57.7	44.0	80.0	50.0	78.3	68.8	76.8	66.7	50.0	60.0	87.5	100.0	88.2	61.4	69.2	62.9	256
N**	165	50	215	25	5	30	83	16	99	3	2	5	16	1	17	329	78	407	407
<i>dati mancanti</i>	1526	762	2288	84	37	121	786	213	999	46	27	73	371	220	591	3597	2182	5779	5779
Canapa*	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Ipnotici/sedativi			Comp. comparabili ad una dip.						
ogni giorno	20.9	10.6	18.5	40.9	0.0	34.6	31.7	47.4	34.1	40.0	0.0	35.3	7.1	0.0	6.9	24.9	19.2	23.8	128
4-6 giorni a settimana	8.6	4.5	7.7	9.1	0.0	7.7	11.5	15.8	12.2	13.3	0.0	11.8	0.0	0.0	0.0	8.9	6.1	8.4	45
2-3 giorni a settimana	7.7	10.6	8.4	4.5	0.0	3.8	9.6	10.5	9.8	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	10.3	7.3	10.1	7.8	42
max. 1 giorno a settimana	9.5	12.1	10.1	13.6	0.0	11.5	11.5	10.5	11.4	6.7	100.0	17.6	10.7	0.0	10.3	10.5	13.1	11.0	59
nessun consumo	53.2	62.1	55.2	31.8	100.0	42.3	35.6	15.8	32.5	40.0	0.0	35.3	71.4	100.0	72.4	48.4	51.5	49.0	263
N**	220	66	286	22	4	26	104	19	123	15	2	17	28	1	29	438	99	537	537
<i>dati mancanti</i>	1471	746	2217	87	38	125	314	75	389	34	27	61	359	220	579	3488	2161	5649	5649

* Come problema secondario. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali possono comprendere anche le persone il cui sesso non è conosciuto.

T20b Frequenza del consumo delle sostanze secondarie secondo il problema principale (solo pazienti) (2021)

	Pazienti: problema principale															Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			comportamenti comparabili ad una dipendenza			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Altri stimolanti*																			
ogni giorno	3.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.8	2
4-6 giorni a settimana	3.0	3.7	3.2	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	5.0	3.8	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	3.9	2.0	3.5	9
2-3 giorni a settimana	1.5	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.2	3
max. 1 giorno a settimana	10.6	11.1	10.8	20.0	0.0	16.7	14.3	40.0	17.5	13.2	8.3	12.3	7.1	0.0	6.7	12.6	12.2	12.5	32
nessun consumo	81.8	85.2	82.8	80.0	100.0	83.3	77.1	60.0	75.0	83.0	91.7	84.6	92.9	100.0	93.3	81.2	85.7	82.0	210
N**	66	27	93	10	2	12	35	5	40	53	12	65	14	1	15	207	49	256	256
<i>dati mancanti</i>	1625	785	2410	99	40	139	383	89	472	816	217	1033	373	220	593	3719	2211	5930	5930
Ipnotici/sedativi*																			
ogni giorno	30.0	51.6	39.4	33.3	0.0	20.0	15.4	-	15.4	6.9	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	17.0	41.5	23.8	35
4-6 giorni a settimana	0.0	3.2	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.7	1
2-3 giorni a settimana	10.0	3.2	7.0	0.0	0.0	0.0	7.7	-	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	2.4	4.1	6
max. 1 giorno a settimana	12.5	0.0	7.0	33.3	0.0	20.0	0.0	-	0.0	0.0	33.3	5.7	0.0	0.0	0.0	8.5	4.9	7.5	11
nessun consumo	47.5	41.9	45.1	33.3	100.0	60.0	76.9	-	76.9	93.1	66.7	88.6	100.0	100.0	100.0	69.8	48.8	63.9	94
N**	40	31	71	3	2	5	13	0	13	29	6	35	10	1	11	106	41	147	147
<i>dati mancanti</i>	1651	781	2432	106	40	146	405	94	499	840	223	1063	377	220	597	3820	2219	6039	6039
Allucinogeni*																			
ogni giorno	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	1
4-6 giorni a settimana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
2-3 giorni a settimana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
max. 1 giorno a settimana	11.5	9.5	11.0	0.0	0.0	0.0	8.7	50.0	12.0	9.5	14.3	10.2	0.0	0.0	0.0	10.7	12.5	11.0	21
nessun consumo	88.5	90.5	89.0	100.0	100.0	100.0	91.3	50.0	88.0	90.5	85.7	89.8	100.0	100.0	100.0	88.7	87.5	88.5	169
N**	52	21	73	7	1	8	23	2	25	42	7	49	10	1	11	159	32	191	191
<i>dati mancanti</i>	1639	791	2430	102	41	143	395	92	487	827	222	1049	377	220	597	3767	2228	5995	5995
Altra/e sostanze*																			
ogni giorno	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
4-6 giorni a settimana	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.1	1
2-3 giorni a settimana	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.1	1
max. 1 giorno a settimana	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	20.0	3.2	0.0	0.0	0.0	1.3	5.9	2.2	2
nessun consumo	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	100.0	80.0	96.8	100.0	100.0	100.0	96.1	94.1	95.7	89
N**	15	10	25	3	0	3	8	0	8	26	5	31	9	1	10	76	17	93	93
<i>dati mancanti</i>	1676	802	2478	106	42	148	410	94	504	843	224	1067	378	220	598	3850	2243	6093	6093

* Come problema secondario. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T21 Frequenza del consumo di alcol, numero di "bicchieri standard" al giorno e frequenza di forti consumi di alcol prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2021)

	Pazienti: problema principale												Tutti i problemi principali			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Frequenza del consumo di alcol*																
mai	14.5	11.7	13.6	25.0	20.0	23.8	6.0	19.2	8.7	20.2	25.3	21.1	17.6	21.1	18.7	387
1 volta al mese o meno	4.0	3.6	3.9	31.3	20.0	28.6	12.0	3.8	10.3	23.9	29.9	25.0	11.7	11.1	11.5	238
2 a 4 volte al mese	6.0	4.9	5.6	25.0	60.0	33.3	29.0	26.9	28.6	39.8	31.0	38.1	18.8	13.4	17.2	355
2 a 3 volte alla settimana	17.5	19.0	18.0	0.0	0.0	0.0	34.0	26.9	32.5	13.3	12.6	13.1	17.1	16.1	16.8	347
4 volte alla settimana o più	57.9	60.7	58.8	18.8	0.0	14.3	19.0	23.1	19.8	2.9	1.1	2.6	34.7	38.4	35.9	742
N**	770	384	1154	16	5	21	100	26	126	377	87	464	1428	641	2069	2069
<i>dati mancanti</i>	921	428	1349	93	37	130	318	68	386	492	142	634	2260	853	3113	3113
Numero di "bicchieri standard" al giorno***																
1 o 2	6.7	5.9	6.5	63.6	75.0	66.7	44.7	40.0	43.8	51.2	56.9	52.2	25.3	24.2	25.0	398
3 o 4	20.1	21.1	20.4	27.3	25.0	26.7	29.4	20.0	27.6	31.3	31.0	31.3	25.2	21.5	24.1	383
5 o 6	21.0	28.5	23.5	9.1	0.0	6.7	15.3	20.0	16.2	10.3	8.6	10.0	16.8	22.5	18.5	295
7 o 9	21.0	23.5	21.9	0.0	0.0	0.0	5.9	15.0	7.6	3.9	0.0	3.2	13.5	16.8	14.5	231
10 o più	31.2	21.1	27.8	0.0	0.0	0.0	4.7	5.0	4.8	3.2	3.4	3.2	19.2	14.9	17.9	285
N**	638	323	961	11	4	15	85	20	105	281	58	339	1117	475	1592	1592
<i>dati mancanti</i>	1053	489	1542	98	38	136	333	74	407	588	171	759	2571	1019	3590	3590
Frequenza di forti consumi di alcol***																
mai	14.2	15.0	14.5	75.0	80.0	76.5	25.0	30.4	26.2	55.5	69.2	58.1	32.0	39.0	34.2	624
meno di una volta al mese	8.3	11.2	9.3	16.7	20.0	17.6	29.8	30.4	29.9	26.3	21.8	25.4	16.5	13.8	15.6	285
1 volta al mese	12.0	8.5	10.8	8.3	0.0	5.9	19.0	17.4	18.7	10.4	2.6	9.0	11.4	6.3	9.8	179
1 volta alla settimana	27.3	30.9	28.5	0.0	0.0	0.0	19.0	13.0	17.8	6.6	5.1	6.3	18.6	19.9	19.0	347
quasi ogni giorno	38.2	34.4	36.9	0.0	0.0	0.0	7.1	8.7	7.5	1.2	1.3	1.2	21.5	21.0	21.3	389
N**	675	340	1015	12	5	17	84	23	107	335	78	413	1252	572	1824	1824
<i>dati mancanti</i>	1016	472	1488	97	37	134	334	71	405	534	151	685	2436	922	3358	3358

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che hanno indicato un consumo d'alcol. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T22 Frequenza del consumo di tabacco e numero di sigarette al giorno nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2021)

	Pazienti: problema principale												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Frequenza del consumo di tabacco*																
mai	40.7	46.4	42.6	22.7	40.0	25.9	24.5	30.8	25.8	26.8	31.3	27.7	36.3	49.2	40.3	749
1 giorno alla settimana o meno	1.3	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	1.7	3.4	5.2	3.8	2.2	2.1	2.2	40
2 a 3 giorni alla settimana	0.7	1.0	0.8	0.0	0.0	0.0	2.1	3.8	2.5	8.6	5.2	7.9	3.3	1.7	2.8	52
4 a 6 giorni alla settimana	1.7	0.7	1.4	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.8	2.1	1.0	1.9	1.9	0.5	1.5	27
1 volta al giorno	1.3	0.3	1.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	2.5	1.6	1.0	1.5	1.6	0.3	1.2	23
più volte al giorno	54.3	50.2	52.9	77.3	60.0	74.1	67.0	65.4	66.7	57.6	56.3	57.3	54.8	46.1	52.1	968
N**	597	291	888	22	5	27	94	26	120	384	96	480	1282	577	1859	1859
<i>dati mancanti</i>	1094	521	1615	87	37	124	324	68	392	485	133	618	2406	917	3323	3323
Numero di sigarette al giorno***																
0 a 10	27.3	32.1	28.8	40.0	66.7	44.4	35.0	55.6	39.7	64.9	72.9	66.4	42.1	45.6	43.0	428
11 a 20	49.8	43.8	48.0	60.0	33.3	55.6	50.0	33.3	46.2	30.2	23.7	29.0	42.8	37.3	41.3	411
21 a 30	17.0	20.4	18.1	0.0	0.0	0.0	10.0	11.1	10.3	3.1	3.4	3.1	10.7	14.1	11.6	115
31 o più	5.8	3.6	5.1	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	3.8	1.9	0.0	1.6	4.5	3.0	4.1	41
N**	311	137	448	15	3	18	60	18	78	262	59	321	732	263	995	995
<i>dati mancanti</i>	43	19	62	2	0	2	11	0	11	19	7	26	85	30	115	115

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che hanno indicato un consumo di tabacco. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T23a Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2021), uomini

Pazienti: principale sostanza problematica									
	Alcol	Oppioidi	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Obiettivo di consumo*									
astinenza definitiva	33.2	100.0	67.6	77.8	85.7	100.0	38.0	20.0	100.0
astinenza limitata nel tempo	21.6	0.0	8.5	11.1	0.0	0.0	7.6	20.0	0.0
consumo controllato	31.9	0.0	8.5	11.1	14.3	0.0	30.4	20.0	0.0
non è prevista nessuna limitazione	0.8	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	3.3	20.0	0.0
nessuna decisione finora	11.9	0.0	12.7	0.0	0.0	0.0	20.7	20.0	0.0
altro	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N*	385	7	71	9	7	1	92	5	1
<i>dati mancanti</i>	1306	102	347	56	42	8	777	43	41

T23b Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2021), donne

Obiettivo di consumo*									
astinenza definitiva	32.9	75.0	78.6	0.0	60.0	0.0	21.4	100.0	0.0
astinenza limitata nel tempo	15.1	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0
consumo controllato	37.5	25.0	7.1	0.0	0.0	0.0	42.9	0.0	0.0
non è prevista nessuna limitazione	1.3	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	14.3	0.0	0.0
nessuna decisione finora	13.2	0.0	7.1	100.0	20.0	0.0	14.3	0.0	0.0
altro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N*	152	4	14	1	5	0	14	2	0
<i>dati mancanti</i>	660	38	80	22	24	1	215	35	5

T23c Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2021), uomini e donne

Obiettivo di consumo*									
astinenza definitiva	33.1	90.9	69.4	70.0	75.0	100.0	35.8	42.9	100.0
astinenza limitata nel tempo	19.7	0.0	8.2	10.0	0.0	0.0	7.5	14.3	0.0
consumo controllato	33.5	9.1	8.2	10.0	8.3	0.0	32.1	14.3	0.0
non è prevista nessuna limitazione	0.9	0.0	2.4	0.0	8.3	0.0	4.7	14.3	0.0
nessuna decisione finora	12.3	0.0	11.8	10.0	8.3	0.0	19.8	14.3	0.0
altro	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N*	537	11	85	10	12	1	106	7	1
<i>dati mancanti</i>	1966	140	427	78	66	9	992	78	46

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T24a Problemi psichici nel corso di ultimi 12 mesi (2021), uomini

Uomini

	Pazienti: problema principale								
	Alcol	Oppioidi	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problemi psichici*									
auto devalorizzazione o senso di colpa	37.1	32.0	28.9	81.8	53.3	80.0	35.0	50.0	45.2
stato ansioso/nervoso importante	28.7	20.0	16.9	54.5	73.3	60.0	29.3	25.0	35.5
difficoltà di comprensione/memoria	10.8	4.0	18.1	36.4	26.7	20.0	13.8	25.0	29.0
alterazione dell'attenzione o iperattività	13.6	0.0	20.5	54.5	20.0	20.0	23.6	50.0	29.0
pensieri o azioni compulsive	1.8	4.0	3.6	9.1	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0
reaz. acuta da stress/ disturbi dell'adattamento	7.3	4.0	7.2	36.4	6.7	0.0	8.9	50.0	0.0
allucinazioni	2.2	0.0	4.8	9.1	6.7	20.0	3.3	0.0	9.7
diff. a controllare comp. violenti	13.8	8.0	18.1	36.4	13.3	40.0	17.1	25.0	29.0
problemi psichici curati con medicine	21.0	24.0	14.5	45.5	66.7	40.0	14.6	0.0	35.5
pensieri suicidari important	10.2	8.0	9.6	36.4	40.0	0.0	13.0	0.0	29.0
tentativi di suicidio	5.5	8.0	6.0	0.0	0.0	20.0	8.9	0.0	12.9
altro/i problema/i psichico/i	3.7	0.0	1.2	9.1	6.7	0.0	5.7	0.0	0.0
nessuno	41.5	60.0	45.8	18.2	6.7	20.0	42.3	25.0	38.7
N**	491	25	83	11	15	5	123	4	31
<i>dati mancanti</i>	<i>1200</i>	<i>84</i>	<i>335</i>	<i>54</i>	<i>34</i>	<i>4</i>	<i>746</i>	<i>44</i>	<i>11</i>

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T24b Problemi psichici nel corso di ultimi 12 mesi (2021), donne

Donne

	Pazienti: problema principale								
	Alcol	Oppioidi	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problemi psichici*									
auto devalorizzazione o senso di colpa	42.9	45.5	33.3	25.0	55.6	-	41.4	100.0	100.0
stato ansioso/nervoso importante	31.7	27.3	33.3	50.0	33.3	-	37.9	0.0	100.0
difficoltà di comprensione/memoria	17.1	0.0	16.7	0.0	0.0	-	13.8	0.0	50.0
alterazione dell'attenzione o iperattività	12.7	0.0	11.1	0.0	0.0	-	13.8	0.0	50.0
pensieri o azioni compulsive	2.9	0.0	11.1	0.0	0.0	-	3.4	0.0	0.0
reaz. acuta da stress/ disturbi dell'adattamento	9.8	9.1	11.1	25.0	11.1	-	3.4	100.0	0.0
allucinazioni	4.4	9.1	5.6	0.0	11.1	-	3.4	0.0	50.0
diff. a controllare comp. violenti	8.8	18.2	16.7	25.0	11.1	-	10.3	0.0	100.0
problemi psichici curati con medicine	32.7	27.3	22.2	75.0	44.4	-	10.3	0.0	100.0
pensieri suicidari important	15.6	18.2	5.6	25.0	33.3	-	17.2	0.0	100.0
tentativi di suicidio	10.2	9.1	0.0	25.0	22.2	-	10.3	0.0	50.0
altro/i problema/i psichico/i	4.4	9.1	0.0	0.0	11.1	-	3.4	0.0	0.0
nessuno	37.6	27.3	55.6	25.0	22.2	-	48.3	0.0	0.0
N**	205	11	18	4	9	0	29	1	2
<i>dati mancanti</i>	<i>607</i>	<i>31</i>	<i>76</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>1</i>	<i>200</i>	<i>36</i>	<i>3</i>

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T24c Problemi psichici nel corso di ultimi 12 mesi (2021), uomini e donne

Uomini e donne

	Pazienti: problema principale								
	Alcol	Oppioidi	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problemi psichici*									
auto devalorizzazione o senso di colpa	38.8	36.1	29.7	66.7	54.2	80.0	36.2	60.0	48.5
stato ansioso/nervoso importante	29.6	22.2	19.8	53.3	58.3	60.0	30.9	20.0	39.4
difficoltà di comprensione/memoria	12.6	2.8	17.8	26.7	16.7	20.0	13.8	20.0	30.3
alterazione dell'attenzione o iperattività	13.4	0.0	18.8	40.0	12.5	20.0	21.7	40.0	30.3
pensieri o azioni compulsive	2.2	2.8	5.0	6.7	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0
reaz. acuta da stress/ disturbi dell'adattamento	8.0	5.6	7.9	33.3	8.3	0.0	7.9	60.0	0.0
allucinazioni	2.9	2.8	5.0	6.7	8.3	20.0	3.3	0.0	12.1
diff. a controllare comp. violenti	12.4	11.1	17.8	33.3	12.5	40.0	15.8	20.0	33.3
problemi psichici curati con medicine	24.4	25.0	15.8	53.3	58.3	40.0	13.8	0.0	39.4
pensieri suicidari important	11.8	11.1	8.9	33.3	37.5	0.0	13.8	0.0	33.3
tentativi di suicidio	6.9	8.3	5.0	6.7	8.3	20.0	9.2	0.0	15.2
altro/i problema/i psichico/i	3.9	2.8	1.0	6.7	8.3	0.0	5.3	0.0	0.0
nessuno	40.4	50.0	47.5	20.0	12.5	20.0	43.4	20.0	36.4
N**	696	36	101	15	24	5	152	5	33
<i>dati mancanti</i>	<i>1807</i>	<i>115</i>	<i>411</i>	<i>73</i>	<i>54</i>	<i>5</i>	<i>946</i>	<i>80</i>	<i>14</i>

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T25 Parenti/conoscenti: legame tra l'utente e la persona sintomatica (2021)

Parenti o conoscenti				
	Uomini	Donne	Totale	
	%	%	%	N
L'utente è... *				
madre/padre	43.2	39.8	40.6	406
figlio/figlia	18.6	12.3	13.8	138
sorella/fratello	5.1	5.4	5.3	53
partner	24.2	36.3	33.4	334
altro parente	1.3	1.2	1.2	12
collega/amico/a	4.7	1.7	2.4	24
datore di lavoro/docente	0.4	0.8	0.7	7
tutore/curatore	0.0	0.1	0.1	1
altro	2.5	2.4	2.4	24
N**	236	763	999	999
<i>dati mancanti</i>	2	3	5	5

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T26 Parenti/conoscenti: problema principale della persona sintomatica (2021)

Parenti o conoscenti		
	Totale	
	%	N
Problema principale della persona sintomatica*		
alcol	52.4	525
eroina	1.9	19
metadone	0.5	5
buprenorfina	0.0	0
fentanyl	0.1	1
altri oppioidi	0.2	2
cocaina	8.1	81
crack	0.5	5
altra forma di cocaina	0.0	0
anfetamine	0.7	7
metanfetamine	0.4	4
MDMA e affini (ecstasy)	0.4	4
catinoni sintetici	0.0	0
altri stimolanti	0.1	1
barbiturici	0.1	1
benzodiazepina	0.7	7
GHB/GBL	0.1	1
altri sonniferi e tranquillanti	0.1	1
LSD	0.2	2
ketamina	0.0	0
altri allucinogeni	0.0	0
sostanze volatili	0.0	0
canapa	16.8	168
tabacco	0.4	4
altra sostanza	0.3	3
gioco patologico	3.1	31
dipendenza al computer/Internet	5.3	53
disturbi alimentari	1.9	19
altro/i problema/i di dipendenza	5.7	57
N**	1001	1001
<i>dati mancanti</i>	3	3

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T27 Sesso e età dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale¹) e dei parenti o conoscenti (2021)

	Pazienti: problema principale ¹												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Sesso*																			
maschile																			3784
femminile																			2288
sex non noto																			0
N**	1613	831	2444	119	46	165	402	74	476	855	233	1088	220	817	1037	3784	2288	6072	6072
Età (in anni)*																			
fino a 14 anni	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	3.9	3.0	6.0	1.1	2.2	2.0	1.5	1.8	108
15-19	1.9	1.2	1.6	1.7	6.5	3.0	2.0	6.8	2.7	53.2	61.8	55.1	2.8	2.1	2.3	16.2	10.5	14.0	850
20-24	3.3	3.3	3.3	3.4	4.3	3.6	9.5	10.8	9.7	14.7	12.9	14.3	2.3	3.7	3.4	7.9	6.0	7.2	433
25-29	6.4	5.7	6.1	5.0	10.9	6.7	21.4	17.6	20.8	8.8	6.0	8.2	6.5	4.9	5.2	9.2	6.3	8.1	490
30-34	9.9	6.9	8.8	9.2	19.6	12.1	21.4	23.0	21.6	8.1	4.7	7.4	6.9	10.2	9.5	11.2	9.2	10.4	631
35-39	12.3	13.1	12.6	16.0	13.0	15.2	18.4	13.5	17.6	5.0	6.0	5.2	6.0	10.6	9.6	10.7	10.9	10.8	651
40-44	12.3	10.7	11.8	20.2	13.0	18.2	13.7	13.5	13.7	2.8	2.6	2.8	9.2	10.0	9.8	9.8	9.3	9.6	581
45-49	11.1	11.9	11.4	20.2	15.2	18.8	7.2	9.5	7.6	2.7	0.9	2.3	10.1	14.5	13.6	8.2	10.7	9.1	552
50-54	13.7	14.1	13.8	16.0	6.5	13.3	4.2	0.0	3.6	0.9	0.9	0.9	13.8	16.4	15.8	8.5	12.2	9.9	598
55-59	12.0	11.0	11.7	6.7	8.7	7.3	1.7	5.4	2.3	0.4	0.0	0.3	15.2	13.5	13.9	7.1	9.6	8.0	486
60-64	8.3	9.5	8.7	1.7	0.0	1.2	0.2	0.0	0.2	0.4	0.0	0.3	8.3	5.2	5.9	4.4	5.7	4.9	298
65-69	4.3	6.3	5.0	0.0	2.2	0.6	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	6.0	3.2	3.8	2.5	3.7	3.0	181
70-74	2.7	4.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	1.7	2.4	1.5	2.4	1.9	112
75 e più	1.7	1.9	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	2.3	2.7	2.7	1.0	1.9	1.3	79
N**	1612	829	2441	119	46	165	402	74	476	855	233	1088	217	801	1018	3780	2270	6050	6050
<i>dati mancanti</i>	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	16	19	4	18	22	22
Età																			
media	46.5	48.4	47.2	42.7	38.7	41.6	34.9	34.4	34.8	23.3	21.7	23.0	47.1	46.3	46.5	37.8	42.5	39.6	
deviazione standard	13.6	13.9	13.7	9.7	11.6	10.4	8.9	10.1	9.1	9.3	8.7	9.2	16.8	13.9	14.5	15.8	16.1	16.1	
1° quartile	36.4	38.0	37.0	35.8	30.9	34.9	28.4	28.0	28.2	17.1	16.6	17.0	36.2	36.4	36.3	24.4	30.3	26.4	
mediana	46.8	48.9	47.5	43.4	37.5	42.2	34.0	33.8	33.9	18.6	18.1	18.6	50.2	47.6	48.0	36.5	42.9	38.9	
3° quartile	56.3	58.5	57.0	50.0	46.1	49.6	40.5	42.1	40.7	27.2	22.9	26.4	58.5	55.4	56.1	50.0	54.3	51.8	
N**	1612	829	2441	119	46	165	402	74	476	855	233	1088	217	801	1018	3780	2270	6050	
<i>dati mancanti</i>	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	16	19	4	18	22	

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T28 Stato civile e grado di urbanizzazione del domicilio dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale¹) e dei parenti o conoscenti (2021)

	Pazienti: problema principale ¹												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			N	
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale		
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale								%
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Stato civile*																				
celibe/nubile	47.4	38.0	44.2	70.2	62.5	68.5	78.1	77.4	78.0	95.2	93.9	94.9	21.1	25.1	24.3	67.6	50.3	61.5	2056	
sposato	31.6	27.3	30.1	10.5	12.5	11.0	9.7	3.2	8.8	2.5	2.5	2.5	56.3	49.1	50.6	19.3	26.2	21.7	726	
separato-a (giuridicamente)	3.8	4.6	4.0	1.8	12.5	4.1	1.0	3.2	1.3	0.7	0.6	0.7	1.4	7.4	6.2	2.1	4.1	2.8	94	
divorziato-a	16.0	24.5	19.0	15.8	12.5	15.1	10.2	16.1	11.0	1.5	3.1	1.8	16.9	14.8	15.3	10.0	16.2	12.2	406	
vedovo-a	0.9	5.2	2.4	1.8	0.0	1.4	1.0	0.0	0.9	0.2	0.0	0.1	4.2	3.2	3.4	0.8	3.1	1.6	53	
unione registrata	0.2	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.1	0.3	0.2	6	
N**	879	461	1340	57	16	73	196	31	227	598	163	761	71	283	354	2171	1170	3341	3341	
dati mancanti	734	370	1104	62	30	92	206	43	249	257	70	327	149	534	683	1613	1118	2731	2731	
Grado di urbanizzazione*																				
grandi centri urbani	13.2	13.4	13.3	1.6	4.8	2.4	13.4	17.9	14.0	5.7	2.8	5.1	25.0	15.8	17.7	10.2	11.0	10.5	422	
periferia dei grandi centri	18.6	18.5	18.6	25.8	0.0	19.3	26.7	25.6	26.6	8.3	7.9	8.2	6.0	4.9	5.2	15.2	11.0	13.7	552	
città di media importanza	12.5	15.1	13.4	3.2	0.0	2.4	13.8	7.7	12.9	26.2	28.8	26.8	19.0	19.0	19.0	17.1	19.2	17.9	719	
piccole città	29.0	26.9	28.3	41.9	61.9	47.0	29.1	33.3	29.7	30.9	35.6	31.9	27.0	30.1	29.5	30.6	31.2	30.8	1240	
campagna	26.6	26.1	26.4	27.4	33.3	28.9	17.0	15.4	16.8	28.9	24.9	28.1	23.0	30.1	28.7	26.9	27.6	27.1	1092	
N**	1096	583	1679	62	21	83	247	39	286	664	177	841	100	385	485	2584	1441	4025	4025	
dati mancanti	517	248	765	57	25	82	155	35	190	191	56	247	120	432	552	1200	847	2047	2047	

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T29 Tipo di nucleo familiare, situazione di domicilio e tipo di relazione di coppia dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale¹) e dei parenti o conoscenti (2021)

	Pazienti: problema principale ¹												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			N
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Tipo di nucleo familiare*																			
da solo-a	39.1	39.5	39.2	57.0	48.6	54.3	39.6	45.0	40.3	16.0	12.6	15.2	10.9	13.2	12.8	30.8	29.0	30.2	1241
con famiglia d'origine (genitori,ecc.)	7.5	4.3	6.4	13.9	16.2	14.7	13.1	10.0	12.7	65.9	60.0	64.6	9.4	7.9	8.1	27.3	17.2	23.9	982
con partner e/o figli	45.1	48.5	46.3	16.5	32.4	21.6	35.8	30.0	35.0	9.5	11.6	10.0	76.6	75.7	75.9	33.1	45.3	37.2	1531
con amici o altre persone	3.8	3.2	3.6	2.5	0.0	1.7	5.0	0.0	4.3	3.1	4.7	3.4	1.6	1.4	1.5	3.5	3.4	3.5	142
in prigione	0.1	0.0	0.1	1.3	0.0	0.9	0.8	0.0	0.7	0.1	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	6
istituzione terapeutica/foyer	2.6	2.7	2.6	6.3	2.7	5.2	2.7	7.5	3.3	2.5	3.7	2.7	1.6	0.0	0.3	2.8	2.4	2.7	109
ospedale/clinica	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	2.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	5
altro	1.8	1.6	1.7	2.5	0.0	1.7	2.7	5.0	3.0	2.9	6.8	3.8	0.0	1.8	1.5	2.3	2.4	2.3	96
N**	1188	625	1813	79	37	116	260	40	300	683	190	873	64	280	344	2720	1392	4112	4112
dati mancanti	425	206	631	40	9	49	142	34	176	172	43	215	156	537	693	1064	896	1960	1960
Situazione di domicilio*																			
situazione abitativa stabile	95.0	96.6	95.5	88.9	94.6	90.7	94.2	84.2	92.9	94.1	89.9	93.2	96.8	97.2	97.1	94.4	95.3	94.7	3853
situazione abitativa instabile/senza c	3.2	1.8	2.7	7.4	2.7	5.9	2.3	13.2	3.7	3.3	4.3	3.5	1.6	2.8	2.6	3.1	2.8	3.0	122
in prigione	0.2	0.0	0.1	1.2	0.0	0.8	0.4	0.0	0.3	0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	5
istituzione/foyer/ospedale/altro	1.6	1.6	1.6	2.5	2.7	2.5	3.1	2.6	3.0	2.7	5.3	3.2	1.6	0.0	0.3	2.3	1.9	2.2	88
N**	1170	622	1792	81	37	118	258	38	296	675	188	863	63	283	346	2691	1377	4068	4068
dati mancanti	443	209	652	38	9	47	144	36	180	180	45	225	157	534	691	1093	911	2004	2004
Tipo di relazione di coppia*																			
senza partner, sola-a	37.0	38.9	37.7	50.0	25.0	42.9	28.9	37.5	30.3	72.1	61.3	69.7	10.2	21.6	19.6	45.0	37.6	42.2	961
relazione-i saltuaria-e	2.0	2.9	2.4	5.0	0.0	3.6	1.7	16.7	4.1	3.4	9.7	4.8	2.0	1.3	1.4	2.3	3.6	2.8	64
relazione fissa, vivendo separat.	9.5	13.1	10.8	5.0	0.0	3.6	20.7	25.0	21.4	10.8	19.4	12.7	8.2	12.1	11.4	10.5	13.6	11.7	266
relazione fissa, vivendo insieme	51.4	45.1	49.1	40.0	75.0	50.0	48.8	20.8	44.1	13.6	9.7	12.7	79.6	65.1	67.6	42.1	45.2	43.3	986
N**	683	375	1058	20	8	28	121	24	145	323	93	416	49	232	281	1412	865	2277	2277
dati mancanti	930	456	1386	99	38	137	281	50	331	532	140	672	171	585	756	2372	1423	3795	3795

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T30 Fonte di reddito principale e attività principale all'uscita, secondo il problema principale¹ e dei parenti o conoscenti (2021)

	Pazienti: problema principale ¹												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite				
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale								%
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Fonte di reddito principale*																				
stipendio/salario	56.0	47.0	52.8	33.3	21.4	30.5	64.9	64.5	64.8	26.8	13.7	24.0	65.2	69.7	68.8	47.5	47.4	47.5	1620	
risparmi	1.6	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.9	0.5	0.0	0.4	0.0	1.2	0.9	1.2	1.0	1.1	38	
rendita (AVS/AI o altre)	18.8	27.8	22.0	17.8	28.6	20.3	8.5	9.7	8.7	3.3	3.3	3.3	16.9	11.0	12.2	12.6	18.1	14.6	497	
assistenza sociale	13.8	8.7	12.0	31.1	28.6	30.5	14.9	22.6	16.0	11.1	18.3	12.6	4.5	2.1	2.6	12.1	8.1	10.7	364	
assicurazione disoccupazione	3.5	2.2	3.1	6.7	0.0	5.1	4.8	0.0	4.1	1.4	2.0	1.5	1.1	0.9	0.9	2.9	1.7	2.4	83	
sostegno del/della partner	0.7	6.0	2.6	0.0	7.1	1.7	0.5	0.0	0.5	0.5	0.7	0.5	0.0	7.4	5.9	0.5	5.4	2.3	78	
sostegno dei genitori/conoscenti	2.6	3.4	2.9	6.7	14.3	8.5	3.7	0.0	3.2	54.4	59.5	55.5	12.4	6.8	8.0	21.1	16.1	19.3	657	
spacciando, trafficando	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	3	
altre entrate illegali	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	
prostituzione	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
assicurazione d'indennità giornaliera	0.5	1.4	0.9	2.2	0.0	1.7	0.5	0.0	0.5	0.7	1.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.5	0.8	0.6	21	
altra	2.2	1.8	2.1	2.2	0.0	1.7	0.5	3.2	0.9	1.2	1.3	1.2	0.0	0.9	0.7	1.5	1.3	1.4	48	
N**	911	496	1407	45	14	59	188	31	219	579	153	732	89	337	426	2175	1235	3410	3410	
<i>dati mancanti</i>	702	335	1037	74	32	106	214	43	257	276	80	356	131	480	611	1609	1053	2662	2662	
Attività principale*																				
att. a tempo pieno (70% o più)	50.6	23.3	41.3	28.6	6.7	23.4	57.2	40.9	55.3	15.8	4.7	13.5	61.5	45.2	48.4	39.9	27.0	35.4	1062	
attività a tempo parziale	6.3	29.5	14.2	6.1	13.3	7.8	3.6	36.4	7.4	3.1	6.8	3.9	9.2	30.4	26.3	4.9	24.4	11.7	351	
lavori occasionali	0.9	1.0	0.9	4.1	0.0	3.1	1.8	0.0	1.6	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.9	0.4	0.7	22	
in formazione	3.7	2.5	3.3	6.1	13.3	7.8	5.4	0.0	4.8	61.9	69.6	63.6	7.7	8.9	8.7	24.7	19.4	22.8	686	
disoccup., ricerc. di un lavoro	5.7	5.7	5.7	8.2	6.7	7.8	9.0	4.5	8.5	3.1	4.7	3.4	0.0	1.1	0.9	5.0	3.8	4.6	138	
disoccup., senza ricerc. di un lavoro	7.8	3.4	6.3	16.3	26.7	18.8	6.6	4.5	6.4	5.5	4.7	5.3	0.0	1.1	0.9	6.4	3.0	5.2	157	
rendita	11.6	17.9	13.8	0.0	6.7	1.6	0.6	0.0	0.5	0.2	0.7	0.3	16.9	7.8	9.6	5.9	10.2	7.4	222	
incapacità di lavoro	7.3	9.6	8.1	16.3	20.0	17.2	7.8	4.5	7.4	3.1	1.4	2.7	1.5	3.7	3.3	6.0	6.6	6.2	187	
casalinga/casalingo	0.0	2.7	0.9	2.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.1	0.0	1.5	1.2	0.1	1.7	0.6	19	
altra	6.1	4.4	5.5	12.2	6.7	10.9	7.8	9.1	8.0	6.6	6.8	6.6	3.1	0.4	0.9	6.2	3.5	5.3	159	
N**	784	407	1191	49	15	64	166	22	188	549	148	697	65	270	335	1957	1046	3003	3003	
<i>dati mancanti</i>	829	424	1253	70	31	101	236	52	288	306	85	391	155	547	702	1827	1242	3069	3069	

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T31 Statuto professionale dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale¹) e dei parenti o conoscenti (2021)

	Pazienti: problema principale ¹												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite				N
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale		
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							%	
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Statuto professionale*																				
senza attività professionale	31.4	34.5	32.4	42.9	50.0	45.5	22.9	10.0	20.0	15.6	10.0	14.9	-	-	-	25.4	30.2	26.8	149	
apprendista, praticante	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	2.2	20.3	10.0	18.9	-	-	-	4.3	3.1	4.0	22	
manovale, operaio-a ausiliar.	3.3	5.0	3.9	14.3	25.0	18.2	11.4	0.0	8.9	4.7	10.0	5.4	-	-	-	4.5	5.0	4.7	26	
operaio-a con formaz. pratica	3.7	5.0	4.2	0.0	0.0	0.0	2.9	10.0	4.4	0.0	0.0	0.0	-	-	-	3.0	4.4	3.4	19	
oper. con form. certif. (AFC)	10.3	8.4	9.7	14.3	0.0	9.1	14.3	10.0	13.3	20.3	0.0	17.6	-	-	-	12.8	8.2	11.5	64	
caposquadra	2.5	0.0	1.7	14.3	0.0	9.1	5.7	0.0	4.4	3.1	0.0	2.7	-	-	-	3.0	0.0	2.2	12	
impiegato-a non qualificato-a	23.1	31.1	25.8	0.0	25.0	9.1	14.3	40.0	20.0	12.5	20.0	13.5	-	-	-	20.2	29.6	22.8	127	
impieg. qualif., quadro medio	13.6	10.1	12.5	14.3	0.0	9.1	14.3	0.0	11.1	4.7	0.0	4.1	-	-	-	11.8	8.8	11.0	61	
imp. funz. dirett., quadr. sup.	5.4	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	2.9	10.0	4.4	0.0	0.0	0.0	-	-	-	4.5	0.6	3.4	19	
indipendente	5.4	4.2	5.0	0.0	0.0	0.0	11.4	10.0	11.1	0.0	0.0	0.0	-	-	-	4.3	3.8	4.1	23	
scolaro-a, studente	0.0	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8	50.0	23.0	-	-	-	5.5	5.7	5.6	31	
altro statuto	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.5	0.6	0.5	3	
N**	242	119	361	7	4	11	35	10	45	64	10	74	0	0	0	397	159	556	556	
<i>dati mancanti</i>	1371	712	2083	112	42	154	367	64	431	791	223	1014	220	817	1037	3387	2129	5516	5516	

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T32a Ragione principale della fine del trattamento/accompagnamento dei pazienti (in rapporto al problema principale¹) e dei parenti o conoscenti (2021)

Ragione principale*	Pazienti: problema principale ¹												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			N
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
conclus. pianific. senza passag.	55.1	52.1	54.1	35.3	37.0	35.8	44.1	36.5	42.9	66.2	65.8	66.1	72.1	74.5	74.0	57.5	61.9	59.2	3583
conclus. pianific. con passag.	7.3	8.3	7.7	15.1	10.9	13.9	8.0	12.2	8.7	7.8	8.7	8.0	4.1	3.6	3.7	7.8	7.2	7.6	459
cambio di domicilio	1.9	1.9	1.9	8.4	4.3	7.3	4.0	1.4	3.6	1.2	3.0	1.6	0.9	0.6	0.7	2.1	1.7	1.9	118
ospedalizzazione	0.2	0.7	0.4	0.8	0.0	0.6	0.5	1.4	0.6	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	19
incarcerazione	0.1	0.0	0.1	0.8	0.0	0.6	0.5	0.0	0.4	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	9
perdita di contatto	26.7	27.1	26.9	30.3	28.3	29.7	32.8	33.8	33.0	18.7	15.6	18.1	17.8	16.2	16.5	24.0	21.1	22.9	1388
conclusione esplicita	5.5	6.9	6.0	4.2	6.5	4.8	6.3	6.8	6.3	3.3	2.6	3.1	1.4	2.9	2.6	5.0	4.6	4.9	294
decesso	1.6	1.2	1.4	3.4	8.7	4.8	1.8	4.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.1	1.1	0.8	1.0	61
altre cause	1.6	1.7	1.6	1.7	4.3	2.4	2.0	4.1	2.3	2.3	4.3	2.8	3.2	2.0	2.2	2.0	2.2	2.1	126
N**	1609	829	2438	119	46	165	399	74	473	854	231	1085	219	815	1034	3775	2282	6057	6057
<i>dati mancanti</i>	4	2	6	0	0	0	3	0	3	1	2	3	1	2	3	9	6	15	15

T32b Destinazione dei trasferimenti dei pazienti (in rapporto al problema principale¹) e dei parenti o conoscenti (2021)

Destinazione dei trasferimenti***	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			N
terapia residenziale	28.4	18.8	24.8	14.3	0.0	12.5	15.0	33.3	19.2	22.0	0.0	17.0	0.0	15.4	13.3	22.3	16.5	20.4	
struttura di giorno/clinica di giorno	3.7	2.1	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	1.0	1.8	5
consulenza ambulatoriale	40.7	43.8	41.9	57.1	50.0	56.3	35.0	33.3	34.6	36.6	50.0	39.6	100.0	46.2	53.3	42.6	45.4	43.5	124
appartamento protetto	1.2	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.7	2
altra istituzione specializzata	25.9	35.4	29.5	28.6	50.0	31.3	45.0	33.3	42.3	41.5	50.0	43.4	0.0	38.5	33.3	31.9	37.1	33.7	96
N**	81	48	129	14	2	16	20	6	26	41	12	53	2	13	15	188	97	285	285
<i>dati mancanti</i>	37	21	58	4	3	7	12	3	15	26	8	34	7	16	23	106	68	174	174

T32c Causa di decesso dei pazienti (in rapporto al problema principale¹) e dei parenti o conoscenti (2021)

Cause di decesso****	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			N
suicidio	10.5	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	25.0	100.0	40.0	-	-	-	-	-	-	10.7	10.0	10.5	
infortunio	10.5	33.3	16.0	50.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	10.7	30.0	15.8	6
malattia	57.9	66.7	60.0	0.0	50.0	25.0	50.0	0.0	40.0	-	-	-	-	-	-	57.1	60.0	57.9	22
overdose o intossicazione acuta	5.3	0.0	4.0	50.0	0.0	25.0	25.0	0.0	20.0	-	-	-	-	-	-	10.7	0.0	7.9	3
altre cause di decesso	15.8	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	10.7	0.0	7.9	3
N**	19	6	25	2	2	4	4	1	5	0	0	0	0	0	0	28	10	38	38
<i>dati mancanti</i>	6	4	10	2	2	4	3	2	5	0	0	0	1	0	1	15	8	23	23

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti trasferiti. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

**** I risultati si basano solamente sui clienti deceduti durante l'intervento. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T33 Durata dell'intervento sui pazienti (in rapporto al problema principale¹) e sui parenti o conoscenti (2021)

	Pazienti: problema principale ¹												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite				
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale		
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale								
Durata della presa in carico* (%)																				
1 settimana o meno	4.5	3.7	4.2	0.8	4.3	1.8	2.2	2.7	2.3	5.3	6.9	5.6	14.5	9.1	10.2	4.9	5.8	5.3	320	
> 1 settimana a 1 mese	3.2	3.4	3.3	2.5	2.2	2.4	3.7	1.4	3.4	9.2	12.9	10.0	0.0	3.4	2.7	4.5	4.2	4.4	267	
> 1 a 2 mesi	3.7	2.3	3.2	4.2	0.0	3.0	3.7	5.4	4.0	9.8	9.4	9.7	5.0	5.0	5.0	5.8	4.2	5.2	316	
> 2 a 3 mesi	3.8	3.4	3.6	5.0	0.0	3.6	5.7	0.0	4.8	6.8	6.0	6.6	4.5	5.9	5.6	4.9	4.3	4.7	283	
> 3 a 6 mesi	12.3	13.5	12.7	7.6	8.7	7.9	16.2	18.9	16.6	16.8	18.5	17.2	16.8	14.6	15.0	14.5	15.0	14.7	892	
> 6 mesi a 1 anno	32.6	29.1	31.4	24.4	23.9	24.2	31.3	35.1	31.9	30.9	27.9	30.2	38.2	34.3	35.1	33.0	31.9	32.6	1978	
> 1 a 2 anni	21.9	25.0	23.0	16.8	32.6	21.2	21.1	24.3	21.6	14.0	9.0	13.0	14.5	19.8	18.7	18.4	21.1	19.4	1178	
> 2 a 3 anni	8.9	8.2	8.7	10.9	10.9	10.9	9.7	2.7	8.6	4.0	5.6	4.3	2.7	4.4	4.1	6.9	6.3	6.7	406	
> 3 a 5 anni	4.2	5.7	4.7	8.4	6.5	7.9	3.7	8.1	4.4	2.1	1.7	2.0	2.7	2.7	2.7	3.6	4.0	3.8	228	
> 5 a 10 anni	4.0	4.6	4.2	15.1	6.5	12.7	2.0	1.4	1.9	1.1	2.1	1.3	0.5	0.7	0.7	2.9	2.6	2.8	168	
più di 10 anni	0.9	1.2	1.0	4.2	4.3	4.2	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.2	0.6	0.6	0.6	36	
N**	1613	831	2444	119	46	165	402	74	476	855	233	1088	220	817	1037	3784	2288	6072	6072	
<i>dati mancanti</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Durata (in settimane)																				
media	71.3	78.9	73.9	134.7	124.5	131.9	59.3	56.6	58.9	38.5	38.3	38.4	41.3	43.9	43.4	58.8	59.8	59.2		
deviazione standard	98.0	108.0	101.5	165.7	181.7	169.8	72.3	58.4	70.2	48.4	56.1	50.1	72.1	50.4	55.7	84.7	84.9	84.8		
1° quartile	22.4	23.0	22.7	28.3	31.9	29.3	19.1	21.6	19.3	8.7	5.6	8.0	13.0	13.1	13.1	16.4	17.6	16.9		
mediana	41.9	45.0	43.0	61.9	73.7	63.0	38.7	35.4	38.6	26.1	21.7	25.0	28.0	31.0	30.0	34.7	35.6	35.0		
3° quartile	79.6	89.9	82.5	198.0	105.4	147.9	72.8	63.1	71.4	48.7	43.0	47.6	45.6	56.9	54.0	64.0	67.1	65.1		
N**	1613	831	2444	119	46	165	402	74	476	855	233	1088	220	817	1037	3784	2288	6072		
<i>dati mancanti</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T34 Trattamento sostitutivo durante e immediatamente dopo l'intervento, in rapporto al problema principale¹ (solamente pazienti) (2021)

	Pazienti: problema principale ¹												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Sostituzione nel corso dell'intervento*																
no	98.9	99.2	99.0	42.1	33.3	39.6	93.8	90.0	93.3	100.0	99.3	99.9	97.6	97.3	97.5	2401
si	1.1	0.8	1.0	57.9	66.7	60.4	6.2	10.0	6.7	0.0	0.7	0.1	2.4	2.7	2.5	61
N**	710	378	1088	38	15	53	130	20	150	523	145	668	1715	747	2462	2462
<i>dati mancanti</i>	903	453	1356	81	31	112	272	54	326	332	88	420	1849	724	2573	2573
Tipo di sostituzione***																
eroina	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	5.0	1.6	1
metadone	75.0	66.7	72.7	95.5	80.0	90.6	75.0	100.0	80.0	-	100.0	100.0	87.8	75.0	83.6	51
altri oppiacei	0.0	0.0	0.0	4.5	20.0	9.4	25.0	0.0	20.0	-	0.0	0.0	7.3	15.0	9.8	6
altre sostanze	25.0	33.3	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	4.9	5.0	4.9	3
N**	8	3	11	22	10	32	8	2	10	0	1	1	41	20	61	61
<i>dati mancanti</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sostituzione dopo l'intervento*																
no	99.6	99.4	99.5	64.7	50.0	60.9	96.8	87.5	95.8	100.0	98.5	99.7	98.7	98.0	98.5	2294
si	0.4	0.6	0.5	35.3	50.0	39.1	3.2	12.5	4.2	0.0	1.5	0.3	1.3	2.0	1.5	35
N**	668	360	1028	34	12	46	126	16	142	497	134	631	1621	708	2329	2329
<i>dati mancanti</i>	945	471	1416	85	34	119	276	58	334	358	99	457	1943	763	2706	2706
Tipo di sostituzione***																
prescrizione di eroina	33.3	50.0	40.0	8.3	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	-	50.0	50.0	9.5	21.4	14.3	5
trattamento sostitutivo	66.7	50.0	60.0	91.7	100.0	94.4	100.0	100.0	100.0	-	50.0	50.0	90.5	78.6	85.7	30
N**	3	2	5	12	6	18	4	2	6	0	2	2	21	14	35	35
<i>dati mancanti</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti ai quali è stata prescritta una sostituzione durante l'intervento. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T35 Postassistenza prevista e preparata, in rapporto al problema principale¹ (solamente pazienti) (2021)

	Pazienti: problema principale ¹												Tutti i pazienti			N
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Postassistenza prevista e preparata*																
no	91.6	87.6	90.4	92.3	84.6	89.7	91.0	88.9	90.8	93.3	93.8	93.4	92.9	88.6	91.8	944
sì	8.4	12.4	9.6	7.7	15.4	10.3	9.0	11.1	9.2	6.7	6.3	6.6	7.1	11.4	8.2	84
N**	404	178	582	26	13	39	67	9	76	149	32	181	764	264	1028	1028
<i>dati mancanti</i>	1209	653	1862	93	33	126	335	65	400	706	201	907	2800	1207	4007	4007
Tipo di postassistenza prevista***																
appartamento protetto dell'istituzione	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
servizio di postassistenza dell'istituzione	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
appartamento protetto esterno	6.3	4.8	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	3.6	3.8	3
servizio di postassistenza esterno	15.6	19.0	17.0	50.0	0.0	25.0	33.3	100.0	42.9	44.4	100.0	50.0	23.5	25.0	24.1	19
centro di consulenza per problemi inerenti all'alcol	12.5	14.3	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	10.7	8.9	7
centro di consulenza per problemi inerenti alle droghe	6.3	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	0.0	20.0	7.8	0.0	5.1	4
altri centri di consulenza	18.8	23.8	20.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	10.0	15.7	21.4	17.7	14
gruppo di aiuto reciproco e di autosostegno	15.6	0.0	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	0.0	6.3	5
gruppo di precedenti utenti del centro/ dell'istituzione	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
altro-i	28.1	38.1	32.1	50.0	100.0	75.0	66.7	0.0	57.1	22.2	0.0	20.0	33.3	39.3	35.4	28
N**	32	21	53	2	2	4	6	1	7	9	1	10	51	28	79	79
<i>dati mancanti</i>	2	1	3	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	2	5	5

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti per i quali una postassistenza è prevista. Le categorie non sono esclusive (molte risposte possibili)

T36 Problemi di dipendenza all'uscita, in rapporto al problema principale¹ (solamente pazienti) (2021)

Problemi di dipendenza all'uscita*	Pazienti: problema principale ¹												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
alcol	78.2	84.9	80.4	26.4	20.0	24.5	17.9	12.5	17.1	14.7	9.1	13.6	47.8	61.5	51.6	1281
eroina	2.7	3.4	3.0	48.6	33.3	44.1	3.3	2.5	3.2	0.9	0.0	0.8	4.4	4.0	4.3	107
metadone	1.8	3.0	2.2	11.1	0.0	7.8	1.4	0.0	1.2	0.6	0.0	0.5	1.9	2.0	1.9	48
buprenorfina	1.6	3.0	2.1	2.8	3.3	2.9	0.9	0.0	0.8	0.6	0.0	0.5	1.5	2.2	1.7	41
fentanyl	1.6	3.0	2.1	1.4	0.0	1.0	0.9	0.0	0.8	0.6	0.0	0.5	1.4	2.0	1.6	39
altri oppioidi	1.5	3.0	2.0	5.6	10.0	6.9	0.9	0.0	0.8	0.6	1.3	0.8	1.5	2.6	1.8	44
cocaina	5.9	6.0	5.9	18.1	10.0	15.7	69.3	70.0	69.4	3.8	5.2	4.0	13.4	9.4	12.3	305
crack	1.8	3.2	2.2	4.2	3.3	3.9	5.7	5.0	5.6	0.6	0.0	0.5	2.1	2.6	2.2	55
altra forma di cocaina	1.6	3.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	1.2	2.0	1.4	35
anfetamine	2.1	3.4	2.5	2.8	0.0	2.0	4.2	2.5	4.0	0.9	2.6	1.3	2.7	3.2	2.8	70
metanfetamine	1.6	3.2	2.2	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.2	0.3	0.0	0.3	1.7	2.2	1.9	46
MDMA e affini (ecstasy)	1.8	3.4	2.3	0.0	0.0	0.0	1.4	2.5	1.6	1.3	2.6	1.5	2.0	3.8	2.5	61
catinoni sintetici	1.6	3.2	2.2	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.2	0.9	0.0	0.8	1.4	2.3	1.7	41
altri stimolanti	1.6	3.0	2.1	1.4	0.0	1.0	1.4	0.0	1.2	0.3	0.0	0.3	1.3	2.0	1.5	37
barbiturici	1.6	3.0	2.1	1.4	0.0	1.0	0.9	0.0	0.8	0.6	0.0	0.5	1.3	2.0	1.5	38
benzodiazepina	2.5	3.8	3.0	12.5	16.7	13.7	2.8	7.5	3.6	0.9	0.0	0.8	3.6	4.5	3.9	96
GHB/GBL	1.6	3.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.8	0.6	0.0	0.5	1.3	2.2	1.6	39
altri sonniferi e tranquillanti	1.6	3.0	2.1	0.0	3.3	1.0	0.5	0.0	0.4	0.6	0.0	0.5	1.2	2.2	1.5	37
LSD	2.0	3.0	2.3	1.4	0.0	1.0	1.4	0.0	1.2	0.6	1.3	0.8	2.0	2.3	2.1	51
ketamina	1.6	3.0	2.1	1.4	0.0	1.0	0.9	0.0	0.8	0.6	0.0	0.5	1.7	2.3	1.9	47
altri allucinogeni	1.6	3.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.8	0.6	0.0	0.5	1.3	2.0	1.5	38
sostanze volatili	1.6	3.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.8	0.6	0.0	0.5	1.3	2.0	1.5	37
canapa	6.6	5.8	6.3	19.4	10.0	16.7	14.6	15.0	14.7	73.1	81.8	74.8	20.7	15.3	19.2	476
tabacco	10.0	11.1	10.4	8.3	3.3	6.9	8.0	12.5	8.7	9.7	5.2	8.8	9.2	9.8	9.4	233
altra sostanza	1.6	3.0	2.1	1.4	6.7	2.9	0.9	0.0	0.8	0.6	0.0	0.5	1.8	2.6	2.1	51
gioco patologico	2.1	3.4	2.5	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.0	0.9	0.0	0.8	5.4	4.3	5.1	127
dipendenza al computer/Internet	2.1	3.0	2.4	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.2	1.3	0.0	1.0	5.0	3.2	4.5	112
disturbi alimentari	1.8	3.4	2.3	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.2	0.3	1.3	0.5	1.5	3.5	2.1	51
altro/i problema/i di dipendenza	1.8	2.8	2.1	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.8	0.6	0.0	0.5	2.0	2.9	2.2	55
nessuno	19.2	13.9	17.4	11.1	23.3	14.7	19.3	20.0	19.4	21.9	14.3	20.4	19.4	15.3	18.3	454
N**	912	469	1381	72	30	102	212	40	252	320	77	397	1790	693	2483	2483
<i>dati mancanti</i>	<i>701</i>	<i>362</i>	<i>1063</i>	<i>47</i>	<i>16</i>	<i>63</i>	<i>190</i>	<i>34</i>	<i>224</i>	<i>535</i>	<i>156</i>	<i>691</i>	<i>1774</i>	<i>778</i>	<i>2552</i>	<i>2552</i>

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T37 Frequenza delle ricadute e sostanza o comportamento implicato nel corso dell'intervento, in rapporto al problema principale¹ (solamente pazienti) (2021)

	Pazienti: problema principale ¹												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Frequenza delle ricadute*																
nessuna	55.9	39.1	50.6	26.3	75.0	34.8	31.8	60.0	34.7	64.2	55.0	62.4	54.1	43.0	51.2	348
1 volta	9.0	11.3	9.7	10.5	0.0	8.7	11.4	0.0	10.2	9.9	10.0	9.9	9.6	10.1	9.7	66
2 volte	5.5	6.8	5.9	15.8	0.0	13.0	11.4	0.0	10.2	3.7	10.0	5.0	6.6	7.3	6.8	46
3 o 4 volte	9.3	9.0	9.2	10.5	0.0	8.7	11.4	40.0	14.3	4.9	10.0	5.9	8.2	10.1	8.7	59
5 volte o più	20.3	33.8	24.6	36.8	25.0	34.8	34.1	0.0	30.6	17.3	15.0	16.8	21.6	29.6	23.7	161
N**	290	133	423	19	4	23	44	5	49	81	20	101	501	179	680	680
<i>dati mancanti</i>	1323	698	2021	100	42	142	358	69	427	774	213	987	3063	1292	4355	4355
Sostanza/comportamento comparabile a una dipendenza al momento delle ricadute***																
alcol	98.3	97.3	97.9	10.0	100.0	18.2	31.0	100.0	35.5	34.6	11.1	28.6	71.3	85.1	75.6	229
oppioidi	1.7	0.0	1.0	80.0	100.0	81.8	3.4	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	5.3	1.1	4.0	12
cocaina e derivati	8.4	4.1	6.7	20.0	100.0	27.3	86.2	50.0	83.9	7.7	0.0	5.7	20.1	5.3	15.5	47
altri stimolanti	2.5	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	2.9	2.9	1.1	2.3	7
ipnotici/sedativi	1.7	4.1	2.6	0.0	100.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	5.3	3.6	11
allucinogeni	0.8	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.7	2
sostanze volatili	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
canapa	9.2	5.4	7.8	30.0	0.0	27.3	27.6	0.0	25.8	80.8	100.0	85.7	23.9	14.9	21.1	64
tabacco	0.8	1.4	1.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	1.4	1.1	1.3	4
altra/e sostanza/e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
gioco patologico	0.0	1.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.1	2.6	8
dipendenza al computer/Internet	0.0	1.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.1	2.3	7
disturbi alimentari	0.0	1.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.7	2
altri problemi assimilabili a una dipendenza	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	1
N**	119	74	193	10	1	11	29	2	31	26	9	35	209	94	303	303
<i>dati mancanti</i>	9	7	16	4	0	4	1	0	1	3	0	3	21	8	29	29

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che hanno indicato una o più ricadute. Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

T38 Frequenza del consumo di tabacco e numero di sigarette al giorno nel corso dei 30 giorni precedenti l'uscita, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2021)

	Pazienti: problema principale ¹												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Frequenza del consumo di tabacco*																
mai	42.3	54.9	46.6	20.0	0.0	16.7	23.3	14.3	21.6	17.1	0.0	14.6	37.5	49.6	41.0	171
1 giorno alla settimana o meno	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	1
2 a 3 giorni alla settimana	2.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.1	1.7	0.0	1.2	5
4 a 6 giorni alla settimana	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.1	0.7	0.0	0.5	2
una volta al giorno	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	1
più volte al giorno	54.6	45.1	51.3	80.0	100.0	83.3	73.3	85.7	75.7	78.0	100.0	81.3	59.5	50.4	56.8	237
N**	196	102	298	5	1	6	30	7	37	41	7	48	296	121	417	417
<i>dati mancanti</i>	<i>1417</i>	<i>729</i>	<i>2146</i>	<i>114</i>	<i>45</i>	<i>159</i>	<i>372</i>	<i>67</i>	<i>439</i>	<i>814</i>	<i>226</i>	<i>1040</i>	<i>3268</i>	<i>1350</i>	<i>4618</i>	<i>4618</i>
Numero di sigarette al giorno***																
0 a 10 sigarette al giorno	23.5	16.0	21.8	33.3	0.0	25.0	23.5	50.0	28.6	34.5	40.0	35.3	26.6	22.2	25.7	46
11 a 20 sigarette al giorno	55.3	56.0	55.5	0.0	100.0	25.0	52.9	50.0	52.4	48.3	40.0	47.1	52.4	55.6	53.1	95
21 a 30 sigarette al giorno	18.8	20.0	19.1	33.3	0.0	25.0	11.8	0.0	9.5	13.8	20.0	14.7	16.8	16.7	16.8	30
31 sigarette al giorno o più	2.4	8.0	3.6	33.3	0.0	25.0	11.8	0.0	9.5	3.4	0.0	2.9	4.2	5.6	4.5	8
N**	85	25	110	3	1	4	17	4	21	29	5	34	143	36	179	179
<i>dati mancanti</i>	<i>28</i>	<i>21</i>	<i>49</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>6</i>	<i>2</i>	<i>8</i>	<i>5</i>	<i>2</i>	<i>7</i>	<i>42</i>	<i>25</i>	<i>67</i>	<i>67</i>

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che hanno indicato un consumo di tabacco. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T39 Obiettivo di consumo all'uscita e pronostico, in rapporto alla principale sostanza problematica¹ (solamente pazienti) (2021)

	Pazienti: sostanza problematica ¹												Tutti i pazienti			N
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Obiettivo di consumo*																
astinenza definitiva	32.5	37.3	34.1	80.0	57.1	74.1	63.9	83.3	66.7	40.5	18.5	36.7	39.2	38.0	38.9	394
astinenza limitata nel tempo	12.6	11.8	12.3	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	4.8	3.8	0.0	3.2	8.8	9.1	8.9	90
consumo controllato	40.9	39.7	40.5	0.0	14.3	3.7	16.7	8.3	15.5	29.0	44.4	31.6	34.7	37.7	35.5	360
nessuna limitazione nel consumo prevista	2.0	2.0	2.0	10.0	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	10.7	18.5	12.0	3.7	3.6	3.7	37
nessuna decisione per il momento	11.1	9.3	10.5	10.0	28.6	14.8	9.7	8.3	9.5	13.0	18.5	13.9	11.8	11.2	11.6	118
altro	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	3.6	3.1	0.0	2.5	1.8	0.4	1.4	14
N**	406	204	610	20	7	27	72	12	84	131	27	158	737	276	1013	1013
<i>dati mancanti</i>	1207	627	1834	99	39	138	330	62	392	724	206	930	2827	1195	4022	4022
Pronostico*																
pronostico molto positivo	16.3	13.2	15.2	11.1	0.0	7.7	10.6	10.0	10.5	21.2	0.0	17.7	15.8	11.4	14.5	81
pronostico positivo	47.4	44.1	46.3	22.2	25.0	23.1	40.4	40.0	40.4	50.0	40.0	48.4	46.4	44.6	45.9	256
pronostico piuttosto sfavorevole	25.1	31.6	27.4	55.6	25.0	46.2	46.8	40.0	45.6	23.1	40.0	25.8	28.8	31.3	29.6	165
pronostico negativo	11.2	11.0	11.1	11.1	50.0	23.1	2.1	10.0	3.5	5.8	20.0	8.1	8.9	12.7	10.0	56
N**	251	136	387	9	4	13	47	10	57	52	10	62	392	166	558	558
<i>dati mancanti</i>	1362	695	2057	110	42	152	355	64	419	803	223	1026	3172	1305	4477	4477

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto