

Intervento ambulatoriale nelle problematiche di dipendenza

Risultati dell'indagine presso gli utenti 2005

Raccolta di tabelle statistiche

Mariana Astudillo, Etienne Maffli

Ringraziamenti

Ringraziamo vivamente sia i collaboratori e le collaboratrici che i pazienti delle istituzioni che hanno partecipato e che hanno gentilmente accettato di riempire i questionari del monitoraggio *act-info*. Ringraziamo ugualmente i collaboratori e le collaboratrici dei servizi di consultazione che hanno effettuato i lavori di logistica e di registrazione dei dati. I nostri migliori ringraziamenti vanno anche all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) che finanzia e coordina l'insieme della rete *act-info*, in particolare alle persone responsabili di questo progetto. Grazie anche a Edith Bacher per la grafica e l'impaginazione di questo rapporto e a Marina Delgrande Jordan per la sua preziosa collaborazione nell'elaborazione delle procedure d'analisi.

Complementi d'informazione: Etienne Maffli, tel. 021 321 29 54, fax 021 321 29 40,
e-mail emmafli@sfa-ispa.ch

Realizzazione: Mariana Astudillo & Etienne Maffli, Istituto svizzero di
prevenzione dell'alcolismo
e altre tossicomanie (ISPA)

Diffusione: Libreria ISPA, casella postale 870, 1001 Losanna,
tel. 021 321 29 35, fax 021 321 29 40,
e-mail librairie@sfa-ispa.ch

Prezzo: Fr. 10.–

Lingua del testo originale : francese

Grafica/impaginazione: ISPA

Copyright: © ISPA-SFA Losanna 2007

Indice

act-info – Information network on addiction care and therapy in Switzerland

act-info nel settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale nel campo delle dipendenze

ENTRATA

- T1 Sesso e età dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2005)
- T2 Stato civile e nazionalità dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2005)
- T3 Grado di urbanizzazione del domicilio, tipo di nucleo familiare e situazione di domicilio dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2005)
- T4 Tipo di relazione di coppia, numero di figli, di figli vivendo nel nucleo familiare dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2005)
- T5 Più alta formazione portata a termine e statuto professionale dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2005)
- T6 Fonte di reddito principale e attività dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2005)
- T7 Reddito mensile netto e debiti dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2005)
- T8 Incarcerazione o detenzione preventiva prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2005)
- T9 Istanza d'invio principale e secondaria dei pazienti (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2005)
- T10 Tipo di aiuto atteso dai pazienti (in rapporto al problema principale) e dai parenti o conoscenti all'entrata e base legale dell'intervento (2005)
- T11 Trattamenti/accompagnamenti dei pazienti prima dell'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2005)
- T12 Trattamento sostitutivo e altri interventi all'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2005)
- T13a Entrata in seguito a una cura di disintossicazione, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2005)
- T13b Frequenza delle cure di disintossicazione senza aiuto professionale prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2005)
- T14 Problema principale all'entrata (solamente pazienti) (2005)

-
- T15.1a Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso dei 30 ultimi giorni e dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata (2005), uomini
- T15.1b Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso dei 30 ultimi giorni e dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata (2005), uomini
- T15.2a Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso dei 30 ultimi giorni e dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata (2005), donne
- T15.2b Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso dei 30 ultimi giorni e dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata (2005), donne
- T15.3a Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso dei 30 ultimi giorni e dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata (2005), uomini e donne
- T15.3b Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso dei 30 ultimi giorni e dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata (2005), uomini e donne
- T16.1a Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2005), uomini
- T16.1b Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2005), donne
- T16.1c Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2005), uomini e donne
- T16.2a Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2005), uomini
- T16.2b Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2005), donne
- T16.2c Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2005), uomini e donne
- T17 Modo di amministrazione della principale sostanza problematica nel corso dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata (2005)
- T18 Prevalenza delle iniezioni a vita, nel corso dei 30 ultimi giorni e dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata, scambio di materiale d'iniezione nel corso dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata e età all'epoca della prima iniezione, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2005)
- T19.1a Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2005), uomini
- T19.1b Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2005), donne
- T19.1c Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2005), uomini e donne
- T19.2a Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2005), uomini

-
- T19.2b Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2005), donne
- T19.2c Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2005), uomini e donne
- T20 Frequenza del consumo di alcol, numero di "bicchieri standard" al giorno e frequenza di forti consumi di alcol prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2005)
- T21 Frequenza del consumo di tabacco e numero di sigarette al giorno nel corso dei 30 ultimi giorni prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2005)
- T22a Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2005), uomini
- T22b Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2005), donne
- T22c Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2005), uomini e donne

USCITA

- T23 Sesso e età dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2005)
- T24 Stato civile e grado di urbanizzazione del domicilio dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2005)
- T25 Tipo di nucleo familiare, situazione di domicilio e tipo di relazione di coppia dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2005)
- T26 Più alta formazione portata a termine, fonte di reddito principale e attività principale dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2005)
- T27 Statuto professionale e reddito mensile netto dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2005)
- T28a Ragione principale della fine del trattamento/accompagnamento dei pazienti (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2005)
- T28b Destinazione dei trasferimenti dei pazienti (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2005)
- T28c Causa di decesso dei pazienti (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2005)
- T29 Durata dell'intervento sui pazienti (in rapporto al problema principale) e sui parenti o conoscenti (2005)
- T30 Trattamento sostitutivo durante e immediatamente dopo l'intervento, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2005)
- T31 Postassistenza prevista e preparata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2005)

-
- T32 Problemi di dipendenza all'uscita, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2005)
- T33 Frequenza delle ricadute, sostanza o comportamento implicato e durata delle ricadute nel corso dell'intervento, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2005)
- T34 Frequenza del consumo di tabacco e numero di sigarette al giorno nel corso dei 30 ultimi giorni precedenti l'uscita, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2005)
- T35 Obiettivo di consumo all'uscita e pronostico, in rapporto alla principale sostanza problematica (solamente pazienti) (2005)

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland

La Rete di monitoraggio degli interventi e dei trattamenti delle dipendenze in Svizzera (*act-info*) raccoglie nel suo seno i 5 sistemi statistici che erano realizzati in materia di intervento e di trattamento della dipendenza in Svizzera. Tali sistemi sono:

- SAMBAD (Statistica del settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale in materia di dipendenza)
- Residalc (Statistica dei trattamenti residenziali della dipendenza all'alcol in Svizzera)
- FOS (Statistica della Lega per la valutazione dei trattamenti residenziali della tossicomania)
- HegeBe (Statistica dei trattamenti con prescrizione di eroina)
- Metadone (Statistica nazionale dei trattamenti con prescrizione di metadone)

Queste cinque statistiche, realizzate separatamente fino alla fine 2003, dispongono ormai di strumenti armonizzati e ottimizzati che permettono di costituire una banca dati nazionale e di ottenere dei risultati comparabili sia al livello nazionale che internazionale.

act-info è finanziato e coordinato dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e l'analisi e la raccolta dei dati nei differenti campi dell'intervento è affidata all'Istituto di medicina sociale e preventiva dell'Università di Berna (ISPM), all'Istituto svizzero di prevenzione dell'alcolismo e altre tossicomanie a Losanna (ISPA) e all'Istituto di ricerca sulla salute pubblica e sulle dipendenze affiliato all'Università di Zurigo (ISGF).

act-info nel settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale in materia di dipendenza (SAMBAD)

Gli strumenti di monitoraggio *act-info* sono stati introdotti a partire dal 2004 nel settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale in materia di dipendenza e sostituiscono i vecchi questionari in vigore dal 1994. La realizzazione di *act-info* in questo settore è affidata all'Istituto svizzero di prevenzione dell'alcolismo e altre tossicomanie (ISPA).

La statistica *act-info* SAMBAD dà una visione dell'utenza e delle attività di aiuto ambulatoriale in materia di dipendenza in Svizzera. I dati sono raccolti all'inizio e alla fine dell'intervento. Le informazioni rilevate al momento dell'entrata permettono di valutare particolarmente le caratteristiche socio-demografiche degli utenti, la eventuale presenza di trattamenti precedenti, le modalità di consumo e la presenza di problemi psicosociali precedenti l'intervento. Le informazioni finali rilevate al termine dell'intervento evidenziano particolarmente le caratteristiche socio-demografiche dell'utenza in quel preciso momento, le misure prese dalle persone curanti durante la presa in carico e le circostanze della fine di quest'ultima.

Nel 2005, 49 istituzioni del settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale in materia di dipendenza hanno partecipato al monitoraggio *act-info*; la maggior parte di queste ha già utilizzato i nuovi strumenti. Queste istituzioni sono sia servizi deputati alla consultazione specialistica dei problemi inerenti all'alcol e/o alle droghe illegali, sia servizi polivalenti offrenti ugualmente un'aiuto per i problemi di dipendenza. Il profilo dettagliato delle istituzioni del settore ambulatoriale è oggetto di un'altro rapporto annuale basato su un'indagine realizzata all'inizio dell'anno presso tutti i servizi interessati.

Qualche spiegazione riguardo alle tabelle

La presente statistica descrittiva dei dati dell'indagine *act-info* presso gli utenti del settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale in materia di dipendenza si basa su due tipi di tabelle:

- quando la domanda contiene delle categorie di risposte predefinite o ricodificate in parti distinte (per esempio « stato civile » o « età »), la tabella indica le percentuali delle differenti categorie di risposte
- quando la domanda non contiene delle categorie predefinite, ma richiede un valore numerico (per esempio « età all'inizio del consumo problematico »), la tabella presenta dei parametri di posizione (media, mediana) e dei parametri di dispersione (deviazione standard, 1° quartile, 3° quartile)

La maggior parte delle tabelle presenta i risultati in maniera distinta per i sottogruppi di pazienti che hanno menzionato l'**alcol**, un **oppiaceo** (eroina particolarmente), la **cocaina** (e derivati) o la **canapa** come problema principale al momento dell'entrata. I **parenti o conoscenti** che consultano per i problemi di un terzo sono ugualmente oggetto di analisi separate per gli aspetti socio-demografici. Invece, gli utenti (poco numerosi) che hanno menzionato altre sostanze come problema principale (per esempio un stimolante o le sostanze volatili) o un problema di dipendenza non inerente a una sostanza (per esempio gioco patologico), non sono differenziati nei risultati (eccetto nei temi direttamente inerenti ai modi di consumo o alle forme di comportamenti additivi non inerenti alle sostanze). Queste persone sono tuttavia incluse nelle analisi relative all'insieme degli interventi che figurano nei blocchi a destra delle tabelle rispettive. Tutte le analisi sono effettuate separatamente per gli uomini, per le donne e per i sessi riuniti (le colonne « Totale » comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è conosciuto).

Solo le risposte valide sono considerate nelle analisi. Cioè, le risposte « non noto » e le informazioni mancanti (*missings*) sono escluse dalle analisi. Il numero di risposte valide **N** rappresenta il numero esatto di casi sui quali sono calcolati le percentuali o altri parametri; esso viene indicato per ogni gruppo o sottogruppo. In basso alla tabella viene anche indicato il numero corrispondente di dati mancanti. La presenza di numerosi dati mancanti costringe a interpretare i risultati con particolare prudenza.

Le note in basso alla tabella danno informazioni sulle eventuali particolarità dei gruppi di riferimento e sul tipo di domanda. Quando sono possibili più risposte a una stessa domanda (per esempio nelle tabelle del tema T19, « altri problemi di dipendenza ») le percentuali ottenute non si possono addizionare.

T1 Sesso e età dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2005)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Sesso*																			
uomini			71.6			76.3			72.9			81.4			20.2			63.6	2'469
donne			28.4			23.7			27.1			18.6			79.8			36.4	1'415
nesso non noto			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	0
N**	1'484	590	2'074	283	88	371	132	49	181	258	59	317	134	531	665	2'469	1'415	3'884	3'884
Età (in anni)*																			
fino a 14	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	1.7	5.7	0.8	0.6	0.6	0.9	0.7	0.8	31
15-19	1.4	1.5	1.4	1.4	12.6	4.1	8.3	19.1	11.2	52.2	59.3	53.5	3.9	2.7	3.0	7.8	6.2	7.3	277
20-24	4.0	2.6	3.6	17.2	25.3	19.1	25.0	29.8	26.3	20.8	13.6	19.4	4.7	5.9	5.6	9.0	7.1	8.3	316
25-29	6.5	5.0	6.1	16.5	21.8	17.8	18.2	10.6	16.2	7.5	3.4	6.7	11.8	6.3	7.4	9.0	6.8	8.2	312
30-34	9.6	7.6	9.0	23.7	17.2	22.1	19.7	17.0	19.0	8.6	5.1	8.0	6.3	10.5	9.7	11.8	9.7	11.0	420
35-39	14.5	12.9	14.1	24.0	14.9	21.9	15.9	8.5	14.0	2.7	10.2	4.1	12.6	11.5	11.7	14.2	12.4	13.6	518
40-44	17.0	17.2	17.0	11.5	3.4	9.6	6.8	14.9	8.9	1.2	3.4	1.6	12.6	18.2	17.1	14.0	15.7	14.6	557
45-49	16.4	15.1	16.0	4.3	3.4	4.1	6.1	0.0	4.5	0.4	3.4	1.0	15.0	15.2	15.2	12.1	13.0	12.4	474
50-54	12.5	16.2	13.6	1.1	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	10.9	11.0	8.8	11.5	9.8	373
55-59	9.1	10.0	9.3	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	6.6	6.4	6.2	7.2	6.5	249
60-64	4.8	7.4	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	5.9	5.8	3.3	5.7	4.2	160
65-69	2.7	3.4	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	3.1	3.8	1.9	2.7	2.2	84
70-74	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	2.0	1.9	0.7	1.2	0.9	35
75 e più	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.6	0.9	0.4	0.2	0.3	12
N**	1'467	582	2'049	279	87	366	132	47	179	255	59	314	127	512	639	2'434	1'384	3'818	3'818
<i>dati mancanti</i>	17	8	25	4	1	5	0	2	2	3	0	3	7	19	26	35	31	66	66
Età																			
media	44.1	45.8	44.6	33.1	28.4	32.0	30.1	27.9	29.5	21.1	22.6	21.4	43.9	43.5	43.6	39.1	41.8	40.1	
deviazione standard	11.7	11.5	11.7	7.4	7.7	7.7	8.2	8.6	8.3	6.3	9.3	7.0	15.1	12.9	13.4	13.3	13.5	13.5	
1° quartile	36.0	38.5	36.6	27.0	21.5	25.7	23.2	20.5	22.9	16.9	16.2	16.8	33.0	34.7	34.7	29.0	32.3	30.0	
mediana	44.0	45.6	44.5	33.6	27.5	31.9	29.8	25.0	28.1	18.7	18.0	18.7	43.7	43.7	43.7	39.0	42.4	40.1	
3° quartile	51.9	53.7	52.5	38.0	34.8	37.0	35.83	34.0	35.5	23.8	26.0	23.9	52.4	51.7	51.8	48.3	51.2	49.4	
N**	1'467	582	2'049	279	87	366	132	47	179	255	59	314	127	512	639	2'434	1'384	3'818	
<i>dati mancanti</i>	17	8	25	4	1	5	0	2	2	3	0	3	7	19	26	35	31	66	

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T2 Stato civile e nazionalità dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2005)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Stato civile*																			
celibe/nubile	35.7	26.3	33.0	72.9	61.9	70.3	74.4	73.2	74.1	94.6	81.8	92.5	29.0	22.0	23.4	48.5	31.1	42.1	1'517
sposato-a	34.6	32.1	33.9	12.6	11.9	12.5	16.0	7.3	13.9	3.2	6.8	3.8	51.6	56.3	55.4	28.5	37.9	32.0	1'151
separato-a	6.7	6.8	6.7	2.6	3.6	2.8	1.6	2.4	1.8	0.5	0.0	0.4	4.8	4.0	4.2	5.2	5.0	5.1	184
divorziato-a	20.9	28.9	23.2	11.2	21.4	13.6	7.2	14.6	9.0	1.8	11.4	3.4	12.1	15.6	14.9	16.3	22.2	18.4	664
vedovo-a	1.9	5.9	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.8	1.8	1.3	3.6	2.1	76
unione registrata	0.2	0.0	0.2	0.7	1.2	0.8	0.8	2.4	1.2	0.0	0.0	0.0	0.8	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	10
N**	1'405	560	1'965	269	84	353	125	41	166	222	44	266	124	499	623	2'288	1'314	3'602	3'602
<i>dati mancanti</i>	79	30	109	14	4	18	7	8	15	36	15	51	10	32	42	181	101	282	282
Nazionalità*																			
CH	73.0	84.4	76.3	70.3	80.9	72.6	72.0	83.9	74.6	81.9	93.3	83.6	82.9	74.2	76.0	73.1	79.3	75.3	2'270
EU	13.4	10.2	12.5	16.3	10.3	15.0	16.8	16.1	16.7	9.6	3.3	8.7	9.4	13.7	12.8	14.0	12.0	13.2	399
altra	13.5	5.4	11.2	13.4	8.8	12.4	11.2	0.0	8.7	8.5	3.3	7.7	7.7	12.1	11.2	13.0	8.7	11.4	344
N**	1'138	462	1'600	246	68	314	107	31	138	177	30	207	117	454	571	1'911	1'102	3'013	3'013
<i>dati mancanti</i>	346	128	474	37	20	57	25	18	43	81	29	110	17	77	94	558	313	871	871

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T3 Grado di urbanizzazione del domicilio, tipo di nucleo familiare e situazione di domicilio dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2005)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			N
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Grado di urbanizzazione*																			
grandi centri urbani	17.6	18.9	18.0	0.0	1.4	0.4	2.9	9.7	4.4	0.0	2.0	0.4	17.1	16.5	16.6	12.0	15.0	13.2	401
periferia dei grandi centri	18.9	19.1	19.0	7.0	7.2	7.1	7.6	0.0	5.9	4.8	0.0	3.9	23.4	17.6	18.8	15.0	15.7	15.3	465
città di media importanza	9.9	6.9	9.1	28.6	27.5	28.4	19.0	25.8	20.6	16.4	2.0	13.7	13.5	12.3	12.5	13.5	10.8	12.5	381
piccole città	29.1	31.7	29.9	42.7	36.2	41.1	40.0	45.2	41.2	39.1	40.8	39.5	23.4	28.3	27.4	33.0	32.4	32.8	999
campagne	24.4	23.3	24.1	21.6	27.5	23.0	30.5	19.4	27.9	39.6	55.1	42.6	22.5	25.2	24.7	26.5	26.0	26.3	802
N**	1'168	476	1'644	213	69	282	105	31	136	207	49	256	111	448	559	1'905	1'143	3'048	3'048
<i>dati mancanti</i>	316	114	430	70	19	89	27	18	45	51	10	61	23	83	106	564	272	836	836
Tipo di nucleo familiare (30 ultimi giorni)*																			
da solo-a	39.7	33.2	37.9	34.9	17.5	30.8	30.8	20.5	28.0	15.0	10.9	14.2	22.2	12.1	14.0	34.3	22.1	29.8	953
con i genitori/un genitore	7.2	3.7	6.2	18.8	16.3	18.2	19.2	13.6	17.7	57.5	49.1	55.9	5.1	5.6	5.5	16.4	8.6	13.6	434
con figlio-a-i (senza partner)	1.2	12.1	4.3	0.4	8.8	2.3	0.0	13.6	3.7	0.0	5.5	1.0	5.1	13.1	11.6	1.1	12.6	5.3	168
con un-a partner (senza figli)	23.3	29.1	25.0	16.1	31.3	19.6	15.8	20.5	17.1	3.3	9.1	4.4	30.3	23.8	25.0	19.5	25.7	21.8	695
con un-a partner e figlio-a-i	21.0	15.9	19.5	11.9	8.8	11.1	12.5	9.1	11.6	3.3	7.3	4.1	33.3	42.5	40.8	17.7	24.2	20.0	640
con altri parenti/familiari	1.4	1.3	1.3	3.1	6.3	3.8	5.0	4.5	4.9	5.8	5.5	5.8	3.0	1.2	1.5	2.5	1.8	2.3	72
con amici (comunità abitativa)	1.4	1.7	1.5	3.1	3.8	3.2	4.2	2.3	3.7	4.2	7.3	4.7	1.0	0.9	0.9	2.1	1.7	1.9	62
altro	4.9	3.0	4.3	11.9	7.5	10.9	12.5	15.9	13.4	10.8	5.5	9.8	0.0	0.7	0.6	6.5	3.2	5.3	169
N**	1'174	464	1'638	261	80	341	120	44	164	240	55	295	99	428	527	2'035	1'158	3'193	3'193
<i>dati mancanti</i>	310	126	436	22	8	30	12	5	17	18	4	22	35	103	138	434	257	691	691
Situazione di domicilio (30 ultimi giorni)*																			
domicilio fisso	93.9	94.9	94.2	84.2	87.2	84.8	83.1	82.6	82.9	92.9	89.3	92.3	99.0	99.1	99.1	92.2	95.4	93.4	3'063
senza domicilio fisso	2.4	2.3	2.4	7.5	6.4	7.3	8.1	4.3	7.1	1.2	7.1	2.4	1.0	0.4	0.5	3.1	2.2	2.8	91
istituzione	3.7	2.7	3.5	8.3	6.4	7.9	8.9	13.0	10.0	5.8	3.6	5.4	0.0	0.4	0.4	4.7	2.4	3.9	127
N**	1'207	474	1'681	265	78	343	124	46	170	241	56	297	103	454	557	2'090	1'191	3'281	3'281
<i>dati mancanti</i>	277	116	393	18	10	28	8	3	11	17	3	20	31	77	108	379	224	603	603

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T4 Tipo di relazione di coppia, numero di figli, di figli vivendo nel nucleo familiare dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2005)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Tipo di relazione di coppia*																			
senza partner, sola-a	34.1	32.6	33.7	47.8	12.5	39.4	47.8	20.7	41.3	68.1	45.5	65.0	6.4	13.9	12.4	38.9	23.5	33.3	751
relazione-i saltuaria-e	4.0	8.9	5.4	7.8	12.5	8.9	7.6	10.3	8.3	10.6	13.6	11.0	3.8	2.2	2.5	5.6	6.8	6.0	136
relazione fissa, vivendo separato-a	14.9	12.5	14.2	15.1	31.3	19.0	7.6	31.0	13.2	13.5	27.3	15.3	20.5	14.9	16.0	14.7	16.3	15.3	344
relazione fissa, vivendo insieme	46.9	46.0	46.7	29.3	43.8	32.7	37.0	37.9	37.2	7.8	13.6	8.6	69.2	69.0	69.0	40.9	53.4	45.4	1'022
N**	844	337	1'181	205	64	269	92	29	121	141	22	163	78	316	394	1'444	809	2'253	2'253
<i>dati mancanti</i>	640	253	893	78	24	102	40	20	60	117	37	154	56	215	271	1'025	606	1'631	1'631
Numero di figli*																			
nessuno	44.9	37.4	42.7	69.0	62.5	67.4	75.2	59.4	71.6	90.4	80.0	88.7	36.5	29.5	30.8	54.5	38.5	48.7	1'341
1 figlio	17.9	20.0	18.5	17.7	19.4	18.1	12.8	25.0	15.6	6.8	11.4	7.5	11.8	16.2	15.4	16.1	18.1	16.8	464
2 figli	23.9	30.0	25.7	10.2	12.5	10.7	8.3	6.3	7.8	2.8	5.7	3.3	42.4	33.9	35.5	20.0	28.7	23.1	638
3 figli o più	13.3	12.6	13.1	3.1	5.6	3.7	3.7	9.4	5.0	0.0	2.9	0.5	9.4	20.4	18.4	9.5	14.6	11.4	313
N**	1'045	420	1'465	226	72	298	109	32	141	177	35	212	85	383	468	1'752	1'004	2'756	2'756
<i>dati mancanti</i>	439	170	609	57	16	73	23	17	40	81	24	105	49	148	197	717	411	1'128	1'128
Numero dei figli vivendo nel nucleo familiare*																			
nessuno	74.3	66.3	71.9	83.3	69.0	80.0	81.6	84.2	82.1	77.3	66.7	75.6	63.1	46.1	48.9	75.9	58.8	69.4	1'504
1 figlio	10.2	16.0	12.0	10.4	20.7	12.8	5.7	10.5	6.6	6.1	16.7	7.7	12.3	20.0	18.7	9.6	17.6	12.6	273
2 figli	10.1	14.0	11.3	5.2	8.6	6.0	9.2	5.3	8.5	11.4	8.3	10.9	21.5	25.2	24.6	10.2	17.8	13.1	283
3 figli o più	5.3	3.8	4.9	1.0	1.7	1.2	3.4	0.0	2.8	5.3	8.3	5.8	3.1	8.8	7.8	4.4	5.8	4.9	106
N**	810	344	1'154	192	58	250	87	19	106	132	24	156	65	330	395	1'350	816	2'166	2'166
<i>dati mancanti</i>	674	246	920	91	30	121	45	30	75	126	35	161	69	201	270	1'119	599	1'718	1'718

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T5 Più alta formazione portata a termine e statuto professionale dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2005)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Più alta formazione portata a termine*																			
nessuna formazione terminata	3.6	5.7	4.2	4.3	9.6	5.5	4.2	2.5	3.8	18.6	13.5	17.8	2.5	5.4	4.8	5.3	6.0	5.6	158
scuola dell'obbligo	15.2	20.4	16.6	26.1	37.0	28.5	32.8	37.5	34.0	49.5	48.6	49.4	12.3	24.4	22.0	22.5	26.1	23.7	673
scolarità complementare	4.1	8.6	5.3	9.3	9.6	9.4	2.5	12.5	5.0	2.4	5.4	2.8	2.5	6.6	5.8	4.9	8.3	6.1	172
apprendistato/ scuola profes.	60.8	50.0	57.9	54.5	34.2	50.0	52.1	42.5	49.7	25.7	21.6	25.1	44.4	43.1	43.3	53.7	43.6	50.3	1'427
liceo/diploma	4.1	5.9	4.6	1.6	6.8	2.7	2.5	0.0	1.9	2.4	8.1	3.2	1.2	4.8	4.1	3.3	5.4	4.0	114
magistrale, scuola pedagogica	0.5	2.2	0.9	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	2.1	1.9	0.4	1.8	0.8	24
form. profession. superiore	5.3	4.2	5.0	1.2	1.4	1.2	4.2	2.5	3.8	1.0	0.0	0.8	12.3	6.3	7.5	4.4	4.3	4.3	123
scuola profession. superiore	1.4	0.5	1.1	0.8	1.4	0.9	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	4.9	1.8	2.4	1.2	0.9	1.1	32
alta scuola specializzata	0.9	0.7	0.9	0.4	0.0	0.3	0.8	0.0	0.6	0.5	2.7	0.8	6.2	1.5	2.4	1.0	1.0	1.0	28
università, politecnico	4.1	1.7	3.5	1.6	0.0	1.2	0.0	2.5	0.6	0.0	0.0	0.0	12.3	3.9	5.6	3.3	2.4	3.0	85
N**	1'085	406	1'491	257	73	330	119	40	159	210	37	247	81	332	413	1'876	960	2'836	2'836
<i>dati mancanti</i>	399	184	583	26	15	41	13	9	22	48	22	70	53	199	252	593	455	1'048	1'048
Statuto professionale*																			
senza attività professionale	30.9	46.2	35.2	60.4	65.5	61.5	41.4	72.7	47.7	25.7	15.4	24.2	18.0	21.8	21.1	33.8	37.8	35.2	767
apprendista, praticante	1.3	0.6	1.1	1.0	7.3	2.4	6.9	0.0	5.5	25.7	30.8	26.4	1.6	2.5	2.4	4.3	2.9	3.8	83
manovale, operaio-a ausiliare	2.4	5.4	3.2	4.1	3.6	4.0	6.9	0.0	5.5	2.0	0.0	1.7	0.0	3.6	3.0	3.0	4.1	3.4	74
operaio-a con formaz. pratica	8.4	7.6	8.2	8.1	3.6	7.1	10.3	0.0	8.3	2.0	0.0	1.7	4.9	10.5	9.5	7.8	7.9	7.8	171
oper. con formaz. certif. (AFC)	14.5	6.0	12.1	10.7	1.8	8.7	11.5	4.5	10.1	2.0	7.7	2.8	9.8	5.5	6.3	12.2	5.7	10.0	218
caposquadra	2.6	0.3	2.0	1.5	0.0	1.2	3.4	0.0	2.8	0.7	0.0	0.6	3.3	0.7	1.2	2.2	0.4	1.6	35
impiegato-a non qualificato-a	13.8	19.3	15.4	6.1	3.6	5.6	3.4	0.0	2.8	6.6	0.0	5.6	14.8	25.1	23.2	12.2	19.4	14.7	320
impieg. qualif., quadro medio	10.8	5.4	9.3	3.0	3.6	3.2	5.7	9.1	6.4	1.3	3.8	1.7	23.0	9.5	11.9	8.5	6.8	7.9	172
imp. funz. dirett., quadr. sup.	2.8	0.9	2.3	1.5	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	3.6	6.3	2.7	2.0	2.5	54
indipendente	10.5	5.7	9.2	2.0	0.0	1.6	4.6	0.0	3.7	0.7	0.0	0.6	6.6	11.3	10.4	7.5	6.8	7.2	158
scolaro-a, studente	0.7	0.9	0.8	0.0	9.1	2.0	4.6	9.1	5.5	33.6	42.3	34.8	0.0	3.3	2.7	4.6	4.1	4.4	97
altro statuto	1.3	1.5	1.4	1.5	1.8	1.6	1.1	4.5	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.1	1.1	2.0	1.4	31
N**	846	331	1'177	197	55	252	87	22	109	152	26	178	61	275	336	1'431	749	2'180	2'180
<i>dati mancanti</i>	638	259	897	86	33	119	45	27	72	106	33	139	73	256	329	1'038	666	1'704	1'704

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T6 Fonte di reddito principale e attività dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2005)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Fonte di reddito principale (nel corso dei 30 ultimi giorni)*																			
reddito da lavoro	51.6	32.9	46.5	29.8	29.2	29.7	45.9	22.2	40.8	31.5	33.3	31.8	77.8	55.1	59.2	48.4	41.1	45.8	1'350
risparmi	1.5	0.7	1.3	1.0	0.0	0.7	1.0	0.0	0.8	0.5	0.0	0.5	0.0	1.2	1.0	1.2	0.8	1.0	30
rendita (AVS/AI, ecc.)	16.6	23.5	18.5	14.9	16.9	15.4	12.2	25.9	15.2	8.2	5.6	7.7	15.6	10.8	11.6	15.1	17.6	15.9	470
assistenz./previdenza sociale	13.9	12.5	13.5	30.3	33.8	31.1	21.4	11.1	19.2	6.0	5.6	5.9	1.1	2.7	2.4	14.4	9.6	12.7	373
assicurazione disoccupazione	11.9	9.4	11.2	14.9	7.7	13.2	7.1	18.5	9.6	7.1	5.6	6.8	2.2	2.0	2.0	11.0	6.2	9.3	274
sostegno del/della partner	1.2	17.7	5.7	1.0	6.2	2.2	0.0	7.4	1.6	0.0	2.8	0.5	0.0	24.5	20.1	0.8	18.7	7.2	213
sosteg. genitori/familiari/amici	2.0	2.7	2.2	4.3	3.1	4.0	7.1	14.8	8.8	45.1	47.2	45.5	2.2	3.4	3.2	7.3	5.6	6.7	198
spacciando/tagliando	0.2	0.2	0.2	0.0	1.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	5
altre entrate illegali	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1
prostituzione	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
altra-e	1.1	0.4	0.9	3.8	1.5	3.3	4.1	0.0	3.2	1.1	0.0	0.9	1.1	0.2	0.4	1.5	0.4	1.1	33
N**	1'191	447	1'638	208	65	273	98	27	125	184	36	220	90	408	498	1'893	1'054	2'947	2'947
<i>dati mancanti</i>	293	143	436	75	23	98	34	22	56	74	23	97	44	123	167	576	361	937	937
Attività principale (nel corso dei 30 ultimi giorni)*																			
att. a tempo pieno (70% o più)	46.5	21.2	39.7	26.7	16.7	24.5	39.2	15.6	32.7	22.4	14.0	21.0	69.8	31.5	38.6	42.1	24.0	35.9	1'092
attività a tempo parziale	4.1	18.9	8.1	4.7	8.3	5.5	5.8	11.1	7.3	1.8	11.6	3.4	3.5	32.0	26.6	4.0	22.1	10.2	310
varie attività occas.	1.9	1.2	1.7	4.7	2.8	4.3	2.5	2.2	2.4	3.7	0.0	3.1	0.0	1.3	1.1	2.6	1.2	2.1	65
in formazione	1.2	1.6	1.3	0.8	12.5	3.4	7.5	2.2	6.1	42.9	48.8	43.9	3.5	5.6	5.2	6.5	6.4	6.5	197
inattivo sul mercat. del lavoro	20.2	37.2	24.7	26.7	30.6	27.5	20.0	33.3	23.6	12.8	7.0	11.8	17.4	25.8	24.2	20.2	31.3	24.0	730
disoccup., ricerc. di un lavoro	23.0	17.6	21.6	31.4	23.6	29.7	20.8	33.3	24.2	14.6	16.3	14.9	4.7	2.7	3.1	21.6	12.9	18.6	566
disoccup., lav. futuro garantito	0.4	0.5	0.4	0.0	2.8	0.6	0.0	2.2	0.6	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.4	11
altra	2.8	1.8	2.5	5.1	2.8	4.6	4.2	0.0	3.0	1.4	2.3	1.5	1.2	1.1	1.1	2.8	1.5	2.4	72
N**	1'181	433	1'614	255	72	327	120	45	165	219	43	262	86	372	458	1'998	1'045	3'043	3'043
<i>dati mancanti</i>	303	157	460	28	16	44	12	4	16	39	16	55	48	159	207	471	370	841	841

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T7 Reddito mensile netto e debiti dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2005)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			N
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Reddito mensile netto (6 ultimi mesi)*																			
nessun reddito	24.1	30.2	25.7	28.9	31.6	29.5	20.8	26.7	22.1	46.1	46.4	46.2	14.3	25.7	23.8	27.7	30.7	28.6	362
fino a 1000 fr.	3.7	5.3	4.1	6.7	13.2	8.1	17.0	20.0	17.6	29.7	25.0	28.8	0.0	4.3	3.6	8.7	8.9	8.8	111
da 1001 a 2000 fr.	7.6	11.1	8.5	19.3	18.4	19.1	9.4	20.0	11.8	4.7	17.9	7.1	0.0	12.9	10.7	8.5	12.1	9.6	121
da 2001 a 3000 fr.	14.4	24.3	17.0	19.3	31.6	22.0	7.5	20.0	10.3	6.3	7.1	6.4	0.0	17.1	14.3	12.9	22.4	15.7	199
da 3001 a 4000 fr.	12.0	13.2	12.4	15.6	2.6	12.7	20.8	6.7	17.6	8.6	0.0	7.1	14.3	20.0	19.0	13.3	12.1	12.9	164
da 4001 a 5000 fr.	19.2	8.5	16.3	5.2	2.6	4.6	17.0	0.0	13.2	3.1	3.6	3.2	21.4	11.4	13.1	15.1	7.3	12.8	162
da 5001 a 6000 fr.	9.5	4.8	8.2	3.7	0.0	2.9	5.7	6.7	5.9	0.0	0.0	0.0	21.4	4.3	7.1	6.9	3.8	6.0	76
da 6001 a 8000 fr.	7.4	2.6	6.1	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.5	1.6	0.0	1.3	28.6	4.3	8.3	5.2	2.7	4.5	57
da 8001 a 10 000 fr.	1.4	0.0	1.0	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.7	9
da 10 001 a 15 000 fr.	0.8	0.0	0.6	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.4	5
più di 15 000 fr.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	1
N**	515	189	704	135	38	173	53	15	68	128	28	156	14	70	84	896	371	1267	1'267
<i>dati mancanti</i>	969	401	1'370	148	50	198	79	34	113	130	31	161	120	461	581	1'573	1'044	2'617	2'617
Debiti*																			
nessun debito	62.0	75.2	65.8	38.0	48.4	40.3	32.7	76.9	41.5	70.7	82.4	72.4	81.5	91.5	89.6	58.1	77.3	64.3	805
fino a 5000 fr.	7.6	6.8	7.4	12.0	22.6	14.4	13.5	7.7	12.3	11.1	0.0	9.5	7.4	2.6	3.5	9.1	6.2	8.2	102
da 5001 a 10 000 fr.	5.7	5.8	5.7	15.7	12.9	15.1	13.5	0.0	10.8	6.1	11.8	6.9	11.1	1.7	3.5	7.6	5.9	7.0	88
da 10 001 a 25 000 fr.	9.6	4.9	8.2	17.6	6.5	15.1	15.4	7.7	13.8	4.0	0.0	3.4	0.0	3.4	2.8	10.1	4.9	8.4	105
da 25 001 a 50 000 fr.	6.0	1.5	4.7	9.3	9.7	9.4	19.2	7.7	16.9	4.0	5.9	4.3	0.0	0.9	0.7	7.3	2.2	5.7	71
da 50 001 a 100 000 fr.	2.9	1.9	2.6	5.6	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	2.8	1.0	2.2	28
più di 100 000 fr.	6.2	3.9	5.6	1.9	0.0	1.4	5.8	0.0	4.6	3.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	5.0	2.5	4.2	52
N**	513	206	719	108	31	139	52	13	65	99	17	116	27	117	144	845	406	1'251	1'251
<i>dati mancanti</i>	971	384	1'355	175	57	232	80	36	116	159	42	201	107	414	521	1'624	1'009	2'633	2'633

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T8 Incarcerazione o detenzione preventiva prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2005)

	Pazienti: problema principale												Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Incarcerazione o detenzione preventiva*																
nessuna	88.3	97.8	91.1	47.3	75.5	54.4	63.6	91.3	70.0	89.9	100.0	92.0	82.7	95.3	86.3	1'581
in prigione	6.9	2.0	5.4	20.5	12.2	18.5	15.6	8.7	14.0	4.2	0.0	3.3	8.6	3.4	7.1	130
in detenzione preventiva	3.1	0.3	2.3	11.6	6.1	10.3	10.4	0.0	8.0	6.0	0.0	4.7	4.7	0.8	3.5	65
in prigione e in detenzione preventiva	1.7	0.0	1.2	20.5	6.1	16.9	10.4	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.6	3.0	55
N**	835	358	1'193	146	49	195	77	23	100	168	44	212	1'302	529	1'831	1'831
<i>dati mancanti</i>	649	232	881	137	39	176	55	26	81	90	15	105	1'033	355	1'388	1'388
Durata totale di detenzione***																
fino a 1 mese	30.3	14.3	28.9	28.6	57.1	32.1	37.5	0.0	35.3	50.0	0.0	50.0	31.0	31.3	31.0	53
> 1 a 2 mesi	11.8	0.0	10.8	6.1	14.3	7.1	12.5	0.0	11.8	0.0	0.0	0.0	9.0	6.3	8.8	15
> 2 a 6 mesi	22.4	42.9	24.1	18.4	28.6	19.6	31.3	100.0	35.3	20.0	0.0	20.0	21.9	43.8	24.0	41
> 6 a 12 mesi	10.5	0.0	9.6	14.3	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	12.3	0.0	11.1	19
più di un anno	25.0	42.9	26.5	32.7	0.0	28.6	18.8	0.0	17.6	10.0	0.0	10.0	25.8	18.8	25.1	42
N**	76	7	83	48	7	55	16	1	17	10	0	10	154	16	170	170
<i>dati mancanti</i>	22	1	23	29	5	34	12	1	13	7	0	7	71	9	80	80

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che hanno vissuto un'esperienza di detenzione. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T9 Istanza d'invio principale e secondaria dei pazienti (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2005)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Coacaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Istanza d'invio principale*																			
propria iniziativa	26.0	32.3	27.7	50.2	41.5	48.2	36.5	37.5	36.8	19.5	17.5	19.1	71.3	75.0	74.3	31.7	49.3	38.1	1'324
coniuge/partner	7.1	4.2	6.3	3.3	1.2	2.8	2.4	6.3	3.4	6.9	8.8	7.3	6.1	3.0	3.6	6.2	3.8	5.3	185
famiglia	3.6	5.4	4.1	5.1	4.9	5.1	7.9	8.3	8.0	15.4	8.8	14.2	3.5	5.7	5.3	5.5	5.6	5.5	192
amici/collegli/conoscenti	1.0	2.2	1.3	1.1	1.2	1.1	1.6	0.0	1.1	0.4	5.3	1.3	2.6	3.7	3.5	1.0	3.1	1.8	62
istituto ambulatoriale specializ.	1.5	1.6	1.5	3.3	11.0	5.1	3.2	0.0	2.3	0.8	0.0	0.7	2.6	1.8	2.0	1.8	2.3	2.0	69
istituto residenziale specializ.	5.3	6.6	5.7	3.3	1.2	2.8	2.4	6.3	3.4	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	3.9	3.3	3.7	127
studio medico	8.2	8.8	8.3	8.4	19.5	11.0	8.7	14.6	10.3	2.0	7.0	3.0	5.2	3.9	4.1	7.1	7.6	7.3	254
ospedale/clinica	14.9	18.8	16.0	4.4	4.9	4.5	7.1	10.4	8.0	5.3	10.5	6.3	0.9	1.4	1.3	10.6	10.0	10.4	360
servizi sociali	5.4	7.6	6.0	8.1	6.1	7.6	5.6	6.3	5.7	3.3	0.0	2.6	1.7	1.4	1.5	5.1	4.4	4.9	169
prov. penale/amministrativo	16.9	5.0	13.6	7.0	2.4	5.9	19.8	4.2	15.5	29.7	24.6	28.7	0.9	0.8	0.8	16.9	4.2	12.3	426
datore di lavoro	5.0	4.4	4.8	0.4	0.0	0.3	0.8	0.0	0.6	2.0	1.8	2.0	0.0	0.4	0.3	3.3	2.1	2.9	100
insegnante	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	8.8	5.9	1.7	0.4	0.7	0.8	0.6	0.7	26
altra	5.1	3.0	4.5	5.5	6.1	5.6	4.0	6.3	4.6	8.9	7.0	8.6	3.5	2.4	2.6	6.0	3.7	5.1	178
N**	1'287	499	1'786	273	82	355	126	48	174	246	57	303	115	492	607	2'201	1'271	3'472	3'472
<i>dati mancanti</i>	197	91	288	10	6	16	6	1	7	12	2	14	19	39	58	268	144	412	412
Istanza d'invio secondaria***																			
propria iniziativa	22.5	21.2	22.1	23.3	33.9	25.8	26.1	23.3	25.4	18.7	14.9	17.9	10.6	10.2	10.3	21.9	18.2	20.5	510
coniuge/partner	10.9	8.4	10.2	12.4	6.8	11.1	10.2	0.0	7.6	4.3	4.3	4.3	13.6	5.8	7.2	10.2	6.5	8.9	221
famiglia	4.2	6.4	4.8	13.0	13.6	13.1	11.4	13.3	11.9	10.7	12.8	11.1	6.1	8.2	7.8	6.7	7.7	7.0	175
amici/collegli/conoscenti	1.5	3.3	2.1	2.1	0.0	1.6	1.1	0.0	0.8	0.5	2.1	0.9	6.1	4.8	5.0	1.7	3.4	2.3	57
istituto ambulatoriale specializ.	0.7	0.8	0.7	3.6	1.7	3.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	1.0	0.8	1.1	1.0	1.0	26
istituto residenziale specializ.	2.2	1.8	2.1	1.6	0.0	1.2	4.5	3.3	4.2	1.1	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	1.9	0.9	1.6	39
studio medico	7.5	7.9	7.6	16.1	13.6	15.5	9.1	6.7	8.5	3.7	4.3	3.8	3.0	2.7	2.8	7.9	6.1	7.2	180
ospedale/clinica	4.1	6.6	4.8	4.7	1.7	4.0	2.3	6.7	3.4	0.0	2.1	0.4	4.5	2.0	2.5	3.5	4.4	3.8	95
servizi sociali	3.1	4.8	3.6	6.2	3.4	5.6	5.7	3.3	5.1	1.6	6.4	2.6	3.0	2.7	2.8	3.5	4.1	3.7	92
prov. penale/amministrativo	4.1	1.8	3.4	6.2	0.0	4.8	2.3	3.3	2.5	3.2	0.0	2.6	1.5	0.3	0.6	3.9	1.1	2.9	72
datore di lavoro	3.1	2.3	2.9	1.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.3	1.5	0.7	0.8	2.3	1.2	1.9	48
insegnante	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.1	2.1	0.0	0.7	0.6	0.4	0.5	0.4	10
altra	2.5	2.6	2.5	3.6	1.7	3.2	2.3	3.3	2.5	2.1	0.0	1.7	0.0	3.8	3.1	2.6	2.6	2.6	64
nessuna	45.3	44.4	45.0	33.7	37.3	34.5	40.9	60.0	45.8	56.1	61.7	57.3	57.6	60.1	59.6	45.5	51.5	47.7	1'184
N**	972	392	1'364	193	59	252	88	30	118	187	47	234	66	293	359	1'597	887	2'484	2'484
<i>dati mancanti</i>	512	198	710	90	29	119	44	19	63	71	12	83	68	238	306	872	528	1'400	1'400

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili)

T10 Tipo di aiuto atteso dai pazienti (in rapporto al problema principale) e dai parenti o conoscenti all'entrata e base legale dell'intervento (2005)

Tipo di aiuto atteso*	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Tipo di aiuto atteso*																			
problemi di dipendenza	82.2	86.2	83.3	85.9	90.0	86.9	83.0	88.0	84.1	60.5	57.6	60.0	51.2	55.5	54.7	77.8	72.5	75.9	2'032
problemi somatici	4.3	3.9	4.2	8.0	6.7	7.7	4.5	4.0	4.4	0.0	3.0	0.5	2.4	2.9	2.8	4.4	4.0	4.3	114
problemi psichici	23.6	30.7	25.5	26.6	33.3	28.2	20.5	36.0	23.9	12.5	9.1	11.9	23.8	18.0	19.0	22.6	24.8	23.4	627
problemi relazionali	18.3	24.1	19.9	22.6	26.7	23.6	8.0	36.0	14.2	8.6	15.2	9.7	38.1	40.1	39.7	18.5	29.9	22.7	607
problemi familiari	9.5	17.0	11.6	15.6	28.3	18.5	14.8	36.0	19.5	12.5	24.2	14.6	29.8	38.0	36.5	11.8	26.7	17.3	462
problemi finanziari	9.9	8.6	9.6	26.1	21.7	25.1	15.9	12.0	15.0	5.9	9.1	6.5	7.1	5.2	5.6	12.0	8.1	10.6	283
problemi professionali o di formazione	16.1	12.3	15.0	20.6	16.7	19.7	13.6	40.0	19.5	14.5	15.2	14.6	6.0	3.4	3.8	15.1	9.4	13.0	349
problemi di alloggio	5.3	3.4	4.8	13.6	16.7	14.3	8.0	12.0	8.8	3.9	9.1	4.9	2.4	2.9	2.8	6.1	4.4	5.5	147
problemi di violenza	1.7	1.7	1.7	1.5	3.3	1.9	0.0	4.0	0.9	0.7	6.1	1.6	2.4	2.3	2.4	1.5	2.2	1.8	47
problemi giuridici	16.7	5.2	13.5	14.1	10.0	13.1	11.4	8.0	10.6	10.5	6.1	9.7	7.1	3.6	4.3	14.5	4.9	11.1	296
altro-i	2.5	3.2	2.7	3.5	5.0	3.9	8.0	4.0	7.1	3.3	0.0	2.7	6.0	3.1	3.6	3.8	3.8	3.8	102
nessuna richiesta	5.7	4.4	5.4	4.5	1.7	3.9	3.4	0.0	2.7	23.7	36.4	25.9	2.4	1.0	1.3	7.3	4.1	6.1	164
N**	1'069	407	1'476	199	60	259	88	25	113	152	33	185	84	384	468	1'705	973	2'678	2'678
<i>dati mancanti</i>	415	183	598	84	28	112	44	24	68	106	26	132	50	147	197	764	442	1'206	1'206
Base legale dell'intervento*																			
Sospensione della procedura, rinuncia a infliggere una pena o un avvertimento (art. 19a cifra 2 Lstup)	0.6	0.0	0.4	0.5	0.0	0.4	1.0	3.4	1.6	7.3	8.7	7.6	1.6	0.0	0.3	1.6	0.6	1.2	31
abbandono del perseguimento penale nel caso di un trattamento sotto sorveglianza medica (art. 19a cifra 3 Lstup)	0.3	0.0	0.2	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	5
misure concernenti delinquenti mentalmente anormali (art. 43 CPS)	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	2
trattamento delle persone dipendenti dall'alcol o dalle droghe (art. 44 CPS)	3.3	0.5	2.5	3.4	0.0	2.6	5.2	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.2	1.8	47
irresponsabilità (art. 10 CPS)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
responsabilità limitata (art 11 CPS)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
esecuzione di misure per tossicodipend. in un'istituzione di educazione al lavoro (art. 2a ord. 3 rel. al CPS SR 311.03)	0.1	0.2	0.1	0.5	1.6	0.7	2.1	3.4	2.4	5.8	13.0	7.2	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	1.1	28
altra	12.9	6.2	11.0	4.9	6.3	5.2	12.5	3.4	10.4	24.6	13.0	22.4	1.6	1.0	1.1	12.5	4.9	9.8	249
nessuna misura (trattamento volontario)	82.8	93.1	85.8	90.2	92.1	90.7	80.2	89.7	82.4	61.8	65.2	62.4	96.8	99.0	98.6	81.9	93.3	85.9	2'190
N**	1'002	403	1'405	205	63	268	96	29	125	191	46	237	62	303	365	1'645	904	2'549	2'549
<i>dati mancanti</i>	482	187	669	78	25	103	36	20	56	67	13	80	72	228	300	824	511	1'335	1'335

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T11 Trattamenti/accompagnamenti dei pazienti prima dell'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2005)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Interventi precedenti*																			
no	46.2	36.9	43.6	15.6	19.8	16.6	44.6	34.0	41.7	70.9	64.3	69.6	67.0	71.5	70.6	46.8	49.0	47.5	1'567
si	53.8	63.1	56.4	84.4	80.2	83.4	55.4	66.0	58.3	29.1	35.7	30.4	33.0	28.5	29.4	53.2	51.0	52.5	1'729
N**	1'268	502	1'770	269	81	350	121	47	168	247	56	303	88	382	470	2'142	1'154	3'296	3'296
<i>dati mancanti</i>	216	88	304	14	7	21	11	2	13	11	3	14	46	149	195	327	261	588	588
Tipo di intervento***																			
trattamento con prescriz. di eroina	0.2	0.4	0.3	4.2	4.2	4.2	3.6	5.3	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.1	1.4	1.2	1.3	17
terapia sostitut. (metadone, subutex)	5.1	5.2	5.1	72.0	62.5	69.9	34.5	57.9	40.5	2.3	0.0	1.7	0.0	4.2	3.4	20.7	13.9	18.4	235
altro tratt. medicam. delle dipendenze	19.8	16.4	18.7	11.9	8.3	11.1	12.7	15.8	13.5	16.3	0.0	12.1	5.6	5.6	5.6	16.8	12.8	15.4	197
consulenza ambulatoriale	65.6	61.2	64.2	63.7	52.1	61.1	65.5	73.7	67.6	86.0	53.3	77.6	88.9	83.1	84.3	66.4	64.3	65.6	839
terapia residenziale	46.9	48.4	47.4	43.5	43.8	43.5	32.7	36.8	33.8	18.6	46.7	25.9	11.1	8.5	9.0	42.6	40.6	41.9	536
cura di disintossicazione	43.9	49.6	45.7	58.3	52.1	56.9	38.2	47.4	40.5	9.3	33.3	15.5	11.1	5.6	6.7	43.1	39.9	42.0	537
gruppo di aiuto reciproco/ autosost.	10.6	11.2	10.8	1.8	0.0	1.4	3.6	5.3	4.1	2.3	13.3	5.2	5.6	7.0	6.7	7.9	9.0	8.3	106
altro-i	2.8	3.2	3.0	1.2	4.2	1.9	3.6	5.3	4.1	2.3	13.3	5.2	11.1	7.0	7.9	3.3	4.6	3.8	48
N**	529	250	779	168	48	216	55	19	74	43	15	58	18	71	89	847	431	1'278	1'278
<i>dati mancanti</i>	153	67	220	59	17	76	12	12	24	29	5	34	11	38	49	293	158	451	451

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che sono già stati presi in carico in precedenza. Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

T12 Trattamento sostitutivo e altri interventi all'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2005)

	Pazienti: problema principale												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Sostituzione o prescrizione di eroina*																
no	98.5	98.5	98.5	51.0	44.4	49.4	86.6	61.5	81.3	100.0	100.0	100.0	91.4	90.7	91.2	1'957
si	1.5	1.5	1.5	49.0	55.6	50.6	13.4	38.5	18.7	0.0	0.0	0.0	8.6	9.3	8.8	189
N**	998	390	1'388	206	63	269	97	26	123	178	41	219	1'566	580	2'146	2'146
<i>dati mancanti</i>	486	200	686	77	25	102	35	23	58	80	18	98	769	304	1'073	1'073
Tipo di sostituzione***																
eroina	0.0	0.0	0.0	2.0	2.9	2.3	7.7	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	2.3	1.9	2.2	4
metadone	86.7	100.0	90.5	95.9	91.4	94.7	92.3	100.0	95.7	0.0	0.0	0.0	93.9	92.6	93.5	173
altri oppiacei	0.0	0.0	0.0	2.0	2.9	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.9	1.6	3
altre sostanze	13.3	0.0	9.5	0.0	2.9	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	3.7	2.7	5
N**	15	6	21	98	35	133	13	10	23	0	0	0	131	54	185	185
<i>dati mancanti</i>	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4
Altro intervento parallelo*																
no	86.9	85.1	86.4	73.5	72.3	73.2	85.7	89.6	86.8	93.0	93.1	93.0	85.8	85.6	85.8	2'370
si	13.1	14.9	13.6	26.5	27.7	26.8	14.3	10.4	13.2	7.0	6.9	7.0	14.2	14.4	14.2	393
N**	1'248	478	1'726	268	83	351	119	48	167	242	58	300	2'013	750	2'763	2'763
<i>dati mancanti</i>	236	112	348	15	5	20	13	1	14	16	1	17	322	134	456	456
Tipo di intervento parallelo****																
trattamento o consulenza ambulatoriale	58.0	56.5	57.6	70.4	69.6	70.2	70.6	75.0	71.4	70.6	100.0	76.2	63.5	61.9	63.0	244
terapia residenziale	18.5	20.3	19.0	18.3	26.1	20.2	11.8	25.0	14.3	11.8	0.0	9.5	17.4	21.0	18.3	71
gruppo di aiuto reciproco o di autosostegno	3.1	5.8	3.9	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	2.5	3.8	2.8	11
altro-i	22.2	20.3	21.6	15.5	8.7	13.8	17.6	0.0	14.3	17.6	0.0	14.3	19.1	16.2	18.3	71
N**	162	69	231	71	23	94	17	4	21	17	4	21	282	105	387	387
<i>dati mancanti</i>	2	2	4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	3	6	6

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che seguono un programma di sostituzione. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

**** I risultati si basano solamente sui clienti presi in carico parallelamente. Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

T13a Entrata in seguito a una cura di disintossicazione, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2005)

	Pazienti: problema principale												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Entrata in seguito a una cura di disintossicazione*																
no	75.7	70.5	74.2	86.3	88.7	86.9	83.9	75.9	82.0	94.6	92.9	94.2	80.6	75.0	79.1	1'687
disintossicazione nella stessa istituzione	0.7	1.5	0.9	0.5	1.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.5	0.8	18
disintossicazione in un'altra istituzione	23.5	28.0	24.9	13.2	9.7	12.4	16.1	24.1	18.0	5.4	7.1	5.8	18.8	23.4	20.1	428
N**	981	407	1'388	197	62	259	93	29	122	184	42	226	1'540	593	2'133	2'133
<i>dati mancanti</i>	503	183	686	86	26	112	39	20	59	74	17	91	795	291	1'086	1'086

T13b Frequenza delle cure di disintossicazione senza aiuto professionale prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2005)

Freq. disintossicazioni senza accompagnamento*																
mai	60.9	60.8	60.8	12.1	26.9	15.0	41.1	55.6	43.1	81.9	76.9	81.4	56.9	58.5	57.3	605
una volta	8.9	8.0	8.7	15.0	7.7	13.5	14.3	0.0	12.3	8.6	7.7	8.5	9.9	7.3	9.3	98
due o tre volte	12.4	11.9	12.3	16.8	34.6	20.3	8.9	22.2	10.8	4.8	0.0	4.2	11.1	14.1	11.8	125
più di tre volte	17.8	19.3	18.2	56.1	30.8	51.1	35.7	22.2	33.8	4.8	15.4	5.9	22.0	20.2	21.6	228
N**	493	176	669	107	26	133	56	9	65	105	13	118	808	248	1'056	1'056
<i>dati mancanti</i>	991	414	1'405	176	62	238	76	40	116	153	46	199	1'527	636	2'163	2'163

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T14 Problema principale all'entrata (solamente pazienti) (2005)

Tutti i pazienti									
Problema principale	Uomini	Donne	Totale	N		Uomini	Donne	Totale	N
	%	%	%			%	%	%	
alcol	65.9	68.8	66.7	2'074	alcol	65.9	68.8	66.7	2'074
cocktail (eroina e cocaina)	0.3	0.4	0.3	10	cocktail	0.3	0.4	0.3	10
eroina	11.7	9.7	11.1	346	oppiacei	12.3	9.9	11.6	361
metadone	0.6	0.2	0.5	15					
altri oppiacei	0.0	0.0	0.0	0					
cocaina	5.8	5.7	5.8	180	cocaina e derivati	5.9	5.7	5.8	181
crack, freebase	0.0	0.0	0.0	1					
amfetamine	0.2	0.1	0.2	5	stimolanti	0.4	0.4	0.4	12
MDMA e affini (ecstasy)	0.2	0.2	0.2	7					
altri stimolanti (per es., khat)	0.0	0.0	0.0	0					
barbiturici	0.0	0.0	0.0	0	medicamenti	0.6	2.0	1.0	31
benzodiazepine	0.6	1.9	1.0	30					
altri sonniferi e tranquillanti	0.0	0.1	0.0	1					
LSD	0.2	0.0	0.1	4	allucinogeni	0.2	0.0	0.1	4
altri allucinogeni	0.0	0.0	0.0	0					
canapa	11.5	6.9	10.2	317	canapa	11.5	6.9	10.2	317
tabacco	0.4	1.3	0.6	20	tabacco	0.4	1.3	0.6	20
sostanze volatili (per es., solventi)	0.0	0.0	0.0	0	altra/e sostanza/e	0.6	2.0	1.0	31
altra/e sostanza/e	0.6	2.0	1.0	31					
gioco patologico	1.7	1.3	1.6	50	problemi assimilabili a una dipendenza	2.0	2.7	2.2	69
disturbi alimentari	0.0	1.2	0.3	10					
altri problemi assimilabili a una dipendenza	0.3	0.2	0.3	9					
N**	2'253	857	3'110	3'110		2'253	857	3'110	3'110
<i>dati mancanti</i>	82	27	109	109		82	27	109	109

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T15.1a Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso dei 30 ultimi giorni e dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata (2005), uomini

Pazienti: principale sostanza problematica										
Uomini	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Coacaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
Frequenza di consumo 30 ultimi giorni (%)*										
mai	29.0	16.7	23.3	28.2	12.5	25.0	25.0	23.9	0.0	0.0
un giorno alla settimana o meno	8.9	0.0	13.2	16.4	25.0	0.0	50.0	10.6	14.3	0.0
2 a 3 giorni alla settimana	13.1	33.3	14.1	22.7	37.5	0.0	25.0	16.5	0.0	33.3
4 a 6 giorni alla settimana	13.1	0.0	4.8	11.8	12.5	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0
una volta al giorno	4.7	33.3	15.0	5.5	0.0	0.0	0.0	15.1	0.0	0.0
più volte al giorno	31.2	16.7	29.5	15.5	12.5	75.0	0.0	25.7	85.7	66.7
N**	1'073	6	227	110	8	12	4	218	7	3
<i>dati mancanti</i>	411	1	49	22	1	2	0	40	2	11
Frequenza di consumo 6 ultimi mesi (%)*										
mai	9.9	16.7	12.7	12.2	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0
un giorno alla settimana o meno	8.5	0.0	18.0	17.6	0.0	0.0	33.3	12.0	0.0	0.0
2 a 3 giorni alla settimana	19.7	33.3	20.0	23.0	60.0	0.0	33.3	26.4	0.0	50.0
4 a 6 giorni alla settimana	13.4	0.0	8.7	20.3	40.0	0.0	0.0	9.6	0.0	0.0
una volta al giorno	6.3	33.3	19.3	5.4	0.0	20.0	0.0	8.8	0.0	0.0
più volte al giorno	42.2	16.7	21.3	21.6	0.0	80.0	33.3	39.2	100.0	50.0
N**	756	6	150	74	5	5	3	125	5	2
<i>dati mancanti</i>	728	1	126	58	4	9	1	133	4	12

T15.1b Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso dei 30 ultimi giorni e dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata (2005), uomini

Pazienti: problema principale			
Uomini	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
Frequenza di manifestazione 30 ultimi giorni (%)*			
mai	43.8	0.0	0.0
1 giorno alla settimana o meno	25.0	0.0	0.0
2 a 3 giorni alla settimana	12.5	0.0	0.0
4 a 6 giorni alla settimana	9.4	0.0	0.0
una volta al giorno	9.4	0.0	33.3
più volte al giorno	0.0	0.0	66.7
N**	32	0	3
<i>dati mancanti</i>	7	0	4
Frequenza di manifestazione 6 ultimi mesi (%)*			
mai	24.0	0.0	0.0
1 giorno alla settimana o meno	36.0	0.0	0.0
2 a 3 giorni alla settimana	28.0	0.0	0.0
4 a 6 giorni alla settimana	8.0	0.0	0.0
una volta al giorno	0.0	0.0	0.0
più volte al giorno	4.0	0.0	100.0
N**	25	0	4
<i>dati mancanti</i>	14	0	3

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T15.2a Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso dei 30 ultimi giorni e dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata (2005), donne

Pazienti: principale sostanza problematica										
Donne	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Coacaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
Frequenza di consumo 30 ultimi giorni (%)*										
mai	23.0	0.0	22.7	35.7	100.0	16.7	0.0	10.9	0.0	0.0
un giorno alla settimana o meno	8.7	33.3	7.6	9.5	0.0	0.0	0.0	28.3	0.0	0.0
2 a 3 giorni alla settimana	15.7	33.3	10.6	19.0	0.0	0.0	0.0	13.0	18.2	50.0
4 a 6 giorni alla settimana	9.0	33.3	10.6	11.9	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0
una volta al giorno	4.6	0.0	10.6	2.4	0.0	8.3	0.0	13.0	0.0	0.0
più volte al giorno	39.0	0.0	37.9	21.4	0.0	75.0	0.0	21.7	81.8	50.0
N**	413	3	66	42	2	12	0	46	11	2
<i>dati mancanti</i>	177	0	19	7	1	5	0	13	0	15
Frequenza di consumo 6 ultimi mesi (%)*										
mai	4.9	0.0	5.1	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
un giorno alla settimana o meno	9.8	50.0	17.9	0.0	100.0	0.0	0.0	24.0	0.0	0.0
2 a 3 giorni alla settimana	19.2	0.0	17.9	30.0	0.0	0.0	0.0	12.0	9.1	0.0
4 a 6 giorni alla settimana	9.4	50.0	5.1	10.0	0.0	0.0	0.0	4.0	9.1	0.0
una volta al giorno	6.5	0.0	17.9	5.0	0.0	25.0	0.0	8.0	0.0	0.0
più volte al giorno	50.2	0.0	35.9	35.0	0.0	75.0	0.0	52.0	81.8	0.0
N**	307	2	39	20	1	8	0	25	11	1
<i>dati mancanti</i>	283	1	46	29	2	9	0	34	0	16

T15.2b Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso dei 30 ultimi giorni e dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata (2005), donne

Pazienti: problema principale			
Donne	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
Frequenza di manifestazione 30 ultimi giorni (%)*			
mai	10.0	0.0	0.0
1 giorno alla settimana o meno	60.0	0.0	100.0
2 a 3 giorni alla settimana	10.0	25.0	0.0
4 a 6 giorni alla settimana	20.0	25.0	0.0
una volta al giorno	0.0	25.0	0.0
più volte al giorno	0.0	25.0	0.0
N**	10	4	1
<i>dati mancanti</i>	1	6	1
Frequenza di manifestazione 6 ultimi mesi (%)*			
mai	33.3	0.0	0.0
1 giorno alla settimana o meno	66.7	0.0	100.0
2 a 3 giorni alla settimana	0.0	33.3	0.0
4 a 6 giorni alla settimana	0.0	66.7	0.0
una volta al giorno	0.0	0.0	0.0
più volte al giorno	0.0	0.0	0.0
N**	6	3	1
<i>dati mancanti</i>	5	7	1

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T15.3a Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso dei 30 ultimi giorni e dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata (2005), uomini e donne

Pazienti: principale sostanza problematica										
Uomini e donne	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Coacaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
Frequenza di consumo 30 ultimi giorni (%)*										
mai	27.3	11.1	23.2	30.3	30.0	20.8	25.0	21.6	0.0	0.0
un giorno alla settimana o meno	8.8	11.1	11.9	14.5	20.0	0.0	50.0	13.6	5.6	0.0
2 a 3 giorni alla settimana	13.9	33.3	13.3	21.7	30.0	0.0	25.0	15.9	11.1	40.0
4 a 6 giorni alla settimana	12.0	11.1	6.1	11.8	10.0	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0
una volta al giorno	4.6	22.2	14.0	4.6	0.0	4.2	0.0	14.8	0.0	0.0
più volte al giorno	33.4	11.1	31.4	17.1	10.0	75.0	0.0	25.0	83.3	60.0
N**	1'486	9	293	152	10	24	4	264	18	5
<i>dati mancanti</i>	588	1	68	29	2	7	0	53	2	26
Frequenza di consumo 6 ultimi mesi (%)*										
mai	8.5	12.5	11.1	13.8	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	33.3
un giorno alla settimana o meno	8.8	12.5	18.0	13.8	16.7	0.0	33.3	14.0	0.0	0.0
2 a 3 giorni alla settimana	19.6	25.0	19.6	24.5	50.0	0.0	33.3	24.0	6.3	33.3
4 a 6 giorni alla settimana	12.2	12.5	7.9	18.1	33.3	0.0	0.0	8.7	6.3	0.0
una volta al giorno	6.4	25.0	19.0	5.3	0.0	23.1	0.0	8.7	0.0	0.0
più volte al giorno	44.5	12.5	24.3	24.5	0.0	76.9	33.3	41.3	87.5	33.3
N**	1'063	8	189	94	6	13	3	150	16	3
<i>dati mancanti</i>	1'011	2	172	87	6	18	1	167	4	28

T15.3b Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso dei 30 ultimi giorni e dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata (2005), uomini e donne

Pazienti: problema principale			
Uomini e donne	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
Frequenza di manifestazione 30 ultimi giorni (%)*			
mai	35.7	0.0	0.0
1 giorno alla settimana o meno	33.3	0.0	25.0
2 a 3 giorni alla settimana	11.9	25.0	0.0
4 a 6 giorni alla settimana	11.9	25.0	0.0
una volta al giorno	7.1	25.0	25.0
più volte al giorno	0.0	25.0	50.0
N**	42	4	4
<i>dati mancanti</i>	8	6	5
Frequenza di manifestazione 6 ultimi mesi (%)*			
mai	25.8	0.0	0.0
1 giorno alla settimana o meno	41.9	0.0	20.0
2 a 3 giorni alla settimana	22.6	33.3	0.0
4 a 6 giorni alla settimana	6.5	66.7	0.0
una volta al giorno	0.0	0.0	0.0
più volte al giorno	3.2	0.0	80.0
N**	31	3	5
<i>dati mancanti</i>	19	7	4

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T16.1a Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2005), uomini

Pazienti: principale sostanza problematica										
Uomini	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Coacaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
Età all'epoca del primo consumo										
media	16.6	19.1	20.4	21.0	16.9	30.8	17.7	14.9	13.6	27.7
deviazione standard	4.4	6.9	5.5	6.3	1.3	7.3	0.6	2.3	3.5	6.1
1° quartile	15.0	15.0	17.0	17.0	17.0	25.0	17.0	14.0	10.0	21.0
mediana	16.0	16.0	19.0	19.0	17.0	32.0	18.0	15.0	13.0	29.0
3° quartile	18.0	25.0	23.0	23.0	18.0	36.0	18.0	16.0	18.0	33.0
N*	697	7	207	97	7	9	3	170	7	3
<i>dati mancanti</i>	787	0	69	35	2	5	1	88	2	11
Età all'inizio del consumo regolare										
media	22.5	21.2	22.2	21.9	18.7	32.0	18.0	16.2	15.6	27.7
deviazione standard	7.9	8.8	6.1	7.3	2.3	7.5	1.0	3.1	5.3	6.1
1° quartile	18.0	15.0	18.0	18.0	17.0	29.0	17.0	14.0	13.0	21.0
mediana	20.0	16.0	20.0	20.0	18.0	32.0	18.0	16.0	14.0	29.0
3° quartile	25.0	25.0	25.0	25.0	19.0	37.0	19.0	17.0	20.0	33.0
N*	692	5	187	89	6	9	3	162	7	3
<i>dati mancanti</i>	792	2	89	43	3	5	1	96	2	11
Età all'inizio del consumo problematico										
media	31.5	24.5	23.2	23.3	18.6	29.0	18.0	17.4	20.0	22.0
deviazione standard	10.8	9.0	6.9	8.2	1.3	10.8	.	4.4	9.8	.
1° quartile	23.0	18.0	18.5	19.0	18.0	17.0	18.0	15.0	13.0	22.0
mediana	30.0	21.5	22.0	22.5	18.0	32.0	18.0	16.5	14.0	22.0
3° quartile	38.0	31.0	25.0	25.5	20.0	38.0	18.0	18.0	25.0	22.0
N*	485	4	116	56	5	3	1	102	5	1
<i>dati mancanti</i>	999	3	160	76	4	11	3	156	4	13
Periodo di latenza (in anni)**										
media	25.4	9.7	8.7	6.5	5.8	10.8	6.7	5.3	9.0	2.0
deviazione standard	12.0	.	6.8	6.0	2.8	6.2	4.7	4.8	10.0	.
1° quartile	16.2	9.7	4.0	2.3	3.9	6.5	3.4	2.0	2.2	2.0
mediana	26.0	9.7	7.1	5.4	5.9	10.0	6.7	3.7	4.8	2.0
3° quartile	34.1	9.7	14.7	8.1	7.0	15.0	10.0	7.0	12.0	2.0
N*	323	1	34	45	6	4	2	124	6	1
<i>dati mancanti</i>	263	0	7	9	1	2	0	51	1	8

* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

** Lasso di tempo tra il primo consumo della sostanza problematica e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

T16.1b Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2005), donne

Pazienti: principale sostanza problematica										
Donne	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Coacaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
Età all'epoca del primo consumo										
media	17.8	25.5	20.6	20.2	16.0	29.7	.	14.4	17.3	29.0
deviazione standard	5.5	12.0	6.4	6.6	.	9.2	.	2.0	4.0	12.7
1° quartile	16.0	17.0	17.0	17.0	16.0	20.0	.	13.0	15.0	20.0
mediana	17.0	25.5	19.0	17.0	16.0	30.0	.	14.0	15.0	29.0
3° quartile	20.0	34.0	22.0	23.0	16.0	35.0	.	15.5	18.0	38.0
N*	242	2	63	34	1	13	0	32	9	2
<i>dati mancanti</i>	348	1	22	15	2	4	0	27	2	15
Età all'inizio del consumo regolare										
media	26.0	26.0	21.1	21.3	.	29.4	.	15.8	18.2	34.0
deviazione standard	9.7	11.3	5.3	6.3	.	6.7	.	2.7	5.1	7.1
1° quartile	19.0	18.0	17.5	17.0	.	25.0	.	14.0	15.0	29.0
mediana	23.0	26.0	20.0	20.0	.	29.0	.	15.0	16.0	34.0
3° quartile	32.0	34.0	23.5	27.0	.	35.5	.	16.0	18.0	39.0
N*	249	2	56	31	0	12	0	31	5	2
<i>dati mancanti</i>	341	1	29	18	3	5	0	28	6	15
Età all'inizio del consumo problematico										
media	35.2	26.0	21.4	23.1	18.0	32.3	.	16.2	36.3	.
deviazione standard	10.9	11.3	5.1	7.2	.	12.5	.	2.6	22.2	.
1° quartile	26.0	18.0	17.0	17.0	18.0	20.0	.	14.0	16.0	.
mediana	35.0	26.0	21.0	21.0	18.0	32.0	.	16.0	33.0	.
3° quartile	42.5	34.0	24.0	30.0	18.0	45.0	.	17.0	60.0	.
N*	192	2	34	15	1	3	0	15	3	0
<i>dati mancanti</i>	398	1	51	34	2	14	0	44	8	17
Periodo di latenza (in anni)**										
media	26.3	.	4.3	3.6	3.3	16.9	.	5.9	30.5	12.5
deviazione standard	9.7	.	5.3	3.0	.	11.1	.	6.1	14.1	10.6
1° quartile	20.3	.	1.4	1.7	3.3	8.0	.	2.7	19.9	5.0
mediana	26.5	.	2.0	2.7	3.3	13.0	.	4.0	32.2	12.5
3° quartile	32.6	.	3.4	5.4	3.3	24.0	.	6.0	41.2	20.0
N*	98	0	13	14	1	5	0	21	4	2
<i>dati mancanti</i>	87	0	3	2	1	1	0	15	2	5

* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

** Lasso di tempo tra il primo consumo della sostanza problematica e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

T16.1c Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2005), uomini e donne

Pazienti: principale sostanza problematica										
Uomini e donne	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Coacaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
Età all'epoca del primo consumo										
media	16.9	20.6	20.4	20.8	16.8	30.1	17.7	14.8	15.7	28.2
deviazione standard	4.7	7.8	5.7	6.4	1.3	8.3	0.6	2.3	4.2	7.7
1° quartile	15.0	15.0	17.0	17.0	16.5	25.0	17.0	13.0	13.5	21.0
mediana	16.0	17.0	19.0	19.0	17.0	30.5	18.0	15.0	15.0	29.0
3° quartile	18.0	25.0	23.0	23.0	17.5	36.0	18.0	16.0	18.0	33.0
N*	939	9	270	131	8	22	3	202	16	5
<i>dati mancanti</i>	1'135	1	91	50	4	9	1	115	4	26
Età all'inizio del consumo regolare										
media	23.4	22.6	21.9	21.8	18.7	30.5	18.0	16.1	16.7	30.2
deviazione standard	8.5	8.8	6.0	7.0	2.3	7.0	1.0	3.1	5.1	6.6
1° quartile	18.0	15.0	18.0	17.0	17.0	27.0	17.0	14.0	13.5	29.0
mediana	20.0	18.0	20.0	20.0	18.0	31.0	18.0	16.0	15.0	29.0
3° quartile	27.0	34.0	25.0	25.0	19.0	36.0	19.0	17.0	19.0	33.0
N*	941	7	243	120	6	21	3	193	12	5
<i>dati mancanti</i>	1'133	3	118	61	6	10	1	124	8	26
Età all'inizio del consumo problematico										
media	32.6	25.0	22.8	23.2	18.5	30.7	18.0	17.2	26.1	22.0
deviazione standard	10.9	8.6	6.5	7.9	1.2	10.6	.	4.2	16.3	.
1° quartile	24.0	18.0	18.0	19.0	18.0	20.0	18.0	15.0	13.5	22.0
mediana	31.0	21.5	21.0	22.0	18.0	32.0	18.0	16.0	20.5	22.0
3° quartile	40.0	34.0	25.0	27.0	20.0	38.0	18.0	18.0	34.0	22.0
N*	677	6	150	71	6	6	1	117	8	1
<i>dati mancanti</i>	1'397	4	211	110	6	25	3	200	12	30
Periodo di latenza (in anni)**										
media	25.6	9.7	7.5	5.8	5.5	14.1	6.7	5.4	17.6	9.0
deviazione standard	11.5	.	6.7	5.5	2.8	9.3	4.7	5.0	15.7	9.6
1° quartile	17.9	9.7	1.7	1.9	3.3	8.0	3.4	2.0	4.0	2.0
mediana	26.0	9.7	5.0	4.9	5.0	11.0	6.7	3.9	12.2	5.0
3° quartile	33.7	9.7	13.0	8.0	7.0	19.0	10.0	7.0	28.1	20.0
N*	421	1	47	59	7	9	2	145	10	3
<i>dati mancanti</i>	350	0	10	11	2	3	0	66	3	13

* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

** Lasso di tempo tra il primo consumo della sostanza problematica e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

T16.2a Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2005), uomini

Pazienti: problema principale			
<i>Uomini</i>	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
Età all'epoca della prima manifestazione			
media	31.2	.	29.7
deviazione standard	10.7	.	11.9
1° quartile	22.0	.	20.0
mediana	30.0	.	26.0
3° quartile	39.0	.	43.0
N*	22	0	3
<i>dati mancanti</i>	17	0	4
Età all'inizio della manifestazione regolare			
media	33.0	.	30.3
deviazione standard	10.3	.	11.4
1° quartile	27.0	.	21.0
mediana	34.5	.	27.0
3° quartile	39.0	.	43.0
N*	22	0	3
<i>dati mancanti</i>	17	0	4
Età all'inizio della manifestazione problematica			
media	35.7	.	25.0
deviazione standard	12.3	.	15.2
1° quartile	30.0	.	22.0
mediana	36.0	.	27.0
3° quartile	40.0	.	30.0
N*	21	0	5
<i>dati mancanti</i>	18	0	2
Periodo di latenza (in anni)**			
media	10.0	.	4.5
deviazione standard	8.1	.	0.5
1° quartile	3.5	.	4.0
mediana	6.2	.	4.7
3° quartile	14.9	.	4.9
N*	21	0	3
<i>dati mancanti</i>	18	0	4

* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

** Lasso di tempo tra la prima manifestazione del comportamento problematico e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

T16.2b Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2005), donne

Pazienti: problema principale			
Donne	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
Età all'epoca della prima manifestazione			
media	39.8	18.0	.
deviazione standard	17.0	8.6	.
1° quartile	26.5	15.0	.
mediana	42.5	16.0	.
3° quartile	53.0	16.0	.
N*	4	6	0
<i>dati mancanti</i>	7	4	2
Età all'inizio della manifestazione regolare			
media	44.8	17.0	.
deviazione standard	8.3	10.3	.
1° quartile	38.0	15.0	.
mediana	44.0	16.0	.
3° quartile	50.0	17.0	.
N*	5	6	0
<i>dati mancanti</i>	6	4	2
Età all'inizio della manifestazione problematica			
media	45.6	16.0	.
deviazione standard	7.4	0.8	.
1° quartile	40.0	15.5	.
mediana	44.0	16.0	.
3° quartile	50.0	16.5	.
N*	5	4	0
<i>dati mancanti</i>	6	6	2
Periodo di latenza (in anni)**			
media	8.3	7.9	.
deviazione standard	10.6	6.5	.
1° quartile	1.8	3.2	.
mediana	4.5	6.0	.
3° quartile	14.9	9.5	.
N*	4	6	0
<i>dati mancanti</i>	7	4	2

* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

** Lasso di tempo tra la prima manifestazione del comportamento problematico e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

T16.2c Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2005), uomini e donne

Pazienti: problema principale			
<i>Uomini e donne</i>	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
Età all'epoca della prima manifestazione			
media	32.5	18.0	29.7
deviazione standard	11.9	8.6	11.9
1° quartile	22.0	15.0	20.0
mediana	32.0	16.0	26.0
3° quartile	39.0	16.0	43.0
N*	26	6	3
<i>dati mancanti</i>	24	4	6
Età all'inizio della manifestazione regolare			
media	35.1	17.0	30.3
deviazione standard	10.9	10.3	11.4
1° quartile	27.0	15.0	21.0
mediana	36.0	16.0	27.0
3° quartile	44.0	17.0	43.0
N*	27	6	3
<i>dati mancanti</i>	23	4	6
Età all'inizio della manifestazione problematica			
media	37.6	16.0	25.0
deviazione standard	12.1	0.8	15.2
1° quartile	30.0	15.5	22.0
mediana	37.5	16.0	27.0
3° quartile	45.0	16.5	30.0
N*	26	4	5
<i>dati mancanti</i>	24	6	4
Periodo di latenza (in anni)**			
media	9.7	7.9	4.5
deviazione standard	8.3	6.5	0.5
1° quartile	3.1	3.2	4.0
mediana	6.0	6.0	4.7
3° quartile	14.9	9.5	4.9
N*	25	6	3
<i>dati mancanti</i>	25	4	6

* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

** Lasso di tempo tra la prima manifestazione del comportamento problematico e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

T17 Modo di amministrazione della principale sostanza problematica nel corso dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata (2005)

Pazienti: principale sostanza problematica															
	Eroina			Cocaina			Amfetamine			Canapa			Benzodiazepine		
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Modo di amministrazione*															
iniettato	27.6	34.2	29.1	13.0	13.3	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
fumato/inalato	40.9	39.5	40.6	23.2	26.7	23.8	0.0	0.0	0.0	96.9	100.0	97.3	0.0	0.0	0.0
ingerito /bevuto	0.8	0.0	0.6	0.0	6.7	1.2	25.0	0.0	25.0	3.1	0.0	2.7	80.0	87.5	84.6
sniffato	29.9	26.3	29.1	63.8	53.3	61.9	75.0	0.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
altro	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	12.5	15.4
N**	127	38	165	69	15	84	4	0	4	128	20	148	5	8	13
<i>dati mancanti</i>	136	45	181	62	34	96	0	1	1	130	39	169	9	8	17

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T18 Prevalenza delle iniezioni a vita, nel corso dei 30 ultimi giorni e dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata, scambio di materiale d'iniezione nel corso dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata e età all'epoca della prima iniezione, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2005)

	Pazienti: principale sostanza problematica												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Iniezioni nel corso della vita*																
sì	5.3	5.1	5.3	64.6	64.9	64.7	32.2	35.7	33.1	4.0	14.7	5.8	14.6	14.0	14.5	302
no	94.7	94.9	94.7	35.4	35.1	35.3	67.8	64.3	66.9	96.0	85.3	94.2	85.4	86.0	85.5	1'784
N**	977	371	1'348	195	57	252	90	28	118	174	34	208	1'537	549	2'086	2'086
<i>dati mancanti</i>	507	219	726	88	31	119	42	21	63	84	25	109	798	335	1'133	1'133
Iniezioni nel corso dei 6 ultimi mesi*																
sì	1.2	0.5	1.0	35.3	40.7	36.6	17.6	20.0	18.2	1.1	6.3	1.9	6.1	6.1	6.1	125
no	98.8	99.5	99.0	64.7	59.3	63.4	82.4	80.0	81.8	98.9	93.8	98.1	93.9	93.9	93.9	1'917
N**	976	371	1'347	170	54	224	85	25	110	174	32	206	1'503	539	2'042	2'042
<i>dati mancanti</i>	508	219	727	113	34	147	47	24	71	84	27	111	832	345	1'177	1'177
Iniezioni nel corso dei 30 ultimi giorni*																
sì	0.7	0.5	0.7	32.6	34.8	33.1	11.5	15.4	12.5	0.0	2.9	0.5	4.3	4.7	4.4	87
no	99.3	99.5	99.3	67.4	65.2	66.9	88.5	84.6	87.5	100.0	97.1	99.5	95.7	95.3	95.6	1'876
N**	954	365	1'319	135	46	181	78	26	104	170	34	204	1'434	529	1'963	1'963
<i>dati mancanti</i>	530	225	755	148	42	190	54	23	77	88	25	113	901	355	1'256	1'256
Scambio di materiale d'iniezione nel corso dei 6 ultimi mesi***																
sì	0.0	0.0	0.0	28.9	8.3	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	5.6	15.8	12
no	100.0	100.0	100.0	71.1	91.7	76.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	81.0	94.4	84.2	64
N**	7	1	8	38	12	50	9	3	12	2	1	3	58	18	76	76
<i>dati mancanti</i>	1	0	1	21	10	31	3	2	5	0	0	0	25	12	37	37
Età all'epoca della prima iniezione****																
fino a 14 anni	3.8	0.0	2.9	4.9	11.5	6.5	4.8	28.6	10.7	16.7	25.0	20.0	5.0	14.3	7.4	14
da 15 a 16 anni	11.5	0.0	8.8	12.2	7.7	11.1	9.5	0.0	7.1	16.7	25.0	20.0	11.4	6.1	10.1	19
da 17 a 18 anni	26.9	12.5	23.5	18.3	26.9	20.4	19.0	42.9	25.0	0.0	0.0	0.0	19.3	24.5	20.6	39
da 19 a 20 anni	23.1	0.0	17.6	15.9	11.5	14.8	28.6	0.0	21.4	33.3	25.0	30.0	20.7	12.2	18.5	35
da 21 a 25 anni	11.5	12.5	11.8	25.6	34.6	27.8	33.3	14.3	28.6	16.7	25.0	20.0	23.6	24.5	23.8	45
da 26 a 30 anni	15.4	50.0	23.5	17.1	3.8	13.9	4.8	14.3	7.1	16.7	0.0	10.0	15.0	12.2	14.3	27
da 31 a 39 anni	7.7	25.0	11.8	4.9	3.8	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	6.1	4.8	9
dai 40 anni in su	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	1
N**	26	8	34	82	26	108	21	7	28	6	4	10	140	49	189	189
<i>dati mancanti</i>	26	11	37	44	11	55	8	3	11	1	1	2	85	28	113	113

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che si sono iniettati una sostanza illegale nel corso dei 6 ultimi mesi. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

**** I risultati si basano solamente sui clienti che si sono iniettati una sostanza illegale nel corso della loro vita. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T19.1a Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2005), uomini

Uomini

	Pazienti: principale sostanza problematica									
	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Altri problemi*										
alcol		33.3	28.1	41.0	0.0	15.4	50.0	21.9	42.9	42.9
cocktail (eroina e cocaina)	0.4		7.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
eroina	1.8	16.7	1.6	27.0	0.0	23.1	25.0	3.0	0.0	0.0
metadone	1.3	66.7	34.4	10.7	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0
altri oppiacei	0.1	0.0	4.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
cocaina	4.7	33.3	51.4	0.0	22.2	15.4	0.0	11.0	14.3	0.0
crack, freebase	0.1	33.3	2.0	4.9	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
amfetamine	0.6	16.7	2.0	11.5	22.2	0.0	0.0	1.3	0.0	7.1
MDMA e affini (ecstasy)	0.3	0.0	3.2	21.3	11.1	7.7	50.0	4.6	14.3	0.0
altri stimolanti	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
barbiturici	0.3	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazepine	4.1	50.0	23.7	12.3	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0
altri sonniferi e tranquillanti	0.8	0.0	3.6	3.3	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.1	0.0	3.6	6.6	33.3	7.7	0.0	2.1	0.0	0.0
altri allucinogeni	0.2	16.7	1.2	1.6	0.0	0.0	25.0	0.8	0.0	0.0
sostanze volatili (per es., solventi)	0.1	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0
canapa	10.0	66.7	41.1	49.2	44.4	0.0	75.0		28.6	21.4
tabacco	31.6	33.3	48.2	45.1	33.3	30.8	25.0	32.1		7.1
altra/e sostanza/e	0.6	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	25.0	0.8	0.0	
gioco patologico	0.3	0.0	0.4	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
disturbi alimentari	0.3	0.0	0.0	0.8	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
altri problemi assimilabili a una dipendenza	0.1	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0
nessun altro problema di dipendenza	57.9	0.0	13.0	15.6	11.1	46.2	0.0	48.9	42.9	42.9
N**	1'146	6	253	122	9	13	4	237	7	14
<i>dati mancanti</i>	338	1	23	10	0	1	0	21	2	0

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T19.1b Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2005), donne

Donne

	Pazienti: principale sostanza problematica									
	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Altri problemi*										
alcol		66.7	28.9	31.3	0.0	37.5	0.0	22.6	0.0	18.8
cocktail (eroina e cocaina)	0.5		6.6	4.2	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0
eroina	2.6	0.0	0.0	33.3	0.0	18.8	0.0	5.7	0.0	6.3
metadone	1.4	66.7	27.6	20.8	0.0	18.8	0.0	0.0	0.0	6.3
altri oppiacei	0.9	0.0	1.3	6.3	0.0	6.3	0.0	1.9	0.0	0.0
cocaina	4.0	0.0	43.4	0.0	0.0	18.8	0.0	7.5	0.0	6.3
crack, freebase	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amfetamine	0.7	0.0	2.6	8.3	33.3	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0
MDMA e affini (ecstasy)	1.2	0.0	6.6	20.8	0.0	0.0	0.0	11.3	0.0	0.0
altri stimolanti	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
barbiturici	0.2	0.0	0.0	2.1	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazepine	7.2	0.0	18.4	20.8	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	0.0
altri sonniferi e tranquillanti	1.4	0.0	3.9	2.1	0.0	6.3	0.0	1.9	0.0	0.0
LSD	0.7	0.0	2.6	10.4	33.3	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0
altri allucinogeni	0.0	0.0	1.3	0.0	33.3	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0
sostanze volatili (per es., solventi)	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
canapa	5.8	0.0	35.5	43.8	66.7	12.5	0.0		0.0	18.8
tabacco	30.4	33.3	42.1	20.8	0.0	31.3	0.0	24.5		0.0
altra/e sostanza/e	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	
gioco patologico	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
disturbi alimentari	2.1	0.0	3.9	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	6.3
altri problemi assimilabili a una dipendenza	0.5	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
nessun altro problema di dipendenza	57.2	0.0	22.4	20.8	33.3	31.3	0.0	49.1	88.9	56.3
N**	428	3	76	48	3	16	0	53	9	16
<i>dati mancanti</i>	<i>162</i>	<i>0</i>	<i>9</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>6</i>	<i>2</i>	<i>1</i>

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T19.1c Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2005), uomini e donne

Uomini e donne

	Pazienti: principale sostanza problematica									
	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Altri problemi*										
alcol		44.4	28.3	38.2	0.0	27.6	50.0	22.1	18.8	30.0
cocktail (eroina e cocaina)	0.4		7.0	4.1	0.0	3.4	0.0	0.3	0.0	0.0
eroina	2.0	11.1	1.2	28.8	0.0	20.7	25.0	3.4	0.0	3.3
metadone	1.3	66.7	32.8	13.5	0.0	17.2	0.0	0.0	0.0	3.3
altri oppiacei	0.3	0.0	3.3	2.9	0.0	3.4	0.0	0.7	0.0	0.0
cocaina	4.5	22.2	49.5	0.0	16.7	17.2	0.0	10.3	6.3	3.3
crack, freebase	0.1	22.2	1.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
amfetamine	0.6	11.1	2.1	10.6	25.0	0.0	0.0	1.4	0.0	3.3
MDMA e affini (ecstasy)	0.6	0.0	4.0	21.2	8.3	3.4	50.0	5.9	6.3	0.0
altri stimolanti	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
barbiturici	0.3	0.0	0.6	1.2	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazepine	5.0	33.3	22.5	14.7	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0
altri sonniferi e tranquillanti	1.0	0.0	3.6	2.9	0.0	6.9	0.0	0.3	0.0	0.0
LSD	0.3	0.0	3.3	7.6	33.3	3.4	0.0	2.4	0.0	0.0
altri allucinogeni	0.1	11.1	1.2	1.2	8.3	0.0	25.0	1.0	0.0	0.0
sostanze volatili (per es., solventi)	0.1	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0
canapa	8.9	44.4	39.8	47.6	50.0	6.9	75.0		12.5	20.0
tabacco	31.3	33.3	46.8	38.2	25.0	31.0	25.0	30.7		3.3
altra/e sostanza/e	0.8	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	25.0	1.0	0.0	
gioco patologico	0.4	0.0	0.3	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
disturbi alimentari	0.9	0.0	0.9	2.4	8.3	0.0	0.0	0.0	6.3	3.3
altri problemi assimilabili a una dipendenza	0.3	0.0	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0
nessun altro problema di dipendenza	57.8	0.0	15.2	17.1	16.7	37.9	0.0	49.0	68.8	50.0
N**	1'574	9	329	170	12	29	4	290	16	30
<i>dati mancanti</i>	500	1	32	11	0	2	0	27	4	1

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T19.2a Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2005), uomini

Uomini

Pazienti: problema principale			
	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
	%	%	%
Altri problemi*			
alcol	6.3	0.0	25.0
cocktail (eroina e cocaina)	0.0	0.0	0.0
eroina	0.0	0.0	0.0
metadone	0.0	0.0	0.0
altri oppiacei	0.0	0.0	0.0
cocaina	6.3	0.0	0.0
crack, freebase	0.0	0.0	0.0
amfetamine	0.0	0.0	0.0
MDMA e affini (ecstasy)	0.0	0.0	0.0
altri stimolanti	0.0	0.0	0.0
barbiturici	0.0	0.0	0.0
benzodiazepine	0.0	0.0	0.0
altri sonniferi e tranquillanti	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0
altri allucinogeni	0.0	0.0	0.0
sostanze volatili (per es., solventi)	0.0	0.0	0.0
canapa	3.1	0.0	25.0
tabacco	18.8	0.0	50.0
altra/e sostanza/e	6.3	0.0	0.0
gioco patologico		0.0	0.0
disturbi alimentari	0.0		0.0
altri problemi assimilabili a una dipendenza	0.0	0.0	
nessun altro problema di dipendenza	68.8	0.0	50.0
N**	32	0	4
<i>dati mancanti</i>	7	0	3

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T19.2b Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2005), donne

Donne

Pazienti: problema principale			
	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
	%	%	%
Altri problemi*			
alcol	0.0	0.0	0.0
cocktail (eroina e cocaina)	0.0	0.0	0.0
eroina	0.0	0.0	0.0
metadone	0.0	0.0	0.0
altri oppiacei	0.0	0.0	0.0
cocaina	0.0	0.0	0.0
crack, freebase	0.0	0.0	0.0
amfetamine	0.0	0.0	0.0
MDMA e affini (ecstasy)	0.0	0.0	0.0
altri stimolanti	0.0	0.0	0.0
barbiturici	0.0	0.0	0.0
benzodiazepine	0.0	0.0	0.0
altri sonniferi e tranquillanti	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0
altri allucinogeni	0.0	0.0	0.0
sostanze volatili (per es., solventi)	0.0	0.0	0.0
canapa	0.0	0.0	0.0
tabacco	0.0	0.0	0.0
altra/e sostanza/e	0.0	0.0	0.0
gioco patologico		0.0	0.0
disturbi alimentari	0.0		0.0
altri problemi assimilabili a una dipendenza	0.0	0.0	
nessun altro problema di dipendenza	100.0	100.0	100.0
N**	10	5	2
<i>dati mancanti</i>	1	5	0

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T19.2c Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2005), uomini e donne

Uomini e donne

Pazienti: problema principale			
	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
	%	%	%
Altri problemi*			
alcol	4.8	0.0	16.7
cocktail (eroina e cocaina)	0.0	0.0	0.0
eroina	0.0	0.0	0.0
metadone	0.0	0.0	0.0
altri oppiacei	0.0	0.0	0.0
cocaina	4.8	0.0	0.0
crack, freebase	0.0	0.0	0.0
amfetamine	0.0	0.0	0.0
MDMA e affini (ecstasy)	0.0	0.0	0.0
altri stimolanti	0.0	0.0	0.0
barbiturici	0.0	0.0	0.0
benzodiazepine	0.0	0.0	0.0
altri sonniferi e tranquillanti	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0
altri allucinogeni	0.0	0.0	0.0
sostanze volatili (per es., solventi)	0.0	0.0	0.0
canapa	2.4	0.0	16.7
tabacco	14.3	0.0	33.3
altra/e sostanza/e	4.8	0.0	0.0
gioco patologico		0.0	0.0
disturbi alimentari	0.0		0.0
altri problemi assimilabili a una dipendenza	0.0	0.0	
nessun altro problema di dipendenza	76.2	100.0	66.7
N**	42	5	6
<i>dati mancanti</i>	8	5	3

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T20 Frequenza del consumo di alcol, numero di "bicchieri standard" al giorno e frequenza di forti consumi di alcol prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2005)

	Pazienti: problema principale												Tutti i pazienti			N
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Frequenza del consumo di alcol*																
mai	11.0	8.9	10.4	21.6	28.6	22.9	4.6	7.7	5.1	14.6	12.5	14.3	12.7	11.0	12.3	180
1 volta al mese o meno	3.5	3.6	3.5	18.1	17.9	18.1	13.8	15.4	14.1	28.1	18.8	26.8	8.6	6.8	8.1	119
2 a 4 volte al mese	7.1	7.3	7.2	22.4	10.7	20.1	26.2	23.1	25.6	38.5	31.3	37.5	13.1	9.4	12.2	178
2 a 3 volte alla settimana	17.9	18.8	18.2	14.7	32.1	18.1	24.6	30.8	25.6	17.7	31.3	19.6	17.7	20.2	18.4	269
4 volte alla settimana o più	60.4	61.4	60.7	23.3	10.7	20.8	30.8	23.1	29.5	1.0	6.3	1.8	47.9	52.5	49.1	719
N**	770	303	1'073	116	28	144	65	13	78	96	16	112	1'084	381	1'465	1'465
<i>dati mancanti</i>	714	287	1'001	167	60	227	67	36	103	162	43	205	1'251	503	1'754	1'754
Numero di "bicchieri standard" al giorno***																
1 o 2	8.8	5.5	7.9	53.8	47.4	52.5	30.9	41.7	32.8	52.4	75.0	56.0	19.3	14.5	18.0	209
3 o 4	19.7	19.3	19.6	25.0	26.3	25.3	40.0	16.7	35.8	25.4	8.3	22.7	21.8	18.7	21.0	243
5 o 6	17.0	22.0	18.5	10.0	10.5	10.1	14.5	16.7	14.9	12.7	8.3	12.0	15.8	19.7	16.8	195
7 o 9	20.7	24.8	21.9	6.3	10.5	7.1	9.1	16.7	10.4	4.8	8.3	5.3	16.9	22.3	18.3	212
10 o più	33.8	28.3	32.2	5.0	5.3	5.1	5.5	8.3	6.0	4.8	0.0	4.0	26.2	24.8	25.8	299
N**	624	254	878	80	19	99	55	12	67	63	12	75	848	310	1'158	1'158
<i>dati mancanti</i>	860	336	1'196	203	69	272	77	37	114	195	47	242	1'487	574	2'061	2'061
Frequenza di forti consumi di alcol***																
mai	10.3	7.3	9.5	47.2	40.9	45.9	23.2	33.3	25.0	43.6	53.8	45.1	20.4	14.6	18.9	222
meno di una volta al mese	9.4	9.7	9.5	22.5	27.3	23.4	30.4	16.7	27.9	35.9	30.8	35.2	14.6	12.6	14.1	166
1 volta al mese	13.1	11.3	12.6	9.0	9.1	9.0	21.4	8.3	19.1	16.7	0.0	14.3	13.4	10.4	12.6	148
1 volta alla settimana	24.6	24.3	24.5	9.0	13.6	9.9	12.5	25.0	14.7	3.8	15.4	5.5	19.6	22.0	20.2	238
quasi ogni giorno	42.5	47.4	43.9	12.4	9.1	11.7	12.5	16.7	13.2	0.0	0.0	0.0	32.0	40.5	34.2	403
N**	609	247	856	89	22	111	56	12	68	78	13	91	868	309	1'177	1'177
<i>dati mancanti</i>	875	343	1'218	194	66	260	76	37	113	180	46	226	1'467	575	2'042	2'042

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che hanno indicato un consumo d'alcol. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T21 Frequenza del consumo di tabacco e numero di sigarette al giorno nel corso dei 30 ultimi giorni prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2005)

	Pazienti: problema principale												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Frequenza del consumo di tabacco*																
mai	24.2	28.2	25.3	3.2	6.3	3.8	7.5	11.1	7.9	14.7	0.0	13.2	18.7	23.8	20.0	228
1 giorno alla settimana o meno	0.9	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.3	2.0	0.0	1.8	0.9	0.7	0.9	10
2 a 3 giorni alla settimana	2.3	1.9	2.1	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.6	1.9	1.4	1.8	20
4 a 6 giorni alla settimana	0.9	0.9	0.9	0.0	3.1	0.6	1.5	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.7	1.1	0.8	9
1 volta al giorno	1.3	0.5	1.1	0.8	0.0	0.6	0.0	11.1	1.3	3.9	0.0	3.5	1.4	0.7	1.2	14
più volte al giorno	70.4	67.6	69.6	95.2	90.6	94.3	89.6	77.8	88.2	76.5	100.0	78.9	76.4	72.3	75.4	861
N**	533	213	746	125	32	157	67	9	76	102	12	114	860	282	1'142	1'142
<i>dati mancanti</i>	951	377	1'328	158	56	214	65	40	105	156	47	203	1'475	602	2'077	2'077
Numero di sigarette al giorno***																
0 a 10	11.7	14.3	12.3	4.7	7.7	5.3	10.4	14.3	10.9	36.9	66.7	40.5	13.2	16.3	13.9	105
11 a 20	40.2	38.7	39.8	50.9	34.6	47.7	52.1	42.9	50.9	38.5	0.0	33.8	42.7	34.9	40.9	309
21 a 30	26.8	31.1	27.9	31.1	38.5	32.6	31.3	42.9	32.7	24.6	33.3	25.7	28.3	33.1	29.4	222
31 o più	21.3	16.0	19.9	13.2	19.2	14.4	6.3	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	15.8	15.7	15.8	119
N**	343	119	462	106	26	132	48	7	55	65	9	74	583	172	755	755
<i>dati mancanti</i>	61	34	95	15	4	19	14	1	15	22	3	25	116	43	159	159

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che hanno indicato un consumo di tabacco. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T22a Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2005), uomini

Pazienti: principale sostanza problematica										
	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Obiettivo di consumo*										
astinenza definitiva	38.1	80.0	72.5	77.4	85.7	41.7	100.0	51.8	25.0	60.0
astinenza limitata nel tempo	21.9	0.0	1.8	5.4	14.3	0.0	0.0	7.8	12.5	0.0
consumo controllato	23.5	20.0	9.5	9.7	0.0	33.3	0.0	24.1	25.0	40.0
non è prevista nessuna limitazione	1.7	0.0	1.4	1.1	0.0	8.3	0.0	3.6	25.0	0.0
nessuna decisione finora	14.7	0.0	14.0	6.5	0.0	16.7	0.0	12.0	12.5	0.0
altro	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
N*	944	5	222	93	7	12	3	166	8	5
<i>dati mancanti</i>	540	2	54	39	2	2	1	92	1	9

T22b Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2005), donne

Obiettivo di consumo*										
astinenza definitiva	38.5	50.0	79.3	59.4	100.0	61.5	0.0	41.2	80.0	75.0
astinenza limitata nel tempo	16.4	0.0	1.7	9.4	0.0	7.7	0.0	8.8	0.0	0.0
consumo controllato	26.7	0.0	3.4	18.8	0.0	23.1	0.0	23.5	0.0	0.0
non è prevista nessuna limitazione	0.9	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	10.0	0.0
nessuna decisione finora	17.0	50.0	12.1	12.5	0.0	7.7	0.0	20.6	10.0	25.0
altro	0.6	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N*	348	2	58	32	1	13	0	34	10	4
<i>dati mancanti</i>	242	1	27	17	2	4	0	25	1	13

T22c Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2005), uomini e donne

Obiettivo di consumo*										
astinenza definitiva	38.2	71.4	73.9	72.8	87.5	52.0	100.0	50.0	55.6	66.7
astinenza limitata nel tempo	20.4	0.0	1.8	6.4	12.5	4.0	0.0	8.0	5.6	0.0
consumo controllato	24.4	14.3	8.2	12.0	0.0	28.0	0.0	24.0	11.1	22.2
non è prevista nessuna limitazione	1.5	0.0	1.4	0.8	0.0	4.0	0.0	4.0	16.7	0.0
nessuna decisione finora	15.3	14.3	13.6	8.0	0.0	12.0	0.0	13.5	11.1	11.1
altro	0.2	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
N*	1'292	7	280	125	8	25	3	200	18	9
<i>dati mancanti</i>	782	3	81	56	4	6	1	117	2	22

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T23 Sesso e età dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale¹) e dei parenti o conoscenti (2005)

	Pazienti: problema principale ¹												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Sesso*																			
maschile			67.0			63.2			72.6			76.7			21.4			57.7	1'857
femminile			27.0			29.1			22.6			15.7			77.4			35.2	1'132
sesso non noto			6.0			7.6			4.7			7.6			1.2			7.1	228
N**	972	391	1'450	141	65	223	77	24	106	181	37	236	104	377	487	1'857	1'132	3'217	3'217
Età (in anni)*																			
fino a 14 anni	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	3.7	2.0	0.5	0.9	0.7	0.5	0.6	19
15-19	0.9	1.3	1.0	1.4	12.7	4.9	5.2	20.8	8.9	57.5	62.9	58.4	5.1	2.2	2.8	7.7	5.2	6.7	199
20-24	3.7	2.8	3.5	16.3	20.6	17.6	24.7	25.0	24.8	15.6	5.7	14.0	3.0	4.4	4.1	6.9	5.9	6.6	194
25-29	6.8	4.4	6.1	17.7	22.2	19.1	15.6	20.8	16.8	8.9	8.6	8.9	11.1	6.3	7.3	8.7	7.8	8.4	247
30-34	9.7	8.5	9.4	24.1	17.5	22.1	16.9	8.3	14.9	8.4	5.7	7.9	6.1	9.6	8.8	11.1	9.4	10.5	310
35-39	13.8	12.4	13.4	23.4	17.5	21.6	23.4	12.5	20.8	3.9	5.7	4.2	11.1	10.7	10.8	14.0	11.8	13.2	389
40-44	16.0	15.7	15.9	12.8	4.8	10.3	6.5	12.5	7.9	0.0	5.7	0.9	14.1	18.3	17.4	13.5	14.7	13.9	412
45-49	16.6	16.2	16.5	2.1	3.2	2.5	7.8	0.0	5.9	0.6	5.7	1.4	13.1	14.8	14.4	12.7	13.7	13.1	386
50-54	12.7	15.5	13.5	0.7	1.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	12.6	12.7	9.5	11.9	10.4	308
55-59	10.6	9.8	10.4	1.4	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	4.0	10.1	8.8	7.4	8.5	7.8	231
60-64	4.7	7.7	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	5.2	5.6	4.0	6.0	4.8	141
65-69	2.3	3.6	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	3.6	4.1	2.1	2.9	2.4	71
70-74	1.3	1.5	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.1	1.3	1.2	1.3	1.3	37
75 e più	0.6	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.8	1.1	0.4	0.4	0.4	12
N**	969	388	1'357	141	63	204	77	24	101	179	35	214	99	366	465	1'843	1'113	2'956	2'956
<i>dati mancanti</i>	3	3	93	0	2	19	0	0	5	2	2	22	5	11	22	14	19	261	261
Età																			
media	44.7	46.3	45.1	33.0	29.4	31.9	31.6	27.6	30.6	21.2	23.9	21.7	43.8	44.6	44.4	40.4	42.8	41.3	
deviazione standard	11.8	11.9	11.8	7.5	8.3	7.9	8.4	9.0	8.7	6.8	10.2	7.5	15.4	12.5	13.2	13.7	13.5	13.7	
1° quartile	36.6	38.4	37.1	28.1	22.6	26.0	24.3	20.4	23.4	16.8	16.8	16.8	32.3	36.1	35.7	30.5	33.2	31.4	
mediana	44.6	46.0	45.1	33.0	28.0	31.9	31.9	26.3	29.9	18.8	18.2	18.6	43.9	44.6	44.4	40.3	43.7	41.5	
3° quartile	52.9	54.2	53.3	37.8	35.5	37.0	37.3	35.5	37.3	24.2	28.9	24.5	53.0	53.2	53.0	49.9	52.1	50.7	
N**	969	388	1'357	141	63	204	77	24	101	179	35	214	99	366	465	1'843	1'113	2'956	
<i>dati mancanti</i>	3	3	93	0	2	19	0	0	5	2	2	22	5	11	22	14	19	261	

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T24 Stato civile e grado di urbanizzazione del domicilio dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale¹) e dei parenti o conoscenti (2005)

	Pazienti: problema principale ¹												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Stato civile*																			
celibe/nubile	35.2	27.1	32.5	69.2	53.4	65.5	67.1	77.3	71.1	95.1	78.1	91.5	31.8	19.2	22.0	46.4	30.2	41.2	1'178
sposato	32.5	33.9	33.2	13.1	20.7	14.8	18.6	13.6	16.5	3.7	3.1	4.2	49.4	56.5	55.0	29.0	38.4	32.0	916
separato-a (giuridicamente)	6.3	6.0	6.4	1.5	3.4	2.5	5.7	4.5	5.2	0.0	12.5	2.4	4.7	5.4	5.4	4.7	5.6	5.3	152
divorziato-a	24.8	24.8	24.7	14.6	17.2	14.8	7.1	4.5	6.2	1.2	6.3	1.9	14.1	15.0	14.6	18.7	20.1	18.7	534
vedovo-a	1.0	8.3	3.1	0.0	1.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	2.5	0.8	5.0	2.4	68
unione registrata	0.2	0.0	0.2	1.5	3.4	2.0	1.4	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	0.3	0.7	0.4	12
N**	862	351	1'290	130	58	203	70	22	97	162	32	212	85	313	404	1'659	995	2'860	2'860
<i>dati mancanti</i>	110	40	160	11	7	20	7	2	9	19	5	24	19	64	83	198	137	357	357
Grado di urbanizzazione*																			
grandi centri urbani	21.1	22.9	21.6	0.0	3.8	1.2	2.9	4.5	3.3	0.0	0.0	0.0	19.6	20.4	20.2	14.3	17.0	15.3	402
periferia dei grandi centri	16.7	21.1	17.9	10.8	9.4	10.4	8.8	4.5	7.8	5.6	0.0	4.6	20.7	20.1	20.2	17.4	19.5	18.2	476
città di media importanza	8.9	7.5	8.5	38.3	26.4	34.7	27.9	22.7	26.7	12.3	5.7	11.2	9.8	13.4	12.6	15.0	14.1	14.6	383
piccole città	28.8	27.1	28.3	25.8	32.1	27.7	30.9	40.9	33.3	33.3	40.0	34.5	29.3	24.8	25.7	27.6	26.7	27.3	714
campagna	24.6	21.4	23.7	25.0	28.3	26.0	29.4	27.3	28.9	48.8	54.3	49.7	20.7	21.3	21.1	25.8	22.8	24.6	645
N**	834	332	1'166	120	53	173	68	22	90	162	35	197	92	343	435	1'618	1'001	2'620	2'620
<i>dati mancanti</i>	138	59	284	21	12	50	9	2	16	19	2	39	12	34	52	239	131	597	597

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T25 Tipo di nucleo familiare, situazione di domicilio e tipo di relazione di coppia dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale¹) e dei parenti o conoscenti (2005)

	Pazienti: problema principale ¹												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			N
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Tipo di nucleo familiare*																			
da solo-a	39.2	30.7	37.1	35.4	31.1	32.9	39.0	14.3	31.8	12.8	11.8	13.5	25.9	11.3	14.3	34.7	22.8	30.5	695
con i genitori/un genitore	9.1	2.8	7.2	14.2	11.1	13.5	16.9	33.3	21.2	62.8	55.9	60.5	3.4	7.0	6.5	16.7	8.9	14.0	318
con figlio-a-i	1.6	12.2	4.4	0.9	8.9	2.9	1.7	9.5	3.5	0.0	8.8	1.5	1.7	15.2	12.6	1.4	13.0	5.5	125
con un-a partner (senza figli)	25.4	31.1	26.5	16.8	22.2	17.6	11.9	28.6	16.5	3.2	5.9	4.0	19.0	22.2	21.4	20.7	25.4	21.9	498
con un-a partner e figlio-a-i	18.7	15.7	18.5	10.6	13.3	11.2	10.2	0.0	7.1	3.8	2.9	3.5	41.4	41.3	41.2	16.9	23.3	19.4	441
con altri parenti-familiari	0.6	2.0	1.0	6.2	4.4	5.9	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	4.0	1.7	1.7	1.7	1.9	1.7	1.9	43
con amici (comunità abitativa)	1.9	1.6	1.6	8.0	4.4	7.1	5.1	0.0	4.7	3.8	0.0	3.0	6.9	0.9	2.0	2.9	1.3	2.3	52
altro	3.6	3.9	3.6	8.0	4.4	8.8	15.3	14.3	15.3	8.3	14.7	10.0	0.0	0.4	0.3	4.8	3.5	4.7	106
N**	638	254	971	113	45	170	59	21	85	156	34	200	58	230	294	1'324	763	2'278	2'278
<i>dati mancanti</i>	334	137	479	28	20	53	18	3	21	25	3	36	46	147	193	533	369	939	939
Situazione di domicilio*																			
domicilio fisso	94.7	94.9	95.2	82.2	85.4	82.1	78.3	85.7	79.1	91.7	81.8	89.3	98.6	99.3	99.2	93.0	95.0	93.6	2'313
senza domicilio fisso	3.0	2.9	2.7	10.2	12.5	10.1	10.0	9.5	9.3	1.3	3.0	1.5	1.4	0.4	0.6	3.5	3.3	3.2	80
istituzione	2.3	2.2	2.1	7.6	2.1	7.8	11.7	4.8	11.6	7.1	15.2	9.3	0.0	0.4	0.3	3.5	1.7	3.2	79
N**	702	277	1'061	118	48	179	60	21	86	156	33	205	74	281	361	1'422	841	2'472	2'472
<i>dati mancanti</i>	270	114	389	23	17	44	17	3	20	25	4	31	30	96	126	435	291	745	745
Tipo di relazione di coppia*																			
senza partner, sola-a	34.3	32.5	32.6	47.9	21.6	41.7	42.9	64.3	47.5	71.3	66.7	69.8	9.3	17.7	16.2	38.1	28.5	35.1	604
relazione-i saltuaria-e	7.4	7.3	7.7	6.3	10.8	7.6	14.3	0.0	9.8	9.2	20.0	11.2	7.0	1.1	2.6	7.2	6.6	7.3	125
relazione fissa, vivendo separat.	12.4	14.1	13.0	14.6	18.9	15.3	21.4	14.3	21.3	10.3	6.7	9.5	14.0	11.3	12.3	12.5	12.3	12.3	211
relazione fissa, vivendo insieme	46.0	46.1	46.7	31.3	48.6	35.4	21.4	21.4	21.3	9.2	6.7	9.5	69.8	69.9	68.9	42.1	52.7	45.4	782
N**	461	191	705	96	37	144	42	14	61	87	15	116	43	186	235	968	594	1'722	1'722
<i>dati mancanti</i>	511	200	745	45	28	79	35	10	45	94	22	120	61	191	252	889	538	1'495	1'495

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

**T26 Più alta formazione portata a termine, fonte di reddito principale e attività principale dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale)
e dei parenti o conoscenti (2005)**

	Pazienti: problema principale ¹												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Più alta formazione portata a termine**																			
nessuna form. terminata	4.1	4.3	4.1	10.5	20.0	13.0	5.1	0.0	3.9	24.8	20.0	24.1	2.0	5.1	4.4	7.2	5.9	6.8	124
scuola dell'obbligo	13.5	25.6	16.8	23.7	40.0	27.9	25.4	41.2	28.9	45.4	56.0	47.0	9.8	18.6	16.7	19.7	26.0	21.9	398
scolarità complementare	1.6	6.2	2.8	2.6	0.0	1.9	3.4	0.0	2.6	2.8	4.0	3.0	2.0	1.7	1.8	2.4	4.0	3.0	54
apprendistato/ scuola profes.	62.9	53.6	60.4	57.0	37.5	51.9	59.3	52.9	57.9	23.4	16.0	22.3	51.0	49.2	49.6	55.4	49.3	53.2	967
liceo/diploma	3.5	4.3	3.7	1.8	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	2.1	4.0	2.4	2.0	5.6	4.8	2.9	4.3	3.4	62
magistrale, scuola pedagogic.	0.2	1.9	0.6	0.9	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.7	1.8	0.3	2.1	0.9	16
form. profession. superiore	7.6	1.9	6.1	2.6	2.5	2.6	5.1	0.0	3.9	0.7	0.0	0.6	9.8	9.6	9.6	5.9	3.8	5.2	94
scuola profession. superiore	0.9	0.0	0.6	0.9	0.0	0.6	1.7	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	7.8	2.8	3.9	1.3	1.1	1.2	22
alta scuola specializzata	0.7	0.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	1.1	2.2	0.8	1.0	0.8	15
università, politecnico	5.0	1.9	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	1.3	0.7	0.0	0.6	7.8	4.5	5.3	4.1	2.6	3.6	65
N**	564	211	775	114	40	154	59	17	76	141	25	166	51	177	228	1'188	627	1'817	1'817
<i>dati mancanti</i>	408	180	675	27	25	69	18	7	30	40	12	70	53	200	259	669	505	1'400	1'400
Fonte di reddito principale*																			
reddito da lavoro	55.8	33.9	50.5	34.8	23.4	30.5	48.0	35.3	43.5	32.0	24.1	30.2	73.8	58.6	61.7	52.5	42.2	48.7	1'098
risparmi	1.3	0.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.2	1.3	0.7	0.5	0.6	14
rendita (AVS/AI, ecc.)	18.6	25.7	20.4	17.0	23.4	18.3	12.0	17.6	13.0	10.2	6.9	9.5	15.4	9.2	10.4	17.0	19.3	17.6	398
assistenza/previdenza sociale	13.5	10.5	12.3	31.3	38.3	33.5	26.0	17.6	26.1	4.8	13.8	6.7	1.5	1.2	1.3	13.4	9.9	12.5	281
assicurazione disoccupazione	8.4	7.4	8.4	10.7	4.3	9.1	8.0	5.9	7.2	7.5	6.9	7.3	3.1	2.0	2.2	7.9	4.8	6.9	155
sostegno del/della partner	0.7	18.7	5.4	0.9	4.3	2.4	0.0	5.9	1.4	0.0	3.4	1.7	0.0	24.1	19.0	0.4	16.8	6.4	144
sosteg. genitori/familiari/amici	1.0	2.3	1.3	2.7	6.4	3.7	4.0	17.6	7.2	44.9	44.8	44.1	4.6	3.6	4.1	7.1	5.7	6.4	144
spacciando/tagliando	0.1	0.0	0.1	0.9	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	2
altre entrate illegali	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
prostituzione	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
altra-e	0.4	1.2	0.7	1.8	0.0	1.8	2.0	0.0	1.4	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.7	0.6	0.8	18
N**	676	257	1'002	112	47	164	50	17	69	147	29	179	65	249	316	1'349	784	2'255	2'255
<i>dati mancanti</i>	296	134	448	29	18	59	27	7	37	34	8	57	39	128	171	508	348	962	962
Attività principale (nel corso dei 30 ultimi giorni)*																			
att. a tempo pieno (70% o più)	53.8	25.1	46.0	27.3	14.3	22.2	46.2	27.8	41.3	24.5	25.0	23.3	69.5	42.3	47.9	48.8	30.0	41.2	877
attività a tempo parziale	5.2	16.3	8.3	5.5	7.1	5.6	0.0	22.2	5.3	2.8	6.3	3.1	1.7	25.0	19.9	4.4	18.0	9.1	194
varie attività occas.	1.6	2.2	2.3	4.5	0.0	3.7	7.7	0.0	5.3	2.8	0.0	2.6	0.0	1.5	1.1	2.7	1.3	2.6	55
in formazione	1.0	2.6	1.3	0.9	11.9	3.7	3.8	5.6	5.3	48.3	40.6	47.2	6.8	4.6	5.4	8.0	6.5	7.5	159
inattivo sul mercat. del lavor.	20.1	37.0	24.5	26.4	42.9	31.5	9.6	22.2	14.7	10.5	12.5	12.4	16.9	23.0	21.5	19.1	31.8	24.4	519
disoccup., ricerc. di un lavoro	16.4	14.5	15.8	30.9	19.0	28.4	26.9	22.2	24.0	9.8	9.4	9.3	3.4	3.1	3.4	14.7	10.6	13.0	277
disoccupato, lav. fut. garant.	0.3	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.2	5
altra	1.5	1.8	1.5	4.5	4.8	4.9	5.8	0.0	4.0	0.7	6.3	1.6	1.7	0.5	0.8	1.9	1.6	2.0	42
N**	611	227	918	110	42	162	52	18	75	143	32	193	59	196	261	1'249	679	2'128	2'128
<i>dati mancanti</i>	361	164	532	31	23	61	25	6	31	38	5	43	45	181	226	608	453	1'089	1'089

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T27 Statuto professionale e reddito mensile netto dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale¹) e dei parenti o conoscenti (2005)

	Pazienti: problema principale ¹												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			N
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Statuto professionale*																			
senza attività professionale	33.5	45.6	34.5	52.4	70.0	56.8	33.3	57.1	38.7	19.3	33.3	22.0	18.6	21.4	20.7	31.7	39.0	34.1	584
apprendista, praticante	0.9	0.5	0.7	1.9	10.0	4.1	6.7	7.1	6.5	33.0	27.8	29.1	2.3	3.0	2.8	5.1	3.5	4.1	71
manovale, operaio-a ausiliar.	3.0	5.5	3.4	4.9	0.0	3.4	6.7	14.3	8.1	2.8	0.0	2.1	0.0	3.0	2.3	3.7	4.2	3.6	62
operaio-a con formaz. pratica	5.4	4.4	4.6	7.8	2.5	6.1	6.7	0.0	4.8	0.9	0.0	0.7	2.3	8.3	7.0	5.9	5.1	5.1	88
oper. con form. certif. (AFC)	11.4	3.3	8.3	16.5	2.5	12.2	22.2	0.0	16.1	6.4	0.0	5.0	7.0	4.2	4.7	11.6	4.2	8.2	140
caposquadra	3.9	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	2.3	0.5	1.5	26
impiegato-a non qualificato-a	16.6	27.5	24.3	11.7	10.0	12.2	8.9	14.3	11.3	5.5	11.1	5.7	23.3	27.4	26.3	15.8	24.5	20.9	357
impieg. qualif., quadro medio	10.3	3.3	7.9	1.9	0.0	1.4	4.4	0.0	3.2	0.9	5.6	1.4	18.6	17.3	17.8	8.2	7.4	7.5	128
imp. funz. dirett., quadr. sup.	3.4	2.2	3.1	0.0	0.0	0.7	2.2	0.0	1.6	0.9	0.0	0.7	14.0	3.6	5.6	3.3	1.9	2.7	47
indipendente	9.9	4.4	8.3	2.9	0.0	2.0	4.4	0.0	3.2	2.8	0.0	2.1	11.6	9.5	9.9	7.7	5.8	6.8	116
scolaro-a, studente	0.6	1.1	0.7	0.0	5.0	1.4	0.0	7.1	3.2	25.7	22.2	29.1	2.3	1.2	1.9	3.8	2.8	4.0	69
altro statuto	1.1	2.2	1.8	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	1.6	1.8	0.0	2.1	0.0	0.6	0.5	1.1	0.9	1.4	24
N**	465	182	713	103	40	148	45	14	62	109	18	141	43	168	213	1004	567	1712	1'712
<i>dati mancanti</i>	507	209	737	38	25	75	32	10	44	72	19	95	61	209	274	853	565	1'505	1'505
Reddito mensile netto*																			
nessun reddito	25.4	38.5	28.6	29.4	52.4	36.1	29.2	44.4	33.3	52.2	70.6	55.1	9.1	24.3	20.8	28.7	36.8	31.0	248
fino a 1000 fr.	2.5	3.3	2.7	7.8	9.5	8.3	20.8	22.2	21.2	30.0	11.8	27.1	9.1	2.7	4.2	8.8	6.4	8.3	66
da 1001 a 2000 fr.	9.3	13.2	10.2	11.8	9.5	11.1	16.7	11.1	15.2	1.1	5.9	1.9	0.0	13.5	10.4	8.3	12.0	9.4	75
da 2001 a 3000 fr.	15.7	16.5	15.9	19.6	28.6	22.2	4.2	11.1	6.1	3.3	11.8	4.7	18.2	13.5	14.6	12.7	18.4	14.4	115
da 3001 a 4000 fr.	13.9	11.0	13.2	17.6	0.0	12.5	12.5	11.1	12.1	6.7	0.0	5.6	27.3	10.8	14.6	13.5	12.0	13.0	104
da 4001 a 5000 fr.	15.7	7.7	13.7	11.8	0.0	8.3	12.5	0.0	9.1	5.6	0.0	4.7	0.0	18.9	14.6	14.2	7.3	12.1	97
da 5001 a 6000 fr.	9.6	5.5	8.6	2.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.9	18.2	10.8	12.5	7.1	4.7	6.4	51
da 6001 a 8000 fr.	4.3	4.4	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	2.7	6.3	3.7	2.1	3.3	26
da 8001 a 10 000 fr.	2.5	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.1	1.9	0.4	1.5	12
da 10 001 a 15 000 fr.	1.1	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.6	5
più di 15 000 fr.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	1
N**	280	91	371	51	21	72	24	9	33	90	17	107	11	37	48	565	234	800	800
<i>dati mancanti</i>	692	300	1'079	90	44	151	53	15	73	91	20	129	93	340	439	1'292	898	2'417	2'417

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T28a Ragione principale della fine del trattamento/accompagnamento dei pazienti (in rapporto al problema principale¹) e dei parenti o conoscenti (2005)

	Pazienti: problema principale ¹												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Ragione principale*																			
conclus. pianific. senza passag.	44.8	42.6	44.7	20.7	18.8	20.1	27.3	41.7	31.4	55.6	58.3	56.4	65.7	69.6	68.3	43.0	51.3	46.0	1'469
conclus. pianific. con passag.	5.8	6.2	5.7	18.6	17.2	18.3	9.1	16.7	12.4	4.4	0.0	3.4	2.9	2.2	2.7	7.5	5.3	7.0	224
cambio di domicilio	2.3	2.1	2.2	12.1	9.4	11.0	13.0	4.2	10.5	3.9	0.0	3.0	1.0	0.5	0.8	4.4	2.4	3.5	113
ospedalizzazione	0.7	1.8	1.0	2.1	0.0	1.4	3.9	8.3	4.8	0.0	2.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.9	1.0	0.9	28
incarcerazione	0.5	0.0	0.3	3.6	3.1	5.5	1.3	0.0	1.0	0.6	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.9	0.4	0.8	25
perdita di contatto	30.9	32.8	30.5	28.6	28.1	26.9	36.4	20.8	31.4	23.9	22.2	22.6	19.6	19.4	19.4	28.2	25.6	26.4	843
conclusione esplicita	10.7	10.5	11.0	5.7	10.9	7.3	7.8	8.3	7.6	7.8	11.1	9.4	6.9	6.2	6.3	9.8	10.1	10.2	324
decesso	1.5	1.8	1.7	3.6	7.8	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.5	1.8	59
altre cause	2.8	2.3	2.9	5.0	4.7	4.6	1.3	0.0	1.0	3.9	5.6	4.3	3.9	2.2	2.5	3.5	2.6	3.3	106
N**	964	390	1'440	140	64	219	77	24	105	180	36	234	102	372	480	1'845	1'123	3'191	3'191
<i>dati mancanti</i>	8	1	10	1	1	4	0	0	1	1	1	2	2	5	7	12	9	26	26

T28b Destinazione dei trasferimenti dei pazienti (in rapporto al problema principale¹) e dei parenti o conoscenti (2005)

Destinazione dei trasferimenti***																			
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N			
terapia residenziale	45.5	40.0	42.4	54.2	40.0	48.6	14.3	66.7	25.0	42.9	0.0	42.9	0.0	33.3	16.7	40.4	40.4	36.2	68
consulenza ambulatoriale	40.9	45.0	43.9	37.5	50.0	43.2	71.4	33.3	66.7	42.9	0.0	42.9	100.0	66.7	83.3	46.5	48.9	53.2	100
appartamento protetto	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.5	1
altra istituzione specializzata	13.6	15.0	13.6	8.3	10.0	8.1	14.3	0.0	8.3	14.3	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	13.2	8.5	10.1	19
N**	44	20	66	24	10	37	7	3	12	7	0	7	1	3	6	114	47	188	188
<i>dati mancanti</i>	12	4	16	2	1	3	0	1	1	1	0	1	2	5	7	24	12	36	36

T28c Causa di decesso dei pazienti (in rapporto al problema principale¹) e dei parenti o conoscenti (2005)

Cause di decesso****																			
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N			
suicidio	14.3	0.0	7.1	20.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	6.7	12.2	5
infortunio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
malattia	71.4	85.7	78.6	40.0	50.0	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.5	66.7	61.0	25
overdose o intossicazione acuta	0.0	0.0	0.0	20.0	25.0	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	13.3	12.2	5
altre cause di decesso	14.3	14.3	14.3	20.0	25.0	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	13.3	14.6	6
N**	7	7	14	5	4	9	0	24	15	41	41								
<i>dati mancanti</i>	7	0	11	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	18	18

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti trasferiti. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

**** I risultati si basano solamente sui clienti deceduti durante l'intervento. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T29 Durata dell'intervento sui pazienti (in rapporto al problema principale¹) e sui parenti o conoscenti (2005)

	Pazienti: problema principale ¹												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite					
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale									
Durata della presa in carico* (%)																					
1 settimana o meno	11.3	13.0	11.1	4.3	7.8	6.8	3.9	4.3	4.8	9.6	19.4	11.3	21.6	20.4	20.6	11.2	16.0	12.6	337		
> 1 settimana a 1 mese	7.5	6.0	6.8	5.0	4.7	5.4	2.6	8.7	3.8	10.2	13.9	10.4	13.7	10.2	10.8	7.7	8.2	7.7	205		
> 1 a 2 mesi	8.1	8.3	7.8	5.7	4.7	5.9	7.9	8.7	9.6	10.7	5.6	10.8	7.8	8.6	8.3	8.4	8.0	8.2	219		
> 2 a 3 mesi	4.6	5.4	4.7	7.1	7.8	7.2	3.9	0.0	2.9	8.5	5.6	8.7	2.9	4.0	3.7	4.9	5.1	4.9	132		
> 3 a 6 mesi	12.3	15.0	13.0	12.1	14.1	13.1	18.4	13.0	16.3	18.1	11.1	17.3	11.8	14.7	14.1	13.3	14.2	13.6	363		
> 6 mesi a 1 anno	26.0	26.9	25.6	27.9	23.4	25.3	32.9	47.8	34.6	29.9	30.6	28.6	31.4	32.2	32.0	27.7	29.5	27.8	743		
> 1 a 2 anni	15.9	15.5	15.9	22.9	20.3	20.8	21.1	13.0	19.2	9.0	8.3	9.1	9.8	7.0	7.9	15.4	12.0	14.3	383		
> 2 a 3 anni	8.7	4.4	8.3	7.9	4.7	6.3	7.9	0.0	6.7	2.3	2.8	2.2	0.0	1.6	1.2	6.8	3.1	5.8	156		
> 3 a 5 anni	4.2	4.7	5.3	5.0	9.4	5.9	1.3	4.3	1.9	1.7	2.8	1.7	1.0	0.8	0.8	3.4	3.2	3.9	103		
> 5 a 10 anni	1.3	0.8	1.3	2.1	3.1	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	1.1	0.7	1.0	28		
più di 10 anni	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	3		
N**	967	386	1'440	140	64	221	76	23	104	177	36	231	102	373	481	1'576	950	2'672	2'672		
<i>dati mancanti</i>	5	5	10	1	1	2	1	1	2	4	1	5	2	4	6	281	182	545	545		
Durata (in settimane)																					
media	48.9	42.0	50.4	55.5	60.5	57.3	44.3	37.9	42.8	27.9	28.6	27.3	22.1	25.2	24.7	43.9	35.7	42.9			
deviazione standard	67.5	54.2	68.1	67.3	80.4	77.7	38.7	41.0	39.5	33.8	38.0	33.7	27.4	37.9	35.8	60.7	52.2	61.1			
1° quartile	7.3	7.0	7.8	13.3	12.4	11.9	16.8	17.9	14.6	5.1	2.4	4.7	1.6	3.0	2.9	7.0	4.3	6.1			
mediana	29.0	26.1	29.9	34.1	30.4	32.0	29.1	28.0	28.2	19.3	18.0	18.1	15.6	16.9	16.9	26.6	22.9	26.1			
3° quartile	62.7	53.0	64.0	63.6	63.4	62.3	67.5	44.0	58.9	36.1	39.9	35.9	30.7	32.7	32.0	54.9	43.1	52.4			
N**	967	386	1'440	140	64	221	76	23	104	177	36	231	102	373	481	1'576	950	2'672			
<i>dati mancanti</i>	5	5	10	1	1	2	1	1	2	4	1	5	2	4	6	281	182	545			

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T30 Trattamento sostitutivo durante e immediatamente dopo l'intervento, in rapporto al problema principale¹ (solamente pazienti) (2005)

	Pazienti: problema principale ¹												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Sostituzione nel corso dell'intervento*																
no	96.4	97.9	96.7	33.6	40.7	35.4	77.3	70.0	75.6	99.4	100.0	99.5	88.2	89.2	88.2	1'721
sì	3.6	2.1	3.3	66.4	59.3	64.6	22.7	30.0	24.4	0.6	0.0	0.5	11.8	10.8	11.8	231
N**	748	285	1'034	122	54	178	66	20	86	157	34	191	1'399	546	1'952	1'952
<i>dati mancanti</i>	223	102	411	19	11	45	11	4	20	22	2	42	335	150	690	690
Tipo di sostituzione***																
eroina	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.4	1
metadone	29.6	16.7	26.5	91.1	93.5	92.0	86.7	100.0	90.5	100.0	0.0	100.0	79.9	79.7	80.0	182
altri oppiacei	0.0	0.0	0.0	5.1	3.2	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	1.7	2.6	6
altre sostanze	70.4	83.3	73.5	2.5	3.2	2.7	13.3	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0	16.5	18.6	17.0	39
N**	27	6	34	79	31	112	15	6	21	1	0	1	163	58	228	228
<i>dati mancanti</i>	0	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3
Sostituzione dopo l'intervento*																
no	99.4	100.0	99.5	62.1	65.9	63.3	87.3	83.3	86.3	100.0	100.0	100.0	94.8	95.2	94.9	1'591
sì	0.6	0.0	0.5	37.9	34.1	36.7	12.7	16.7	13.7	0.0	0.0	0.0	5.2	4.8	5.1	85
N**	637	251	888	103	44	147	55	18	73	134	25	159	1'199	475	1'676	1'676
<i>dati mancanti</i>	334	136	557	38	21	76	22	6	33	45	11	74	535	221	966	966
Tipo di sostituzione***																
prescrizione di eroina	0.0	0.0	0.0	7.7	6.7	7.4	14.3	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	8.1	4.3	7.1	6
trattamento sostitutivo	100.0	0.0	100.0	92.3	93.3	92.6	85.7	100.0	90.0	0.0	0.0	0.0	91.9	95.7	92.9	79
N**	4	0	4	39	15	54	7	3	10	0	0	0	62	23	85	85
<i>dati mancanti</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti ai quali è stata prescritta una sostituzione durante l'intervento. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T31 Postassistenza prevista e preparata, in rapporto al problema principale¹ (solamente pazienti) (2005)

	Pazienti: problema principale ¹												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Postassistenza prevista e preparata*																
no	90.1	87.6	89.3	69.0	60.0	66.5	74.6	72.2	74.0	92.1	96.8	92.9	86.4	84.3	85.8	1'493
si	9.9	12.4	10.7	31.0	40.0	33.5	25.4	27.8	26.0	7.9	3.2	7.1	13.6	15.7	14.2	247
N**	655	259	915	113	45	158	59	18	77	151	31	182	1'254	483	1'740	1'740
<i>dati mancanti</i>	316	128	530	28	20	65	18	6	29	28	5	51	480	213	902	902
Tipo di postassistenza prevista***																
appartamento protetto dell'istituzione	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.5	1
servizio di postassistenza dell'istituzione	3.4	3.4	3.4	3.3	6.7	4.4	13.3	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	4.6	3.1	4.1	9
appartamento protetto esterno	1.7	3.4	2.2	0.0	6.7	2.2	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	8.3	1.3	4.7	2.3	5
servizio di postassistenza esterno	15.3	17.2	15.7	20.0	20.0	20.0	26.7	0.0	22.2	9.1	0.0	8.3	16.4	12.5	15.2	33
centro di consulenza per problemi inerenti all'alcol	23.7	20.7	22.5	0.0	13.3	4.4	0.0	33.3	5.6	9.1	0.0	8.3	15.8	18.8	16.6	36
centro di consulenza per problemi inerenti alle droghe	3.4	3.4	3.4	33.3	26.7	31.1	20.0	33.3	22.2	27.3	0.0	25.0	12.5	10.9	12.0	26
altri centri di consulenza	13.6	10.3	12.4	6.7	13.3	8.9	6.7	0.0	5.6	27.3	0.0	25.0	13.8	17.2	14.7	32
gruppo di aiuto reciproco e di autosostegno	6.8	10.3	9.0	3.3	6.7	4.4	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	8.3	6.6	9.4	7.8	17
gruppo di precedenti utenti del centro/ dell'istituzione	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	1
altro-i	39.0	34.5	37.1	36.7	26.7	33.3	33.3	33.3	33.3	54.5	100.0	58.3	36.2	28.1	33.6	73
N**	59	29	89	30	15	45	15	3	18	11	1	12	152	64	217	217
<i>dati mancanti</i>	6	3	9	5	3	8	0	2	2	1	0	1	18	12	30	30

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti per i quali una postassistenza è prevista. Le categorie non sono esclusive (molte risposte possibili)

T32 Problemi di dipendenza all'uscita, in rapporto al problema principale¹ (solamente pazienti) (2005)

Problemi di dipendenza*	Pazienti: problema principale ¹												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
alcol	63.1	67.9	64.5	30.8	22.7	28.5	28.0	21.4	26.6	9.4	15.0	10.2	49.0	54.4	50.5	766
cocktail (eroina e cocaina)	0.7	0.5	0.7	13.1	13.6	13.2	2.0	21.4	6.3	0.0	0.0	0.0	1.9	2.6	2.1	32
eroina	1.1	1.0	1.0	72.0	52.3	66.2	8.0	14.3	9.4	0.9	0.0	0.7	9.5	8.6	9.2	140
metadone	1.3	1.0	1.2	38.3	43.2	39.7	6.0	14.3	7.8	0.9	0.0	0.7	6.4	7.2	6.6	100
altri oppiacei	0.2	0.0	0.1	3.7	4.5	4.0	2.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	0.7	10
cocaina	1.6	2.9	2.0	30.8	20.5	27.8	68.0	35.7	60.9	1.7	0.0	1.5	8.9	6.7	8.3	126
crack, freebase	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7	0.2	0.0	0.1	2
amfetamine	0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	2.0	7.1	3.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.3	5
MDMA e affini (ecstasy)	0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	4.0	7.1	4.7	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0	0.5	8
altri stimolanti	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
barbiturici	0.2	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	2
benzodiazepine	1.6	2.9	2.0	15.9	9.1	13.9	2.0	0.0	1.6	0.0	5.0	0.7	3.5	5.0	4.0	60
altri sonniferi e tranquillanti	0.2	1.0	0.4	0.9	4.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.7	0.8	12
LSD	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7	0.4	0.0	0.3	4
altri allucinogeni	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7	0.3	0.2	0.3	4
sostanze volatili (per es., solventi)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	1
canapa	4.3	3.3	4.0	17.8	20.5	18.5	24.0	0.0	18.8	50.4	35.0	48.2	11.8	9.6	11.2	170
tabacco	24.5	28.2	25.5	39.3	31.8	37.1	24.0	14.3	21.9	18.8	25.0	19.7	24.7	25.4	24.9	378
altra/e sostanza/e	0.2	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	0.5	7
gioco patologico	0.0	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.5	0.8	12
disturbi alimentari	0.0	1.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.9	14
altri problemi assimilabili a una dipendenza	0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.5	0.6	0.2	0.5	8
nessuno	30.2	25.8	29.0	10.3	15.9	11.9	14.0	28.6	17.2	41.9	40.0	41.6	28.5	24.9	27.5	418
N**	559	209	768	107	44	151	50	14	64	117	20	137	1'099	417	1'518	1'518
<i>dati mancanti</i>	412	178	677	34	21	72	27	10	42	62	16	96	635	279	1'124	1'124

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T33 Frequenza delle ricadute, sostanza o comportamento implicato e durata delle ricadute nel corso dell'intervento, in rapporto al problema principale¹ (solamente pazienti) (2005)

	Pazienti: problema principale ¹												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Frequenza delle ricadute*																
nessuna	60.0	47.2	56.5	34.3	22.2	31.6	22.2	53.8	30.6	69.7	63.2	67.9	53.4	42.6	50.3	617
1 volta	8.4	10.7	8.6	10.4	22.2	13.7	11.1	7.7	10.2	6.7	5.3	6.4	8.5	10.4	8.6	106
2 volte	7.5	7.3	8.1	10.4	14.8	11.6	19.4	0.0	14.3	10.1	10.5	11.0	9.1	9.5	9.8	120
3 o 4 volte	13.0	18.5	13.8	14.9	11.1	13.7	19.4	7.7	16.3	10.1	15.8	11.0	13.2	16.9	13.6	167
5 volte o più	11.0	16.3	12.9	29.9	29.6	29.5	27.8	30.8	28.6	3.4	5.3	3.7	15.8	20.7	17.6	216
N**	438	178	651	67	27	95	36	13	49	89	19	109	834	338	1'226	1'226
<i>dati mancanti</i>	533	209	794	74	38	128	41	11	57	90	17	124	900	358	1'416	1'416
Sostanza/comportamento comparabile a una dipendenza al momento delle ricadute***																
alcol	98.7	100.0	99.1	19.5	33.3	24.2	29.2	0.0	24.1	22.7	16.7	21.4	73.9	79.7	75.7	390
cocktail (eroina e cocaina)	1.3	1.3	1.3	19.5	14.3	17.7	4.2	40.0	10.3	0.0	0.0	0.0	3.5	4.1	3.7	19
oppiacei	2.0	3.8	2.6	82.9	66.7	77.4	12.5	40.0	17.2	4.5	0.0	3.6	16.4	14.0	15.9	82
cocaina e derivati	1.3	5.0	2.6	22.0	38.1	27.4	87.5	40.0	79.3	4.5	0.0	3.6	14.4	12.8	13.8	71
stimolanti	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	20.0	13.8	4.5	0.0	3.6	1.5	2.3	1.7	9
medicamenti	2.6	6.3	3.9	14.6	14.3	14.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	8.1	7.4	38
allucinogeni	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.6	3
canapa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
tabacco	2.6	1.3	2.2	9.8	4.8	8.1	16.7	0.0	13.8	86.4	100.0	89.3	11.1	9.9	11.1	57
sostanze volatili	3.3	5.0	3.9	7.3	4.8	6.5	4.2	0.0	3.4	4.5	16.7	7.1	5.0	6.4	5.6	29
altra/e sostanza/e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
gioco patologico	0.0	1.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.6	1.0	5
disturbi alimentari	0.0	1.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	1.0	5
altri problemi assimilabili a una dipendenza	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.4	2
N**	152	80	232	41	21	62	24	5	29	22	6	28	341	172	515	515
<i>dati mancanti</i>	23	14	51	3	0	3	4	1	5	5	1	7	48	22	94	94
Durata delle ricadute****																
1 a 2 giorni	33.9	25.9	31.3	7.7	37.5	19.0	75.0	100.0	77.8	70.0	100.0	76.9	35.8	41.3	37.7	69
3 a 6 giorni	35.7	33.3	34.9	38.5	12.5	28.6	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	7.7	30.0	25.4	28.4	52
7 a 10 giorni	10.7	22.2	14.5	15.4	12.5	14.3	12.5	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	12.5	15.9	13.7	25
>10 giorni a 2 settimane	5.4	14.8	8.4	7.7	0.0	4.8	12.5	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	4.2	9.5	6.0	11
> 2 a 4 settimane	8.9	3.7	7.2	15.4	25.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	6.3	7.7	14
>4 a 6 settimane	1.8	0.0	1.2	7.7	12.5	9.5	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	15.4	5.8	1.6	4.4	8
>6 a 8 settimane	1.8	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.5	1
> 2 mesi	1.8	0.0	1.2	7.7	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	1.6	3
N**	56	27	83	13	8	21	8	1	9	10	3	13	120	63	183	183
<i>dati mancanti</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che hanno indicato una o più ricadute. Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

**** I risultati si basano solamente sui clienti che hanno indicato una o più ricadute. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

**T34 Frequenza del consumo di tabacco e numero di sigarette al giorno nel corso dei 30 ultimi giorni precedenti l'uscita, in rapporto al problema principale¹
(solamente pazienti) (2005)**

	Pazienti: problema principale ¹												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Frequenza del consumo di tabacco*																
mai	26.2	33.3	28.2	11.8	7.4	10.5	11.4	12.5	11.6	21.1	0.0	19.0	24.9	28.4	25.8	247
1 giorno alla settimana o meno	1.4	0.7	1.2	1.5	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	1.3	1.1	1.6	1.3	12
2 a 3 giorni alla settimana	1.4	0.7	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.3	1.3	0.8	1.1	11
4 a 6 giorni alla settimana	1.1	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	2.3	1.4	0.0	1.3	1.3	0.4	1.0	10
una volta al giorno	0.6	0.0	0.4	4.4	3.7	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.8	0.9	9
più volte al giorno	69.3	65.2	68.2	82.4	88.9	84.2	88.6	75.0	86.0	76.1	87.5	77.2	70.4	68.1	69.9	670
N**	362	138	500	68	27	95	35	8	43	71	8	79	700	257	959	959
<i>dati mancanti</i>	609	249	945	73	38	128	42	16	63	108	28	154	1'034	439	1'683	1'683
Numero di sigarette al giorno***																
0 a 10 sigarette al giorno	14.3	14.1	14.2	6.1	6.7	6.3	7.1	50.0	12.5	32.1	37.5	33.3	15.1	16.7	15.5	72
11 a 20 sigarette al giorno	37.9	34.4	37.0	54.5	60.0	56.3	42.9	50.0	43.8	53.6	37.5	50.0	42.3	42.1	42.2	196
21 a 30 sigarette al giorno	31.9	39.1	33.7	30.3	26.7	29.2	35.7	0.0	31.3	14.3	25.0	16.7	29.6	31.7	30.3	141
31 sigarette al giorno o più	15.9	12.5	15.0	9.1	6.7	8.3	14.3	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	13.0	9.5	12.0	56
N**	182	64	246	33	15	48	14	2	16	28	8	36	338	126	465	465
<i>dati mancanti</i>	85	28	113	27	10	37	17	5	22	28	0	28	188	58	247	247

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che hanno indicato un consumo di tabacco. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T35 Obiettivo di consumo all'uscita e pronostico, in rapporto alla principale sostanza problematica¹ (solamente pazienti) (2005)

	Pazienti: sostanza problematica ¹												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Obiettivo di consumo*																
astinenza definitiva	33.1	41.8	36.7	63.3	64.9	63.7	56.3	69.2	60.0	46.3	39.1	46.9	41.1	46.7	44.2	630
astinenza limitata nel tempo	13.9	11.6	12.8	6.1	0.0	4.8	0.0	7.7	1.5	8.3	8.7	7.6	11.5	8.8	10.2	145
consumo controllato	35.9	32.8	34.6	10.2	5.4	10.3	12.5	7.7	10.8	31.5	26.1	29.0	31.4	28.3	29.6	422
nessuna limitazione nel consumo previsto	5.2	1.6	4.5	3.1	8.1	4.1	0.0	0.0	0.0	4.6	4.3	4.8	3.8	3.3	3.9	56
nessuna decisione per il momento	10.5	12.2	10.5	17.3	21.6	17.1	31.3	15.4	27.7	9.3	21.7	11.7	11.4	11.8	11.3	161
altro	1.3	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.1	0.8	12
N**	459	189	687	98	37	146	48	13	65	108	23	145	940	364	1'426	1'426
<i>dati mancanti</i>	512	198	758	43	28	77	29	11	41	71	13	88	794	332	1'216	1'216
Pronostico*																
pronostico molto positivo	10.4	9.0	9.4	5.6	5.7	5.6	2.3	13.3	5.2	19.6	10.0	18.0	13.0	10.4	11.7	168
pronostico positivo	45.4	44.7	47.1	22.2	28.6	24.0	30.2	26.7	29.3	48.2	55.0	48.9	42.1	41.5	43.7	628
pronostico piuttosto sfavorevole	32.1	28.6	30.6	48.9	40.0	46.4	44.2	40.0	43.1	22.3	30.0	24.1	31.4	31.9	30.9	444
pronostico negativo	12.1	17.6	12.9	23.3	25.7	24.0	23.3	20.0	22.4	9.8	5.0	9.0	13.5	16.2	13.6	196
N**	520	199	768	90	35	125	43	15	58	112	20	133	992	376	1'436	1'436
<i>dati mancanti</i>	451	188	677	51	30	98	34	9	48	67	16	100	742	320	1'206	1'206

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto