

# **Intervento ambulatoriale nelle problematiche di dipendenza**

## **Risultati dell'indagine presso gli utenti 2006**

### **Raccolta di tabelle statistiche**

Mariana Astudillo, Etienne Maffli

---

## Ringraziamenti

Ringraziamo vivamente sia i collaboratori e le collaboratrici che i pazienti delle istituzioni che hanno partecipato e che hanno gentilmente accettato di riempire i questionari del monitoraggio *act-info*. Ringraziamo ugualmente i collaboratori e le collaboratrici dei servizi di consultazione che hanno effettuato i lavori di logistica e di registrazione dei dati. I nostri migliori ringraziamenti vanno anche all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) che finanzia e coordina l'insieme della rete *act-info*. Grazie anche a Edith Bacher e Christiane Gmel per la grafica e l'impaginazione di questo rapporto come pure a Marina Delgrande Jordan per la sua preziosa collaborazione nell'elaborazione delle procedure d'analisi.

---

**Complementi d'informazione:** Etienne Maffli, tel. 021 321 29 54, fax 021 321 29 40,  
e-mail [emaffli@sfa-ispa.ch](mailto:emaffli@sfa-ispa.ch)

**Realizzazione:** Mariana Astudillo & Etienne Maffli, Istituto svizzero di prevenzione dell'alcolismo e altre tossicomanie (ISPA)

**Diffusione:** Libreria ISPA, casella postale 870, 1001 Losanna,  
tel. 021 321 29 35, fax 021 321 29 40,  
e-mail [librairie@sfa-ispa.ch](mailto:librairie@sfa-ispa.ch)

**Prezzo:** Fr. 10.–

**Lingua del testo originale :** francese

**Grafica/impaginazione:** ISPA

**Copyright:** © ISPA-SFA Losanna 2008

**Citazione raccomandata:** Astudillo, M & Maffli, E. (2008). Intervento ambulatoriale nelle problematiche di dipendenza. Risultati dell'indagine presso gli utenti 2006 – Raccolta di tabelle statistiche. Losanna: Istituto svizzero di prevenzione dell'alcolismo e altre tossicomanie.

---

---

## Indice

### **act-info – Information network on addiction care and therapy in Switzerland**

### **act-info nel settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale nel campo delle dipendenze**

#### **ENTRATA**

- T1 Sesso e età dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2006)
- T2 Stato civile e nazionalità dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2006)
- T3 Grado di urbanizzazione del domicilio, tipo di nucleo familiare e situazione di domicilio dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2006)
- T4 Tipo di relazione di coppia, numero di figli, di figli vivendo nel nucleo familiare dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2006)
- T5 Più alta formazione portata a termine e statuto professionale dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2006)
- T6 Fonte di reddito principale e attività dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2006)
- T7 Reddito mensile netto e debiti dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2006)
- T8 Incarcerazione o detenzione preventiva prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2006)
- T9 Istanza d'invio principale e secondaria dei pazienti (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2006)
- T10 Tipo di aiuto atteso dai pazienti (in rapporto al problema principale) e dai parenti o conoscenti all'entrata e base legale dell'intervento (2006)
- T11 Trattamenti/accompagnamenti dei pazienti prima dell'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2006)
- T12 Trattamento sostitutivo e altri interventi all'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2006)
- T13a Entrata in seguito a una cura di disintossicazione, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2006)
- T13b Frequenza delle cure di disintossicazione senza aiuto professionale prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2006)
- T14 Problema principale all'entrata (solamente pazienti) (2006)

- 
- T15.1a Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso dei 30 ultimi giorni e dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata (2006), uomini
- T15.1b Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso dei 30 ultimi giorni e dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata (2006), uomini
- T15.2a Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso dei 30 ultimi giorni e dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata (2006), donne
- T15.2b Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso dei 30 ultimi giorni e dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata (2006), donne
- T15.3a Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso dei 30 ultimi giorni e dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata (2006), uomini e donne
- T15.3b Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso dei 30 ultimi giorni e dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata (2006), uomini e donne
- T16.1a Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2006), uomini
- T16.1b Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2006), donne
- T16.1c Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2006), uomini e donne
- T16.2a Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2006), uomini
- T16.2b Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2006), donne
- T16.2c Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2006), uomini e donne
- T17 Modo di amministrazione della principale sostanza problematica nel corso dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata (2006)
- T18 Prevalenza delle iniezioni a vita, nel corso dei 30 ultimi giorni e dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata, scambio di materiale d'iniezione nel corso dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata e età all'epoca della prima iniezione, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2006)
- T19.1a Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2006), uomini
- T19.1b Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2006), donne
- T19.1c Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2006), uomini e donne
- T19.2a Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2006), uomini

- 
- T19.2b Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2006), donne
- T19.2c Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2006), uomini e donne
- T20 Frequenza del consumo di alcol, numero di "bicchieri standard" al giorno e frequenza di forti consumi di alcol prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti ) (2006)
- T21 Frequenza del consumo di tabacco e numero di sigarette al giorno nel corso dei 30 ultimi giorni prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2006)
- T22a Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2006), uomini
- T22b Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2006), donne
- T22c Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2006), uomini e donne

## **USCITA**

- T23 Sesso e età dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2006)
- T24 Stato civile e grado di urbanizzazione del domicilio dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2006)
- T25 Tipo di nucleo familiare, situazione di domicilio e tipo di relazione di coppia dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2006)
- T26 Più alta formazione portata a termine, fonte di reddito principale e attività principale dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2006)
- T27 Statuto professionale e reddito mensile netto dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2006)
- T28a Ragione principale della fine del trattamento/accompagnamento dei pazienti (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2006)
- T28b Destinazione dei trasferimenti dei pazienti (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2006)
- T28c Causa di decesso dei pazienti (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2006)
- T29 Durata dell'intervento sui pazienti (in rapporto al problema principale) e sui parenti o conoscenti (2006)
- T30 Trattamento sostitutivo durante e immediatamente dopo l'intervento, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2006)
- T31 Postassistenza prevista e preparata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2006)

- 
- T32 Problemi di dipendenza all'uscita, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2006)
- T33 Frequenza delle ricadute, sostanza o comportamento implicato e durata delle ricadute nel corso dell'intervento, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2006)
- T34 Frequenza del consumo di tabacco e numero di sigarette al giorno nel corso dei 30 ultimi giorni precedenti l'uscita, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2006)
- T35 Obiettivo di consumo all'uscita e pronostico, in rapporto alla principale sostanza problematica (solamente pazienti) (2006)

---

## **act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland**

La Rete di monitoraggio degli interventi e dei trattamenti delle dipendenze in Svizzera (*act-info*) raccoglie nel suo seno i cinque sistemi statistici che erano realizzati in materia di intervento e di trattamento della dipendenza in Svizzera. Tali sistemi sono:

- SAMBAD (Statistica del settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale in materia di dipendenza)
- Residalc (Statistica dei trattamenti residenziali della dipendenza all'alcol in Svizzera)
- FOS (Statistica della Lega per la valutazione dei trattamenti residenziali della tossicomania)
- HegeBe (Statistica dei trattamenti con prescrizione di eroina)
- Metadone (Statistica nazionale dei trattamenti con prescrizione di metadone)

Dal 2004 queste cinque statistiche dispongono di strumenti armonizzati e ottimizzati. I dati comuni sono integrati in una banca dati centralizzata che permette di procedere ad analisi concernenti l'insieme dei settori. L'adozione degli standard europei (Treatment Demande Indicator) permette di garantire anche la comparabilità dei dati al livello internazionale.

*act-info* è finanziato e coordinato dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e l'analisi e la raccolta dei dati nei differenti campi dell'intervento è affidata all'Istituto di medicina sociale e preventiva dell'Università di Berna (ISPM), all'Istituto svizzero di prevenzione dell'alcolismo e altre tossicomanie a Losanna (ISPA) e all'Istituto di ricerca sulla salute pubblica e sulle dipendenze affiliato all'Università di Zurigo (ISGF).

### **act-info nel settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale in materia di dipendenza (SAMBAD)**

Gli strumenti di monitoraggio *act-info* sono stati introdotti a partire dal 2004 nel settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale in materia di dipendenza e sostituiscono i vecchi questionari in vigore dal 1994. Solo alcuni servizi hanno utilizzato i vecchi strumenti per rilevare i dati del 2006. La realizzazione di *act-info* in questo settore è affidata all'Istituto svizzero di prevenzione dell'alcolismo e altre tossicomanie (ISPA).

La statistica *act-info* SAMBAD da una visione dell'utenza e delle attività di aiuto ambulatoriale in materia di dipendenza in Svizzera. I dati sono raccolti all'inizio e alla fine dell'intervento. Le informazioni rilevate al momento dell'entrata permettono di valutare particolarmente le caratteristiche socio-demografiche degli utenti, la eventuale presenza di trattamenti precedenti, le modalità di consumo e la presenza di problemi psicosociali precedenti l'intervento. Le informazioni finali rilevate al termine dell'intervento evidenziano particolarmente le caratteristiche socio-demografiche dell'utenza in quel preciso momento, le misure prese dalle persone curanti durante la presa in carico e le circostanze della fine di quest'ultima.

Nel 2006, 68 tra le 223 istituzioni registrate nel settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale in materia di dipendenza hanno partecipato al monitoraggio *act-info*. Queste istituzioni sono sia servizi deputati alla consultazione specialistica dei problemi inerenti all'alcol e/o alle droghe illegali, sia servizi polivalenti offrenti ugualmente un'aiuto per i problemi di dipendenza.

---

## Qualche spiegazione riguardo alle tabelle

La presente statistica descrittiva dei dati dell'indagine *act-info* presso gli utenti del settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale in materia di dipendenza si basa su due tipi di tabelle:

- quando la domanda contiene delle categorie di risposte predefinite o ricodificate in parti distinte (per esempio « stato civile » o « età »), la tabella indica le percentuali delle differenti categorie di risposte
- quando la domanda non contiene delle categorie predefinite, ma richiede un valore numerico (per esempio « età all'inizio del consumo problematico »), la tabella presenta dei parametri di posizione (media, mediana) e dei parametri di dispersione (deviazione standard, 1° quartile, 3° quartile)

La maggior parte delle tabelle presenta i risultati in maniera distinta per i sottogruppi di pazienti che hanno menzionato l'**alcol**, un **oppiaceo** (eroina particolarmente), la **cocaina** (e derivati) o la **canapa** come problema principale al momento dell'entrata. I **parenti o conoscenti** che consultano per i problemi di un terzo sono ugualmente oggetto di analisi separate per gli aspetti socio-demografici. Invece, gli utenti (poco numerosi) che hanno menzionato altre sostanze come problema principale (per esempio un stimolante o le sostanze volatili) o un problema di dipendenza non inerente a una sostanza (per esempio gioco patologico), non sono differenziati nei risultati (eccetto nei temi direttamente inerenti ai modi di consumo o alle forme di comportamenti additivi non inerenti alle sostanze). Queste persone sono tuttavia incluse nelle analisi relative all'insieme degli interventi che figurano nei blocchi a destra delle tabelle rispettive. Tutte le analisi sono effettuate separatamente per gli uomini, per le donne e per i sessi riuniti (le colonne « Totale » comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è conosciuto).

Solo le risposte valide sono considerate nelle analisi. Cioè, le risposte « non noto » e le informazioni mancanti (missings) sono escluse dalle analisi. Il numero di risposte valide **N** rappresenta il numero esatto di casi sui quali sono calcolati le percentuali o altri parametri; esso viene indicato per ogni gruppo o sottogruppo. In basso alla tabella viene anche indicato il numero corrispondente di dati mancanti. La presenza di numerosi dati mancanti costringe a interpretare i risultati con particolare prudenza.

Le note in basso alla tabella danno informazioni sulle eventuali particolarità dei gruppi di riferimento e sul tipo di domanda. Quando sono possibili più risposte a una stessa domanda (per esempio nelle tabelle del tema T19, « altri problemi di dipendenza ») le percentuali ottenute non si possono addizionare.

## T1 Sesso e età dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2006)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Sesso*</b>																			
uomini			71.6			77.4			75.8			81.4			26.7			64.7	4'009
donne			28.4			22.6			24.2			18.6			73.1			35.2	2'183
Sesso non noto			0.0			0.0			0.0			0.0			0.2			0.0	2
<b>N**</b>	<b>2'301</b>	<b>913</b>	<b>3'214</b>	<b>485</b>	<b>142</b>	<b>627</b>	<b>232</b>	<b>74</b>	<b>306</b>	<b>490</b>	<b>112</b>	<b>602</b>	<b>288</b>	<b>787</b>	<b>1'077</b>	<b>4'009</b>	<b>2'183</b>	<b>6'194</b>	<b>6'194</b>
<b>Età (in anni)*</b>																			
fino a 14	0.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	5.5	4.4	4.0	0.9	1.7	0.9	1.0	1.0	58
15-19	1.8	1.5	1.8	3.1	12.9	5.3	7.0	23.3	10.9	53.2	56.4	53.8	16.8	4.5	7.7	10.1	7.8	9.3	564
20-24	4.4	2.4	3.9	14.7	22.1	16.4	22.2	30.1	24.1	20.1	20.0	20.1	9.1	5.5	6.5	9.3	7.7	8.7	532
25-29	6.2	4.6	5.8	18.7	11.4	17.0	20.9	19.2	20.5	9.7	5.5	8.9	5.1	5.5	5.4	9.1	6.6	8.2	501
30-34	10.0	9.0	9.7	22.4	15.0	20.7	18.3	4.1	14.9	5.5	5.5	5.5	4.0	10.4	8.7	11.3	9.4	10.7	651
35-39	12.7	9.5	11.8	23.3	22.1	23.0	17.0	17.8	17.2	4.3	1.8	3.9	8.4	12.5	11.4	13.2	11.4	12.6	766
40-44	16.9	16.8	16.9	10.7	12.9	11.2	10.0	4.1	8.6	1.6	4.5	2.2	10.9	13.4	12.8	13.3	13.6	13.4	818
45-49	14.8	18.7	15.9	5.2	2.9	4.7	3.5	1.4	3.0	0.8	0.0	0.7	14.2	17.1	16.3	10.9	14.8	12.2	746
50-54	13.4	15.4	13.9	1.5	0.7	1.3	1.3	0.0	1.0	0.6	0.9	0.7	8.0	10.8	10.0	8.9	10.8	9.6	583
55-59	9.6	9.5	9.5	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	8.1	7.1	5.9	7.3	6.4	392
60-64	5.9	6.9	6.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	5.3	5.0	3.9	5.0	4.3	261
65-69	2.4	4.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	3.3	3.5	1.7	3.0	2.1	131
70-74	1.3	0.8	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	1.8	2.2	1.0	1.0	1.0	61
75 e più	0.4	0.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.9	1.5	0.5	0.6	0.5	33
<b>N**</b>	<b>2'281</b>	<b>905</b>	<b>3'186</b>	<b>477</b>	<b>140</b>	<b>617</b>	<b>230</b>	<b>73</b>	<b>303</b>	<b>487</b>	<b>110</b>	<b>597</b>	<b>274</b>	<b>761</b>	<b>1'036</b>	<b>3'956</b>	<b>2'140</b>	<b>6'097</b>	<b>6'097</b>
<i>dati mancanti</i>	20	8	28	8	2	10	2	1	3	3	2	5	14	26	41	53	43	97	97
<b>Età</b>																			
media	44.3	48.3	45.5	33.0	30.9	32.5	30.7	26.5	29.7	21.6	20.9	21.4	39.7	43.3	42.4	38.6	42.2	39.9	
deviazione standard	12.1	66.2	36.8	7.8	8.8	8.1	8.0	8.2	8.3	7.2	7.4	7.2	18.1	13.7	15.0	14.0	44.8	28.9	
1° quartile	36.2	38.9	36.7	27.0	22.4	26.0	24.2	20.7	23.2	16.8	16.4	16.8	22.3	34.0	32.2	27.7	31.0	28.6	
mediana	44.2	46.2	45.0	33.2	31.3	32.9	29.8	24.6	28.3	18.1	17.7	18.0	41.4	43.7	43.2	38.5	42.2	39.8	
3° quartile	52.6	53.9	53.0	38.0	38.2	38.0	36.1	32.8	36.0	24.0	23.0	23.9	51.8	52.0	51.9	48.2	51.1	49.5	
<b>N**</b>	<b>2'281</b>	<b>905</b>	<b>3'186</b>	<b>477</b>	<b>140</b>	<b>617</b>	<b>230</b>	<b>73</b>	<b>303</b>	<b>487</b>	<b>110</b>	<b>597</b>	<b>274</b>	<b>761</b>	<b>1'036</b>	<b>3'956</b>	<b>2'140</b>	<b>6'097</b>	
<i>dati mancanti</i>	20	8	28	8	2	10	2	1	3	3	2	5	14	26	41	53	43	97	

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T2 Stato civile e nazionalità dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2006)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Stato civile*</b>																			
celibe/nubile	37.7	28.8	35.1	74.0	70.5	73.2	73.1	77.8	74.2	92.6	93.1	92.7	45.5	23.2	28.9	52.4	36.2	46.6	2'669
sposato-a	34.6	31.0	33.6	14.1	9.1	13.0	16.3	9.7	14.7	5.1	4.0	4.9	43.2	58.1	54.2	27.7	37.2	31.1	1'779
separato-a	5.8	6.0	5.9	2.4	3.0	2.5	3.5	2.8	3.3	0.9	1.0	0.9	4.9	4.4	4.6	4.5	4.8	4.6	265
divorziato-a	19.5	28.8	22.2	8.0	13.6	9.3	6.2	9.7	7.0	1.2	2.0	1.3	6.1	11.7	10.2	13.7	18.2	15.3	876
vedovo-a	2.2	5.3	3.1	0.4	1.5	0.7	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.4	1.9	1.5	1.4	3.0	2.0	114
unione registrata	0.1	0.1	0.1	1.1	2.3	1.3	0.4	0.0	0.3	0.2	0.0	0.2	0.0	0.8	0.6	0.3	0.6	0.4	22
<b>N**</b>	<b>2'108</b>	<b>845</b>	<b>2'953</b>	<b>462</b>	<b>132</b>	<b>594</b>	<b>227</b>	<b>72</b>	<b>299</b>	<b>433</b>	<b>101</b>	<b>534</b>	<b>264</b>	<b>754</b>	<b>1'020</b>	<b>3'685</b>	<b>2'038</b>	<b>5'725</b>	<b>5'725</b>
<i>dati mancanti</i>	193	68	261	23	10	33	5	2	7	57	11	68	24	33	57	324	145	469	469
<b>Nazionalità*</b>																			
CH	79.2	88.9	82.0	65.9	85.8	70.5	73.5	74.2	73.7	89.1	84.5	88.2	78.7	81.8	80.8	77.9	84.8	80.3	4'597
EU	12.7	8.3	11.4	19.5	9.7	17.2	16.0	18.2	16.5	4.6	6.8	5.0	10.3	9.8	9.9	12.6	9.3	11.4	655
altra	8.0	2.8	6.5	14.6	4.5	12.3	10.5	7.6	9.8	6.3	8.7	6.8	11.0	8.4	9.2	9.5	5.9	8.2	470
<b>N**</b>	<b>2'079</b>	<b>856</b>	<b>2'935</b>	<b>452</b>	<b>134</b>	<b>586</b>	<b>219</b>	<b>66</b>	<b>285</b>	<b>457</b>	<b>103</b>	<b>560</b>	<b>263</b>	<b>753</b>	<b>1'018</b>	<b>3'666</b>	<b>2'054</b>	<b>5'722</b>	<b>5'722</b>
<i>dati mancanti</i>	222	57	279	33	8	41	13	8	21	33	9	42	25	34	59	343	129	472	472

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

## T3 Grado di urbanizzazione del domicilio, tipo di nucleo familiare e situazione di domicilio dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2006)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Grado di urbanizzazione*</b>																			
grandi centri urbani	10.4	12.6	11.0	0.3	0.8	0.4	1.1	1.6	1.2	0.2	0.0	0.2	9.2	12.1	11.4	6.8	9.9	7.9	424
periferia dei grandi centri	10.4	14.9	11.7	1.0	2.4	1.4	2.2	1.6	2.0	2.8	2.1	2.7	12.9	11.8	12.1	7.8	11.1	8.9	479
città di media importanza	17.2	19.0	17.7	27.8	32.0	28.8	29.6	29.0	29.4	23.9	39.4	26.7	12.0	18.8	17.0	20.0	21.7	20.6	1103
piccole città	33.1	27.6	31.6	43.6	43.2	43.5	33.9	37.1	34.7	32.2	28.7	31.5	34.9	29.3	30.8	35.0	30.1	33.2	1778
campagne	28.9	25.9	28.0	27.3	21.6	25.9	33.3	30.6	32.7	40.9	29.8	38.9	30.9	28.0	28.8	30.4	27.2	29.3	1568
<b>N**</b>	<b>2'007</b>	<b>807</b>	<b>2'814</b>	<b>392</b>	<b>125</b>	<b>517</b>	<b>186</b>	<b>62</b>	<b>248</b>	<b>423</b>	<b>94</b>	<b>517</b>	<b>249</b>	<b>693</b>	<b>942</b>	<b>3'443</b>	<b>1'909</b>	<b>5'352</b>	<b>5'352</b>
dati mancanti	294	106	400	93	17	110	46	12	58	67	18	85	39	94	135	566	274	842	842
<b>Tipo di nucleo familiare (30 ultimi giorni)*</b>																			
da solo-a	39.9	34.2	38.3	36.0	29.6	34.6	31.9	26.7	30.7	15.9	15.9	15.9	14.0	9.8	10.9	33.6	23.4	30.0	1388
con i genitori/un genitore	7.7	3.7	6.6	15.2	15.7	15.3	22.4	23.3	22.6	58.6	51.1	57.2	23.1	6.1	10.1	17.8	9.9	15.0	694
con figlio-a-i (senza partner)	1.9	13.7	5.3	1.5	9.6	3.3	0.5	3.3	1.1	0.5	6.8	1.7	2.7	11.8	9.6	1.6	11.7	5.2	239
con un-a partner (senza figli)	22.5	26.6	23.7	13.7	18.3	14.7	15.2	18.3	15.9	7.6	8.0	7.6	19.4	25.5	23.9	18.3	23.8	20.2	936
con un-a partner e figlio-a-i	19.6	13.9	18.0	11.0	7.8	10.3	11.9	5.0	10.4	3.9	3.4	3.8	36.0	44.5	42.5	17.1	23.6	19.4	899
con altri parenti/familiari	1.2	1.1	1.1	2.5	6.1	3.3	7.6	6.7	7.4	4.7	1.1	4.0	0.0	0.5	0.4	2.3	1.4	2.0	91
con amici (comunità abitativa)	1.9	2.0	1.9	5.9	3.5	5.4	5.7	6.7	5.9	1.8	2.3	1.9	2.2	1.0	1.3	2.7	2.0	2.5	115
altro	5.3	4.9	5.2	14.2	9.6	13.2	4.8	10.0	5.9	7.0	11.4	7.8	2.7	0.8	1.3	6.5	4.1	5.7	262
<b>N**</b>	<b>1'642</b>	<b>657</b>	<b>2'299</b>	<b>408</b>	<b>115</b>	<b>523</b>	<b>210</b>	<b>60</b>	<b>270</b>	<b>384</b>	<b>88</b>	<b>472</b>	<b>186</b>	<b>593</b>	<b>781</b>	<b>2'992</b>	<b>1'630</b>	<b>4'624</b>	<b>4'624</b>
dati mancanti	659	256	915	77	27	104	22	14	36	106	24	130	102	194	296	1017	553	1570	1570
<b>Situazione di domicilio (30 ultimi giorni)*</b>																			
domicilio fisso	94.4	93.7	94.2	83.3	80.5	82.6	90.0	78.1	87.2	93.6	87.1	92.4	94.8	97.6	96.9	92.6	93.2	92.8	4388
senza domicilio fisso	3.5	3.9	3.6	9.6	12.7	10.3	7.2	12.5	8.4	3.5	7.1	4.1	4.7	2.1	2.7	4.6	4.6	4.6	218
istituzione	2.0	2.4	2.1	7.1	6.8	7.1	2.9	9.4	4.4	2.9	5.9	3.5	0.5	0.3	0.4	2.8	2.2	2.6	123
<b>N**</b>	<b>1'722</b>	<b>664</b>	<b>2'386</b>	<b>406</b>	<b>118</b>	<b>524</b>	<b>209</b>	<b>64</b>	<b>273</b>	<b>374</b>	<b>85</b>	<b>459</b>	<b>191</b>	<b>614</b>	<b>807</b>	<b>3'062</b>	<b>1'665</b>	<b>4'729</b>	<b>4'729</b>
dati mancanti	579	249	828	79	24	103	23	10	33	116	27	143	97	173	270	947	518	1465	1465

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

## T4 Tipo di relazione di coppia, numero di figli, di figli vivendo nel nucleo familiare dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2006)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
<b> Tipo di relazione di coppia*</b>																			
senza partner, sola-a	31.1	33.6	31.9	42.0	25.2	38.0	37.8	43.6	39.1	62.8	48.5	59.9	19.6	12.4	13.9	35.9	26.4	32.4	1'248
relazione-i saltuaria-e	4.7	6.0	5.1	9.6	11.2	10.0	9.4	12.7	10.2	7.5	7.6	7.5	4.3	1.9	2.4	6.0	5.2	5.7	221
relazione fissa, vivendo separato-a	13.1	13.6	13.2	19.2	27.1	21.1	19.4	14.5	18.3	11.7	22.7	13.9	8.7	10.9	10.4	14.0	14.3	14.1	545
relazione fissa, vivendo insieme	51.1	46.7	49.8	29.1	36.4	30.9	33.3	29.1	32.3	18.0	21.2	18.7	67.4	74.8	73.3	44.1	54.0	47.8	1'843
<b>N**</b>	<b>1'385</b>	<b>580</b>	<b>1'965</b>	<b>333</b>	<b>107</b>	<b>440</b>	<b>180</b>	<b>55</b>	<b>235</b>	<b>266</b>	<b>66</b>	<b>332</b>	<b>138</b>	<b>531</b>	<b>670</b>	<b>2'425</b>	<b>1'431</b>	<b>3'857</b>	<b>3'857</b>
<i>dati mancanti</i>	916	333	1'249	152	35	187	52	19	71	224	46	270	150	256	407	1'584	752	2'337	2'337
<b> Numero di figli*</b>																			
nessuno	43.2	34.6	40.7	71.9	60.3	69.2	71.9	73.3	72.2	90.1	82.7	88.7	43.7	26.9	30.6	55.1	39.1	49.3	2'249
1 figlio	19.3	22.7	20.3	15.1	25.0	17.4	16.6	16.7	16.6	6.3	12.3	7.5	13.8	17.0	16.5	16.7	19.5	17.8	811
2 figli	25.1	28.4	26.1	10.0	9.5	9.9	8.5	10.0	8.9	3.0	1.2	2.7	23.6	36.4	33.4	18.9	27.3	22.0	1'002
3 figli o più	12.4	14.2	12.9	3.1	5.2	3.6	3.0	0.0	2.3	0.6	3.7	1.2	19.0	19.7	19.5	9.3	14.0	11.0	501
<b>N**</b>	<b>1'659</b>	<b>682</b>	<b>2'341</b>	<b>391</b>	<b>116</b>	<b>507</b>	<b>199</b>	<b>60</b>	<b>259</b>	<b>334</b>	<b>81</b>	<b>415</b>	<b>174</b>	<b>594</b>	<b>770</b>	<b>2'915</b>	<b>1'646</b>	<b>4'563</b>	<b>4'563</b>
<i>dati mancanti</i>	642	231	873	94	26	120	33	14	47	156	31	187	114	193	307	1'094	537	1'631	1'631
<b> Numero dei figli vivendo nel nucleo familiare*</b>																			
nessuno	73.6	65.1	71.1	82.6	69.8	79.4	79.6	81.6	80.1	71.7	63.5	70.2	51.6	44.6	46.2	73.3	58.7	68.0	2'742
1 figlio	11.3	18.8	13.6	9.2	19.8	11.8	11.4	10.2	11.1	7.2	14.3	8.4	18.3	20.2	19.7	11.3	18.6	14.0	563
2 figli	10.5	11.9	10.9	5.5	6.6	5.8	6.0	6.1	6.0	14.0	14.3	14.0	21.6	26.2	25.1	10.6	16.7	12.8	518
3 figli o più	4.6	4.1	4.4	2.8	3.8	3.0	3.0	2.0	2.8	7.2	7.9	7.3	8.5	9.0	8.9	4.8	6.0	5.3	212
<b>N**</b>	<b>1'482</b>	<b>637</b>	<b>2'119</b>	<b>327</b>	<b>106</b>	<b>433</b>	<b>167</b>	<b>49</b>	<b>216</b>	<b>293</b>	<b>63</b>	<b>356</b>	<b>153</b>	<b>531</b>	<b>684</b>	<b>2'554</b>	<b>1'481</b>	<b>4'035</b>	<b>4'035</b>
<i>dati mancanti</i>	819	276	1'095	158	36	194	65	25	90	197	49	246	135	256	393	1'455	702	2'159	2'159

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

## T5 Più alta formazione portata a termine e statuto professionale dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2006)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Più alta formazione portata a termine*</b>																			
nessuna formazione terminata	3.8	3.8	3.8	6.4	5.8	6.3	6.3	7.9	6.7	9.6	15.7	10.7	5.2	5.6	5.5	5.5	5.7	5.6	235
scuola dell'obbligo	15.5	20.5	16.9	33.9	38.3	34.9	22.2	38.1	25.9	50.4	51.8	50.7	24.7	15.5	18.2	24.5	23.4	24.2	1'015
scolarità complementare	4.0	5.6	4.4	6.4	10.0	7.2	4.8	12.7	6.7	4.9	10.8	6.0	5.2	4.1	4.4	4.9	6.4	5.4	227
apprendistato/ scuola profes.	59.0	53.2	57.4	48.4	41.7	46.9	57.0	36.5	52.2	30.1	12.0	26.8	42.0	55.8	51.9	51.5	48.8	50.6	2'123
liceo/diploma	2.9	5.0	3.5	2.2	4.2	2.7	1.4	4.8	2.2	2.7	8.4	3.8	4.0	5.6	5.1	2.8	5.3	3.6	152
magistrale, scuola pedagogica	1.1	1.7	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	1.1	4.9	3.9	0.7	2.8	1.4	59
form. profession. superiore	6.8	5.6	6.4	1.2	0.0	0.9	3.4	0.0	2.6	1.9	0.0	1.6	5.7	3.2	3.9	4.8	3.7	4.4	186
scuola profession. superiore	1.3	1.4	1.4	0.7	0.0	0.6	2.4	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	2.9	1.3	1.7	1.2	1.0	1.1	47
alta scuola specializzata	1.0	1.2	1.1	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	1.7	1.1	1.2	0.8	0.9	0.8	33
università, politecnico	4.6	1.9	3.8	0.7	0.0	0.6	1.4	0.0	1.1	0.0	1.2	0.2	7.5	3.0	4.2	3.3	2.1	2.9	121
<b>N**</b>	<b>1'493</b>	<b>575</b>	<b>2'068</b>	<b>407</b>	<b>120</b>	<b>527</b>	<b>207</b>	<b>63</b>	<b>270</b>	<b>365</b>	<b>83</b>	<b>448</b>	<b>174</b>	<b>466</b>	<b>642</b>	<b>2'786</b>	<b>1'410</b>	<b>4'198</b>	<b>4'198</b>
<i>dati mancanti</i>	808	338	1'146	78	22	100	25	11	36	125	29	154	114	321	435	1'223	773	1'996	1'996
<b>Statuto professionale*</b>																			
senza attività professionale	35.3	46.2	38.5	63.8	63.6	63.8	28.8	30.6	29.3	15.9	35.0	18.1	22.9	29.2	27.8	36.9	41.0	38.3	967
apprendista, praticante	1.6	2.5	1.8	1.1	5.2	2.0	3.6	13.9	6.1	24.5	30.0	25.1	2.4	1.4	1.6	3.7	3.9	3.8	95
manovale, operaio-a ausiliare	6.0	5.0	5.7	4.8	5.2	4.9	6.3	11.1	7.5	3.3	0.0	2.9	2.4	3.1	3.0	5.4	4.3	5.0	127
operaio-a con formaz. pratica	7.3	5.5	6.8	5.9	5.2	5.7	8.1	0.0	6.1	4.6	0.0	4.1	3.6	4.9	4.6	7.0	4.8	6.3	158
oper. con formaz. certif. (AFC)	10.9	6.5	9.6	12.5	7.8	11.5	21.6	5.6	17.7	9.9	0.0	8.8	8.4	9.4	9.2	11.8	7.5	10.3	261
caposquadra	2.5	0.5	1.9	1.1	0.0	0.9	1.8	0.0	1.4	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	2.1	0.2	1.4	36
impiegato-a non qualificato-a	10.6	19.6	13.2	7.0	9.1	7.5	13.5	16.7	14.3	9.9	10.0	9.9	13.3	23.3	21.0	10.6	19.7	13.7	347
impieg. qualif., quadro medio	9.0	6.3	8.2	1.1	1.3	1.1	4.5	5.6	4.8	2.6	0.0	2.3	13.3	8.3	9.4	6.7	6.2	6.5	165
imp. funz. dirett., quadr. sup.	3.7	2.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	9.6	2.4	4.0	2.7	1.7	2.4	60
indipendente	10.9	3.5	8.7	1.5	0.0	1.1	5.4	2.8	4.8	3.3	0.0	2.9	20.5	11.5	13.5	8.4	5.5	7.4	187
scolaro-a, studente	0.7	0.8	0.7	0.4	2.6	0.9	3.6	13.9	6.1	24.5	20.0	24.0	2.4	3.1	3.0	3.5	3.1	3.4	85
altro statuto	1.6	1.5	1.5	0.7	0.0	0.6	1.8	0.0	1.4	0.7	5.0	1.2	1.2	3.5	3.0	1.3	2.1	1.5	39
<b>N**</b>	<b>966</b>	<b>398</b>	<b>1'364</b>	<b>271</b>	<b>77</b>	<b>348</b>	<b>111</b>	<b>36</b>	<b>147</b>	<b>151</b>	<b>20</b>	<b>171</b>	<b>83</b>	<b>288</b>	<b>371</b>	<b>1'658</b>	<b>869</b>	<b>2'527</b>	<b>2'527</b>
<i>dati mancanti</i>	1'335	515	1'850	214	65	279	121	38	159	339	92	431	205	499	706	2'351	1'314	3'667	3'667

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

## T6 Fonte di reddito principale e attività dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2006)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Fonte di reddito principale (nel corso dei 30 ultimi giorni)*</b>																			
reddito da lavoro	53.6	36.5	48.9	31.8	24.8	30.0	62.8	37.9	56.7	40.2	16.7	36.2	58.0	54.6	55.5	50.5	41.8	47.5	2'253
risparmi	1.3	0.9	1.2	1.4	2.5	1.7	1.1	0.0	0.8	2.0	0.0	1.7	0.5	0.3	0.4	1.3	0.7	1.1	51
rendita (AVS/AI, ecc.)	15.6	20.3	16.9	16.0	10.7	14.7	5.0	6.9	5.5	3.7	6.9	4.3	13.5	9.8	10.7	13.5	14.3	13.8	655
assistenz./previdenza sociale	16.0	16.7	16.2	31.8	38.0	33.3	16.1	29.3	19.3	5.1	16.7	7.1	6.0	3.7	4.2	15.4	13.5	14.7	699
assicurazione disoccupazione	8.5	5.0	7.5	9.9	7.4	9.3	5.0	10.3	6.3	4.0	2.8	3.8	2.0	1.5	1.6	7.4	4.0	6.2	296
sostegno del/della partner	1.2	16.4	5.4	0.8	3.3	1.4	1.1	1.7	1.3	0.6	1.4	0.7	2.0	24.1	18.6	1.2	16.7	6.7	317
sosteg. genitori/familiari/amici	2.4	2.2	2.4	4.4	9.9	5.8	5.6	12.1	7.1	42.7	52.8	44.4	16.0	5.3	8.0	8.8	7.4	8.3	394
spacciando/tagliando	0.0	0.1	0.0	0.0	1.7	0.4	1.7	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	6
altre entrate illegali	0.1	0.0	0.0	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	5
prostituzione	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1
altra-e	1.3	1.9	1.5	3.0	1.7	2.7	1.7	0.0	1.3	1.4	2.8	1.7	2.0	0.7	1.0	1.6	1.3	1.5	71
<b>N**</b>	<b>1'805</b>	<b>695</b>	<b>2'500</b>	<b>362</b>	<b>121</b>	<b>483</b>	<b>180</b>	<b>58</b>	<b>238</b>	<b>351</b>	<b>72</b>	<b>423</b>	<b>200</b>	<b>601</b>	<b>802</b>	<b>3'079</b>	<b>1'668</b>	<b>4'748</b>	<b>4'748</b>
<i>dati mancanti</i>	496	218	714	123	21	144	52	16	68	139	40	179	88	186	275	930	515	1446	1446
<b>Attività principale (nel corso dei 30 ultimi giorni)*</b>																			
att. a tempo pieno (70% o più)	49.1	25.6	42.5	28.3	17.7	25.9	57.9	28.8	50.9	31.2	14.0	27.9	52.8	31.5	37.1	45.0	26.9	38.8	1'825
attività a tempo parziale	4.9	16.8	8.2	2.2	7.3	3.4	1.9	3.0	2.2	3.2	5.8	3.7	5.6	32.4	25.3	4.2	20.1	9.7	455
varie attività occas.	1.4	1.6	1.5	2.7	2.4	2.6	2.9	1.5	2.5	2.4	2.3	2.4	2.6	2.2	2.3	1.9	1.8	1.9	88
in formazione	1.7	2.1	1.8	1.2	7.3	2.6	4.3	18.2	7.6	40.3	45.3	41.3	13.3	5.8	7.7	7.6	7.4	7.5	354
inattivo sul mercat. del lavoro	18.0	34.3	22.6	28.3	25.0	27.6	11.5	22.7	14.2	4.8	15.1	6.8	13.8	22.2	20.0	17.1	27.5	20.7	973
disoccup., ricerc. di un lavoro	18.0	12.4	16.4	26.9	23.4	26.1	12.9	16.7	13.8	11.3	3.5	9.8	6.2	4.2	4.8	16.9	9.9	14.5	682
disoccup., lav. futuro garantito	0.2	0.7	0.3	0.5	0.8	0.6	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.3	13
altra	6.7	6.4	6.7	9.9	16.1	11.4	7.7	9.1	8.0	6.7	14.0	8.1	5.6	1.8	2.8	7.2	6.0	6.8	318
<b>N**</b>	<b>1'706</b>	<b>668</b>	<b>2'374</b>	<b>413</b>	<b>124</b>	<b>537</b>	<b>209</b>	<b>66</b>	<b>275</b>	<b>372</b>	<b>86</b>	<b>458</b>	<b>195</b>	<b>553</b>	<b>750</b>	<b>3'083</b>	<b>1'623</b>	<b>4'708</b>	<b>4'708</b>
<i>dati mancanti</i>	595	245	840	72	18	90	23	8	31	118	26	144	93	234	327	926	560	1486	1486

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

## T7 Reddito mensile netto e debiti dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2006)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi				N
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale		
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale								
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
<b>Reddito mensile netto (6 ultimi mesi)*</b>																				
nessun reddito	26.1	36.4	28.9	29.6	37.8	31.4	21.0	18.8	20.5	41.6	76.5	45.8	4.5	28.0	22.7	27.7	36.4	30.1	410	
fino a 1000 fr.	4.6	5.3	4.8	7.4	8.9	7.7	9.7	6.3	9.0	32.8	11.8	30.3	13.6	9.3	10.3	9.3	7.9	8.9	121	
da 1001 a 2000 fr.	10.2	14.1	11.3	19.1	8.9	16.9	6.5	25.0	10.3	4.8	0.0	4.2	13.6	16.0	15.5	10.5	13.7	11.4	155	
da 2001 a 3000 fr.	12.2	21.8	14.8	20.4	26.7	21.7	8.1	18.8	10.3	3.2	5.9	3.5	13.6	21.3	19.6	11.9	20.6	14.3	195	
da 3001 a 4000 fr.	13.3	11.7	12.8	17.3	15.6	16.9	19.4	18.8	19.2	8.0	5.9	7.7	13.6	13.3	13.4	14.4	12.1	13.8	187	
da 4001 a 5000 fr.	17.0	4.9	13.7	4.9	2.2	4.3	24.2	12.5	21.8	7.2	0.0	6.3	13.6	6.7	8.2	14.2	4.7	11.5	157	
da 5001 a 6000 fr.	8.3	3.4	7.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	3.8	1.6	0.0	1.4	0.0	4.0	3.1	5.9	2.6	5.0	68	
da 6001 a 8000 fr.	6.7	1.9	5.4	1.2	0.0	1.0	3.2	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	13.6	1.3	4.1	4.6	1.6	3.8	51	
da 8001 a 10 000 fr.	1.1	0.5	0.9	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.3	0.8	0.0	0.7	4.5	0.0	1.0	0.9	0.3	0.7	10	
da 10 001 a 15 000 fr.	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	2.1	0.6	0.0	0.4	6	
più di 15 000 fr.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
<b>N**</b>	<b>566</b>	<b>206</b>	<b>772</b>	<b>162</b>	<b>45</b>	<b>207</b>	<b>62</b>	<b>16</b>	<b>78</b>	<b>125</b>	<b>17</b>	<b>142</b>	<b>22</b>	<b>75</b>	<b>97</b>	<b>981</b>	<b>379</b>	<b>1'360</b>	<b>1'360</b>	
<i>dati mancanti</i>	1'735	707	2'442	323	97	420	170	58	228	365	95	460	266	712	980	3'028	1'804	4'834	4'834	
<b>Debiti*</b>																				
nessun debito	63.5	77.1	67.6	32.2	42.6	34.4	33.7	52.0	37.2	85.0	83.7	84.8	88.5	93.2	92.1	60.4	77.9	66.0	1'347	
fino a 5000 fr.	6.6	8.2	7.1	17.3	13.0	16.4	13.5	16.0	14.0	4.7	6.1	5.0	1.6	2.1	2.0	8.1	7.0	7.7	158	
da 5001 a 10 000 fr.	6.8	4.4	6.1	16.8	14.8	16.4	14.4	16.0	14.7	5.6	4.1	5.3	0.0	2.1	1.6	8.3	5.0	7.3	148	
da 10 001 a 25 000 fr.	9.2	5.1	8.0	10.9	25.9	14.1	21.2	4.0	17.8	2.6	2.0	2.5	3.3	1.6	2.0	9.1	6.1	8.1	166	
da 25 001 a 50 000 fr.	5.9	2.7	5.0	8.9	1.9	7.4	9.6	0.0	7.8	1.3	4.1	1.8	3.3	0.5	1.2	6.3	1.8	4.9	99	
da 50 001 a 100 000 fr.	2.9	1.0	2.3	9.4	1.9	7.8	5.8	8.0	6.2	0.0	0.0	0.0	1.6	0.5	0.8	3.8	1.2	2.9	60	
più di 100 000 fr.	5.0	1.4	4.0	4.5	0.0	3.5	1.9	4.0	2.3	0.9	0.0	0.7	1.6	0.0	0.4	4.0	1.1	3.0	62	
<b>N**</b>	<b>694</b>	<b>293</b>	<b>987</b>	<b>202</b>	<b>54</b>	<b>256</b>	<b>104</b>	<b>25</b>	<b>129</b>	<b>233</b>	<b>49</b>	<b>282</b>	<b>61</b>	<b>192</b>	<b>253</b>	<b>1'380</b>	<b>660</b>	<b>2'040</b>	<b>2'040</b>	
<i>dati mancanti</i>	1'607	620	2'227	283	88	371	128	49	177	257	63	320	227	595	824	2'629	1'523	4'154	4'154	

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

## T8 Incarcerazione o detenzione preventiva prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2006)

	Pazienti: problema principale												Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Incarcerazione o detenzione preventiva*</b>																
nessuna	84.1	96.5	87.8	43.5	78.3	49.8	60.0	78.3	64.3	91.2	94.7	91.6	77.5	94.2	82.0	1'526
in prigione	10.3	1.6	7.7	20.8	2.2	17.4	9.3	13.0	10.2	4.1	0.0	3.6	11.1	2.0	8.6	161
in detenzione preventiva	3.1	1.3	2.6	14.5	15.2	14.6	25.3	8.7	21.4	4.8	0.0	4.2	6.3	2.8	5.4	100
in prigione e in detenzione preventiva	2.5	0.5	1.9	21.3	4.3	18.2	5.3	0.0	4.1	0.0	5.3	0.6	5.1	1.0	4.0	75
<b>N**</b>	<b>881</b>	<b>372</b>	<b>1'253</b>	<b>207</b>	<b>46</b>	<b>253</b>	<b>75</b>	<b>23</b>	<b>98</b>	<b>147</b>	<b>19</b>	<b>166</b>	<b>1'365</b>	<b>497</b>	<b>1'862</b>	<b>1'862</b>
<i>dati mancanti</i>	1'420	541	1'961	278	96	374	157	51	208	343	93	436	2'356	899	3'255	3'255
<b>Durata totale di detenzione***</b>																
fino a 1 mese	24.2	40.0	25.7	18.4	60.0	21.0	42.1	66.7	45.5	60.0	0.0	54.5	25.4	47.4	27.2	62
> 1 a 2 mesi	17.2	20.0	17.4	10.5	0.0	9.9	15.8	0.0	13.6	10.0	100.0	18.2	13.9	15.8	14.0	32
> 2 a 6 mesi	22.2	10.0	21.1	26.3	0.0	24.7	10.5	33.3	13.6	10.0	0.0	9.1	22.5	10.5	21.5	49
> 6 a 12 mesi	9.1	10.0	9.2	10.5	20.0	11.1	15.8	0.0	13.6	10.0	0.0	9.1	10.5	10.5	10.5	24
più di un anno	27.3	20.0	26.6	34.2	20.0	33.3	15.8	0.0	13.6	10.0	0.0	9.1	27.8	15.8	26.8	61
<b>N**</b>	<b>99</b>	<b>10</b>	<b>109</b>	<b>76</b>	<b>5</b>	<b>81</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>209</b>	<b>19</b>	<b>228</b>	<b>228</b>
<i>dati mancanti</i>	41	3	44	41	5	46	11	2	13	3	0	3	98	10	108	108

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti che hanno vissuto un'esperienza di detenzione. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

## T9 Istanza d'invio principale e secondaria dei pazienti (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2006)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Coacaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Istanza d'invio principale*</b>																			
propria iniziativa	26.5	35.7	29.1	53.7	45.7	51.8	38.3	32.9	36.9	21.4	24.5	22.0	52.5	67.2	63.5	32.1	48.6	38.1	1'952
coniuge/partner	6.7	4.7	6.1	4.0	2.4	3.6	8.6	2.9	7.2	3.4	1.1	3.0	3.8	3.2	3.3	6.0	3.5	5.1	262
famiglia	3.5	4.7	3.8	2.6	7.1	3.6	9.1	8.6	9.0	10.0	9.6	9.9	10.6	5.3	6.7	5.2	5.6	5.3	272
amici/colleghi/conoscenti	2.0	3.3	2.4	1.2	1.6	1.3	2.9	4.3	3.2	1.5	3.2	1.8	3.8	5.1	4.7	2.3	4.1	2.9	150
istituto ambulatoriale specializ.	1.7	2.2	1.8	4.3	4.7	4.4	1.9	4.3	2.5	1.2	0.0	1.0	0.8	1.2	1.1	2.0	1.8	1.9	99
istituto residenziale specializ.	6.4	6.4	6.4	3.6	4.7	3.8	4.3	1.4	3.6	0.7	1.1	0.8	0.8	0.9	0.9	4.5	3.4	4.1	211
studio medico	8.4	10.6	9.0	7.6	9.4	8.0	4.3	5.7	4.7	3.4	5.3	3.8	4.2	5.2	4.9	6.9	8.2	7.4	378
ospedale/clinica	11.3	14.5	12.3	2.1	0.8	1.8	2.9	11.4	5.0	2.4	4.3	2.8	1.7	1.9	1.9	7.4	7.4	7.4	381
servizi sociali	7.3	6.3	7.0	6.2	13.4	7.8	2.9	10.0	4.7	3.9	5.3	4.2	5.5	3.8	4.2	6.3	5.8	6.1	315
prov. penale/amministrativo	17.7	5.8	14.3	9.7	5.5	8.8	19.1	10.0	16.8	44.0	28.7	41.2	7.6	1.3	2.9	18.7	5.0	13.7	705
datore di lavoro	5.0	2.6	4.3	0.2	2.4	0.7	0.5	2.9	1.1	1.5	2.1	1.6	2.5	0.9	1.3	3.6	2.1	3.1	157
insegnante	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.7	1.5	3.2	1.8	1.7	0.6	0.9	0.5	0.6	0.6	29
altra	3.1	3.3	3.2	4.8	2.4	4.2	5.3	2.9	4.7	5.1	11.7	6.3	4.2	3.6	3.8	4.4	4.0	4.3	218
<b>N**</b>	<b>1'816</b>	<b>729</b>	<b>2'545</b>	<b>421</b>	<b>127</b>	<b>548</b>	<b>209</b>	<b>70</b>	<b>279</b>	<b>411</b>	<b>94</b>	<b>505</b>	<b>236</b>	<b>693</b>	<b>931</b>	<b>3'279</b>	<b>1'848</b>	<b>5'129</b>	<b>5'129</b>
<i>dati mancanti</i>	485	184	669	64	15	79	23	4	27	79	18	97	52	94	146	730	335	1'065	1'065
<b>Istanza d'invio secondaria***</b>																			
propria iniziativa	26.5	25.8	26.3	23.2	30.9	24.8	38.9	36.4	38.3	20.6	18.2	20.3	11.7	11.0	11.1	25.6	20.8	24.1	674
coniuge/partner	9.1	7.3	8.6	7.7	14.7	9.1	6.5	6.1	6.4	3.9	0.0	3.5	10.4	6.0	6.9	8.2	7.2	7.9	221
famiglia	4.2	7.3	5.0	8.5	8.8	8.6	10.2	15.2	11.3	7.2	9.1	7.4	9.1	10.0	9.8	5.8	8.6	6.7	189
amici/colleghi/conoscenti	2.0	3.7	2.5	3.3	1.5	2.9	2.8	12.1	5.0	0.6	4.5	1.0	2.6	5.3	4.8	2.2	4.4	2.9	82
istituto ambulatoriale specializ.	1.1	1.6	1.2	3.7	4.4	3.8	1.9	3.0	2.1	0.6	0.0	0.5	1.3	3.0	2.6	1.4	2.3	1.7	48
istituto residenziale specializ.	2.8	3.0	2.9	2.6	2.9	2.7	1.9	3.0	2.1	0.0	0.0	0.0	1.3	0.3	0.5	2.3	1.9	2.1	60
studio medico	5.2	8.0	5.9	10.7	13.2	11.2	6.5	3.0	5.7	2.2	0.0	2.0	2.6	1.0	1.3	5.7	5.4	5.6	158
ospedale/clinica	3.0	4.2	3.3	2.2	4.4	2.7	0.9	3.0	1.4	0.6	4.5	1.0	2.6	1.3	1.6	2.4	3.0	2.6	72
servizi sociali	3.3	4.0	3.5	5.5	7.4	5.9	1.9	6.1	2.8	3.9	4.5	4.0	2.6	2.3	2.4	3.5	4.0	3.6	102
prov. penale/amministrativo	3.7	1.4	3.1	4.8	5.9	5.0	6.5	0.0	5.0	1.7	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	3.6	1.1	2.8	78
datore di lavoro	3.2	2.1	2.9	1.1	1.5	1.2	1.9	0.0	1.4	0.6	0.0	0.5	1.3	0.3	0.5	2.5	1.3	2.1	59
insegnante	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	2.0	0.0	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	9
altra	1.9	1.9	1.9	3.3	2.9	3.2	3.7	6.1	4.3	2.2	4.5	2.5	0.0	2.3	1.9	2.3	2.4	2.3	65
nessuna	42.8	39.8	42.0	38.4	29.4	36.6	36.1	30.3	34.8	60.0	54.5	59.4	54.5	61.5	60.1	44.0	46.9	44.9	1'259
<b>N**</b>	<b>1'181</b>	<b>427</b>	<b>1'608</b>	<b>271</b>	<b>68</b>	<b>339</b>	<b>108</b>	<b>33</b>	<b>141</b>	<b>180</b>	<b>22</b>	<b>202</b>	<b>77</b>	<b>301</b>	<b>378</b>	<b>1'899</b>	<b>902</b>	<b>2'801</b>	<b>2'801</b>
<i>dati mancanti</i>	1'120	486	1'606	214	74	288	124	41	165	310	90	400	211	486	699	2'110	1'281	3'393	3'393

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

\*\*\* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili)

## T10 Tipo di aiuto atteso dai pazienti (in rapporto al problema principale) e dai parenti o conoscenti all'entrata e base legale dell'intervento (2006)

Tipo di aiuto atteso*	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Tipo di aiuto atteso*</b>																			
problemi di dipendenza	79.7	88.2	82.1	86.0	87.8	86.4	79.0	91.9	82.1	62.0	66.7	62.6	51.6	53.6	53.0	76.1	74.4	75.5	2'542
problemi somatici	4.1	4.4	4.2	2.9	6.1	3.5	1.7	8.1	3.2	0.0	0.0	0.0	0.8	1.2	1.1	3.2	3.5	3.3	110
problemi psichici	18.5	23.6	19.9	20.4	26.8	21.7	20.2	24.3	21.2	9.1	25.9	11.1	19.4	24.0	23.2	18.2	25.2	20.7	696
problemi relazionali	15.7	23.4	17.9	13.7	14.6	13.9	12.6	16.2	13.5	9.1	7.4	8.9	27.4	45.4	41.5	15.7	30.2	20.7	698
problemi familiari	10.2	17.7	12.3	12.7	23.2	14.9	12.6	29.7	16.7	14.4	25.9	15.7	40.3	41.1	41.0	12.9	27.4	17.9	603
problemi finanziari	9.0	7.4	8.6	26.8	18.3	25.0	16.0	16.2	16.0	4.8	3.7	4.7	1.6	6.5	5.4	11.6	8.1	10.4	351
problemi professionali o di formazione	16.1	12.4	15.1	17.5	9.8	15.9	10.9	18.9	12.8	11.1	14.8	11.5	3.2	6.7	5.9	14.3	10.3	12.9	436
problemi di alloggio	4.6	3.6	4.3	8.6	7.3	8.3	10.1	13.5	10.9	2.9	0.0	2.6	2.4	3.8	3.5	5.1	4.2	4.8	160
problemi di violenza	1.0	2.1	1.3	1.3	3.7	1.8	1.7	0.0	1.3	1.4	0.0	1.3	1.6	4.8	4.1	1.2	2.9	1.8	61
problemi giuridici	13.1	6.3	11.1	10.2	3.7	8.8	21.0	10.8	18.6	15.9	3.7	14.5	4.0	3.6	3.7	12.5	4.9	9.9	333
altro-i	2.3	1.7	2.1	2.5	2.4	2.5	3.4	2.7	3.2	1.4	3.7	1.7	10.5	4.1	5.7	3.7	3.2	3.5	119
nessuna richiesta	8.9	4.2	7.6	2.5	1.2	2.3	5.0	2.7	4.5	20.2	14.8	19.6	0.0	0.5	0.4	8.4	2.8	6.4	217
<b>N**</b>	<b>1'340</b>	<b>526</b>	<b>1'866</b>	<b>314</b>	<b>82</b>	<b>396</b>	<b>119</b>	<b>37</b>	<b>156</b>	<b>208</b>	<b>27</b>	<b>235</b>	<b>124</b>	<b>416</b>	<b>542</b>	<b>2'211</b>	<b>1'155</b>	<b>3'368</b>	<b>3'368</b>
<i>dati mancanti</i>	961	387	1'348	171	60	231	113	37	150	282	85	367	164	371	535	1'798	1'028	2'826	2'826
<b>Base legale dell'intervento*</b>																			
Sospensione della procedura, rinuncia a infliggere una pena o un avvertimento (art. 19a cifra 2 Lstup)	0.3	0.0	0.2	0.7	0.0	0.6	0.9	0.0	0.7	5.5	9.5	5.9	0.0	0.0	0.0	1.0	0.2	0.7	20
abbandono del perseguimento penale nel caso di un trattamento sotto sorveglianza medica (art. 19a cifra 3 Lstup)	0.1	0.0	0.1	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	3
misure concernenti delinquenti mentalmente anormali (art. 43 CPS)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1
trattamento delle persone dipendenti dall'alcol o dalle droghe (art. 44 CPS)	2.8	1.8	2.5	3.0	1.5	2.7	2.8	3.1	2.9	2.7	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.6	1.1	2.1	59
irresponsabilità (art. 10 CPS)	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1
responsabilità limitata (art 11 CPS)	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1
esecuzione di misure per tossicodipend. in un'istituzione di educazione al lavoro (art. 2a ord. 3 rel. al CPS SR 311.03)	0.6	0.2	0.5	0.7	1.5	0.9	0.9	0.0	0.7	9.3	9.5	9.4	0.0	0.0	0.0	1.4	0.4	1.1	31
altra	12.5	7.6	11.2	7.5	4.6	6.9	23.1	15.6	21.4	25.8	14.3	24.6	1.3	0.0	0.3	13.1	5.0	10.4	293
nessuna misura (trattamento volontario)	83.6	90.3	85.5	87.3	92.3	88.3	71.3	81.3	73.6	56.6	66.7	57.6	98.8	100.0	99.7	81.7	93.3	85.6	2'410
<b>N**</b>	<b>1'174</b>	<b>445</b>	<b>1'619</b>	<b>267</b>	<b>65</b>	<b>332</b>	<b>108</b>	<b>32</b>	<b>140</b>	<b>182</b>	<b>21</b>	<b>203</b>	<b>80</b>	<b>319</b>	<b>399</b>	<b>1'888</b>	<b>929</b>	<b>2'817</b>	<b>2'817</b>
<i>dati mancanti</i>	1'127	468	1'595	218	77	295	124	42	166	308	91	399	208	468	678	2'121	1'254	3'377	3'377

\* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

## T11 Trattamenti/accompagnamenti dei pazienti prima dell'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2006)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Interventi precedenti*</b>																			
no	42.7	39.9	41.8	16.8	15.6	16.5	50.5	50.8	50.6	76.7	79.6	77.2	70.8	70.4	70.5	47.2	52.3	49.0	2'384
si	57.3	60.1	58.2	83.2	84.4	83.5	49.5	49.2	49.4	23.3	20.4	22.8	29.2	29.6	29.5	52.8	47.7	51.0	2'480
<b>N**</b>	<b>1'748</b>	<b>740</b>	<b>2'488</b>	<b>404</b>	<b>122</b>	<b>526</b>	<b>206</b>	<b>65</b>	<b>271</b>	<b>416</b>	<b>93</b>	<b>509</b>	<b>202</b>	<b>585</b>	<b>787</b>	<b>3'139</b>	<b>1'725</b>	<b>4'864</b>	<b>4'864</b>
<i>dati mancanti</i>	553	173	726	81	20	101	26	9	35	74	19	93	86	202	290	870	458	1330	1330
<b>Tipo di intervento***</b>																			
trattamento con prescriz. di eroina	0.9	0.7	0.8	6.7	5.4	6.4	1.2	3.3	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.3	1.8	37
terapia sostitut. (metadone, subutex)	6.7	4.0	5.8	67.5	67.4	67.5	25.3	43.3	30.1	6.6	23.1	9.0	8.6	2.5	3.8	20.0	14.1	18.0	380
altro tratt. medicam. delle dipendenze	11.7	9.9	11.1	10.8	8.7	10.3	2.4	6.7	3.5	2.6	7.7	3.4	2.9	2.5	2.5	10.3	8.0	9.5	201
consulenza ambulatoriale	65.3	57.8	62.9	60.1	57.6	59.4	71.1	56.7	67.3	78.9	76.9	78.7	68.6	88.5	84.1	65.7	63.5	64.9	1'369
terapia residenziale	49.0	56.8	51.4	41.8	39.1	41.1	42.2	40.0	41.6	22.4	30.8	23.6	25.7	9.8	13.4	44.6	43.7	44.3	933
cura di disintossicazione	39.2	42.0	40.1	53.4	46.7	51.7	30.1	46.7	34.5	11.8	30.8	14.6	17.1	5.7	8.3	38.7	35.2	37.5	791
gruppo di aiuto reciproco/ autosost.	7.3	8.6	7.8	3.0	5.4	3.6	2.4	6.7	3.5	1.3	0.0	1.1	0.0	4.9	3.8	5.5	6.8	6.0	126
altro-i	3.0	3.0	3.0	3.4	3.3	3.3	4.8	3.3	4.4	5.3	7.7	5.6	14.3	8.2	9.6	3.8	4.6	4.0	85
<b>N**</b>	<b>898</b>	<b>405</b>	<b>1'303</b>	<b>268</b>	<b>92</b>	<b>360</b>	<b>83</b>	<b>30</b>	<b>113</b>	<b>76</b>	<b>13</b>	<b>89</b>	<b>35</b>	<b>122</b>	<b>157</b>	<b>1'407</b>	<b>701</b>	<b>2'108</b>	<b>2'108</b>
<i>dati mancanti</i>	104	40	144	68	11	79	19	2	21	21	6	27	24	51	75	251	121	372	372

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti che sono già stati presi in carico in precedenza. Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

## T12 Trattamento sostitutivo e altri interventi all'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2006)

	Pazienti: problema principale												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Sostituzione o prescrizione di eroina*</b>																
no	97.1	97.4	97.2	57.2	49.5	55.4	89.4	81.5	87.5	98.9	98.6	98.9	91.2	91.1	91.2	3'114
si	2.9	2.6	2.8	42.8	50.5	44.6	10.6	18.5	12.5	1.1	1.4	1.1	8.8	8.9	8.8	300
<b>N**</b>	<b>1'511</b>	<b>585</b>	<b>2'096</b>	<b>341</b>	<b>103</b>	<b>444</b>	<b>170</b>	<b>54</b>	<b>224</b>	<b>368</b>	<b>72</b>	<b>440</b>	<b>2'514</b>	<b>900</b>	<b>3'414</b>	<b>3'414</b>
<i>dati mancanti</i>	790	328	1'118	144	39	183	62	20	82	122	40	162	1'207	496	1'703	1'703
<b>Tipo di sostituzione***</b>																
eroina	2.5	0.0	1.9	4.8	5.9	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	3.9	3.8	11
metadone	72.5	84.6	75.5	88.4	90.2	88.8	82.4	90.0	85.2	75.0	100.0	80.0	85.0	88.3	85.9	250
altri oppiacei	5.0	0.0	3.8	5.5	3.9	5.1	11.8	10.0	11.1	0.0	0.0	0.0	5.6	5.2	5.5	16
altre sostanze	20.0	15.4	18.9	1.4	0.0	1.0	5.9	0.0	3.7	25.0	0.0	20.0	5.6	2.6	4.8	14
<b>N**</b>	<b>40</b>	<b>13</b>	<b>53</b>	<b>146</b>	<b>51</b>	<b>197</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>27</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>214</b>	<b>77</b>	<b>291</b>	<b>291</b>
<i>dati mancanti</i>	4	2	6	0	1	1	1	0	1	0	0	0	6	3	9	9
<b>Altro intervento parallelo*</b>																
no	86.8	83.4	85.9	76.7	69.6	75.4	83.3	75.6	81.6	93.1	93.9	93.2	85.5	82.3	84.7	2'293
si	13.2	16.6	14.1	23.3	30.4	24.6	16.7	24.4	18.4	6.9	6.1	6.8	14.5	17.7	15.3	414
<b>N**</b>	<b>1'222</b>	<b>464</b>	<b>1'686</b>	<b>331</b>	<b>79</b>	<b>410</b>	<b>144</b>	<b>41</b>	<b>185</b>	<b>231</b>	<b>33</b>	<b>264</b>	<b>2'024</b>	<b>683</b>	<b>2'707</b>	<b>2'707</b>
<i>dati mancanti</i>	1079	449	1528	154	63	217	88	33	121	259	79	338	1697	713	2410	2410
<b>Tipo di intervento parallelo****</b>																
trattamento o consulenza ambulatoriale	63.5	65.8	64.3	74.0	79.2	75.2	69.6	50.0	63.6	81.3	100.0	83.3	68.6	68.3	68.5	281
terapia residenziale	12.6	10.5	11.9	11.7	20.8	13.9	21.7	20.0	21.2	6.3	0.0	5.6	12.8	12.5	12.7	52
gruppo di aiuto reciproco o di autosostegno	6.9	6.6	6.8	2.6	0.0	2.0	4.3	10.0	6.1	0.0	0.0	0.0	4.8	5.0	4.9	20
altro-i	22.0	23.7	22.6	15.6	0.0	11.9	13.0	20.0	15.2	12.5	0.0	11.1	18.6	18.3	18.5	76
<b>N**</b>	<b>159</b>	<b>76</b>	<b>235</b>	<b>77</b>	<b>24</b>	<b>101</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>33</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>290</b>	<b>120</b>	<b>410</b>	<b>410</b>
<i>dati mancanti</i>	2	1	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	1	4	4

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti che seguono un programma di sostituzione. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti presi in carico parallelamente. Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

## T13a Entrata in seguito a una cura di disintossicazione, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2006)

	Pazienti: problema principale												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Entrata in seguito a una cura di disintossicazione*</b>																
no	74.9	72.7	74.3	86.3	85.7	86.2	89.2	87.5	88.8	97.1	83.3	95.9	80.3	77.0	79.5	1'845
disintossicazione nella stessa istituzione	1.2	1.4	1.2	0.4	1.6	0.6	0.0	3.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.8	1.4	0.9	22
disintossicazione in un'altra istituzione	23.9	25.9	24.5	13.4	12.7	13.2	10.8	9.4	10.5	2.9	16.7	4.1	18.9	21.6	19.6	455
<b>N**</b>	<b>1'119</b>	<b>428</b>	<b>1'547</b>	<b>262</b>	<b>63</b>	<b>325</b>	<b>111</b>	<b>32</b>	<b>143</b>	<b>175</b>	<b>18</b>	<b>193</b>	<b>1'735</b>	<b>587</b>	<b>2'322</b>	<b>2'322</b>
<i>dati mancanti</i>	1'182	485	1'667	223	79	302	121	42	163	315	94	409	1'986	809	2'795	2'795

## T13b Frequenza delle cure di disintossicazione senza aiuto professionale prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2006)

Freq. disintossicazioni senza accompagnamento*																
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
mai	57.3	52.9	56.2	18.6	23.8	19.9	52.5	38.9	49.4	72.6	85.7	73.5	53.6	50.2	52.7	599
una volta	9.7	6.9	9.0	10.9	9.5	10.5	13.1	11.1	12.7	13.7	0.0	12.7	10.5	8.1	9.9	112
due o tre volte	12.4	12.2	12.3	21.7	23.8	22.2	6.6	22.2	10.1	5.3	0.0	4.9	12.0	13.7	12.4	141
più di tre volte	20.6	28.0	22.5	48.8	42.9	47.4	27.9	27.8	27.8	8.4	14.3	8.8	24.0	28.1	25.0	284
<b>N**</b>	<b>525</b>	<b>189</b>	<b>714</b>	<b>129</b>	<b>42</b>	<b>171</b>	<b>61</b>	<b>18</b>	<b>79</b>	<b>95</b>	<b>7</b>	<b>102</b>	<b>851</b>	<b>285</b>	<b>1'136</b>	<b>1'136</b>
<i>dati mancanti</i>	1'776	724	2'500	356	100	456	171	56	227	395	105	500	2'870	1'111	3'981	3'981

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

**T14 Problema principale all'entrata (solamente pazienti) (2006)**

Tutti i pazienti										
Problema principale	Uomini	Donne	Totale	N		Uomini	Donne	Totale	N	
	%	%	%			%	%	%		
alcol	62.2	66.2	63.3	3'214	alcol	62.2	66.2	63.3	3'214	
cocktail (eroina e cocaina)	0.5	0.7	0.6	29	cocktail	0.5	0.7	0.6	29	
eroina	11.4	7.9	10.5	531	oppiacei	12.6	9.6	11.8	598	
metadone	1.1	1.2	1.1	55						
altri oppiacei	0.1	0.6	0.2	12	cocaina e derivati	6.3	5.4	6.0	306	
cocaina	6.2	5.4	6.0	303						
crack, freebase	0.1	0.0	0.1	3						
amfetamine	0.2	0.1	0.2	11	stimolanti	0.5	0.2	0.4	20	
MDMA e affini (ecstasy)	0.2	0.1	0.2	9						
altri stimolanti (per es., khat)	0.0	0.0	0.0	0						
barbiturici	0.0	0.0	0.0	0	medicamenti	0.6	1.0	0.7	38	
benzodiazepine	0.5	0.9	0.6	33						
altri sonniferi e tranquillanti	0.1	0.1	0.1	5						
LSD	0.0	0.0	0.0	0	allucinogeni	0.0	0.0	0.0	1	
altri allucinogeni	0.0	0.0	0.0	1						
canapa	13.2	8.1	11.9	602	canapa	13.2	8.1	11.9	602	
tabacco	1.3	3.0	1.8	89	tabacco	1.3	3.0	1.8	89	
sostanze volatili (per es., solventi)	0.1	0.1	0.1	3	altra/e sostanza/e	0.3	0.8	0.4	21	
altra/e sostanza/e	0.2	0.7	0.4	18						
gioco patologico	1.7	0.8	1.5	75	problemi assimilabili a una dipendenza	2.5	5.1	3.2	161	
disturbi alimentari	0.1	2.7	0.8	39						
altri problemi assimilabili a una dipendenza	0.7	1.6	0.9	47						
<b>N**</b>	<b>3'699</b>	<b>1'380</b>	<b>5'079</b>	<b>5'079</b>		<b>3'699</b>	<b>1'380</b>	<b>5'079</b>	<b>5'079</b>	
<i>dati mancanti</i>	22	16	38	38		22	16	38	38	

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

## T15.1a Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso dei 30 ultimi giorni e dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata (2006), uomini

Pazienti: principale sostanza problematica										
Uomini	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Coacaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
<b>Frequenza di consumo 30 ultimi giorni (%)*</b>										
mai	28.2	20.0	27.1	37.2	33.3	5.3	100.0	21.4	0.0	0.0
un giorno alla settimana o meno	7.8	13.3	12.2	16.8	25.0	0.0	0.0	14.7	0.0	50.0
2 a 3 giorni alla settimana	13.3	40.0	11.3	22.5	41.7	0.0	0.0	22.2	0.0	0.0
4 a 6 giorni alla settimana	11.5	6.7	8.3	7.3	0.0	0.0	0.0	10.6	0.0	0.0
una volta al giorno	7.0	6.7	15.8	5.8	0.0	21.1	0.0	9.8	2.6	25.0
più volte al giorno	32.2	13.3	25.3	10.5	0.0	73.7	0.0	21.4	97.4	25.0
<b>N**</b>	<b>1'315</b>	<b>15</b>	<b>336</b>	<b>191</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>388</b>	<b>38</b>	<b>4</b>
<i>dati mancanti</i>	986	5	129	41	5	5	0	102	10	6
<b>Frequenza di consumo 6 ultimi mesi (%)*</b>										
mai	9.0	13.3	22.3	16.9	9.1	10.0	0.0	6.7	2.7	0.0
un giorno alla settimana o meno	7.3	6.7	16.0	23.6	27.3	0.0	0.0	16.2	0.0	20.0
2 a 3 giorni alla settimana	15.6	46.7	12.5	27.7	36.4	10.0	100.0	23.8	0.0	0.0
4 a 6 giorni alla settimana	14.8	6.7	9.0	8.1	27.3	0.0	0.0	10.8	2.7	0.0
una volta al giorno	8.8	0.0	16.0	6.8	0.0	20.0	0.0	8.6	2.7	20.0
più volte al giorno	44.5	26.7	24.2	16.9	0.0	60.0	0.0	34.0	91.9	60.0
<b>N**</b>	<b>1'199</b>	<b>15</b>	<b>256</b>	<b>148</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>315</b>	<b>37</b>	<b>5</b>
<i>dati mancanti</i>	1102	5	209	84	6	14	0	175	11	5

## T15.1b Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso dei 30 ultimi giorni e dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata (2006), uomini

Pazienti: problema principale			
Uomini	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
<b>Frequenza di manifestazione 30 ultimi giorni (%)*</b>			
mai	50.0	0.0	28.6
1 giorno alla settimana o meno	19.0	0.0	0.0
2 a 3 giorni alla settimana	14.3	0.0	0.0
4 a 6 giorni alla settimana	2.4	0.0	28.6
una volta al giorno	0.0	0.0	42.9
più volte al giorno	14.3	0.0	0.0
<b>N**</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
<i>dati mancanti</i>	22	2	18
<b>Frequenza di manifestazione 6 ultimi mesi (%)*</b>			
mai	34.4	0.0	14.3
1 giorno alla settimana o meno	28.1	0.0	0.0
2 a 3 giorni alla settimana	15.6	0.0	14.3
4 a 6 giorni alla settimana	3.1	0.0	28.6
una volta al giorno	3.1	0.0	14.3
più volte al giorno	15.6	0.0	28.6
<b>N**</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
<i>dati mancanti</i>	32	2	18

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

## T15.2a Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso dei 30 ultimi giorni e dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata (2006), donne

Pazienti: principale sostanza problematica										
Donne	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Coacaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
<b>Frequenza di consumo 30 ultimi giorni (%)*</b>										
mai	23.2	42.9	24.2	28.1	0.0	30.0	0.0	14.3	0.0	0.0
un giorno alla settimana o meno	11.5	14.3	13.1	24.6	0.0	0.0	0.0	20.2	5.7	0.0
2 a 3 giorni alla settimana	14.2	14.3	5.1	28.1	50.0	0.0	0.0	17.9	0.0	50.0
4 a 6 giorni alla settimana	13.4	14.3	6.1	10.5	0.0	0.0	0.0	1.2	2.9	0.0
una volta al giorno	8.0	0.0	22.2	1.8	50.0	10.0	0.0	21.4	2.9	0.0
più volte al giorno	29.8	14.3	29.3	7.0	0.0	60.0	0.0	25.0	88.6	50.0
<b>N**</b>	<b>514</b>	<b>7</b>	<b>99</b>	<b>57</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>35</b>	<b>2</b>
<i>dati mancanti</i>	399	2	34	17	1	4	0	28	6	9
<b>Frequenza di consumo 6 ultimi mesi (%)*</b>										
mai	6.6	28.6	14.8	7.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0
un giorno alla settimana o meno	9.3	0.0	9.9	32.6	0.0	20.0	0.0	23.9	3.0	0.0
2 a 3 giorni alla settimana	17.4	42.9	12.3	23.3	100.0	0.0	0.0	19.7	0.0	20.0
4 a 6 giorni alla settimana	16.5	14.3	7.4	18.6	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0
una volta al giorno	8.3	0.0	19.8	2.3	0.0	20.0	0.0	9.9	3.0	0.0
più volte al giorno	41.9	14.3	35.8	16.3	0.0	60.0	0.0	39.4	93.9	80.0
<b>N**</b>	<b>484</b>	<b>7</b>	<b>81</b>	<b>43</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>33</b>	<b>5</b>
<i>dati mancanti</i>	429	2	52	31	2	9	0	41	8	6

## T15.2b Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso dei 30 ultimi giorni e dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata (2006), donne

Pazienti: problema principale			
Donne	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
<b>Frequenza di manifestazione 30 ultimi giorni (%)*</b>			
mai	28.6	0.0	20.0
1 giorno alla settimana o meno	28.6	9.1	20.0
2 a 3 giorni alla settimana	14.3	18.2	50.0
4 a 6 giorni alla settimana	14.3	22.7	0.0
una volta al giorno	0.0	13.6	0.0
più volte al giorno	14.3	36.4	10.0
<b>N**</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>10</b>
<i>dati mancanti</i>	4	15	12
<b>Frequenza di manifestazione 6 ultimi mesi (%)*</b>			
mai	60.0	0.0	20.0
1 giorno alla settimana o meno	20.0	10.5	30.0
2 a 3 giorni alla settimana	20.0	21.1	30.0
4 a 6 giorni alla settimana	0.0	26.3	10.0
una volta al giorno	0.0	10.5	0.0
più volte al giorno	0.0	31.6	10.0
<b>N**</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>10</b>
<i>dati mancanti</i>	6	18	12

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

## T15.3a Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso dei 30 ultimi giorni e dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata (2006), uomini e donne

Pazienti: principale sostanza problematica										
Uomini e donne	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Coacaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
<b>Frequenza di consumo 30 ultimi giorni (%)*</b>										
mai	26.8	27.3	26.4	35.1	28.6	13.8	100.0	20.1	0.0	0.0
un giorno alla settimana o meno	8.9	13.6	12.4	18.5	21.4	0.0	0.0	15.7	2.7	33.3
2 a 3 giorni alla settimana	13.6	31.8	9.9	23.8	42.9	0.0	0.0	21.4	0.0	16.7
4 a 6 giorni alla settimana	12.0	9.1	7.8	8.1	0.0	0.0	0.0	8.9	1.4	0.0
una volta al giorno	7.3	4.5	17.2	4.8	7.1	17.2	0.0	11.9	2.7	16.7
più volte al giorno	31.5	13.6	26.2	9.7	0.0	69.0	0.0	22.0	93.2	33.3
<b>N**</b>	<b>1'829</b>	<b>22</b>	<b>435</b>	<b>248</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>1</b>	<b>472</b>	<b>73</b>	<b>6</b>
<i>dati mancanti</i>	1385	7	163	58	6	9	0	130	16	15
<b>Frequenza di consumo 6 ultimi mesi (%)*</b>										
mai	8.3	18.2	20.5	14.7	8.3	6.7	0.0	6.0	1.4	0.0
un giorno alla settimana o meno	7.8	4.5	14.5	25.7	25.0	6.7	0.0	17.6	1.4	10.0
2 a 3 giorni alla settimana	16.1	45.5	12.5	26.7	41.7	6.7	100.0	23.1	0.0	10.0
4 a 6 giorni alla settimana	15.3	9.1	8.6	10.5	25.0	0.0	0.0	9.6	1.4	0.0
una volta al giorno	8.7	0.0	16.9	5.8	0.0	20.0	0.0	8.8	2.9	10.0
più volte al giorno	43.8	22.7	27.0	16.8	0.0	60.0	0.0	35.0	92.9	70.0
<b>N**</b>	<b>1'683</b>	<b>22</b>	<b>337</b>	<b>191</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>386</b>	<b>70</b>	<b>10</b>
<i>dati mancanti</i>	1531	7	261	115	8	23	0	216	19	11

## T15.3b Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso dei 30 ultimi giorni e dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata (2006), uomini e donne

Pazienti: problema principale			
Uomini e donne	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
<b>Frequenza di manifestazione 30 ultimi giorni (%)*</b>			
mai	46.9	0.0	23.5
1 giorno alla settimana o meno	20.4	9.1	11.8
2 a 3 giorni alla settimana	14.3	18.2	29.4
4 a 6 giorni alla settimana	4.1	22.7	11.8
una volta al giorno	0.0	13.6	17.6
più volte al giorno	14.3	36.4	5.9
<b>N**</b>	<b>49</b>	<b>22</b>	<b>17</b>
<i>dati mancanti</i>	26	17	30
<b>Frequenza di manifestazione 6 ultimi mesi (%)*</b>			
mai	37.8	0.0	17.6
1 giorno alla settimana o meno	27.0	10.5	17.6
2 a 3 giorni alla settimana	16.2	21.1	23.5
4 a 6 giorni alla settimana	2.7	26.3	17.6
una volta al giorno	2.7	10.5	5.9
più volte al giorno	13.5	31.6	17.6
<b>N**</b>	<b>37</b>	<b>19</b>	<b>17</b>
<i>dati mancanti</i>	38	20	30

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

## T16.1a Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2006), uomini

Pazienti: principale sostanza problematica										
Uomini	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Coacaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
<b>Età all'epoca del primo consumo</b>										
media	16.2	21.8	20.6	22.2	19.4	23.0	22.0	15.0	15.9	18.8
deviazione standard	4.3	3.4	5.2	5.9	7.4	3.6	.	1.9	4.4	8.5
1° quartile	15.0	18.5	17.0	17.0	15.5	21.0	22.0	14.0	13.0	15.0
mediana	16.0	22.5	19.0	20.0	17.5	25.0	22.0	15.0	15.0	15.0
3° quartile	18.0	24.5	23.0	26.0	19.5	25.0	22.0	16.0	19.0	16.0
<b>N*</b>	<b>798</b>	<b>12</b>	<b>286</b>	<b>169</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>323</b>	<b>17</b>	<b>5</b>
<i>dati mancanti</i>	1503	8	179	63	5	15	0	167	31	5
<b>Età all'inizio del consumo regolare</b>										
media	22.1	22.8	22.4	24.2	21.5	27.2	22.0	16.2	17.1	27.4
deviazione standard	8.1	3.9	5.6	6.8	8.0	6.3	.	2.7	4.4	12.1
1° quartile	17.0	20.0	18.0	18.0	16.0	22.0	22.0	15.0	14.0	18.0
mediana	20.0	23.0	21.0	23.0	20.0	25.0	22.0	16.0	16.0	24.0
3° quartile	25.0	26.0	25.0	28.0	21.0	32.0	22.0	17.0	20.0	34.0
<b>N*</b>	<b>821</b>	<b>13</b>	<b>266</b>	<b>154</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>300</b>	<b>19</b>	<b>5</b>
<i>dati mancanti</i>	1480	7	199	78	6	11	0	190	29	5
<b>Età all'inizio del consumo problematico</b>										
media	30.5	21.9	23.3	25.2	22.8	34.0	24.0	17.0	18.2	31.0
deviazione standard	11.4	3.0	5.9	7.2	8.1	4.4	.	3.4	5.6	4.2
1° quartile	20.0	20.0	19.0	20.0	18.0	32.0	24.0	15.0	14.5	28.0
mediana	29.0	21.0	22.0	24.0	20.0	35.0	24.0	16.0	17.0	31.0
3° quartile	40.0	23.0	26.0	30.0	26.0	35.0	24.0	17.0	20.0	34.0
<b>N*</b>	<b>635</b>	<b>9</b>	<b>159</b>	<b>119</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>202</b>	<b>12</b>	<b>2</b>
<i>dati mancanti</i>	1666	11	306	113	7	19	0	288	36	8
<b>Periodo di latenza (in anni)**</b>										
media	26.2	9.6	9.5	6.1	6.6	13.0	.	5.8	14.4	14.0
deviazione standard	13.4	10.4	8.6	5.3	7.9	0.0	.	5.9	18.0	12.5
1° quartile	16.1	2.3	2.0	2.0	0.9	13.0	.	1.9	3.0	0.0
mediana	26.1	6.1	7.4	4.6	3.1	13.0	.	3.7	5.5	17.6
3° quartile	34.9	16.9	14.9	9.9	9.9	13.0	.	7.9	13.1	24.3
<b>N*</b>	<b>347</b>	<b>4</b>	<b>50</b>	<b>86</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>237</b>	<b>9</b>	<b>3</b>
<i>dati mancanti</i>	399	0	14	18	2	3	0	82	13	3

\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

\*\* Lasso di tempo tra il primo consumo della sostanza problematica e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

## T16.1b Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2006), donne

Pazienti: principale sostanza problematica										
Donne	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Coacaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
<b>Età all'epoca del primo consumo</b>										
media	17.5	21.5	21.2	19.4	19.0	21.3	.	14.6	17.7	19.6
deviazione standard	6.3	5.6	7.4	4.5	2.8	9.3	.	3.1	7.4	13.6
1° quartile	15.0	17.0	16.0	16.0	17.0	14.0	.	14.0	12.0	12.0
mediana	17.0	20.0	19.0	18.0	19.0	19.0	.	14.0	16.0	13.5
3° quartile	19.0	26.0	25.0	22.0	21.0	27.0	.	15.0	20.0	27.5
<b>N*</b>	<b>280</b>	<b>6</b>	<b>82</b>	<b>54</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>15</b>	<b>4</b>
<i>dati mancanti</i>	633	3	51	20	1	4	0	39	26	7
<b>Età all'inizio del consumo regolare</b>										
media	26.7	22.2	22.2	20.5	19.5	23.8	.	16.1	18.1	23.6
deviazione standard	11.3	6.0	7.1	5.3	2.1	12.1	.	3.7	7.2	13.2
1° quartile	18.0	17.0	18.0	17.0	18.0	15.0	.	15.0	13.0	14.0
mediana	23.0	21.0	20.0	19.0	19.5	20.5	.	15.0	16.0	15.0
3° quartile	34.0	28.0	25.0	23.0	21.0	27.0	.	16.0	20.0	36.0
<b>N*</b>	<b>310</b>	<b>6</b>	<b>81</b>	<b>53</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>17</b>	<b>5</b>
<i>dati mancanti</i>	603	3	52	21	1	4	0	42	24	6
<b>Età all'inizio del consumo problematico</b>										
media	33.9	22.5	23.0	23.7	21.0	17.7	.	16.0	18.7	36.0
deviazione standard	11.8	5.7	7.7	6.5	.	3.5	.	2.4	7.7	.
1° quartile	25.0	18.0	18.0	19.5	21.0	14.0	.	15.0	14.0	36.0
mediana	34.0	21.5	20.0	21.5	21.0	18.0	.	16.0	17.0	36.0
3° quartile	42.0	28.0	25.0	26.0	21.0	21.0	.	17.0	20.0	36.0
<b>N*</b>	<b>261</b>	<b>6</b>	<b>61</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>14</b>	<b>1</b>
<i>dati mancanti</i>	652	3	72	38	2	11	0	66	27	10
<b>Periodo di latenza (in anni)**</b>										
media	46.3	2.5	5.3	4.9	1.1	12.3	.	5.2	21.3	15.7
deviazione standard	194.4	0.3	4.2	6.0	.	5.7	.	3.8	18.9	4.9
1° quartile	17.8	2.2	1.2	1.0	1.1	6.0	.	2.8	2.2	11.5
mediana	28.4	2.5	4.4	3.0	1.1	14.0	.	4.0	28.0	14.4
3° quartile	35.7	2.7	8.0	5.2	1.1	17.0	.	7.3	38.7	21.1
<b>N*</b>	<b>102</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>9</b>	<b>3</b>
<i>dati mancanti</i>	193	0	3	3	0	1	0	21	11	5

\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

\*\* Lasso di tempo tra il primo consumo della sostanza problematica e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

## T16.1c Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2006), uomini e donne

Pazienti: principale sostanza problematica										
Uomini e donne	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Coacaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
<b>Età all'epoca del primo consumo</b>										
media	16.6	21.7	20.7	21.5	19.4	22.1	22.0	14.9	16.7	19.2
deviazione standard	4.9	4.1	5.8	5.7	6.8	7.1	.	2.2	6.0	10.3
1° quartile	15.0	18.0	17.0	17.0	16.0	17.0	22.0	14.0	13.0	14.0
mediana	16.0	22.0	19.0	20.0	17.5	22.0	22.0	15.0	15.0	15.0
3° quartile	18.0	25.0	23.0	25.0	20.0	25.0	22.0	16.0	19.5	16.0
<b>N*</b>	<b>1'078</b>	<b>18</b>	<b>368</b>	<b>223</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>396</b>	<b>32</b>	<b>9</b>
<i>dati mancanti</i>	2'136	11	230	83	6	19	0	206	57	12
<b>Età all'inizio del consumo regolare</b>										
media	23.4	22.6	22.4	23.2	21.2	25.7	22.0	16.2	17.6	25.5
deviazione standard	9.3	4.5	6.0	6.6	7.3	9.2	.	2.9	5.8	12.1
1° quartile	17.0	18.0	18.0	18.0	18.0	20.0	22.0	15.0	14.0	15.0
mediana	20.0	23.0	21.0	22.0	20.0	24.0	22.0	16.0	16.0	21.0
3° quartile	27.0	26.0	25.0	27.0	21.0	32.0	22.0	17.0	20.0	36.0
<b>N*</b>	<b>1'131</b>	<b>19</b>	<b>347</b>	<b>207</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>370</b>	<b>36</b>	<b>10</b>
<i>dati mancanti</i>	2'083	10	251	99	7	15	0	232	53	11
<b>Età all'inizio del consumo problematico</b>										
media	31.5	22.1	23.2	24.8	22.6	27.9	24.0	16.8	18.5	32.7
deviazione standard	11.6	4.1	6.4	7.0	7.7	9.3	.	3.3	6.7	4.2
1° quartile	21.0	19.0	19.0	20.0	18.0	19.5	24.0	15.0	14.0	28.0
mediana	30.0	21.0	21.0	23.0	20.0	30.0	24.0	16.0	17.0	34.0
3° quartile	40.0	26.0	25.5	30.0	26.0	35.0	24.0	17.0	20.0	36.0
<b>N*</b>	<b>896</b>	<b>15</b>	<b>220</b>	<b>155</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>248</b>	<b>26</b>	<b>3</b>
<i>dati mancanti</i>	2'318	14	378	151	9	30	0	354	63	18
<b>Periodo di latenza (in anni)**</b>										
media	30.8	7.3	8.6	5.8	6.1	12.6	.	5.7	17.8	14.8
deviazione standard	93.5	8.9	8.0	5.5	7.7	4.0	.	5.5	18.3	8.6
1° quartile	16.5	2.2	2.0	1.7	0.9	13.0	.	2.0	2.2	11.5
mediana	27.0	2.7	6.9	4.0	2.8	13.0	.	3.8	7.0	16.0
3° quartile	35.4	9.4	13.2	8.6	9.9	14.0	.	7.9	38.7	21.1
<b>N*</b>	<b>449</b>	<b>6</b>	<b>64</b>	<b>116</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>290</b>	<b>18</b>	<b>6</b>
<i>dati mancanti</i>	592	0	17	21	2	4	0	103	24	8

\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

\*\* Lasso di tempo tra il primo consumo della sostanza problematica e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

## T16.2a Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2006), uomini

Pazienti: problema principale			
<i>Uomini</i>	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
<b>Età all'epoca della prima manifestazione</b>			
media	31.4	.	34.0
deviazione standard	9.9	.	8.5
1° quartile	25.0	.	28.0
mediana	29.5	.	34.0
3° quartile	40.0	.	40.0
<b>N*</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<i>dati mancanti</i>	38	2	23
<b>Età all'inizio della manifestazione regolare</b>			
media	32.0	.	30.7
deviazione standard	9.2	.	8.3
1° quartile	27.0	.	24.0
mediana	30.5	.	28.0
3° quartile	40.0	.	40.0
<b>N*</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<i>dati mancanti</i>	36	2	22
<b>Età all'inizio della manifestazione problematica</b>			
media	32.4	.	33.3
deviazione standard	9.2	.	7.6
1° quartile	27.0	.	27.0
mediana	31.0	.	34.5
3° quartile	40.0	.	39.5
<b>N*</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<i>dati mancanti</i>	37	2	21
<b>Periodo di latenza (in anni)**</b>			
media	3.9	.	6.2
deviazione standard	3.0	.	7.2
1° quartile	1.7	.	1.1
mediana	3.0	.	6.2
3° quartile	5.7	.	11.4
<b>N*</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<i>dati mancanti</i>	39	2	23

\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

\*\* Lasso di tempo tra la prima manifestazione del comportamento problematico e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

## T16.2b Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2006), donne

Pazienti: problema principale			
Donne	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
<b>Età all'epoca della prima manifestazione</b>			
media	28.3	17.3	28.2
deviazione standard	6.0	3.9	17.7
1° quartile	22.0	15.0	16.0
mediana	29.0	16.0	40.0
3° quartile	34.0	18.0	40.0
<b>N*</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>5</b>
<i>dati mancanti</i>	8	20	17
<b>Età all'inizio della manifestazione regolare</b>			
media	29.3	18.1	31.3
deviazione standard	6.4	4.3	12.4
1° quartile	22.0	14.5	18.0
mediana	32.0	17.0	32.5
3° quartile	34.0	21.0	42.0
<b>N*</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>6</b>
<i>dati mancanti</i>	8	21	16
<b>Età all'inizio della manifestazione problematica</b>			
media	29.3	18.4	26.2
deviazione standard	6.4	4.7	12.2
1° quartile	22.0	15.0	18.0
mediana	32.0	17.0	22.5
3° quartile	34.0	24.0	40.0
<b>N*</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>6</b>
<i>dati mancanti</i>	8	22	16
<b>Periodo di latenza (in anni)**</b>			
media	2.1	8.2	12.1
deviazione standard	2.0	7.4	10.0
1° quartile	0.5	3.0	6.1
mediana	1.5	4.9	10.0
3° quartile	4.4	10.9	18.2
<b>N*</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>4</b>
<i>dati mancanti</i>	8	20	18

\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

\*\* Lasso di tempo tra la prima manifestazione del comportamento problematico e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

**T16.2c Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2006), uomini e donne**

Pazienti: problema principale			
<i>Uomini e donne</i>	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
<b>Età all'epoca della prima manifestazione</b>			
media	31.1	17.3	29.9
deviazione standard	9.5	3.9	15.1
1° quartile	25.0	15.0	16.0
mediana	29.0	16.0	40.0
3° quartile	40.0	18.0	40.0
<b>N*</b>	<b>29</b>	<b>17</b>	<b>7</b>
<i>dati mancanti</i>	46	22	40
<b>Età all'inizio della manifestazione regolare</b>			
media	31.8	18.1	31.1
deviazione standard	8.9	4.3	10.7
1° quartile	27.0	14.5	24.0
mediana	31.0	17.0	28.0
3° quartile	40.0	21.0	40.0
<b>N*</b>	<b>31</b>	<b>16</b>	<b>9</b>
<i>dati mancanti</i>	44	23	38
<b>Età all'inizio della manifestazione problematica</b>			
media	32.1	18.4	29.0
deviazione standard	8.9	4.7	10.8
1° quartile	27.0	15.0	20.0
mediana	31.5	17.0	27.5
3° quartile	38.0	24.0	40.0
<b>N*</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>10</b>
<i>dati mancanti</i>	45	24	37
<b>Periodo di latenza (in anni)**</b>			
media	3.7	8.2	10.2
deviazione standard	3.0	7.4	8.9
1° quartile	1.5	3.0	2.4
mediana	2.8	4.9	10.0
3° quartile	5.3	10.9	11.4
<b>N*</b>	<b>28</b>	<b>17</b>	<b>6</b>
<i>dati mancanti</i>	47	22	41

\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

\*\* Lasso di tempo tra la prima manifestazione del comportamento problematico e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

## T17 Modo di amministrazione della principale sostanza problematica nel corso dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata (2006)

Pazienti: principale sostanza problematica															
Modo di amministrazione*	Eroina			Cocaina			Amfetamine			Canapa			Benzodiazepine		
	Uomini %	Donne %	Totale %	Uomini %	Donne %	Totale %									
iniettato	29.4	39.7	31.9	8.9	22.2	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	7.7
fumato/inalato	42.4	29.3	39.1	16.3	22.2	17.9	0.0	0.0	0.0	99.3	100.0	99.4	0.0	0.0	0.0
ingerito /bevuto	1.1	0.0	0.9	0.8	0.0	0.6	20.0	100.0	33.3	0.7	0.0	0.6	90.0	66.7	84.6
sniffato	26.6	31.0	27.7	74.0	55.6	69.0	80.0	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	7.7
altro	0.6	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>N**</b>	<b>177</b>	<b>58</b>	<b>235</b>	<b>123</b>	<b>45</b>	<b>168</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>283</b>	<b>63</b>	<b>346</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>13</b>
<i>dati mancanti</i>	245	51	296	106	29	135	4	1	5	207	49	256	10	10	20

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

**T18 Prevalenza delle iniezioni a vita, nel corso dei 30 ultimi giorni e dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata, scambio di materiale d'iniezione nel corso dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata e età all'epoca della prima iniezione, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2006)**

	Pazienti: pricipale sostanza problematica												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Iniezioni nel corso della vita*</b>																
sì	10.3	9.9	10.2	68.3	60.0	66.3	36.2	47.7	38.8	25.9	33.3	27.2	22.9	20.8	22.3	639
no	89.7	90.1	89.8	31.7	40.0	33.7	63.8	52.3	61.2	74.1	66.7	72.8	77.1	79.2	77.7	2'221
<b>N**</b>	<b>1'222</b>	<b>473</b>	<b>1'695</b>	<b>290</b>	<b>90</b>	<b>380</b>	<b>152</b>	<b>44</b>	<b>196</b>	<b>344</b>	<b>72</b>	<b>416</b>	<b>2'104</b>	<b>756</b>	<b>2'860</b>	<b>2'860</b>
<i>dati mancanti</i>	1'079	440	1'519	195	52	247	80	30	110	146	40	186	1'617	640	2'257	2'257
<b>Iniezioni nel corso dei 6 ultimi mesi*</b>																
sì	3.7	4.7	4.0	40.8	42.9	41.3	26.8	45.5	31.1	24.3	30.1	25.4	13.8	14.7	14.1	397
no	96.3	95.3	96.0	59.2	57.1	58.7	73.2	54.5	68.9	75.7	69.9	74.6	86.2	85.3	85.9	2'428
<b>N**</b>	<b>1'212</b>	<b>472</b>	<b>1'684</b>	<b>267</b>	<b>91</b>	<b>358</b>	<b>149</b>	<b>44</b>	<b>193</b>	<b>345</b>	<b>73</b>	<b>418</b>	<b>2'068</b>	<b>757</b>	<b>2'825</b>	<b>2'825</b>
<i>dati mancanti</i>	1'089	441	1'530	218	51	269	83	30	113	145	39	184	1'653	639	2'292	2'292
<b>Iniezioni nel corso dei 30 ultimi giorni*</b>																
sì	1.1	0.6	1.0	38.9	35.6	38.1	11.8	24.4	14.6	0.0	0.0	0.0	6.1	5.5	6.0	182
no	98.9	99.4	99.0	61.1	64.4	61.9	88.2	75.6	85.4	100.0	100.0	100.0	93.9	94.5	94.0	2'871
<b>N**</b>	<b>1'358</b>	<b>505</b>	<b>1'863</b>	<b>262</b>	<b>87</b>	<b>349</b>	<b>153</b>	<b>45</b>	<b>198</b>	<b>346</b>	<b>76</b>	<b>422</b>	<b>2'238</b>	<b>815</b>	<b>3'053</b>	<b>3'053</b>
<i>dati mancanti</i>	943	408	1'351	223	55	278	79	29	108	144	36	180	1'483	581	2'064	2'064
<b>Scambio di materiale d'iniezione nel corso dei 6 ultimi mesi***</b>																
sì	2.7	0.0	1.8	9.4	14.3	10.3	3.2	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	3.6	2.8	3.4	10
no	97.3	100.0	98.2	90.6	85.7	89.7	96.8	100.0	97.6	100.0	100.0	100.0	96.4	97.2	96.6	283
<b>N**</b>	<b>37</b>	<b>18</b>	<b>55</b>	<b>64</b>	<b>14</b>	<b>78</b>	<b>31</b>	<b>11</b>	<b>42</b>	<b>83</b>	<b>22</b>	<b>105</b>	<b>221</b>	<b>72</b>	<b>293</b>	<b>293</b>
<i>dati mancanti</i>	5	3	8	25	15	40	5	4	9	1	0	1	38	23	61	61
<b>Età all'epoca della prima iniezione****</b>																
fino a 14 anni	5.7	10.0	6.3	3.4	11.8	5.3	9.1	10.0	9.4	0.0	0.0	0.0	4.5	10.2	5.7	15
da 15 a 16 anni	9.4	20.0	11.1	6.8	14.7	8.6	13.6	0.0	9.4	25.0	50.0	30.0	9.4	15.3	10.7	28
da 17 a 18 anni	26.4	30.0	27.0	23.1	20.6	22.5	27.3	40.0	31.3	25.0	0.0	20.0	24.3	25.4	24.5	64
da 19 a 20 anni	13.2	20.0	14.3	17.9	23.5	19.2	9.1	10.0	9.4	0.0	0.0	0.0	14.9	18.6	15.7	41
da 21 a 25 anni	26.4	20.0	25.4	28.2	17.6	25.8	31.8	30.0	31.3	37.5	0.0	30.0	28.2	20.3	26.4	69
da 26 a 30 anni	9.4	0.0	7.9	14.5	11.8	13.9	0.0	10.0	3.1	12.5	0.0	10.0	11.9	8.5	11.1	29
da 31 a 39 anni	5.7	0.0	4.8	4.3	0.0	3.3	9.1	0.0	6.3	0.0	50.0	10.0	5.0	1.7	4.2	11
dai 40 anni in su	3.8	0.0	3.2	1.7	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.5	4
<b>N**</b>	<b>53</b>	<b>10</b>	<b>63</b>	<b>117</b>	<b>34</b>	<b>151</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>32</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>202</b>	<b>59</b>	<b>261</b>	<b>261</b>
<i>dati mancanti</i>	73	37	110	81	20	101	33	11	44	81	22	103	280	98	378	378

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti che si sono iniettati una sostanza illegale nel corso dei 6 ultimi mesi. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti che si sono iniettati una sostanza illegale nel corso della loro vita. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

## T19.1a Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2006), uomini

## Uomini

	Pazienti: principale sostanza problematica									
	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Altri problemi*</b>										
alcol		27.8	33.3	40.9	41.7	35.0	0.0	23.6	29.4	11.1
cocktail (eroina e cocaina)	0.6		6.1	3.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
eroina	2.8	44.4	2.8	15.8	0.0	50.0	0.0	2.2	0.0	22.2
metadone	1.5	27.8	28.4	6.4	0.0	35.0	0.0	0.3	0.0	0.0
altri oppiacei	0.2	0.0	3.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
cocaina	6.9	44.4	43.0	0.5	25.0	20.0	0.0	8.8	0.0	11.1
crack, freebase	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
amfetamine	0.6	0.0	2.5	3.9	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0
MDMA e affini (ecstasy)	0.7	5.6	5.2	10.3	25.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0
altri stimolanti	0.1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
barbiturici	0.1	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
benzodiazepine	3.2	27.8	15.2	5.9	0.0	10.0	0.0	0.8	0.0	11.1
altri sonniferi e tranquillanti	1.0	0.0	1.4	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.3	5.6	4.1	1.5	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0
altri allucinogeni	0.0	5.6	0.6	1.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0
sostanze volatili (per es., solventi)	0.1	0.0	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
canapa	9.2	44.4	40.2	37.9	41.7	20.0	0.0		11.8	11.1
tabacco	27.6	38.9	38.6	32.0	41.7	35.0	0.0	26.9		11.1
altra/e sostanza/e	0.6	0.0	1.1	1.5	0.0	0.0	0.0	0.5	5.9	
gioco patologico	0.1	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1
disturbi alimentari	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
altri problemi assimilabili a una dipendenza	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
nessun altro problema di dipendenza	59.7	11.1	17.1	20.2	8.3	20.0	0.0	52.2	70.6	44.4
<b>N**</b>	<b>1'267</b>	<b>18</b>	<b>363</b>	<b>203</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>364</b>	<b>17</b>	<b>9</b>
<i>dati mancanti</i>	<i>1'034</i>	<i>2</i>	<i>102</i>	<i>29</i>	<i>5</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>126</i>	<i>31</i>	<i>1</i>

\* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

## T19.1b Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2006), donne

## Donne

Pazienti: principale sostanza problematica										
	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Altri problemi*</b>										
alcol		0.0	31.0	47.5	100.0	23.1	0.0	25.0	8.3	0.0
cocktail (eroina e cocaina)	0.0		5.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
eroina	1.7	0.0	4.0	16.9	0.0	7.7	0.0	2.5	0.0	0.0
metadone	2.1	14.3	18.0	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
altri oppiacei	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaina	3.9	14.3	33.0	0.0	0.0	15.4	0.0	13.8	0.0	0.0
crack, freebase	0.0	0.0	2.0	3.4	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0
amfetamine	0.4	42.9	2.0	18.6	100.0	7.7	0.0	2.5	0.0	0.0
MDMA e affini (ecstasy)	0.8	28.6	6.0	16.9	0.0	7.7	0.0	10.0	0.0	0.0
altri stimolanti	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
barbiturici	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazepine	8.7	0.0	26.0	8.5	0.0	7.7	0.0	2.5	0.0	10.0
altri sonniferi e tranquillanti	1.4	0.0	3.0	3.4	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0
LSD	0.4	0.0	7.0	5.1	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0
altri allucinogeni	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sostanze volatili (per es., solventi)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0
canapa	7.0	28.6	29.0	47.5	0.0	23.1	0.0		8.3	0.0
tabacco	27.3	0.0	34.0	33.9	0.0	46.2	0.0	38.8		10.0
altra/e sostanza/e	0.4	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	
gioco patologico	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
disturbi alimentari	3.3	28.6	5.0	1.7	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0
altri problemi assimilabili a una dipendenza	1.2	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0
nessun altro problema di dipendenza	57.6	28.6	20.0	11.9	0.0	38.5	0.0	41.3	83.3	80.0
<b>N**</b>	<b>483</b>	<b>7</b>	<b>100</b>	<b>59</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>12</b>	<b>10</b>
<i>dati mancanti</i>	<i>430</i>	<i>2</i>	<i>33</i>	<i>15</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>32</i>	<i>29</i>	<i>1</i>

\* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

## T19.1c Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2006), uomini e donne

## Uomini e donne

	Pazienti: principale sostanza problematica									
	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Altri problemi*</b>										
alcol		20.0	32.8	42.4	46.2	30.3	0.0	23.9	20.7	5.3
cocktail (eroina e cocaina)	0.4		5.8	3.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
eroina	2.5	32.0	3.0	16.0	0.0	33.3	0.0	2.3	0.0	10.5
metadone	1.7	24.0	26.1	7.3	0.0	21.2	0.0	0.2	0.0	0.0
altri oppiacei	0.3	0.0	2.6	0.4	0.0	3.0	0.0	0.2	0.0	0.0
cocaina	6.1	36.0	40.8	0.4	23.1	18.2	0.0	9.7	0.0	5.3
crack, freebase	0.0	0.0	1.7	0.8	0.0	3.0	0.0	0.2	0.0	0.0
amfetamine	0.5	12.0	2.4	7.3	7.7	3.0	0.0	3.2	0.0	0.0
MDMA e affini (ecstasy)	0.7	12.0	5.4	11.8	23.1	3.0	0.0	5.6	0.0	0.0
altri stimolanti	0.1	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
barbiturici	0.1	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
benzodiazepine	4.7	20.0	17.5	6.5	0.0	9.1	0.0	1.1	0.0	10.5
altri sonniferi e tranquillanti	1.1	0.0	1.7	1.9	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
LSD	0.3	4.0	4.8	2.3	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0
altri allucinogeni	0.0	4.0	0.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0
sostanze volatili (per es., solventi)	0.1	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
canapa	8.6	40.0	37.8	40.1	38.5	21.2	0.0		10.3	5.3
tabacco	27.5	28.0	37.6	32.4	38.5	39.4	0.0	29.1		10.5
altra/e sostanza/e	0.5	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.9	3.4	
gioco patologico	0.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3
disturbi alimentari	0.9	8.0	1.1	0.8	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0
altri problemi assimilabili a una dipendenza	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
nessun altro problema di dipendenza	59.1	16.0	17.7	18.3	7.7	27.3	0.0	50.2	75.9	63.2
<b>N**</b>	<b>1'750</b>	<b>25</b>	<b>463</b>	<b>262</b>	<b>13</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>444</b>	<b>29</b>	<b>19</b>
<i>dati mancanti</i>	<i>1'464</i>	<i>4</i>	<i>135</i>	<i>44</i>	<i>7</i>	<i>5</i>	<i>1</i>	<i>158</i>	<i>60</i>	<i>2</i>

\* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

## T19.2a Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2006), uomini

## Uomini

Pazienti: problema principale			
	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
	%	%	%
<b>Altri problemi*</b>			
alcol	7.7	0.0	12.5
cocktail (eroina e cocaina)	0.0	0.0	0.0
eroina	0.0	0.0	12.5
metadone	0.0	0.0	0.0
altri oppiacei	0.0	0.0	0.0
cocaina	0.0	0.0	0.0
crack, freebase	0.0	0.0	0.0
amfetamine	0.0	0.0	0.0
MDMA e affini (ecstasy)	0.0	0.0	0.0
altri stimolanti	0.0	0.0	0.0
barbiturici	0.0	0.0	0.0
benzodiazepine	0.0	0.0	0.0
altri sonniferi e tranquillanti	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0
altri allucinogeni	0.0	0.0	0.0
sostanze volatili (per es., solventi)	0.0	0.0	0.0
canapa	2.6	0.0	0.0
tabacco	12.8	0.0	37.5
altra/e sostanza/e	0.0	0.0	0.0
gioco patologico		0.0	0.0
disturbi alimentari	0.0		0.0
altri problemi assimilabili a una dipendenza	2.6	0.0	
nessun altro problema di dipendenza	74.4	0.0	50.0
<b>N**</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
<i>dati mancanti</i>	25	2	17

\* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

## T19.2b Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2006), donne

## Donne

Pazienti: problema principale			
	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
	%	%	%
<b>Altri problemi*</b>			
alcol	14.3	13.6	10.0
cocktail (eroina e cocaina)	0.0	0.0	0.0
eroina	0.0	0.0	0.0
metadone	0.0	0.0	0.0
altri oppiacei	0.0	0.0	0.0
cocaina	0.0	0.0	0.0
crack, freebase	0.0	0.0	0.0
amfetamine	0.0	0.0	0.0
MDMA e affini (ecstasy)	0.0	0.0	0.0
altri stimolanti	0.0	0.0	0.0
barbiturici	0.0	0.0	0.0
benzodiazepine	0.0	0.0	0.0
altri sonniferi e tranquillanti	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0
altri allucinogeni	0.0	0.0	0.0
sostanze volatili (per es., solventi)	0.0	0.0	0.0
canapa	0.0	0.0	0.0
tabacco	0.0	4.5	10.0
altra/e sostanza/e	0.0	0.0	0.0
gioco patologico		0.0	0.0
disturbi alimentari	14.3		20.0
altri problemi assimilabili a una dipendenza	0.0	0.0	
nessun altro problema di dipendenza	85.7	81.8	60.0
<b>N**</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>10</b>
<i>dati mancanti</i>	4	15	12

\* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

### T19.2c Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2006), uomini e donne

#### Uomini e donne

Pazienti: problema principale			
	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
	%	%	%
<b>Altri problemi*</b>			
alcol	8.7	13.6	11.1
cocktail (eroina e cocaina)	0.0	0.0	0.0
eroina	0.0	0.0	5.6
metadone	0.0	0.0	0.0
altri oppiacei	0.0	0.0	0.0
cocaina	0.0	0.0	0.0
crack, freebase	0.0	0.0	0.0
amfetamine	0.0	0.0	0.0
MDMA e affini (ecstasy)	0.0	0.0	0.0
altri stimolanti	0.0	0.0	0.0
barbiturici	0.0	0.0	0.0
benzodiazepine	0.0	0.0	0.0
altri sonniferi e tranquillanti	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0
altri allucinogeni	0.0	0.0	0.0
sostanze volatili (per es., solventi)	0.0	0.0	0.0
canapa	2.2	0.0	0.0
tabacco	10.9	4.5	22.2
altra/e sostanza/e	0.0	0.0	0.0
gioco patologico		0.0	0.0
disturbi alimentari	2.2		11.1
altri problemi assimilabili a una dipendenza	2.2	0.0	
nessun altro problema di dipendenza	76.1	81.8	55.6
<b>N**</b>	<b>46</b>	<b>22</b>	<b>18</b>
<i>dati mancanti</i>	29	17	29

\* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

**T20 Frequenza del consumo di alcol, numero di "bicchieri standard" al giorno e frequenza di forti consumi di alcol prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti ) (2006)**

	Pazienti: problema principale												Tutti i pazienti			N
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Frequenza del consumo di alcol*</b>																
mai	11.2	9.4	10.7	13.0	22.2	15.2	10.4	8.3	9.9	15.4	20.4	16.3	12.3	12.2	12.3	310
1 volta al mese o meno	3.4	3.7	3.5	15.5	15.9	15.6	13.6	11.1	13.0	14.5	24.1	16.3	7.2	8.2	7.5	189
2 a 4 volte al mese	6.1	5.8	6.0	20.3	28.6	22.2	20.0	33.3	23.0	41.2	37.0	40.4	13.7	12.8	13.5	340
2 a 3 volte alla settimana	18.2	18.9	18.4	21.3	15.9	20.0	34.4	25.0	32.3	19.3	14.8	18.4	19.6	18.6	19.4	489
4 volte alla settimana o più	61.0	62.2	61.3	30.0	17.5	27.0	21.6	22.2	21.7	9.6	3.7	8.5	47.2	48.1	47.4	1'199
<b>N**</b>	<b>1'239</b>	<b>481</b>	<b>1'720</b>	<b>207</b>	<b>63</b>	<b>270</b>	<b>125</b>	<b>36</b>	<b>161</b>	<b>228</b>	<b>54</b>	<b>282</b>	<b>1'856</b>	<b>671</b>	<b>2'527</b>	<b>2'527</b>
<i>dati mancanti</i>	1'062	432	1'494	278	79	357	107	38	145	262	58	320	1'865	725	2'590	2'590
<b>Numero di "bicchieri standard" al giorno***</b>																
1 o 2	7.2	8.7	7.6	43.9	66.7	48.7	41.8	32.1	39.7	50.3	59.5	52.0	19.6	20.9	19.9	395
3 o 4	18.2	21.7	19.2	37.4	14.3	32.5	35.7	32.1	34.9	31.7	29.7	31.4	23.3	21.7	22.8	453
5 o 6	21.9	21.2	21.7	10.3	14.3	11.2	12.2	28.6	15.9	9.6	8.1	9.3	18.2	19.8	18.6	369
7 o 9	20.6	23.0	21.3	3.9	2.4	3.6	6.1	7.1	6.3	5.4	0.0	4.4	15.6	17.9	16.2	321
10 o più	32.1	25.5	30.3	4.5	2.4	4.1	4.1	0.0	3.2	3.0	2.7	2.9	23.4	19.8	22.4	445
<b>N**</b>	<b>1'005</b>	<b>392</b>	<b>1'397</b>	<b>155</b>	<b>42</b>	<b>197</b>	<b>98</b>	<b>28</b>	<b>126</b>	<b>167</b>	<b>37</b>	<b>204</b>	<b>1'462</b>	<b>521</b>	<b>1'983</b>	<b>1'983</b>
<i>dati mancanti</i>	1'296	521	1'817	330	100	430	134	46	180	323	75	398	2'259	875	3'134	3'134
<b>Frequenza di forti consumi di alcol***</b>																
mai	12.9	15.2	13.5	43.5	54.0	46.0	39.0	37.0	38.6	53.7	72.7	57.3	24.3	27.6	25.2	519
meno di una volta al mese	10.5	11.1	10.6	16.8	22.0	18.0	20.0	22.2	20.5	22.3	13.6	20.7	13.4	12.8	13.2	273
1 volta al mese	11.0	10.8	10.9	13.0	4.0	10.9	14.0	22.2	15.7	12.2	11.4	12.1	11.5	10.8	11.3	234
1 volta alla settimana	23.5	21.1	22.8	19.9	16.0	19.0	22.0	7.4	18.9	9.0	2.3	7.8	20.7	17.3	19.8	409
quasi ogni giorno	42.2	41.9	42.1	6.8	4.0	6.2	5.0	11.1	6.3	2.7	0.0	2.2	30.1	31.5	30.4	628
<b>N**</b>	<b>1'031</b>	<b>389</b>	<b>1'420</b>	<b>161</b>	<b>50</b>	<b>211</b>	<b>100</b>	<b>27</b>	<b>127</b>	<b>188</b>	<b>44</b>	<b>232</b>	<b>1'524</b>	<b>539</b>	<b>2'063</b>	<b>2'063</b>
<i>dati mancanti</i>	1'270	524	1'794	324	92	416	132	47	179	302	68	370	2'197	857	3'054	3'054

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti che hanno indicato un consumo d'alcol. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

## T21 Frequenza del consumo di tabacco e numero di sigarette al giorno nel corso dei 30 ultimi giorni prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2006)

	Pazienti: problema principale												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Frequenza del consumo di tabacco*</b>																
mai	30.0	40.8	33.2	5.2	4.8	5.1	13.4	12.5	13.2	21.2	13.5	19.8	22.9	29.8	24.8	450
1 giorno alla settimana o meno	1.5	0.7	1.3	1.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	3.1	5.8	3.6	1.5	1.2	1.4	26
2 a 3 giorni alla settimana	1.5	0.3	1.2	1.0	1.6	1.2	2.1	0.0	1.6	3.5	1.9	3.2	1.8	0.8	1.5	28
4 a 6 giorni alla settimana	1.3	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.9	1.8	1.0	1.0	1.0	18
1 volta al giorno	1.5	0.3	1.2	1.0	4.8	2.0	2.1	6.3	3.1	2.7	3.8	2.9	1.6	1.6	1.6	29
più volte al giorno	64.1	56.5	61.8	91.7	88.7	90.9	82.5	81.3	82.2	67.7	73.1	68.7	71.2	65.7	69.6	1'264
<b>N**</b>	<b>710</b>	<b>299</b>	<b>1'009</b>	<b>192</b>	<b>62</b>	<b>254</b>	<b>97</b>	<b>32</b>	<b>129</b>	<b>226</b>	<b>52</b>	<b>278</b>	<b>1'308</b>	<b>507</b>	<b>1'815</b>	<b>1'815</b>
<i>dati mancanti</i>	1'591	614	2'205	293	80	373	135	42	177	264	60	324	2'413	889	3'302	3'302
<b>Numero di sigarette al giorno***</b>																
0 a 10	14.4	15.9	14.7	12.4	13.0	12.6	24.3	23.8	24.2	45.0	54.1	46.9	19.9	22.3	20.5	231
11 a 20	33.4	37.2	34.4	40.0	47.8	41.9	43.2	66.7	48.4	47.1	35.1	44.6	38.6	40.9	39.2	441
21 a 30	33.2	27.6	31.8	31.0	23.9	29.3	24.3	9.5	21.1	5.7	5.4	5.6	27.2	23.0	26.1	294
31 o più	19.1	19.3	19.1	16.6	15.2	16.2	8.1	0.0	6.3	2.1	5.4	2.8	14.3	13.7	14.1	159
<b>N**</b>	<b>425</b>	<b>145</b>	<b>570</b>	<b>145</b>	<b>46</b>	<b>191</b>	<b>74</b>	<b>21</b>	<b>95</b>	<b>140</b>	<b>37</b>	<b>177</b>	<b>834</b>	<b>291</b>	<b>1'125</b>	<b>1'125</b>
<i>dati mancanti</i>	72	32	104	37	13	50	10	7	17	38	8	46	175	65	240	240

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti che hanno indicato un consumo di tabacco. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

## T22a Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2006), uomini

Pazienti: principale sostanza problematica										
	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Obiettivo di consumo*</b>										
astinenza definitiva	39.2	60.0	71.4	82.5	80.0	37.5	0.0	41.2	60.0	100.0
astinenza limitata nel tempo	20.5	0.0	2.3	4.4	0.0	6.3	0.0	11.0	0.0	0.0
consumo controllato	23.1	20.0	9.9	4.4	0.0	37.5	0.0	24.2	20.0	0.0
non è prevista nessuna limitazione	2.5	10.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0
nessuna decisione finora	14.1	10.0	13.2	8.8	20.0	12.5	100.0	20.9	20.0	0.0
altro	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>N*</b>	<b>1'147</b>	<b>10</b>	<b>304</b>	<b>137</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>182</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
<i>dati mancanti</i>	1'154	10	161	95	12	8	0	308	43	6

## T22b Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2006), donne

<b>Obiettivo di consumo*</b>										
astinenza definitiva	40.4	50.0	81.7	65.8	0.0	70.0	0.0	50.0	70.0	80.0
astinenza limitata nel tempo	13.9	0.0	1.4	2.6	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	0.0
consumo controllato	33.9	0.0	9.9	13.2	0.0	20.0	0.0	7.1	0.0	20.0
non è prevista nessuna limitazione	1.2	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	10.0	0.0
nessuna decisione finora	10.4	50.0	5.6	18.4	0.0	10.0	0.0	21.4	20.0	0.0
altro	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0
<b>N*</b>	<b>431</b>	<b>2</b>	<b>71</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>5</b>
<i>dati mancanti</i>	482	7	62	36	3	4	0	84	31	6

## T22c Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2006), uomini e donne

<b>Obiettivo di consumo*</b>										
astinenza definitiva	39.5	58.3	73.3	78.9	80.0	50.0	0.0	42.4	66.7	88.9
astinenza limitata nel tempo	18.7	0.0	2.1	4.0	0.0	3.8	0.0	11.0	0.0	0.0
consumo controllato	26.0	16.7	9.9	6.3	0.0	30.8	0.0	21.9	6.7	11.1
non è prevista nessuna limitazione	2.2	8.3	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	6.7	0.0
nessuna decisione finora	13.1	16.7	11.7	10.9	20.0	11.5	100.0	21.0	20.0	0.0
altro	0.4	0.0	0.8	0.0	0.0	3.8	0.0	0.5	0.0	0.0
<b>N*</b>	<b>1'578</b>	<b>12</b>	<b>375</b>	<b>175</b>	<b>5</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>210</b>	<b>15</b>	<b>9</b>
<i>dati mancanti</i>	1'636	17	223	131	15	12	0	392	74	12

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T23 Sesso e età dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale<sup>1</sup>) e dei parenti o conoscenti (2006)

	Pazienti: problema principale <sup>1</sup>												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
<b>Sesso*</b>																			
maschile			70.0			75.6			72.4			81.8			22.3			61.0	2'449
femminile			30.0			22.1			27.6			17.4			77.7			37.4	1'503
sesso non noto			0.0			2.3			0.0			0.8			0.0			1.6	63
<b>N**</b>	<b>1'341</b>	<b>575</b>	<b>1'916</b>	<b>232</b>	<b>68</b>	<b>307</b>	<b>110</b>	<b>42</b>	<b>152</b>	<b>315</b>	<b>67</b>	<b>385</b>	<b>157</b>	<b>546</b>	<b>703</b>	<b>2'449</b>	<b>1'503</b>	<b>4'015</b>	<b>4'015</b>
<b>Età (in anni)*</b>																			
fino a 14 anni	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.6	2.7	2.7	0.8	1.2	0.6	0.8	0.6	25
15-19	1.3	0.7	1.1	1.3	11.9	3.7	8.2	16.7	10.5	53.8	63.1	55.4	12.8	3.9	5.9	9.7	6.4	8.5	327
20-24	3.7	2.5	3.3	11.0	28.4	14.9	25.5	31.0	27.0	20.2	12.3	18.8	4.7	4.1	4.2	7.9	6.8	7.5	290
25-29	7.5	3.7	6.4	19.7	14.9	18.6	11.8	23.8	15.1	10.3	6.2	9.5	4.7	6.0	5.7	9.3	6.4	8.2	317
30-34	10.4	8.2	9.7	21.1	16.4	20.0	17.3	7.1	14.5	6.4	6.2	6.4	4.7	6.6	6.2	10.8	8.0	9.7	376
35-39	13.0	11.4	12.5	29.8	16.4	26.8	20.0	16.7	19.1	3.5	4.6	3.7	14.8	13.5	13.7	13.8	11.7	13.0	502
40-44	15.3	16.7	15.7	11.8	9.0	11.2	11.8	4.8	9.9	2.2	3.1	2.4	6.0	15.4	13.3	12.9	14.6	13.5	523
45-49	15.5	18.3	16.3	3.9	3.0	3.7	3.6	0.0	2.6	0.6	0.0	0.5	15.4	17.2	16.8	11.6	14.8	12.8	494
50-54	13.3	14.6	13.7	0.9	0.0	0.7	1.8	0.0	1.3	0.3	0.0	0.3	10.7	14.0	13.3	9.2	12.1	10.3	397
55-59	9.1	10.7	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	7.0	6.3	6.0	7.6	6.6	254
60-64	6.0	6.6	6.2	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	4.7	4.1	4.1	5.0	4.4	171
65-69	3.2	4.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	6.0	2.9	3.6	2.4	3.5	2.8	107
70-74	1.2	0.7	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	2.5	3.2	1.3	1.3	1.3	50
75 e più	0.3	1.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	1.4	2.4	0.6	1.0	0.8	29
<b>N**</b>	<b>1'327</b>	<b>563</b>	<b>1'890</b>	<b>228</b>	<b>67</b>	<b>295</b>	<b>110</b>	<b>42</b>	<b>152</b>	<b>312</b>	<b>65</b>	<b>377</b>	<b>149</b>	<b>513</b>	<b>662</b>	<b>2'413</b>	<b>1'449</b>	<b>3'862</b>	<b>3'862</b>
<i>dati mancanti</i>	14	12	26	4	1	12	0	0	0	3	2	8	8	33	41	36	54	153	153
<b>Età</b>																			
media	44.6	46.9	45.3	33.7	29.3	32.7	31.1	26.5	29.8	22.0	20.5	21.8	43.9	44.4	44.3	39.6	42.6	40.7	
deviazione standard	12.1	11.6	12.0	7.2	8.1	7.7	8.4	7.4	8.4	7.4	7.0	7.3	18.6	13.4	14.7	14.1	14.1	14.2	
1° quartile	36.0	39.1	36.9	27.7	21.7	26.3	23.8	20.8	22.6	17.2	16.1	17.0	30.8	36.0	35.3	28.6	32.6	30.1	
mediana	44.6	46.7	45.3	34.1	29.3	33.3	31.1	25.9	28.0	18.7	17.4	18.5	44.9	44.8	44.9	39.1	43.6	41.0	
3° quartile	52.9	54.6	53.5	38.1	37.2	37.9	37.5	32.3	36.4	24.1	21.3	24.0	54.3	52.3	52.6	49.3	52.2	50.4	
<b>N**</b>	<b>1'327</b>	<b>563</b>	<b>1'890</b>	<b>228</b>	<b>67</b>	<b>295</b>	<b>110</b>	<b>42</b>	<b>152</b>	<b>312</b>	<b>65</b>	<b>377</b>	<b>149</b>	<b>513</b>	<b>662</b>	<b>2'413</b>	<b>1'449</b>	<b>3'862</b>	
<i>dati mancanti</i>	14	12	26	4	1	12	0	0	0	3	2	8	8	33	41	36	54	153	

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T24 Stato civile e grado di urbanizzazione del domicilio dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale<sup>1</sup>) e dei parenti o conoscenti (2006)

	Pazienti: problema principale <sup>1</sup>												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Stato civile*</b>																			
celibe/nubile	38.1	27.2	34.8	74.1	67.2	72.6	71.0	78.6	73.2	93.0	92.3	93.0	38.8	21.5	25.2	51.4	33.7	45.0	1'686
sposato	35.5	28.9	33.5	10.5	13.1	10.8	18.7	4.8	14.8	4.3	3.1	4.1	47.0	59.0	56.5	28.2	37.8	31.6	1'182
separato-a (giuridicamente)	5.5	7.2	6.0	3.6	1.6	3.8	1.9	4.8	2.7	0.3	1.5	0.5	4.5	4.1	4.1	4.6	5.1	5.0	186
divorziato-a	19.1	30.8	22.5	10.0	13.1	10.4	8.4	9.5	8.7	2.3	3.1	2.4	8.2	14.2	12.9	14.3	19.8	16.1	604
vedovo-a	1.7	5.8	3.0	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.6	0.8	1.2	3.0	1.9	70
unione registrata	0.2	0.2	0.2	1.4	4.9	2.1	0.0	2.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	0.3	0.7	0.4	15
<b>N**</b>	<b>1'258</b>	<b>530</b>	<b>1'788</b>	<b>220</b>	<b>61</b>	<b>288</b>	<b>107</b>	<b>42</b>	<b>149</b>	<b>302</b>	<b>65</b>	<b>370</b>	<b>134</b>	<b>493</b>	<b>627</b>	<b>2'300</b>	<b>1'381</b>	<b>3'743</b>	<b>3'743</b>
<i>dati mancanti</i>	83	45	128	12	7	19	3	0	3	13	2	15	23	53	76	149	122	272	272
<b>Grado di urbanizzazione*</b>																			
grandi centri urbani	14.6	20.2	16.3	1.0	0.0	0.8	1.0	8.3	3.0	0.3	1.7	0.6	14.8	12.6	13.1	9.7	13.1	11.0	389
periferia dei grandi centri	15.2	16.4	15.5	1.5	3.3	1.9	2.1	0.0	1.5	2.7	3.4	2.9	14.8	12.8	13.3	11.3	13.2	12.0	425
città di media importanza	15.4	15.2	15.4	29.4	45.0	33.0	27.8	30.6	28.6	25.1	25.4	25.1	12.0	18.8	17.3	18.7	19.9	19.1	678
piccole città	29.8	25.9	28.6	44.6	30.0	41.3	38.1	38.9	38.3	34.4	35.6	34.6	32.4	25.7	27.1	33.9	28.2	31.7	1'123
campagna	25.0	22.2	24.2	23.5	21.7	23.1	30.9	22.2	28.6	37.5	33.9	36.9	26.1	30.1	29.2	26.5	25.6	26.2	926
<b>N**</b>	<b>1'188</b>	<b>499</b>	<b>1'687</b>	<b>204</b>	<b>60</b>	<b>264</b>	<b>97</b>	<b>36</b>	<b>133</b>	<b>291</b>	<b>59</b>	<b>350</b>	<b>142</b>	<b>499</b>	<b>641</b>	<b>2'197</b>	<b>1'344</b>	<b>3'541</b>	<b>3'541</b>
<i>dati mancanti</i>	153	76	229	28	8	43	13	6	19	24	8	35	15	47	62	252	159	474	474

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T25 Tipo di nucleo familiare, situazione di domicilio e tipo di relazione di coppia dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale<sup>1</sup>) e dei parenti o conoscenti (2006)

	Pazienti: problema principale <sup>1</sup>												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			N
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Tipo di nucleo familiare*</b>																			
da solo-a	39.8	37.1	39.0	43.3	22.0	37.9	30.8	27.0	29.7	14.9	6.3	13.5	12.0	11.6	11.7	34.4	23.2	30.2	855
con i genitori/un genitore	6.6	2.8	5.5	11.7	8.0	11.0	19.8	18.9	19.5	62.9	60.3	62.5	21.7	5.7	9.0	18.2	9.6	14.9	421
con figlio-a-i	2.4	13.2	5.5	0.0	2.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.4	1.6	0.6	7.6	14.4	13.0	2.0	11.6	5.5	156
con un-a partner (senza figli)	25.2	26.7	25.6	17.0	36.0	20.7	24.2	18.9	22.7	6.5	9.5	7.0	25.0	22.9	23.4	20.3	25.5	22.1	625
con un-a partner e figlio-a-i	19.3	13.5	17.7	9.4	14.0	10.1	9.9	0.0	7.0	2.5	6.3	3.2	28.3	42.5	39.6	16.0	22.8	18.5	522
con altri parenti-familiari	1.9	0.8	1.6	1.8	8.0	3.1	4.4	5.4	4.7	4.7	4.8	4.7	1.1	1.1	1.1	2.5	1.7	2.2	63
con amici (comunità abitativa)	1.1	2.8	1.6	3.5	2.0	3.1	2.2	16.2	6.3	2.2	0.0	1.8	2.2	1.1	1.3	1.6	2.4	1.9	55
altro	3.6	3.1	3.5	13.5	8.0	13.2	8.8	13.5	10.2	5.8	11.1	6.7	2.2	0.6	0.9	5.0	3.2	4.6	131
<b>N**</b>	<b>884</b>	<b>356</b>	<b>1'240</b>	<b>171</b>	<b>50</b>	<b>227</b>	<b>91</b>	<b>37</b>	<b>128</b>	<b>275</b>	<b>63</b>	<b>341</b>	<b>92</b>	<b>353</b>	<b>445</b>	<b>1'742</b>	<b>1'029</b>	<b>2'828</b>	<b>2'828</b>
<i>dati mancanti</i>	457	219	676	61	18	80	19	5	24	40	4	44	65	193	258	707	474	1'187	1'187
<b>Situazione di domicilio*</b>																			
domicilio fisso	94.5	95.5	94.8	82.9	80.8	81.6	92.2	83.8	89.8	94.4	89.7	93.6	92.7	97.7	96.6	93.1	94.9	93.6	2'739
senza domicilio fisso	3.6	3.1	3.4	7.6	13.5	8.8	6.7	5.4	6.3	1.9	0.0	1.5	6.4	2.1	3.0	4.2	3.1	3.7	109
istituzione	1.9	1.3	1.8	9.4	5.8	9.6	1.1	10.8	3.9	3.7	10.3	4.9	0.9	0.3	0.4	2.7	1.9	2.7	79
<b>N**</b>	<b>925</b>	<b>381</b>	<b>1'306</b>	<b>170</b>	<b>52</b>	<b>228</b>	<b>90</b>	<b>37</b>	<b>127</b>	<b>267</b>	<b>58</b>	<b>328</b>	<b>109</b>	<b>388</b>	<b>497</b>	<b>1'791</b>	<b>1'080</b>	<b>2'927</b>	<b>2'927</b>
<i>dati mancanti</i>	416	194	610	62	16	79	20	5	25	48	9	57	48	158	206	658	423	1'088	1'088
<b>Tipo di relazione di coppia*</b>																			
senza partner, sola-a	27.3	32.9	28.9	48.5	20.0	41.3	23.0	40.0	27.2	63.9	40.6	59.8	13.3	15.7	15.2	33.0	24.4	29.8	665
relazione-i saltuaria-e	4.9	5.7	5.2	10.4	8.0	9.5	6.6	5.0	6.2	7.7	15.6	9.0	8.0	2.2	3.4	6.6	5.4	6.3	140
relazione fissa, vivendo separat.	13.0	13.4	13.1	7.5	12.0	9.5	19.7	20.0	19.8	11.0	12.5	11.6	10.7	8.3	8.8	12.3	11.1	11.9	265
relazione fissa, vivendo insieme	54.8	48.0	52.8	33.6	60.0	39.7	50.8	35.0	46.9	17.4	31.3	19.6	68.0	73.8	72.7	48.1	59.0	52.0	1'158
<b>N**</b>	<b>730</b>	<b>298</b>	<b>1'028</b>	<b>134</b>	<b>50</b>	<b>189</b>	<b>61</b>	<b>20</b>	<b>81</b>	<b>155</b>	<b>32</b>	<b>189</b>	<b>75</b>	<b>313</b>	<b>388</b>	<b>1'334</b>	<b>847</b>	<b>2'228</b>	<b>2'228</b>
<i>dati mancanti</i>	611	277	888	98	18	118	49	22	71	160	35	196	82	233	315	1'115	656	1'787	1'787

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

**T26 Più alta formazione portata a termine, fonte di reddito principale e attività principale dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale<sup>1</sup>)  
e dei parenti o conoscenti (2006)**

	Pazienti: problema principale <sup>1</sup>												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Più alta formazione portata a termine**</b>																			
nessuna form. terminata	4.1	6.9	4.9	7.4	5.8	7.0	2.5	3.4	2.7	9.6	22.2	11.9	4.2	5.9	5.5	5.5	7.2	6.1	147
scuola dell'obbligo	14.7	21.8	16.7	28.2	50.0	33.5	29.6	34.5	30.9	58.2	57.4	58.1	23.6	18.1	19.2	24.7	25.3	24.9	599
scolarità complementare	1.1	4.0	1.9	1.8	5.8	2.8	3.7	6.9	4.5	1.6	5.6	2.3	1.4	3.0	2.6	1.8	3.9	2.5	61
apprendistato/ scuola profes.	62.2	50.2	58.9	56.4	36.5	51.6	55.6	55.2	55.5	25.3	9.3	22.4	43.1	54.2	51.9	54.2	47.7	51.9	1'248
liceo/diploma	2.7	6.3	3.7	2.5	1.9	2.3	0.0	0.0	0.0	3.2	5.6	3.6	4.2	6.6	6.1	2.5	6.7	4.0	96
magistrale, scuola pedagogic.	0.9	2.0	1.2	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	4.8	4.1	0.6	2.6	1.3	31
form. profession. superiore	7.7	4.6	6.8	1.2	0.0	0.9	6.2	0.0	4.5	1.6	0.0	1.3	8.3	3.7	4.7	5.5	3.4	4.8	115
scuola profession. superiore	1.1	0.7	1.0	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	4.2	0.4	1.2	1.1	0.4	0.8	20
alta scuola specializzata	1.7	1.3	1.6	0.6	0.0	0.5	2.5	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	2.8	1.1	1.5	1.3	0.8	1.1	27
università, politecnico	3.8	2.3	3.4	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	2.2	3.2	2.8	2.1	2.5	61
<b>N**</b>	<b>784</b>	<b>303</b>	<b>1'087</b>	<b>163</b>	<b>52</b>	<b>215</b>	<b>81</b>	<b>29</b>	<b>110</b>	<b>249</b>	<b>54</b>	<b>303</b>	<b>72</b>	<b>271</b>	<b>343</b>	<b>1'554</b>	<b>851</b>	<b>2'405</b>	<b>2'405</b>
<i>dati mancanti</i>	557	272	829	69	16	92	29	13	42	66	13	82	85	275	360	895	652	1'610	1'610
<b>Fonte di reddito principale*</b>																			
reddito da lavoro	57.5	37.2	51.7	36.8	26.9	34.1	56.3	37.5	50.9	31.9	16.7	29.0	61.4	58.0	58.8	52.2	44.2	49.1	1'434
risparmi	0.3	0.8	0.4	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.6	2.6	0.3	0.8	0.7	0.5	0.6	17
rendita (AVS/AI, ecc.)	17.4	26.8	20.1	20.9	19.2	21.2	11.3	18.8	13.4	3.9	3.3	3.8	15.8	8.9	10.5	15.7	17.8	16.7	488
assistenza/previdenza sociale	13.1	11.2	12.5	33.1	28.8	31.8	15.0	25.0	17.9	4.7	10.0	5.7	3.5	3.5	3.5	12.6	8.7	11.2	326
assicurazione disoccupazione	8.1	6.6	7.7	6.7	11.5	7.8	10.0	6.3	8.9	5.8	6.7	6.0	0.9	1.3	1.2	7.1	4.6	6.2	181
sostegno del/della partner	1.1	14.3	4.9	0.6	3.8	1.4	0.0	0.0	0.0	0.8	5.0	1.6	0.9	21.8	16.9	0.9	15.0	6.1	179
sosteg. genitori/familiari/amici	2.1	2.3	2.1	1.2	7.7	2.8	3.8	12.5	6.3	50.6	58.3	52.1	14.0	5.7	7.6	10.0	8.2	9.3	271
spacciando/tagliando	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.5	2.5	0.0	1.8	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	4
altre entrate illegali	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	2
prostituzione	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1
altra-e	0.3	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.9	0.8	0.0	0.6	0.9	0.5	0.6	0.5	0.8	0.7	20
<b>N**</b>	<b>972</b>	<b>392</b>	<b>1'364</b>	<b>163</b>	<b>52</b>	<b>217</b>	<b>80</b>	<b>32</b>	<b>112</b>	<b>257</b>	<b>60</b>	<b>317</b>	<b>114</b>	<b>371</b>	<b>485</b>	<b>1'829</b>	<b>1'078</b>	<b>2'923</b>	<b>2'923</b>
<i>dati mancanti</i>	369	183	552	69	16	90	30	10	40	58	7	68	43	175	218	620	425	1'092	1'092
<b>Attività principale (nel corso dei 30 ultimi giorni)*</b>																			
att. a tempo pieno (70% o più)	54.2	23.6	45.6	35.2	19.6	31.3	56.6	20.6	46.2	27.7	13.1	24.8	63.4	35.5	41.9	48.7	27.7	40.8	1'095
attività a tempo parziale	4.8	20.0	9.1	4.4	6.5	4.8	3.6	17.6	7.7	1.9	8.2	3.0	3.2	33.2	26.4	3.7	24.2	10.9	292
varie attività occas.	2.3	2.1	2.3	0.6	6.5	1.9	1.2	0.0	0.9	1.9	0.0	1.8	0.0	0.3	0.2	1.8	1.3	1.7	45
in formazione	2.3	2.1	2.3	0.6	4.3	1.4	3.6	20.6	8.5	47.6	57.4	49.2	14.0	6.1	7.9	10.4	8.5	9.5	256
inattivo sul mercat. del lavor.	20.4	35.2	24.6	23.9	26.1	25.0	14.5	17.6	15.4	4.5	6.6	4.8	15.1	18.5	17.7	18.5	25.7	21.8	584
disoccup., ricerc. di un lavoro	13.2	14.0	13.4	25.8	32.6	27.4	19.3	20.6	19.7	12.4	6.6	11.5	2.2	1.9	2.0	13.1	9.0	11.6	311
disoccupato, lav. fut. garant.	0.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	5
altra	2.6	2.7	2.6	9.4	4.3	8.2	1.2	2.9	1.7	4.1	8.2	4.8	2.2	4.2	3.7	3.6	3.5	3.5	94
<b>N**</b>	<b>858</b>	<b>335</b>	<b>1'193</b>	<b>159</b>	<b>46</b>	<b>208</b>	<b>83</b>	<b>34</b>	<b>117</b>	<b>267</b>	<b>61</b>	<b>331</b>	<b>93</b>	<b>313</b>	<b>406</b>	<b>1'689</b>	<b>943</b>	<b>2'682</b>	<b>2'682</b>
<i>dati mancanti</i>	483	240	723	73	22	99	27	8	35	48	6	54	64	233	297	760	560	1'333	1'333

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T27 Statuto professionale e reddito mensile netto dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale<sup>1</sup>) e dei parenti o conoscenti (2006)

	Pazienti: problema principale <sup>1</sup>												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			N
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Statuto professionale*</b>																			
senza attività professionale	30.6	44.9	34.7	59.5	59.1	59.5	31.4	47.4	35.7	19.5	12.5	18.5	17.3	20.3	19.7	31.7	35.4	33.7	562
apprendista, praticante	1.2	1.7	1.3	0.9	0.0	0.6	3.9	10.5	5.7	28.3	31.3	28.5	1.9	2.9	2.7	4.4	3.0	3.9	65
manovale, operaio-a ausiliar.	3.4	4.3	3.7	7.8	6.8	7.4	5.9	5.3	5.7	1.8	0.0	1.5	0.0	3.9	3.1	3.7	4.1	3.7	62
operaio-a con formaz. pratica	5.1	4.3	4.9	5.2	6.8	5.5	7.8	5.3	7.1	1.8	6.3	2.3	3.8	4.3	4.2	5.3	4.2	4.8	80
oper. con form. certif. (AFC)	13.5	6.4	11.5	12.9	11.4	12.3	7.8	5.3	7.1	6.2	6.3	6.2	5.8	8.7	8.1	12.0	7.6	10.2	170
caposquadra	2.1	0.4	1.6	0.9	0.0	0.6	7.8	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	1.9	0.5	0.8	2.2	0.3	1.5	25
impiegato-a non qualificato-a	14.7	23.5	17.2	9.5	11.4	10.4	17.6	5.3	14.3	11.5	0.0	10.0	13.5	25.6	23.2	13.9	22.2	17.1	285
impieg. qualif., quadro medio	10.9	5.6	9.4	0.9	4.5	1.8	5.9	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	17.3	12.1	13.1	8.5	8.3	8.2	137
imp. funz. dirett., quadr. sup.	5.0	1.7	4.0	0.9	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.8	13.5	3.4	5.4	3.9	2.2	3.3	55
indipendente	11.8	5.6	10.0	0.9	0.0	0.6	7.8	0.0	5.7	2.7	0.0	2.3	23.1	13.5	15.4	9.8	8.0	8.9	149
scolaro-a, studente	0.9	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	2.0	21.1	7.1	26.5	37.5	28.5	0.0	2.4	1.9	3.6	3.4	3.5	58
altro statuto	0.9	0.9	0.9	0.9	0.0	0.6	2.0	0.0	1.4	0.9	6.3	1.5	1.9	2.4	2.3	1.1	1.4	1.1	19
<b>N**</b>	<b>585</b>	<b>234</b>	<b>819</b>	<b>116</b>	<b>44</b>	<b>163</b>	<b>51</b>	<b>19</b>	<b>70</b>	<b>113</b>	<b>16</b>	<b>130</b>	<b>52</b>	<b>207</b>	<b>259</b>	<b>1'039</b>	<b>591</b>	<b>1'667</b>	<b>1'667</b>
<i>dati mancanti</i>	756	341	1'097	116	24	144	59	23	82	202	51	255	105	339	444	1'410	912	2'348	2'348
<b>Reddito mensile netto*</b>																			
nessun reddito	19.6	30.4	22.3	20.9	39.1	25.6	31.0	0.0	23.7	41.0	60.0	43.5	0.0	17.4	14.5	23.4	29.6	25.1	222
fino a 1000 fr.	3.8	4.3	3.9	10.4	0.0	7.8	10.3	22.2	13.2	28.0	20.0	27.0	11.1	4.3	5.5	8.6	5.3	7.7	68
da 1001 a 2000 fr.	7.9	8.7	8.1	23.9	17.4	22.2	3.4	44.4	13.2	11.0	6.7	10.4	11.1	19.6	18.2	9.4	12.8	10.3	91
da 2001 a 3000 fr.	12.3	25.2	15.5	16.4	30.4	20.0	17.2	11.1	15.8	2.0	6.7	2.6	0.0	21.7	18.2	10.8	23.5	14.3	126
da 3001 a 4000 fr.	11.1	13.0	11.6	14.9	13.0	14.4	20.7	22.2	21.1	10.0	0.0	8.7	11.1	15.2	14.5	12.8	13.2	12.9	114
da 4001 a 5000 fr.	18.1	7.8	15.5	7.5	0.0	5.6	10.3	0.0	7.9	6.0	6.7	6.1	22.2	8.7	10.9	16.1	7.4	13.7	121
da 5001 a 6000 fr.	14.0	6.1	12.0	3.0	0.0	2.2	6.9	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	22.2	6.5	9.1	9.4	4.5	8.0	71
da 6001 a 8000 fr.	10.2	2.6	8.3	1.5	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.9	11.1	6.5	7.3	7.3	2.9	6.1	54
da 8001 a 10 000 fr.	2.3	0.9	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	1.4	0.4	1.1	10
da 10 001 a 15 000 fr.	0.3	0.9	0.4	1.5	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	1.8	0.5	0.4	0.5	4
più di 15 000 fr.	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	2
<b>N**</b>	<b>342</b>	<b>115</b>	<b>457</b>	<b>67</b>	<b>23</b>	<b>90</b>	<b>29</b>	<b>9</b>	<b>38</b>	<b>100</b>	<b>15</b>	<b>115</b>	<b>9</b>	<b>46</b>	<b>55</b>	<b>640</b>	<b>243</b>	<b>883</b>	<b>883</b>
<i>dati mancanti</i>	999	460	1'459	165	45	217	81	33	114	215	52	270	148	500	648	1'809	1'260	3'132	3'132

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T28a Ragione principale della fine del trattamento/accompagnamento dei pazienti (in rapporto al problema principale<sup>1</sup>) e dei parenti o conoscenti (2006)

Ragione principale*	Pazienti: problema principale <sup>1</sup>												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
conclus. pianific. senza passag.	42.0	40.0	41.4	22.4	17.6	21.5	29.4	28.6	29.1	62.6	64.2	62.9	65.4	62.1	62.9	43.8	48.9	45.5	1'806
conclus. pianific. con passag.	5.3	8.6	6.3	14.9	23.5	17.8	10.1	16.7	11.9	2.6	6.0	3.1	1.9	3.5	3.1	6.0	7.3	6.8	271
cambio di domicilio	4.1	2.3	3.6	9.6	10.3	9.6	6.4	7.1	6.6	2.9	0.0	2.3	0.0	1.5	1.1	4.1	2.4	3.5	137
ospedalizzazione	1.1	1.6	1.2	0.9	0.0	0.7	1.8	0.0	1.3	0.6	0.0	0.5	0.0	0.4	0.3	0.9	0.9	0.9	35
incarcerazione	0.2	0.0	0.1	5.3	1.5	4.3	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.7	0.1	0.5	18
perdita di contatto	27.7	26.4	27.3	30.3	27.9	29.0	32.1	35.7	33.1	17.9	17.9	17.8	19.9	19.7	19.7	26.3	23.7	25.2	1'001
conclusione esplicita	14.2	16.1	14.7	11.8	14.7	12.2	14.7	9.5	13.2	9.9	10.4	10.2	7.1	6.4	6.6	12.6	11.4	12.0	477
decesso	2.0	1.4	1.9	1.8	1.5	2.0	2.8	0.0	2.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.2	0.1	2.0	0.9	1.7	66
altre cause	3.5	3.6	3.5	3.1	2.9	3.0	2.8	2.4	2.6	2.6	1.5	2.3	5.8	6.3	6.1	3.6	4.4	3.9	154
<b>N**</b>	<b>1'327</b>	<b>560</b>	<b>1'887</b>	<b>228</b>	<b>68</b>	<b>303</b>	<b>109</b>	<b>42</b>	<b>151</b>	<b>313</b>	<b>67</b>	<b>383</b>	<b>156</b>	<b>544</b>	<b>700</b>	<b>2'422</b>	<b>1'480</b>	<b>3'965</b>	<b>3'965</b>
<i>dati mancanti</i>	14	15	29	4	0	4	1	0	1	2	0	2	1	2	3	27	23	50	50

T28b Destinazione dei trasferimenti dei pazienti (in rapporto al problema principale<sup>1</sup>) e dei parenti o conoscenti (2006)

Destinazione dei trasferimenti***	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
terapia residenziale	40.7	43.6	41.9	36.7	23.1	29.8	33.3	42.9	37.5	12.5	0.0	9.1	50.0	7.7	13.3	37.8	27.9	32.7	71
consulenza ambulatoriale	50.0	41.0	46.2	46.7	53.8	53.2	44.4	57.1	50.0	75.0	100.0	81.8	50.0	53.8	53.3	48.7	53.5	52.5	114
appartamento protetto	3.7	5.1	4.3	3.3	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.3	2.3	5
altra istituzione specializzata	5.6	10.3	7.5	13.3	23.1	14.9	22.2	0.0	12.5	12.5	0.0	9.1	0.0	38.5	33.3	10.9	16.3	12.4	27
<b>N**</b>	<b>54</b>	<b>39</b>	<b>93</b>	<b>30</b>	<b>13</b>	<b>47</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>119</b>	<b>86</b>	<b>217</b>	<b>217</b>
<i>dati mancanti</i>	16	9	25	4	3	7	2	0	2	0	1	1	1	6	7	27	22	54	54

T28c Causa di decesso dei pazienti (in rapporto al problema principale<sup>1</sup>) e dei parenti o conoscenti (2006)

Cause di decesso****	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
suicidio	17.6	28.6	20.8	33.3	0.0	33.3	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.9	30.0	23.8	10
infortunio	0.0	14.3	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	4.8	2
malattia	58.8	42.9	54.2	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	40.0	47.6	20
overdose o intossicazione acuta	17.6	0.0	12.5	33.3	0.0	33.3	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.9	0.0	16.7	7
altre cause di decesso	5.9	14.3	8.3	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	10.0	7.1	3
<b>N**</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>10</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
<i>dati mancanti</i>	10	1	11	1	1	3	0	0	0	1	0	1	0	1	1	16	3	24	24

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti trasferiti. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti deceduti durante l'intervento. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T29 Durata dell'intervento sui pazienti (in rapporto al problema principale<sup>1</sup>) e sui parenti o conoscenti (2006)

	Pazienti: problema principale <sup>1</sup>												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite				
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale		
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale								
<b>Durata della presa in carico* (%)</b>																				
1 settimana o meno	7.4	10.3	8.3	6.0	9.0	6.5	4.5	7.1	5.3	5.1	6.0	5.5	24.8	16.8	18.6	8.8	12.6	10.2	374	
> 1 settimana a 1 mese	4.9	7.9	5.8	3.9	3.0	3.6	7.3	14.3	9.2	10.5	14.9	11.2	11.5	6.4	7.5	6.2	7.8	6.8	250	
> 1 a 2 mesi	6.0	7.3	6.4	6.0	6.0	6.2	1.8	7.1	3.3	11.5	11.9	11.5	8.3	5.5	6.1	6.8	6.7	6.8	248	
> 2 a 3 mesi	5.6	5.4	5.5	6.0	1.5	4.9	5.5	9.5	6.6	4.8	9.0	5.5	4.5	4.0	4.1	5.5	5.6	5.5	202	
> 3 a 6 mesi	13.2	14.3	13.6	11.6	6.0	10.1	14.5	9.5	13.2	14.3	10.4	13.8	11.5	16.5	15.4	13.2	14.5	13.7	500	
> 6 mesi a 1 anno	25.8	26.2	25.9	25.4	35.8	28.1	30.9	26.2	29.6	32.2	38.8	33.1	24.2	32.4	30.6	26.8	29.3	27.7	1'014	
> 1 a 2 anni	20.8	17.1	19.7	23.3	20.9	22.9	21.8	11.9	19.1	16.2	7.5	14.8	9.6	13.6	12.7	19.3	15.1	17.7	648	
> 2 a 3 anni	9.9	6.3	8.8	9.5	9.0	9.2	12.7	9.5	11.8	4.8	1.5	4.2	3.8	2.9	3.1	8.5	5.0	7.1	261	
> 3 a 5 anni	4.2	3.1	3.9	3.4	6.0	4.2	0.9	2.4	1.3	0.6	0.0	0.5	1.3	0.7	0.9	3.0	2.0	2.7	98	
> 5 a 10 anni	1.7	1.6	1.7	4.7	3.0	4.2	0.0	2.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.6	1.1	1.0	1.5	1.3	1.4	53	
più di 10 anni	0.6	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.3	10	
<b>N**</b>	<b>1'339</b>	<b>572</b>	<b>1'911</b>	<b>232</b>	<b>67</b>	<b>306</b>	<b>110</b>	<b>42</b>	<b>152</b>	<b>314</b>	<b>67</b>	<b>384</b>	<b>157</b>	<b>546</b>	<b>703</b>	<b>2'263</b>	<b>1'382</b>	<b>3'658</b>	<b>3'658</b>	
<i>dati mancanti</i>	2	3	5	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	186	121	357	357	
<b>Durata (in settimane)</b>																				
media	58.1	48.1	55.1	63.8	62.4	63.5	48.9	44.1	47.6	35.3	24.7	33.5	27.1	33.2	31.9	51.3	40.6	47.3		
deviazione standard	80.4	75.3	79.0	76.6	68.8	74.4	41.9	59.6	47.3	34.6	23.5	33.2	41.4	46.3	45.3	70.6	61.0	67.3		
1° quartile	13.0	8.0	11.7	14.4	23.9	15.0	20.7	5.9	13.3	6.6	4.9	6.1	1.3	5.0	3.9	10.3	6.9	9.0		
mediana	35.1	27.9	33.1	42.6	39.3	42.1	37.6	26.6	35.0	27.3	18.9	26.6	13.1	24.7	23.0	31.1	26.1	28.9		
3° quartile	74.6	58.8	69.4	83.9	78.7	82.1	64.6	54.0	63.8	48.3	37.6	45.5	32.3	41.9	39.9	65.0	49.7	58.4		
<b>N**</b>	<b>1'339</b>	<b>572</b>	<b>1'911</b>	<b>232</b>	<b>67</b>	<b>306</b>	<b>110</b>	<b>42</b>	<b>152</b>	<b>314</b>	<b>67</b>	<b>384</b>	<b>157</b>	<b>546</b>	<b>703</b>	<b>2'263</b>	<b>1'382</b>	<b>3'658</b>		
<i>dati mancanti</i>	2	3	5	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	186	121	357		

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T30 Trattamento sostitutivo durante e immediatamente dopo l'intervento, in rapporto al problema principale<sup>1</sup> (solamente pazienti) (2006)

	Pazienti: problema principale <sup>1</sup>												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Sostituzione nel corso dell'intervento*</b>																
no	97.4	98.0	97.5	44.3	34.4	41.6	86.7	83.3	85.7	99.3	100.0	99.4	90.4	90.3	90.2	2'208
sì	2.6	2.0	2.5	55.7	65.6	58.4	13.3	16.7	14.3	0.7	0.0	0.6	9.6	9.7	9.8	239
<b>N**</b>	<b>982</b>	<b>401</b>	<b>1'383</b>	<b>183</b>	<b>61</b>	<b>245</b>	<b>83</b>	<b>36</b>	<b>119</b>	<b>271</b>	<b>55</b>	<b>326</b>	<b>1'755</b>	<b>689</b>	<b>2'447</b>	<b>2'447</b>
<i>dati mancanti</i>	357	174	531	48	7	61	27	6	33	41	10	54	519	225	800	800
<b>Tipo di sostituzione***</b>																
eroina	0.0	0.0	0.0	3.0	2.6	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.5	1.7	4
metadone	47.8	50.0	48.4	91.1	97.4	92.9	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	84.2	90.9	85.9	201
altri oppiacei	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	3.0	7
altre sostanze	52.2	50.0	51.6	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	7.6	9.4	22
<b>N**</b>	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>31</b>	<b>101</b>	<b>39</b>	<b>141</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>165</b>	<b>66</b>	<b>234</b>	<b>234</b>
<i>dati mancanti</i>	3	0	3	1	1	2	0	0	0	0	0	0	4	1	5	5
<b>Sostituzione dopo l'intervento*</b>																
no	98.9	100.0	99.2	65.6	58.3	63.9	93.1	85.7	91.3	99.2	100.0	99.4	95.3	96.1	95.5	2'210
sì	1.1	0.0	0.8	34.4	41.7	36.1	6.9	14.3	8.7	0.8	0.0	0.6	4.7	3.9	4.5	103
<b>N**</b>	<b>941</b>	<b>386</b>	<b>1'327</b>	<b>157</b>	<b>48</b>	<b>205</b>	<b>87</b>	<b>28</b>	<b>115</b>	<b>259</b>	<b>55</b>	<b>314</b>	<b>1'673</b>	<b>640</b>	<b>2'313</b>	<b>2'313</b>
<i>dati mancanti</i>	398	189	587	74	20	101	23	14	37	53	10	66	601	274	934	934
<b>Tipo di sostituzione***</b>																
prescrizione di eroina	20.0	0.0	20.0	7.4	5.0	6.8	16.7	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.3	4.0	8.7	9
trattamento sostitutivo	80.0	0.0	80.0	92.6	95.0	93.2	83.3	100.0	90.0	100.0	0.0	100.0	89.7	96.0	91.3	94
<b>N**</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>54</b>	<b>20</b>	<b>74</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>78</b>	<b>25</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
<i>dati mancanti</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti ai quali è stata prescritta una sostituzione durante l'intervento. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T31 Postassistenza prevista e preparata, in rapporto al problema principale<sup>1</sup> (solamente pazienti) (2006)

	Pazienti: problema principale <sup>1</sup>												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Postassistenza prevista e preparata*</b>																
no	83.9	81.0	83.1	72.9	62.8	70.5	72.5	65.0	70.8	87.3	86.7	87.2	82.9	79.6	82.0	1'548
si	16.1	19.0	16.9	27.1	37.2	29.5	27.5	35.0	29.2	12.7	13.3	12.8	17.1	20.4	18.0	340
<b>N**</b>	<b>820</b>	<b>315</b>	<b>1'135</b>	<b>140</b>	<b>43</b>	<b>183</b>	<b>69</b>	<b>20</b>	<b>89</b>	<b>181</b>	<b>30</b>	<b>211</b>	<b>1'388</b>	<b>500</b>	<b>1'888</b>	<b>1'888</b>
<i>dati mancanti</i>	519	260	779	91	25	123	41	22	63	131	35	169	886	414	1'359	1'359
<b>Tipo di postassistenza prevista***</b>																
appartamento protetto dell'istituzione	0.9	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	1
servizio di postassistenza dell'istituzione	3.5	0.0	2.4	5.7	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	3.7	3.8	0.0	2.6	8
appartamento protetto esterno	6.2	7.4	6.6	5.7	7.1	6.1	5.9	0.0	4.2	4.3	0.0	3.7	5.6	5.4	5.6	17
servizio di postassistenza esterno	13.3	18.5	15.0	20.0	0.0	14.3	17.6	28.6	20.8	13.0	0.0	11.1	13.1	15.1	13.7	42
centro di consulenza per problemi inerenti all'alcol	18.6	11.1	16.2	2.9	0.0	2.0	5.9	42.9	16.7	13.0	25.0	14.8	14.6	11.8	13.7	42
centro di consulenza per problemi inerenti alle droghe	2.7	1.9	2.4	20.0	50.0	28.6	23.5	28.6	25.0	13.0	0.0	11.1	8.5	10.8	9.2	28
altri centri di consulenza	17.7	3.7	13.2	20.0	28.6	22.4	17.6	0.0	12.5	21.7	25.0	22.2	18.3	9.7	15.7	48
gruppo di aiuto reciproco e di autosostegno	8.0	9.3	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	3.7	5.2	6.5	5.6	17
gruppo di precedenti utenti del centro/ dell'istituzione	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
altro-i	33.6	48.1	38.3	34.3	28.6	32.7	35.3	14.3	29.2	30.4	25.0	29.6	35.7	45.2	38.6	118
<b>N**</b>	<b>113</b>	<b>54</b>	<b>167</b>	<b>35</b>	<b>14</b>	<b>49</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>213</b>	<b>93</b>	<b>306</b>	<b>306</b>
<i>dati mancanti</i>	19	6	25	3	2	5	2	0	2	0	0	0	25	9	34	34

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti per i quali una postassistenza è prevista. Le categorie non sono esclusive (molte risposte possibili)

T32 Problemi di dipendenza all'uscita, in rapporto al problema principale<sup>1</sup> (solamente pazienti) (2006)

Problemi di dipendenza*	Pazienti: problema principale <sup>1</sup>												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
alcol	62.1	68.7	64.0	15.2	24.4	17.3	20.3	25.0	21.4	12.0	5.0	10.9	44.0	51.8	46.1	953
cocktail (eroina e cocaina)	0.1	0.3	0.2	6.0	8.9	6.6	5.4	12.5	7.1	0.4	0.0	0.4	1.0	1.6	1.2	24
eroina	1.0	0.9	0.9	46.4	55.6	48.5	9.5	20.8	12.2	0.4	0.0	0.4	7.3	7.0	7.3	150
metadone	1.0	0.9	0.9	25.8	31.1	27.0	6.8	4.2	6.1	0.4	0.0	0.4	3.8	3.7	3.8	78
altri oppiacei	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	1
cocaina	2.3	1.8	2.1	14.6	35.6	19.4	52.7	58.3	54.1	4.9	0.0	4.2	7.0	6.9	7.0	144
crack, freebase	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
amfetamine	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1.4	12.5	4.1	0.4	0.0	0.4	0.3	0.5	0.4	8
MDMA e affini (ecstasy)	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	0.0	8.3	2.0	1.3	2.5	1.5	0.6	0.5	0.6	12
altri stimolanti	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
barbiturici	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	2
benzodiazepine	1.8	3.2	2.2	11.9	26.7	15.3	4.1	4.2	4.1	0.4	0.0	0.4	3.1	6.5	4.0	83
altri sonniferi e tranquillanti	0.0	1.2	0.3	2.6	6.7	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.8	0.8	16
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	1.0	2.7	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.2	4
altri allucinogeni	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.1	3
sostanze volatili (per es., solventi)	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	1.4	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	2
canapa	4.3	3.5	4.1	12.6	13.3	12.8	14.9	20.8	16.3	56.9	35.0	53.6	14.2	7.9	12.4	257
tabacco	17.3	16.1	17.0	19.2	24.4	20.4	12.2	12.5	12.2	10.7	10.0	10.6	16.3	16.7	16.4	339
altra/e sostanza/e	0.6	0.3	0.5	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.8	0.7	1.1	0.8	16
gioco patologico	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.4	1.0	20
disturbi alimentari	0.0	1.2	0.3	0.0	2.2	0.5	0.0	4.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.1	3.3	1.0	20
altri problemi assimilabili a una dipendenza	0.0	0.3	0.1	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.4	2.5	0.8	0.4	0.4	0.4	8
nessuno	33.7	30.1	32.7	24.5	26.7	25.0	25.7	16.7	23.5	36.0	57.5	39.2	32.3	31.3	32.0	662
<b>N**</b>	<b>836</b>	<b>342</b>	<b>1'178</b>	<b>151</b>	<b>45</b>	<b>196</b>	<b>74</b>	<b>24</b>	<b>98</b>	<b>225</b>	<b>40</b>	<b>265</b>	<b>1'497</b>	<b>569</b>	<b>2'066</b>	<b>2'066</b>
<i>dati mancanti</i>	<i>503</i>	<i>233</i>	<i>736</i>	<i>80</i>	<i>23</i>	<i>110</i>	<i>36</i>	<i>18</i>	<i>54</i>	<i>87</i>	<i>25</i>	<i>115</i>	<i>777</i>	<i>345</i>	<i>1'181</i>	<i>1'181</i>

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T33 Frequenza delle ricadute, sostanza o comportamento implicato e durata delle ricadute nel corso dell'intervento, in rapporto al problema principale <sup>1</sup> (solamente pazienti) (2006)

	Pazienti: problema principale <sup>1</sup>												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Frequenza delle ricadute*</b>																
nessuna	58.2	46.5	55.0	28.2	22.6	26.7	35.1	28.6	34.1	66.7	76.5	68.0	53.9	42.1	50.6	623
1 volta	9.9	8.8	9.6	12.9	9.7	12.1	16.2	14.3	15.9	5.7	17.6	7.4	9.4	11.3	9.8	121
2 volte	7.5	11.2	8.5	16.5	6.5	13.8	13.5	14.3	13.6	2.9	0.0	2.5	8.2	9.8	8.8	108
3 o 4 volte	11.8	13.0	12.2	12.9	19.4	14.7	10.8	0.0	9.1	10.5	5.9	9.8	12.1	14.0	12.6	155
5 volte o più	12.5	20.5	14.7	29.4	41.9	32.8	24.3	42.9	27.3	14.3	0.0	12.3	16.4	22.9	18.3	225
<b>N**</b>	<b>558</b>	<b>215</b>	<b>773</b>	<b>85</b>	<b>31</b>	<b>116</b>	<b>37</b>	<b>7</b>	<b>44</b>	<b>105</b>	<b>17</b>	<b>122</b>	<b>898</b>	<b>328</b>	<b>1'232</b>	<b>1'232</b>
<i>dati mancanti</i>	781	360	1'141	146	37	190	73	35	108	207	48	258	1'376	586	2'015	2'015
<b>Sostanza/comportamento comparabile a una dipendenza al momento delle ricadute***</b>																
alcol	96.4	98.2	97.0	14.3	34.8	20.3	33.3	40.0	34.6	17.1	0.0	15.8	70.1	79.2	72.9	415
cocktail (eroina e cocaina)	0.0	0.0	0.0	3.6	8.7	5.1	4.8	0.0	3.8	2.9	0.0	2.6	1.0	2.2	1.4	8
oppiacei	3.2	1.8	2.7	71.4	78.3	73.4	28.6	40.0	30.8	0.0	0.0	0.0	16.6	16.3	16.5	94
cocaina e derivati	2.3	3.7	2.7	26.8	47.8	32.9	71.4	100.0	76.9	8.6	0.0	7.9	11.8	14.0	12.5	71
stimolanti	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.3	4.8	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.7	4
medicamenti	3.6	5.5	4.3	19.6	34.8	24.1	19.0	20.0	19.2	0.0	0.0	0.0	7.4	11.8	8.8	50
allucinogeni	0.0	0.0	0.0	1.8	4.3	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.4	2
canapa	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	1
tabacco	3.2	1.8	2.7	14.3	26.1	17.7	9.5	0.0	7.7	97.1	100.0	97.4	14.1	6.2	11.6	66
sostanze volatili	5.0	2.8	4.3	0.0	8.7	2.5	9.5	0.0	7.7	5.7	0.0	5.3	4.3	5.6	4.7	27
altra/e sostanza/e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	1
gioco patologico	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.6	1.2	7
disturbi alimentari	0.0	1.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	1.1	6
altri problemi assimilabili a una dipendenza	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.2	1
<b>N**</b>	<b>220</b>	<b>109</b>	<b>329</b>	<b>56</b>	<b>23</b>	<b>79</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>26</b>	<b>35</b>	<b>3</b>	<b>38</b>	<b>391</b>	<b>178</b>	<b>569</b>	<b>569</b>
<i>dati mancanti</i>	13	6	19	5	1	6	3	0	3	0	1	1	23	12	40	40
<b>Durata delle ricadute****</b>																
1 a 2 giorni	32.1	15.9	27.5	52.4	20.0	46.2	50.0	33.3	45.5	44.4	100.0	50.0	36.2	21.9	32.4	77
3 a 6 giorni	28.4	36.4	30.7	14.3	20.0	15.4	12.5	33.3	18.2	22.2	0.0	20.0	24.1	31.3	26.1	62
7 a 10 giorni	11.9	27.3	16.3	14.3	20.0	15.4	12.5	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	10.9	21.9	13.9	33
>10 giorni a 2 settimane	7.3	6.8	7.2	4.8	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	4.7	5.9	14
> 2 a 4 settimane	12.8	6.8	11.1	4.8	0.0	3.8	12.5	0.0	9.1	11.1	0.0	10.0	11.5	7.8	10.5	25
>4 a 6 settimane	2.8	4.5	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	10.0	2.9	3.1	2.9	7
>6 a 8 settimane	0.9	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.4	1
> 2 mesi	3.7	2.3	3.3	9.5	40.0	15.4	12.5	33.3	18.2	11.1	0.0	10.0	7.5	9.4	8.0	19
<b>N**</b>	<b>109</b>	<b>44</b>	<b>153</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>26</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>174</b>	<b>64</b>	<b>238</b>	<b>238</b>
<i>dati mancanti</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti che hanno indicato una o più ricadute. Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

\*\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti che hanno indicato una o più ricadute. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

**T34 Frequenza del consumo di tabacco e numero di sigarette al giorno nel corso dei 30 ultimi giorni precedenti l'uscita, in rapporto al problema principale<sup>1</sup>  
(solamente pazienti) (2006)**

	Pazienti: problema principale <sup>1</sup>												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Frequenza del consumo di tabacco*</b>																
mai	31.1	37.4	32.8	2.7	7.7	4.0	11.8	25.0	14.3	13.4	8.3	12.8	24.8	33.7	27.1	261
1 giorno alla settimana o meno	0.9	1.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.1	0.7	1.2	0.8	8
2 a 3 giorni alla settimana	2.1	1.8	2.0	1.4	0.0	1.0	2.9	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	1.7	1.2	1.6	15
4 a 6 giorni alla settimana	1.2	0.0	0.8	1.4	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.1	1.5	0.4	1.2	12
una volta al giorno	1.2	1.2	1.2	2.7	3.8	3.0	0.0	0.0	0.0	3.7	8.3	4.3	1.5	1.6	1.6	15
più volte al giorno	63.6	58.3	62.1	91.9	88.5	91.0	85.3	75.0	83.3	79.3	83.3	79.8	69.8	61.9	67.7	652
<b>N**</b>	<b>428</b>	<b>163</b>	<b>591</b>	<b>74</b>	<b>26</b>	<b>100</b>	<b>34</b>	<b>8</b>	<b>42</b>	<b>82</b>	<b>12</b>	<b>94</b>	<b>711</b>	<b>252</b>	<b>963</b>	<b>963</b>
<i>dati mancanti</i>	911	412	1'323	157	42	206	76	34	110	230	53	286	1'563	662	2'284	2'284
<b>Numero di sigarette al giorno***</b>																
0 a 10 sigarette al giorno	14.1	20.3	15.6	11.4	28.6	15.5	21.1	0.0	18.2	36.6	66.7	38.6	15.7	24.0	17.5	81
11 a 20 sigarette al giorno	41.8	27.5	38.3	43.2	35.7	41.4	52.6	33.3	50.0	48.8	0.0	45.5	43.4	27.0	39.9	185
21 a 30 sigarette al giorno	28.6	36.2	30.5	40.9	21.4	36.2	15.8	66.7	22.7	14.6	33.3	15.9	29.7	33.0	30.4	141
31 sigarette al giorno o più	15.5	15.9	15.6	4.5	14.3	6.9	10.5	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	11.3	16.0	12.3	57
<b>N**</b>	<b>213</b>	<b>69</b>	<b>282</b>	<b>44</b>	<b>14</b>	<b>58</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>41</b>	<b>3</b>	<b>44</b>	<b>364</b>	<b>100</b>	<b>464</b>	<b>464</b>
<i>dati mancanti</i>	82	33	115	28	10	38	11	3	14	30	8	38	171	67	238	238

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti che hanno indicato un consumo di tabacco. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T35 Obiettivo di consumo all'uscita e pronostico, in rapporto alla principale sostanza problematica<sup>1</sup> (solamente pazienti) (2006)

	Pazienti: sostanza problematica <sup>1</sup>												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Obiettivo di consumo*</b>																
astinenza definitiva	38.5	36.4	37.9	71.4	64.9	69.3	72.7	53.8	69.6	34.2	56.0	37.1	43.9	42.5	43.8	708
astinenza limitata nel tempo	14.1	14.2	14.2	3.6	2.7	3.3	4.5	7.7	5.1	7.4	12.0	8.0	11.6	11.7	11.4	185
consumo controllato	33.2	38.7	34.7	9.8	10.8	10.7	6.1	7.7	6.3	36.2	32.0	36.0	28.9	32.3	29.5	477
nessuna limitazione nel consumo previsto	4.5	2.3	3.9	2.7	8.1	4.0	1.5	7.7	2.5	8.1	0.0	6.9	4.8	3.9	4.6	74
nessuna decisione per il momento	8.8	8.0	8.6	10.7	13.5	11.3	12.1	23.1	13.9	13.4	0.0	11.4	9.6	8.8	9.7	157
altro	0.9	0.4	0.7	1.8	0.0	1.3	3.0	0.0	2.5	0.7	0.0	0.6	1.2	0.7	1.1	17
<b>N**</b>	<b>693</b>	<b>261</b>	<b>954</b>	<b>112</b>	<b>37</b>	<b>150</b>	<b>66</b>	<b>13</b>	<b>79</b>	<b>149</b>	<b>25</b>	<b>175</b>	<b>1'170</b>	<b>409</b>	<b>1'618</b>	<b>1'618</b>
<i>dati mancanti</i>	646	314	960	119	31	156	44	29	73	163	40	205	1'104	505	1'629	1'629
<b>Pronostico*</b>																
pronostico molto positivo	10.2	12.0	10.7	7.4	8.9	7.8	5.4	10.5	6.7	11.7	26.1	13.6	10.4	13.2	11.1	188
pronostico positivo	45.7	39.4	44.0	34.7	20.0	30.7	42.9	15.8	36.0	52.6	56.5	53.1	45.4	36.6	43.1	728
pronostico piuttosto sfavorevole	30.2	39.1	32.7	43.8	46.7	44.6	42.9	47.4	44.0	29.2	13.0	27.1	31.7	37.7	33.3	563
pronostico negativo	13.9	9.5	12.7	14.0	24.4	16.9	8.9	26.3	13.3	6.5	4.3	6.2	12.6	12.4	12.5	212
<b>N**</b>	<b>748</b>	<b>284</b>	<b>1'032</b>	<b>121</b>	<b>45</b>	<b>166</b>	<b>56</b>	<b>19</b>	<b>75</b>	<b>154</b>	<b>23</b>	<b>177</b>	<b>1'234</b>	<b>453</b>	<b>1'691</b>	<b>1'691</b>
<i>dati mancanti</i>	591	291	882	110	23	140	54	23	77	158	42	203	1'040	461	1'556	1'556

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto