

Intervento ambulatoriale nelle problematiche di dipendenza

Risultati dell'indagine presso gli utenti 2007

Raccolta di tabelle statistiche

Mariana Astudillo, Etienne Maffli

Ringraziamenti

Ringraziamo vivamente sia i collaboratori e le collaboratrici che i pazienti delle istituzioni che hanno partecipato e che hanno gentilmente accettato di riempire i questionari del monitoraggio *act-info*. Ringraziamo ugualmente i collaboratori e le collaboratrici dei servizi di consultazione che hanno effettuato i lavori di logistica e di registrazione dei dati. I nostri migliori ringraziamenti vanno anche all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) che finanzia e coordina l'insieme della rete *act-info*. Grazie anche a Edith Bacher e Christiane Gmel per la grafica e l'impaginazione di questo rapporto come pure a Marina Delgrande Jordan per la sua preziosa collaborazione nell'elaborazione delle procedure d'analisi.

Complementi d'informazione: Etienne Maffli, tel. 021 321 29 54, fax 021 321 29 40,
e-mail emaffli@sfa-ispa.ch

Realizzazione: Mariana Astudillo & Etienne Maffli, Istituto svizzero di prevenzione dell'alcolismo e altre tossicomanie (ISPA)

Diffusione: Libreria ISPA, casella postale 870, 1001 Losanna,
tel. 021 321 29 35, fax 021 321 29 40,
e-mail librairie@sfa-ispa.ch

Prezzo: Fr. 10.–

Lingua del testo originale : francese

Grafica/impaginazione: ISPA

Copyright: © ISPA-SFA Losanna 2009

Citazione raccomandata: Astudillo, M & Maffli, E. (2009). Intervento ambulatoriale nelle problematiche di dipendenza. Risultati dell'indagine presso gli utenti 2007 – Raccolta di tabelle statistiche. Losanna: Istituto svizzero di prevenzione dell'alcolismo e altre tossicomanie.

Indice

act-info – Information network on addiction care and therapy in Switzerland

act-info nel settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale nel campo delle dipendenze

ENTRATA

- T1 Sesso e età dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2007)
- T2 Stato civile e nazionalità dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2007)
- T3 Grado di urbanizzazione del domicilio, tipo di nucleo familiare e situazione di domicilio dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2007)
- T4 Tipo di relazione di coppia, numero di figli, di figli vivendo nel nucleo familiare dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2007)
- T5 Più alta formazione portata a termine e statuto professionale dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2007)
- T6 Fonte di reddito principale e attività dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2007)
- T7 Reddito mensile netto e debiti dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2007)
- T8 Incarcerazione o detenzione preventiva prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2007)
- T9 Istanza d'invio principale e secondaria dei pazienti (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2007)
- T10 Tipo di aiuto atteso dai pazienti (in rapporto al problema principale) e dai parenti o conoscenti all'entrata e base legale dell'intervento (2007)
- T11 Trattamenti/accompagnamenti dei pazienti prima dell'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2007)
- T12 Trattamento sostitutivo e altri interventi all'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2007)
- T13a Entrata in seguito a una cura di disintossicazione, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2007)
- T13b Frequenza delle cure di disintossicazione senza aiuto professionale prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2007)
- T14 Problema principale all'entrata (solamente pazienti) (2007)
- T15.1a Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso dei 30 ultimi giorni e dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata (2007), uomini

- T15.1b Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso dei 30 ultimi giorni e dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata (2007), uomini
- T15.2a Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso dei 30 ultimi giorni e dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata (2007), donne
- T15.2b Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso dei 30 ultimi giorni e dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata (2007), donne
- T15.3a Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso dei 30 ultimi giorni e dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata (2007), uomini e donne
- T15.3b Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso dei 30 ultimi giorni e dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata (2007), uomini e donne
- T16.1a Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2007), uomini
- T16.1b Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2007), donne
- T16.1c Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2007), uomini e donne
- T16.2a Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2007), uomini
- T16.2b Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2007), donne
- T16.2c Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2007), uomini e donne
- T17 Modo di amministrazione della principale sostanza problematica nel corso dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata (2007)
- T18 Prevalenza delle iniezioni a vita, nel corso dei 30 ultimi giorni e dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata, scambio di materiale d'iniezione nel corso dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata e età all'epoca della prima iniezione, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2007)
- T19.1a Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2007), uomini
- T19.1b Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2007), donne
- T19.1c Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2007), uomini e donne
- T19.2a Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2007), uomini
- T19.2b Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2007), donne

- T19.2c Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2007), uomini e donne
- T20 Frequenza del consumo di alcol, numero di "bicchieri standard" al giorno e frequenza di forti consumi di alcol prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2007)
- T21 Frequenza del consumo di tabacco e numero di sigarette al giorno nel corso dei 30 ultimi giorni prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2007)
- T22a Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2007), uomini
- T22b Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2007), donne
- T22c Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2007), uomini e donne
- T23.1a Problemi psichici nel corso della vita (2007), uomini
- T23.1b Problemi psichici nel corso della vita (2007), donne
- T23.1c Problemi psichici nel corso della vita (2007), uomini e donne
- T24 Parenti/conoscenti: legame tra l'utente e la persona sintomatica (2007)
- T25 Parenti/conoscenti: problema principale e altri problemi della persona sintomatica (2007)
- T26 Parenti/conoscenti: Problemi della persona di contatto legati ai problemi della persona sintomatica (2007)

USCITA

- T27 Sesso e età dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2007)
- T28 Stato civile e grado di urbanizzazione del domicilio dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2007)
- T29 Tipo di nucleo familiare, situazione di domicilio e tipo di relazione di coppia dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2007)
- T30 Più alta formazione portata a termine, fonte di reddito principale e attività principale dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2007)
- T31 Statuto professionale e reddito mensile netto dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2007)
- T32a Ragione principale della fine del trattamento/accompagnamento dei pazienti (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2007)
- T32b Destinazione dei trasferimenti dei pazienti (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2007)
- T32c Causa di decesso dei pazienti (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2007)

- T33 Durata dell'intervento sui pazienti (in rapporto al problema principale) e sui parenti o conoscenti (2007)
- T34 Trattamento sostitutivo durante e immediatamente dopo l'intervento, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2007)
- T35 Postassistenza prevista e preparata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2007)
- T36 Problemi di dipendenza all'uscita, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2007)
- T37 Frequenza delle ricadute, sostanza o comportamento implicato e durata delle ricadute nel corso dell'intervento, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2007)
- T38 Frequenza del consumo di tabacco e numero di sigarette al giorno nel corso dei 30 ultimi giorni precedenti l'uscita, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2007)
- T39 Obiettivo di consumo all'uscita e pronostico, in rapporto alla principale sostanza problematica (solamente pazienti) (2007)

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland

La Rete di monitoraggio degli interventi e dei trattamenti delle dipendenze in Svizzera (*act-info*) raccoglie nel suo seno i cinque sistemi statistici che erano realizzati in materia di intervento e di trattamento della dipendenza in Svizzera. Tali sistemi sono:

- SAMBAD (Statistica del settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale in materia di dipendenza)
- Residalc (Statistica dei trattamenti residenziali della dipendenza all'alcol in Svizzera)
- FOS (Statistica della Lega per la valutazione dei trattamenti residenziali della tossicomania)
- HegeBe (Statistica dei trattamenti con prescrizione di eroina)
- Metadone (Statistica nazionale dei trattamenti con prescrizione di metadone)

Dal 2004 queste cinque statistiche dispongono di strumenti armonizzati e ottimizzati. I dati comuni sono integrati in una banca dati centralizzata che permette di procedere ad analisi concernenti l'insieme dei settori. L'adozione degli standard europei (Treatment Demande Indicator) permette di garantire anche la comparabilità dei dati al livello internazionale.

act-info è finanziato e coordinato dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e l'analisi e la raccolta dei dati nei differenti campi dell'intervento è affidata all'Istituto di medicina sociale e preventiva dell'Università di Berna (ISPM), all'Istituto svizzero di prevenzione dell'alcolismo e altre tossicomanie a Losanna (ISPA) e all'Istituto di ricerca sulla salute pubblica e sulle dipendenze affiliato all'Università di Zurigo (ISGF).

act-info nel settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale in materia di dipendenza (SAMBAD)

Gli strumenti di monitoraggio *act-info* sono stati introdotti a partire dal 2004 nel settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale in materia di dipendenza e sostituiscono i vecchi questionari in vigore dal 1994. Solo alcuni servizi hanno utilizzato i vecchi strumenti per rilevare i dati del 2007. La realizzazione di *act-info* in questo settore è affidata all'Istituto svizzero di prevenzione dell'alcolismo e altre tossicomanie (ISPA).

La statistica *act-info* SAMBAD dà una visione dell'utenza e delle attività di aiuto ambulatoriale in materia di dipendenza in Svizzera. I dati sono raccolti all'inizio e alla fine dell'intervento. Le informazioni rilevate al momento dell'entrata permettono di valutare particolarmente le caratteristiche socio-demografiche degli utenti, la eventuale presenza di trattamenti precedenti, le modalità di consumo e la presenza di problemi psicosociali precedenti l'intervento. Le informazioni finali rilevate al termine dell'intervento evidenziano particolarmente le caratteristiche socio-demografiche dell'utenza in quel preciso momento, le misure prese dalle persone curanti durante la presa in carico e le circostanze della fine di quest'ultima.

Nel 2007, 77 tra le 224 istituzioni registrate nel settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale in materia di dipendenza hanno partecipato al monitoraggio *act-info*. Queste istituzioni sono sia servizi deputati alla consultazione specialistica dei problemi inerenti all'alcol e/o alle droghe illegali, sia servizi polivalenti offrenti ugualmente un'aiuto per i problemi di dipendenza.

Qualche spiegazione riguardo alle tabelle

La presente statistica descrittiva dei dati dell'indagine act-info presso gli utenti del settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale in materia di dipendenza si basa su due tipi di tabelle:

- quando la domanda contiene delle categorie di risposte predefinite o ricodificate in parti distinte (per esempio « stato civile » o « età »), la tabella indica le percentuali delle differenti categorie di risposte
- quando la domanda non contiene delle categorie predefinite, ma richiede un valore numerico (per esempio « età all'inizio del consumo problematico »), la tabella presenta dei parametri di posizione (media, mediana) e dei parametri di dispersione (deviazione standard, 1° quartile, 3° quartile)

La maggior parte delle tabelle presenta i risultati in maniera distinta per i sottogruppi di pazienti che hanno menzionato l'**alcol**, un **oppiaceo** (eroina particolarmente), la **cocaina** (e derivati) o la **canapa** come problema principale al momento dell'entrata. I **parenti o conoscenti** che consultano per i problemi di un terzo sono ugualmente oggetto di analisi separate per gli aspetti socio-demografici. Invece, gli utenti (poco numerosi) che hanno menzionato altre sostanze come problema principale (per esempio un stimolante o le sostanze volatili) o un problema di dipendenza non inerente a una sostanza (per esempio gioco patologico), non sono differenziati nei risultati (eccetto nei temi direttamente inerenti ai modi di consumo o alle forme di comportamenti additivi non inerenti alle sostanze). Queste persone sono tuttavia incluse nelle analisi relative all'insieme degli interventi che figurano nei blocchi a destra delle tabelle rispettive. Tutte le analisi sono effettuate separatamente per gli uomini, per le donne e per i sessi riuniti (le colonne « Totale » comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è conosciuto).

Solo le risposte valide sono considerate nelle analisi. Cioè, le risposte « non noto » e le informazioni mancanti (missings) sono escluse dalle analisi. Il numero di risposte valide **N** rappresenta il numero esatto di casi sui quali sono calcolati le percentuali o altri parametri; esso viene indicato per ogni gruppo o sottogruppo. In basso alla tabella viene anche indicato il numero corrispondente di dati mancanti. La presenza di numerosi dati mancanti costringe a interpretare i risultati con particolare prudenza.

Le note in basso alla tabella danno informazioni sulle eventuali particolarità dei gruppi di riferimento e sul tipo di domanda. Quando sono possibili più risposte a una stessa domanda (per esempio nelle tabelle del tema T19, « altri problemi di dipendenza ») le percentuali ottenute non si possono addizionare.

T1 Sesso e età dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2007)

| | Pazienti: problema principale | | | | | | | | | | | | Parenti o conoscenti | | | Tutti gli interventi | | | |
|-----------------------|-------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------------|------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Alcol | | | Oppiacei | | | Cocaina e derivati | | | Canapa | | | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | N |
| | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | | | | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| Sesso* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| uomini | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 69.6 | | | 72.4 | | | 77.8 | | | 84.1 | | | 24.8 | | | 63.6 4'240 | | | |
| donne | 30.4 | | | 27.6 | | | 22.2 | | | 15.9 | | | 75.2 | | | 36.4 2'426 | | | |
| nesso non noto | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 1 | | | |
| N** | 2'504 | 1'093 | 3'598 | 443 | 169 | 612 | 228 | 65 | 293 | 550 | 104 | 654 | 271 | 823 | 1'094 | 4'240 | 2'426 | 6'667 | 6'667 |
| Età (in anni)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| fino a 14 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 5.2 | 1.2 | 2.2 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 67 |
| 15-19 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 9.0 | 4.1 | 8.8 | 13.8 | 9.9 | 60.5 | 56.3 | 59.8 | 17.2 | 3.7 | 7.0 | 11.4 | 6.5 | 9.6 | 639 |
| 20-24 | 5.5 | 2.8 | 4.7 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 25.4 | 20.0 | 24.2 | 14.4 | 15.5 | 14.6 | 6.0 | 3.9 | 4.4 | 9.2 | 5.8 | 8.0 | 528 |
| 25-29 | 8.2 | 4.7 | 7.1 | 15.2 | 19.2 | 16.3 | 23.2 | 21.5 | 22.9 | 8.6 | 6.8 | 8.3 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 9.8 | 7.7 | 9.1 | 601 |
| 30-34 | 8.4 | 8.0 | 8.3 | 17.9 | 18.6 | 18.1 | 16.2 | 23.1 | 17.7 | 5.3 | 3.9 | 5.1 | 5.6 | 8.8 | 8.0 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 621 |
| 35-39 | 13.4 | 12.2 | 13.1 | 27.7 | 18.6 | 25.2 | 14.5 | 7.7 | 13.0 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 7.5 | 10.1 | 9.4 | 13.4 | 11.4 | 12.7 | 841 |
| 40-44 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 12.5 | 13.2 | 12.7 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 2.0 | 3.9 | 2.3 | 9.3 | 14.8 | 13.5 | 12.4 | 14.0 | 13.0 | 863 |
| 45-49 | 15.0 | 18.5 | 16.0 | 6.8 | 4.2 | 6.1 | 3.1 | 4.6 | 3.4 | 1.1 | 4.9 | 1.7 | 15.7 | 16.8 | 16.5 | 11.4 | 15.3 | 12.8 | 850 |
| 50-54 | 11.7 | 13.6 | 12.3 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 10.1 | 12.4 | 11.8 | 8.2 | 11.1 | 9.2 | 613 |
| 55-59 | 9.0 | 9.6 | 9.2 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 5.2 | 8.1 | 7.4 | 6.3 | 7.8 | 6.8 | 453 |
| 60-64 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 4.1 | 4.8 | 4.4 | 290 |
| 65-69 | 2.7 | 3.6 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 1.9 | 3.0 | 2.3 | 154 |
| 70-74 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | 75 |
| 75 e più | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 42 |
| N** | 2'494 | 1'091 | 3'586 | 441 | 167 | 608 | 228 | 65 | 293 | 549 | 103 | 652 | 268 | 815 | 1'083 | 4'223 | 2'413 | 6'637 | 6'637 |
| <i>dati mancanti</i> | 10 | 2 | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 17 | 13 | 30 | 30 |
| Età | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| media | 43.8 | 45.9 | 44.4 | 34.1 | 31.9 | 33.5 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 21.3 | 22.9 | 21.6 | 38.6 | 44.0 | 42.7 | 38.4 | 42.3 | 39.8 | |
| deviazione standard | 12.7 | 12.3 | 12.6 | 8.2 | 8.5 | 8.3 | 7.9 | 8.8 | 8.1 | 7.6 | 11.5 | 8.3 | 16.8 | 13.7 | 14.7 | 14.3 | 14.0 | 14.3 | |
| 1° quartile | 35.1 | 38.1 | 36.0 | 27.6 | 25.1 | 26.7 | 23.2 | 22.0 | 23.1 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 22.6 | 34.6 | 32.0 | 26.7 | 32.4 | 28.5 | |
| mediana | 43.9 | 45.9 | 44.6 | 34.9 | 32.3 | 34.0 | 28.5 | 29.0 | 28.6 | 18.0 | 17.8 | 18.0 | 40.8 | 44.7 | 44.0 | 38.3 | 42.9 | 40.1 | |
| 3° quartile | 52.7 | 54.0 | 53.1 | 39.3 | 38.0 | 39.1 | 35.3 | 33.6 | 35.2 | 23.4 | 24.8 | 23.7 | 50.3 | 52.6 | 52.0 | 48.5 | 51.8 | 49.8 | |
| N** | 2'494 | 1'091 | 3'586 | 441 | 167 | 608 | 228 | 65 | 293 | 549 | 103 | 652 | 268 | 815 | 1'083 | 4'223 | 2'413 | 6'637 | |
| <i>dati mancanti</i> | 10 | 2 | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 17 | 13 | 30 | |

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T2 Stato civile e nazionalità dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2007)

| | Pazienti: problema principale | | | | | | | | | | | | Parenti o conoscenti | | | Tutti gli interventi | | | |
|----------------------|-------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------------------|------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Alcol | | | Oppiacei | | | Cocaina e derivati | | | Canapa | | | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | N |
| | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | | | | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | |
| Stato civile* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| celibe/nubile | 40.0 | 29.2 | 36.7 | 76.3 | 65.6 | 73.4 | 76.1 | 72.1 | 75.3 | 92.4 | 90.6 | 92.1 | 44.9 | 24.7 | 29.7 | 53.3 | 35.3 | 46.7 | 2'947 |
| sposato-a | 34.1 | 32.0 | 33.4 | 10.6 | 12.5 | 11.1 | 10.6 | 6.6 | 9.7 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 45.7 | 52.0 | 50.4 | 27.1 | 34.7 | 29.9 | 1'885 |
| separato-a | 5.5 | 6.8 | 5.9 | 2.6 | 3.1 | 2.7 | 3.7 | 6.6 | 4.3 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 1.6 | 4.2 | 3.6 | 4.1 | 5.2 | 4.5 | 285 |
| divorziato-a | 18.7 | 26.6 | 21.1 | 9.6 | 15.6 | 11.3 | 9.6 | 11.5 | 10.0 | 2.0 | 3.1 | 2.1 | 6.7 | 14.1 | 12.3 | 14.1 | 19.9 | 16.3 | 1'025 |
| vedovo-a | 1.5 | 5.2 | 2.6 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 3.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 4.4 | 3.5 | 1.0 | 4.4 | 2.3 | 142 |
| unione registrata | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 22 |
| N** | 2'363 | 1'047 | 3'411 | 426 | 160 | 586 | 218 | 61 | 279 | 511 | 96 | 607 | 254 | 781 | 1'035 | 3'998 | 2'307 | 6'306 | 6'306 |
| <i>dati mancanti</i> | 141 | 46 | 187 | 17 | 9 | 26 | 10 | 4 | 14 | 39 | 8 | 47 | 17 | 42 | 59 | 242 | 119 | 361 | 361 |
| Nazionalità* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CH | 81.8 | 89.1 | 84.1 | 73.5 | 84.6 | 76.5 | 76.7 | 85.0 | 78.5 | 87.2 | 86.8 | 87.2 | 84.4 | 87.7 | 86.8 | 81.2 | 88.0 | 83.7 | 5'286 |
| EU | 10.0 | 7.7 | 9.3 | 16.4 | 11.5 | 15.1 | 14.2 | 10.0 | 13.3 | 6.9 | 3.3 | 6.3 | 9.2 | 7.3 | 7.8 | 10.4 | 7.7 | 9.5 | 597 |
| altra | 8.2 | 3.2 | 6.6 | 10.1 | 3.8 | 8.4 | 9.1 | 5.0 | 8.2 | 5.9 | 9.9 | 6.5 | 6.5 | 5.0 | 5.4 | 8.3 | 4.3 | 6.9 | 434 |
| N** | 2'359 | 1'046 | 3'405 | 427 | 156 | 583 | 219 | 60 | 279 | 524 | 91 | 615 | 262 | 779 | 1'041 | 4'023 | 2'294 | 6'317 | 6'317 |
| <i>dati mancanti</i> | 145 | 47 | 193 | 16 | 13 | 29 | 9 | 5 | 14 | 26 | 13 | 39 | 9 | 44 | 53 | 217 | 132 | 350 | 350 |

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T3 Grado di urbanizzazione del domicilio, tipo di nucleo familiare e situazione di domicilio dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2007)

| | Pazienti: problema principale | | | | | | | | | | | | Parenti o conoscenti | | | Tutti gli interventi | | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------------------|------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Alcol | | | Oppiacei | | | Cocaina e derivati | | | Canapa | | | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | N |
| | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | | | | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| Grado di urbanizzazione* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| grandi centri urbani | 8.9 | 11.2 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 6.1 | 8.3 | 6.9 | 428 |
| periferia dei grandi centri | 10.5 | 11.9 | 10.9 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | 12.0 | 12.5 | 12.4 | 7.8 | 10.3 | 8.7 | 539 |
| città di media importanza | 18.0 | 19.5 | 18.5 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 26.6 | 21.6 | 25.8 | 23.2 | 22.6 | 22.7 | 21.7 | 22.1 | 21.9 | 1'349 |
| piccole città | 35.3 | 31.3 | 34.1 | 46.8 | 41.8 | 45.5 | 41.3 | 48.1 | 42.8 | 34.1 | 41.2 | 35.3 | 31.3 | 27.8 | 28.7 | 36.4 | 31.9 | 34.7 | 2'143 |
| campagne | 27.4 | 26.1 | 27.0 | 22.9 | 28.4 | 24.4 | 26.0 | 20.4 | 24.8 | 36.7 | 35.1 | 36.4 | 24.3 | 28.0 | 27.1 | 28.0 | 27.4 | 27.8 | 1'713 |
| N** | 2'332 | 1'032 | 3'365 | 380 | 141 | 521 | 196 | 54 | 250 | 493 | 97 | 590 | 259 | 783 | 1'042 | 3'896 | 2'275 | 6'172 | 6'172 |
| <i>dati mancanti</i> | 172 | 61 | 233 | 63 | 28 | 91 | 32 | 11 | 43 | 57 | 7 | 64 | 12 | 40 | 52 | 344 | 151 | 495 | 495 |
| Tipo di nucleo familiare (30 ultimi giorni)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| da solo-a | 38.6 | 32.2 | 36.6 | 44.6 | 26.0 | 39.5 | 33.0 | 29.8 | 32.3 | 14.8 | 15.2 | 14.9 | 8.1 | 13.6 | 12.4 | 33.4 | 24.6 | 30.3 | 1'507 |
| con i genitori/un genitore | 7.9 | 4.3 | 6.8 | 12.8 | 13.0 | 12.9 | 28.4 | 8.8 | 24.0 | 69.2 | 46.7 | 65.6 | 25.0 | 5.9 | 10.2 | 20.1 | 8.9 | 16.1 | 800 |
| con figlio-a-i (senza partner) | 1.5 | 12.9 | 5.0 | 0.5 | 7.5 | 2.5 | 1.0 | 7.0 | 2.4 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 3.8 | 14.2 | 11.9 | 1.3 | 11.9 | 5.1 | 252 |
| con un-a partner (senza figli) | 22.9 | 25.0 | 23.6 | 14.1 | 24.7 | 17.0 | 13.7 | 31.6 | 17.7 | 4.6 | 13.0 | 5.9 | 20.0 | 23.9 | 23.0 | 18.3 | 23.8 | 20.2 | 1'008 |
| con un-a partner e figlio-a-i | 19.3 | 17.4 | 18.7 | 8.6 | 8.2 | 8.5 | 7.1 | 0.0 | 5.5 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 38.8 | 40.4 | 40.0 | 15.9 | 22.4 | 18.2 | 906 |
| con altri parenti/familiari | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 2.5 | 7.0 | 3.5 | 2.7 | 1.1 | 2.4 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 85 |
| con amici (comunità abitativa) | 2.4 | 1.4 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 3.2 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 0.7 | 1.0 | 2.4 | 1.6 | 2.1 | 106 |
| altro | 5.9 | 5.6 | 5.8 | 13.3 | 13.0 | 13.2 | 8.6 | 10.5 | 9.1 | 5.2 | 18.5 | 7.3 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 6.8 | 5.5 | 6.3 | 314 |
| N** | 1'774 | 788 | 2'562 | 383 | 146 | 529 | 197 | 57 | 254 | 480 | 92 | 572 | 160 | 557 | 717 | 3'199 | 1'779 | 4'978 | 4'978 |
| <i>dati mancanti</i> | 730 | 305 | 1'036 | 60 | 23 | 83 | 31 | 8 | 39 | 70 | 12 | 82 | 111 | 266 | 377 | 1'041 | 647 | 1'689 | 1'689 |
| Situazione di domicilio (30 ultimi giorni)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| domicilio fisso | 93.7 | 94.2 | 93.9 | 85.2 | 83.2 | 84.7 | 85.1 | 87.0 | 85.5 | 94.6 | 81.1 | 92.5 | 95.5 | 98.5 | 97.8 | 92.5 | 94.1 | 93.1 | 4'769 |
| senza domicilio fisso | 4.6 | 3.7 | 4.3 | 9.5 | 12.1 | 10.2 | 11.3 | 7.4 | 10.4 | 4.6 | 10.0 | 5.4 | 4.0 | 1.5 | 2.1 | 5.3 | 4.0 | 4.8 | 248 |
| istituzione | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 5.3 | 4.7 | 5.1 | 3.6 | 5.6 | 4.0 | 0.8 | 8.9 | 2.1 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 107 |
| N** | 1'866 | 806 | 2'672 | 379 | 149 | 528 | 195 | 54 | 249 | 482 | 90 | 572 | 177 | 586 | 763 | 3'304 | 1'820 | 5'124 | 5'124 |
| <i>dati mancanti</i> | 638 | 287 | 926 | 64 | 20 | 84 | 33 | 11 | 44 | 68 | 14 | 82 | 94 | 237 | 331 | 936 | 606 | 1'543 | 1'543 |

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T4 Tipo di relazione di coppia, numero di figli, di figli vivendo nel nucleo familiare dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2007)

| | Pazienti: problema principale | | | | | | | | | | | | Parenti o conoscenti | | | Tutti gli interventi | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------------------|------------|------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Alcol | | | Oppiacei | | | Cocaina e derivati | | | Canapa | | | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | N |
| | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | | | | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | | |
| Tipo di relazione di coppia* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| senza partner, sola-a | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 51.1 | 21.4 | 43.2 | 39.7 | 25.0 | 36.4 | 60.9 | 42.2 | 58.0 | 19.0 | 13.8 | 14.9 | 37.8 | 26.3 | 33.6 | 1'430 |
| relazione-i saltuaria-e | 4.2 | 5.5 | 4.6 | 4.4 | 15.4 | 7.3 | 11.7 | 25.0 | 14.7 | 12.0 | 12.5 | 12.0 | 5.6 | 1.4 | 2.3 | 5.7 | 6.0 | 5.8 | 246 |
| relazione fissa, vivendo separato-a | 13.8 | 14.4 | 14.0 | 15.0 | 21.4 | 16.7 | 23.5 | 17.3 | 22.1 | 15.7 | 25.0 | 17.2 | 10.6 | 13.6 | 12.9 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 622 |
| relazione fissa, vivendo insieme | 50.1 | 48.1 | 49.5 | 29.6 | 41.9 | 32.9 | 25.1 | 32.7 | 26.8 | 11.4 | 20.3 | 12.8 | 64.8 | 71.3 | 69.9 | 42.0 | 53.0 | 46.1 | 1'962 |
| N** | 1'527 | 709 | 2'236 | 321 | 117 | 438 | 179 | 52 | 231 | 343 | 64 | 407 | 142 | 509 | 651 | 2'686 | 1'574 | 4'260 | 4'260 |
| <i>dati mancanti</i> | 977 | 384 | 1'362 | 122 | 52 | 174 | 49 | 13 | 62 | 207 | 40 | 247 | 129 | 314 | 443 | 1'554 | 852 | 2'407 | 2'407 |
| Numero di figli* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nessuno | 45.8 | 33.6 | 41.9 | 69.2 | 64.2 | 67.8 | 74.7 | 67.3 | 72.9 | 91.7 | 86.4 | 90.9 | 48.4 | 26.6 | 31.6 | 56.6 | 38.4 | 49.8 | 2'544 |
| 1 figlio | 16.7 | 24.0 | 19.1 | 21.6 | 20.9 | 21.4 | 13.2 | 16.4 | 14.0 | 5.7 | 4.9 | 5.6 | 11.2 | 18.5 | 16.8 | 15.3 | 20.4 | 17.2 | 879 |
| 2 figli | 25.1 | 28.3 | 26.1 | 6.8 | 9.5 | 7.5 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 2.4 | 4.9 | 2.8 | 25.0 | 33.7 | 31.6 | 18.9 | 26.6 | 21.8 | 1'114 |
| 3 figli o più | 12.4 | 14.2 | 13.0 | 2.4 | 5.4 | 3.3 | 2.9 | 7.3 | 3.9 | 0.2 | 3.7 | 0.8 | 15.4 | 21.3 | 19.9 | 9.2 | 14.6 | 11.2 | 571 |
| N** | 1'851 | 867 | 2'718 | 370 | 148 | 518 | 174 | 55 | 229 | 423 | 81 | 504 | 188 | 621 | 809 | 3'200 | 1'908 | 5'108 | 5'108 |
| <i>dati mancanti</i> | 653 | 226 | 880 | 73 | 21 | 94 | 54 | 10 | 64 | 127 | 23 | 150 | 83 | 202 | 285 | 1'040 | 518 | 1'559 | 1'559 |
| Numero dei figli vivendo nel nucleo familiare* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nessuno | 73.5 | 62.4 | 70.0 | 85.0 | 78.9 | 83.2 | 83.5 | 91.7 | 85.4 | 76.3 | 67.5 | 74.8 | 46.4 | 40.5 | 41.9 | 73.6 | 57.6 | 67.6 | 3'196 |
| 1 figlio | 10.9 | 18.6 | 13.4 | 7.3 | 12.5 | 8.8 | 7.0 | 6.3 | 6.8 | 3.4 | 10.4 | 4.5 | 13.5 | 23.4 | 21.0 | 9.6 | 18.8 | 13.0 | 617 |
| 2 figli | 11.2 | 14.6 | 12.2 | 5.1 | 6.3 | 5.4 | 6.3 | 2.1 | 5.3 | 14.2 | 13.0 | 14.0 | 28.6 | 24.8 | 25.7 | 11.9 | 16.8 | 13.7 | 649 |
| 3 figli o più | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 3.2 | 0.0 | 2.4 | 6.2 | 9.1 | 6.7 | 11.5 | 11.3 | 11.3 | 4.9 | 6.8 | 5.6 | 267 |
| N** | 1'719 | 797 | 2'516 | 313 | 128 | 441 | 158 | 48 | 206 | 388 | 77 | 465 | 192 | 593 | 785 | 2'956 | 1'773 | 4'729 | 4'729 |
| <i>dati mancanti</i> | 785 | 296 | 1'082 | 130 | 41 | 171 | 70 | 17 | 87 | 162 | 27 | 189 | 79 | 230 | 309 | 1'284 | 653 | 1'938 | 1'938 |

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T5 Più alta formazione portata a termine e statuto professionale dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2007)

| | Pazienti: problema principale | | | | | | | | | | | | Parenti o conoscenti | | | Tutti gli interventi | | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------------------|------------|------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Alcol | | | Oppiacei | | | Cocaina e derivati | | | Canapa | | | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | N |
| | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | | | | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | |
| Più alta formazione portata a termine* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nessuna formazione terminata | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 3.3 | 8.3 | 4.4 | 14.7 | 19.4 | 15.5 | 17.1 | 3.3 | 7.1 | 6.8 | 5.8 | 6.5 | 309 |
| scuola dell'obbligo | 12.8 | 17.7 | 14.2 | 26.5 | 41.0 | 30.5 | 23.8 | 43.3 | 28.1 | 55.2 | 48.4 | 54.1 | 18.8 | 14.6 | 15.8 | 22.3 | 22.1 | 22.2 | 1'062 |
| scolarità complementare | 4.4 | 6.8 | 5.1 | 6.4 | 8.3 | 7.0 | 5.7 | 6.7 | 5.9 | 5.3 | 8.6 | 5.8 | 1.8 | 4.2 | 3.5 | 4.7 | 6.2 | 5.2 | 250 |
| apprendistato/ scuola profes. | 61.6 | 53.2 | 59.1 | 55.0 | 39.1 | 50.5 | 57.6 | 35.0 | 52.6 | 20.7 | 16.1 | 19.9 | 40.0 | 55.1 | 51.0 | 52.4 | 48.8 | 51.2 | 2'446 |
| liceo/diploma | 3.6 | 5.8 | 4.2 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 3.3 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 3.5 | 4.2 | 4.0 | 3.3 | 5.0 | 3.9 | 186 |
| magistrale, scuola pedagogica | 0.7 | 1.7 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 0.6 | 4.0 | 3.1 | 0.5 | 2.1 | 1.1 | 51 |
| form. profession. superiore | 6.9 | 5.2 | 6.4 | 2.5 | 3.2 | 2.7 | 2.9 | 1.7 | 2.6 | 1.2 | 2.2 | 1.4 | 5.9 | 6.6 | 6.4 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 250 |
| scuola profession. superiore | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 0.0 | 0.9 | 1.9 | 0.0 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 44 |
| alta scuola specializzata | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 53 |
| università, politecnico | 3.3 | 2.8 | 3.1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 0.2 | 8.2 | 4.4 | 5.5 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 125 |
| N** | 1'733 | 725 | 2'458 | 404 | 156 | 560 | 210 | 60 | 270 | 489 | 93 | 582 | 170 | 452 | 622 | 3'173 | 1'603 | 4'776 | 4'776 |
| <i>dati mancanti</i> | 771 | 368 | 1'140 | 39 | 13 | 52 | 18 | 5 | 23 | 61 | 11 | 72 | 101 | 371 | 472 | 1'067 | 823 | 1'891 | 1'891 |
| Statuto professionale* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| senza attività professionale | 32.1 | 48.8 | 37.4 | 58.3 | 64.4 | 59.9 | 28.2 | 75.8 | 39.2 | 20.1 | 25.9 | 20.9 | 14.7 | 28.0 | 24.2 | 33.1 | 44.0 | 36.9 | 993 |
| apprendista, praticante | 2.7 | 1.3 | 2.3 | 1.9 | 7.8 | 3.4 | 7.3 | 0.0 | 5.6 | 25.1 | 3.7 | 22.3 | 7.8 | 2.4 | 3.9 | 5.4 | 2.5 | 4.4 | 119 |
| manovale, operaio-a ausiliare | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 6.6 | 0.0 | 4.9 | 8.2 | 3.0 | 7.0 | 3.9 | 7.4 | 4.4 | 5.9 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 3.2 | 4.1 | 110 |
| operaio-a con formaz. pratica | 5.4 | 6.3 | 5.7 | 7.7 | 5.6 | 7.2 | 10.0 | 3.0 | 8.4 | 3.9 | 7.4 | 4.4 | 2.9 | 6.7 | 5.6 | 5.9 | 6.3 | 6.1 | 163 |
| oper. con formaz. certif. (AFC) | 14.1 | 4.9 | 11.2 | 14.3 | 6.7 | 12.3 | 19.1 | 6.1 | 16.1 | 8.9 | 3.7 | 8.3 | 7.8 | 8.3 | 8.1 | 13.3 | 5.9 | 10.7 | 289 |
| caposquadra | 2.7 | 0.2 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 5.5 | 0.0 | 4.2 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 2.1 | 0.3 | 1.5 | 40 |
| impiegato-a non qualificato-a | 12.0 | 19.2 | 14.3 | 4.6 | 8.9 | 5.7 | 14.5 | 6.1 | 12.6 | 4.5 | 11.1 | 5.3 | 12.7 | 20.1 | 18.0 | 10.7 | 17.9 | 13.2 | 355 |
| impieg. qualif., quadro medio | 10.3 | 6.8 | 9.2 | 1.9 | 4.4 | 2.6 | 4.5 | 6.1 | 4.9 | 1.7 | 3.7 | 1.9 | 8.8 | 18.1 | 15.4 | 7.7 | 9.7 | 8.4 | 226 |
| imp. funz. dirett., quadr. sup. | 3.6 | 1.5 | 2.9 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 4.9 | 1.2 | 2.2 | 2.9 | 1.2 | 2.3 | 62 |
| indipendente | 9.5 | 5.7 | 8.3 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 3.7 | 1.9 | 14.7 | 7.9 | 9.8 | 7.2 | 5.5 | 6.6 | 178 |
| scolaro-a, studente | 2.3 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 28.5 | 33.3 | 29.1 | 17.6 | 2.4 | 6.7 | 5.8 | 2.7 | 4.8 | 128 |
| altro statuto | 1.7 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 31 |
| N** | 1'024 | 473 | 1'497 | 259 | 90 | 349 | 110 | 33 | 143 | 179 | 27 | 206 | 102 | 254 | 356 | 1'763 | 931 | 2'694 | 2'694 |
| <i>dati mancanti</i> | 1'480 | 620 | 2'101 | 184 | 79 | 263 | 118 | 32 | 150 | 371 | 77 | 448 | 169 | 569 | 738 | 2'477 | 1'495 | 3'973 | 3'973 |

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T6 Fonte di reddito principale e attività dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2007)

| | Pazienti: problema principale | | | | | | | | | | | | Parenti o conoscenti | | | Tutti gli interventi | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------------------|------------|------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Alcol | | | Oppiacei | | | Cocaina e derivati | | | Canapa | | | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | N |
| | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | | | | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | |
| Fonte di reddito principale (nel corso dei 30 ultimi giorni)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| reddito da lavoro | 55.5 | 38.4 | 50.3 | 28.5 | 28.7 | 28.6 | 64.1 | 31.4 | 57.2 | 31.4 | 20.4 | 29.6 | 56.9 | 55.4 | 55.8 | 50.1 | 42.5 | 47.4 | 2'592 |
| risparmi | 1.4 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 66 |
| rendita (AVS/AI, ecc.) | 15.8 | 19.3 | 16.8 | 13.1 | 16.1 | 13.9 | 4.2 | 17.6 | 7.0 | 4.9 | 8.6 | 5.5 | 8.3 | 11.6 | 10.7 | 12.8 | 16.0 | 13.9 | 762 |
| assistenza/previdenza sociale | 13.1 | 11.9 | 12.7 | 36.6 | 34.3 | 36.0 | 13.5 | 33.3 | 17.7 | 7.8 | 14.0 | 8.8 | 4.6 | 3.4 | 3.7 | 14.2 | 11.4 | 13.2 | 723 |
| assicurazione disoccupazione | 7.5 | 6.1 | 7.1 | 9.4 | 3.5 | 7.8 | 8.3 | 3.9 | 7.4 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 0.9 | 2.0 | 1.7 | 6.5 | 4.1 | 5.6 | 307 |
| sostegno del/della partner | 1.5 | 16.8 | 6.1 | 1.8 | 3.5 | 2.3 | 0.5 | 5.9 | 1.6 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 1.9 | 21.2 | 16.1 | 1.3 | 15.4 | 6.3 | 346 |
| sosteg. genitori/familiari/amici | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 6.3 | 9.1 | 7.0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 51.9 | 47.3 | 51.1 | 25.9 | 5.4 | 10.7 | 12.2 | 7.6 | 10.6 | 578 |
| spacciando/tagliando | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 10 |
| altre entrate illegali | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 6 |
| prostituzione | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2 |
| altra-e | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 4.3 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 77 |
| N** | 2'053 | 881 | 2'934 | 382 | 143 | 525 | 192 | 51 | 243 | 474 | 93 | 567 | 216 | 614 | 830 | 3'532 | 1'937 | 5'469 | 5'469 |
| <i>dati mancanti</i> | 451 | 212 | 664 | 61 | 26 | 87 | 36 | 14 | 50 | 76 | 11 | 87 | 55 | 209 | 264 | 708 | 489 | 1'198 | 1'198 |
| Attività principale (nel corso dei 30 ultimi giorni)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| att. a tempo pieno (70% o più) | 50.6 | 24.3 | 42.7 | 24.8 | 22.2 | 24.1 | 52.8 | 23.0 | 46.2 | 22.3 | 13.8 | 20.9 | 52.6 | 35.0 | 39.6 | 44.1 | 27.5 | 38.4 | 2'052 |
| attività a tempo parziale | 5.0 | 19.9 | 9.5 | 3.4 | 7.8 | 4.6 | 5.6 | 9.8 | 6.5 | 2.6 | 7.4 | 3.4 | 3.2 | 30.6 | 23.4 | 4.4 | 20.6 | 10.0 | 532 |
| varie attività occas. | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 3.9 | 2.7 | 1.4 | 0.0 | 1.1 | 0.6 | 2.1 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 67 |
| in formazione | 3.4 | 2.1 | 3.0 | 2.4 | 6.5 | 3.5 | 8.3 | 4.9 | 7.6 | 52.0 | 44.7 | 50.8 | 24.7 | 4.9 | 10.2 | 11.9 | 6.8 | 10.2 | 543 |
| inattivo sul mercat. del lavoro | 19.1 | 32.3 | 23.0 | 26.0 | 29.4 | 26.9 | 8.8 | 32.8 | 14.1 | 6.6 | 10.6 | 7.3 | 8.9 | 22.9 | 19.2 | 16.9 | 27.6 | 20.6 | 1'099 |
| disoccup., ricerc. di un lavoro | 13.3 | 13.0 | 13.3 | 21.4 | 15.0 | 19.6 | 13.0 | 21.3 | 14.8 | 7.2 | 8.5 | 7.4 | 4.2 | 2.8 | 3.2 | 12.5 | 9.7 | 11.5 | 616 |
| disoccup., lav. futuro garantito | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 0.0 | 1.1 | 0.6 | 2.1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 23 |
| altra | 7.0 | 6.8 | 6.9 | 19.7 | 15.0 | 18.4 | 8.8 | 8.2 | 8.7 | 8.0 | 10.6 | 8.4 | 5.3 | 2.3 | 3.1 | 8.6 | 6.1 | 7.7 | 414 |
| N** | 1'978 | 843 | 2'821 | 412 | 153 | 565 | 216 | 61 | 277 | 498 | 94 | 592 | 190 | 529 | 719 | 3'514 | 1'832 | 5'346 | 5'346 |
| <i>dati mancanti</i> | 526 | 250 | 777 | 31 | 16 | 47 | 12 | 4 | 16 | 52 | 10 | 62 | 81 | 294 | 375 | 726 | 594 | 1'321 | 1'321 |

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T7 Reddito mensile netto e debiti dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2007)

| | Pazienti: problema principale | | | | | | | | | | | | Parenti o conoscenti | | | Tutti gli interventi | | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|--------------|--------------|
| | Alcol | | | Oppiacei | | | Cocaina e derivati | | | Canapa | | | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | N |
| | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | | | | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| Reddito mensile netto (6 ultimi mesi)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nessun reddito | 28.8 | 33.6 | 30.2 | 25.5 | 30.4 | 26.7 | 19.3 | 38.5 | 25.3 | 41.6 | 62.5 | 44.5 | 27.3 | 14.1 | 17.2 | 28.6 | 32.0 | 29.6 | 438 |
| fino a 1000 fr. | 4.1 | 6.1 | 4.7 | 16.4 | 8.9 | 14.5 | 7.0 | 3.8 | 6.0 | 32.2 | 25.0 | 31.2 | 9.1 | 12.7 | 11.8 | 10.7 | 8.0 | 9.9 | 146 |
| da 1001 a 2000 fr. | 6.6 | 11.8 | 8.0 | 18.2 | 25.0 | 19.9 | 14.0 | 23.1 | 16.9 | 6.7 | 4.2 | 6.4 | 4.5 | 9.9 | 8.6 | 8.6 | 13.5 | 10.1 | 149 |
| da 2001 a 3000 fr. | 11.6 | 25.3 | 15.5 | 15.2 | 17.9 | 15.8 | 14.0 | 11.5 | 13.3 | 3.4 | 4.2 | 3.5 | 4.5 | 16.9 | 14.0 | 10.7 | 21.0 | 13.7 | 203 |
| da 3001 a 4000 fr. | 14.8 | 10.9 | 13.7 | 14.5 | 14.3 | 14.5 | 17.5 | 23.1 | 19.3 | 5.4 | 4.2 | 5.2 | 9.1 | 15.5 | 14.0 | 13.4 | 13.0 | 13.3 | 197 |
| da 4001 a 5000 fr. | 15.9 | 8.3 | 13.7 | 6.7 | 3.6 | 5.9 | 21.1 | 0.0 | 14.5 | 6.0 | 0.0 | 5.2 | 4.5 | 12.7 | 10.8 | 13.2 | 7.3 | 11.5 | 170 |
| da 5001 a 6000 fr. | 9.8 | 3.1 | 7.9 | 3.0 | 0.0 | 2.3 | 5.3 | 0.0 | 3.6 | 2.0 | 0.0 | 1.7 | 13.6 | 8.5 | 9.7 | 8.1 | 3.2 | 6.6 | 98 |
| da 6001 a 8000 fr. | 5.7 | 0.9 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 1.2 | 2.0 | 0.0 | 1.7 | 9.1 | 8.5 | 8.6 | 4.5 | 1.8 | 3.7 | 55 |
| da 8001 a 10 000 fr. | 2.1 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 18.2 | 1.4 | 5.4 | 1.6 | 0.2 | 1.2 | 18 |
| da 10 001 a 15 000 fr. | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 4 |
| più di 15 000 fr. | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 2 |
| N** | 580 | 229 | 809 | 165 | 56 | 221 | 57 | 26 | 83 | 149 | 24 | 173 | 22 | 71 | 93 | 1'042 | 438 | 1'480 | 1'480 |
| <i>dati mancanti</i> | 1'924 | 864 | 2'789 | 278 | 113 | 391 | 171 | 39 | 210 | 401 | 80 | 481 | 249 | 752 | 1'001 | 3'198 | 1'988 | 5'187 | 5'187 |
| Debiti* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nessun debito | 63.2 | 77.6 | 67.5 | 28.7 | 32.3 | 29.6 | 44.2 | 46.4 | 44.7 | 79.8 | 96.0 | 82.2 | 85.1 | 87.7 | 87.1 | 61.8 | 76.1 | 66.6 | 1'499 |
| fino a 5000 fr. | 4.6 | 7.0 | 5.3 | 19.9 | 11.3 | 17.7 | 11.5 | 14.3 | 12.1 | 7.7 | 4.0 | 7.1 | 1.5 | 2.6 | 2.4 | 7.5 | 6.0 | 7.0 | 158 |
| da 5001 a 10 000 fr. | 9.4 | 6.4 | 8.5 | 8.8 | 21.0 | 11.9 | 7.1 | 17.9 | 9.2 | 4.2 | 0.0 | 3.6 | 3.0 | 2.6 | 2.7 | 7.7 | 6.5 | 7.3 | 164 |
| da 10 001 a 25 000 fr. | 9.0 | 5.1 | 7.9 | 18.2 | 14.5 | 17.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 3.1 | 0.0 | 2.7 | 1.5 | 4.4 | 3.7 | 9.1 | 5.7 | 8.0 | 180 |
| da 25 001 a 50 000 fr. | 5.1 | 1.9 | 4.2 | 11.0 | 16.1 | 12.3 | 16.8 | 7.1 | 14.9 | 3.5 | 0.0 | 3.0 | 4.5 | 1.8 | 2.4 | 6.1 | 3.2 | 5.2 | 116 |
| da 50 001 a 100 000 fr. | 4.0 | 0.3 | 2.9 | 7.7 | 3.2 | 6.6 | 2.7 | 0.0 | 2.1 | 1.4 | 0.0 | 1.2 | 3.0 | 0.9 | 1.4 | 3.9 | 1.2 | 3.0 | 68 |
| più di 100 000 fr. | 4.7 | 1.6 | 3.8 | 5.5 | 1.6 | 4.5 | 3.5 | 0.0 | 2.8 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 3.9 | 1.2 | 3.0 | 67 |
| N** | 744 | 313 | 1'057 | 181 | 62 | 243 | 113 | 28 | 141 | 287 | 50 | 337 | 67 | 228 | 295 | 1'503 | 749 | 2'252 | 2'252 |
| <i>dati mancanti</i> | 1'760 | 780 | 2'541 | 262 | 107 | 369 | 115 | 37 | 152 | 263 | 54 | 317 | 204 | 595 | 799 | 2'737 | 1'677 | 4'415 | 4'415 |

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T8 Incarcerazione o detenzione preventiva prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2007)

| | Pazienti: problema principale | | | | | | | | | | | | Tutti gli interventi | | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------------------|------------|--------------|--------------|
| | Alcol | | | Oppiacei | | | Cocaina e derivati | | | Canapa | | | Uomini | Donne | Totale | N |
| | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | |
| Incarcerazione o detenzione preventiva* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nessuna | 89.3 | 98.8 | 92.3 | 41.5 | 78.2 | 50.9 | 68.5 | 88.0 | 73.5 | 88.5 | 96.6 | 89.7 | 82.5 | 96.1 | 86.5 | 1'661 |
| in prigione | 7.1 | 0.5 | 5.0 | 20.8 | 12.7 | 18.7 | 12.3 | 8.0 | 11.2 | 7.1 | 3.4 | 6.5 | 9.0 | 2.3 | 7.0 | 135 |
| in detenzione preventiva | 2.1 | 0.7 | 1.7 | 11.3 | 7.3 | 10.3 | 9.6 | 4.0 | 8.2 | 3.2 | 0.0 | 2.7 | 3.7 | 1.4 | 3.0 | 58 |
| in prigione e in detenzione preventiva | 1.4 | 0.0 | 1.0 | 26.4 | 1.8 | 20.1 | 9.6 | 0.0 | 7.1 | 1.3 | 0.0 | 1.1 | 4.8 | 0.2 | 3.5 | 67 |
| N** | 900 | 410 | 1'310 | 159 | 55 | 214 | 73 | 25 | 98 | 156 | 29 | 185 | 1'361 | 560 | 1'921 | 1'921 |
| <i>dati mancanti</i> | 1'604 | 683 | 2'288 | 284 | 114 | 398 | 155 | 40 | 195 | 394 | 75 | 469 | 2'608 | 1'043 | 3'652 | 3'652 |
| Durata totale di detenzione*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| fino a 1 mese | 30.6 | 33.3 | 30.7 | 22.6 | 22.2 | 22.5 | 22.2 | 50.0 | 25.0 | 40.0 | 0.0 | 36.4 | 26.0 | 31.3 | 26.5 | 49 |
| > 1 a 2 mesi | 5.6 | 33.3 | 6.7 | 8.1 | 0.0 | 7.0 | 11.1 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 9.1 | 7.7 | 6.3 | 7.6 | 14 |
| > 2 a 6 mesi | 31.9 | 33.3 | 32.0 | 24.2 | 55.6 | 28.2 | 33.3 | 50.0 | 35.0 | 30.0 | 0.0 | 27.3 | 29.0 | 43.8 | 30.3 | 55 |
| > 6 a 12 mesi | 12.5 | 0.0 | 12.0 | 6.5 | 11.1 | 7.0 | 16.7 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 6.3 | 9.2 | 17 |
| più di un anno | 19.4 | 0.0 | 18.7 | 38.7 | 11.1 | 35.2 | 16.7 | 0.0 | 15.0 | 20.0 | 100.0 | 27.3 | 27.8 | 12.5 | 26.5 | 49 |
| N** | 71 | 3 | 74 | 62 | 9 | 71 | 18 | 2 | 20 | 10 | 1 | 11 | 168 | 16 | 184 | 184 |
| <i>dati mancanti</i> | 25 | 2 | 27 | 31 | 3 | 34 | 5 | 1 | 6 | 8 | 0 | 8 | 70 | 6 | 76 | 76 |

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che hanno vissuto un'esperienza di detenzione. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T9 Istanza d'invio principale e secondaria dei pazienti (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2007)

| | Pazienti: problema principale | | | | | | | | | | | | Parenti o conoscenti | | | Tutti gli interventi | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|---------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------------------|------------|------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Alcol | | | Oppiacei | | | Coacaina e derivati | | | Canapa | | | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | N |
| | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | | | | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | |
| Istanza d'invio principale* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| propria iniziativa | 31.5 | 36.2 | 33.0 | 45.1 | 50.6 | 46.6 | 39.5 | 31.0 | 37.7 | 21.2 | 28.1 | 22.3 | 55.1 | 73.4 | 68.8 | 34.0 | 50.6 | 40.1 | 2'316 |
| coniuge/partner | 5.7 | 3.7 | 5.1 | 2.7 | 3.9 | 3.0 | 5.6 | 3.4 | 5.1 | 2.1 | 0.0 | 1.8 | 3.6 | 2.3 | 2.7 | 4.7 | 2.9 | 4.0 | 232 |
| famiglia | 3.6 | 5.0 | 4.0 | 5.4 | 4.5 | 5.2 | 11.2 | 15.5 | 12.1 | 9.6 | 6.7 | 9.1 | 15.8 | 4.8 | 7.6 | 6.1 | 5.2 | 5.8 | 334 |
| amici/colleghi/conoscenti | 1.3 | 2.6 | 1.7 | 2.7 | 0.6 | 2.1 | 2.8 | 10.3 | 4.4 | 0.6 | 5.6 | 1.4 | 1.6 | 4.1 | 3.5 | 1.5 | 3.7 | 2.3 | 134 |
| istituto ambulatoriale specializ. | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 5.7 | 3.2 | 5.0 | 1.9 | 5.2 | 2.6 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 110 |
| istituto residenziale specializ. | 5.6 | 6.4 | 5.9 | 4.7 | 5.8 | 5.0 | 1.9 | 3.4 | 2.2 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 239 |
| studio medico | 7.8 | 11.4 | 8.9 | 11.1 | 9.1 | 10.5 | 8.8 | 10.3 | 9.2 | 4.0 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 3.4 | 3.7 | 7.4 | 8.0 | 7.6 | 441 |
| ospedale/clinica | 10.3 | 14.9 | 11.8 | 3.4 | 1.9 | 3.0 | 2.8 | 6.9 | 3.7 | 1.7 | 3.4 | 1.9 | 1.2 | 1.9 | 1.7 | 7.1 | 8.0 | 7.4 | 427 |
| servizi sociali | 5.9 | 6.4 | 6.1 | 8.1 | 9.7 | 8.6 | 5.6 | 5.2 | 5.5 | 3.7 | 1.1 | 3.3 | 4.5 | 2.5 | 3.0 | 5.7 | 5.1 | 5.5 | 318 |
| prov. penale/amministrativo | 17.6 | 6.5 | 14.1 | 8.1 | 5.2 | 7.3 | 13.5 | 5.2 | 11.7 | 44.5 | 29.2 | 42.1 | 5.3 | 1.0 | 2.0 | 18.1 | 5.0 | 13.3 | 767 |
| datore di lavoro | 5.1 | 2.6 | 4.3 | 0.5 | 1.9 | 0.9 | 1.9 | 0.0 | 1.5 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 2.4 | 0.3 | 0.8 | 3.9 | 1.6 | 3.0 | 176 |
| insegnante | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 40 |
| altra | 3.4 | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 3.2 | 2.7 | 4.7 | 3.4 | 4.4 | 4.4 | 13.5 | 5.8 | 2.0 | 3.2 | 2.9 | 4.3 | 3.7 | 4.1 | 237 |
| N** | 2'070 | 937 | 3'008 | 406 | 154 | 560 | 215 | 58 | 273 | 481 | 89 | 570 | 247 | 730 | 977 | 3'643 | 2'127 | 5'771 | 5'771 |
| <i>dati mancanti</i> | 434 | 156 | 590 | 37 | 15 | 52 | 13 | 7 | 20 | 69 | 15 | 84 | 24 | 93 | 117 | 597 | 299 | 896 | 896 |
| Istanza d'invio secondaria*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| propria iniziativa | 27.8 | 26.0 | 27.3 | 23.3 | 25.6 | 24.0 | 34.7 | 18.2 | 30.5 | 22.2 | 14.7 | 21.1 | 10.4 | 9.6 | 9.8 | 26.1 | 20.3 | 24.1 | 684 |
| coniuge/partner | 8.1 | 4.8 | 7.2 | 5.8 | 8.9 | 6.7 | 9.5 | 6.1 | 8.6 | 6.7 | 5.9 | 6.6 | 6.5 | 5.4 | 5.6 | 7.6 | 5.6 | 6.9 | 196 |
| famiglia | 4.3 | 6.9 | 5.0 | 4.0 | 11.1 | 6.1 | 10.5 | 3.0 | 8.6 | 8.2 | 5.9 | 7.9 | 15.6 | 8.6 | 10.1 | 5.4 | 7.2 | 6.0 | 170 |
| amici/colleghi/conoscenti | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 3.3 | 1.9 | 1.1 | 6.1 | 2.3 | 1.5 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 5.7 | 4.8 | 1.4 | 3.3 | 2.1 | 59 |
| istituto ambulatoriale specializ. | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 3.1 | 6.7 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 34 |
| istituto residenziale specializ. | 1.9 | 2.7 | 2.1 | 3.6 | 0.0 | 2.6 | 2.1 | 6.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 48 |
| studio medico | 5.7 | 8.0 | 6.3 | 10.8 | 13.3 | 11.5 | 11.6 | 9.1 | 10.9 | 1.5 | 2.9 | 1.8 | 3.9 | 3.2 | 3.4 | 5.9 | 6.7 | 6.2 | 175 |
| ospedale/clinica | 3.7 | 4.6 | 4.0 | 4.5 | 2.2 | 3.8 | 2.1 | 6.1 | 3.1 | 1.5 | 0.0 | 1.3 | 2.6 | 1.4 | 1.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 93 |
| servizi sociali | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 5.8 | 3.3 | 5.1 | 1.1 | 18.2 | 5.5 | 2.1 | 0.0 | 1.8 | 7.8 | 0.7 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 63 |
| prov. penale/amministrativo | 3.3 | 1.5 | 2.8 | 3.1 | 2.2 | 2.9 | 6.3 | 3.0 | 5.5 | 2.1 | 2.9 | 2.2 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 3.1 | 1.1 | 2.4 | 69 |
| datore di lavoro | 3.3 | 1.5 | 2.7 | 2.2 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 2.6 | 1.0 | 2.1 | 59 |
| insegnante | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 8 |
| altra | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 4.4 | 3.2 | 0.0 | 9.1 | 2.3 | 1.5 | 2.9 | 1.8 | 3.9 | 3.2 | 3.4 | 2.5 | 3.4 | 2.8 | 79 |
| nessuna | 44.0 | 46.1 | 44.6 | 43.0 | 26.7 | 38.3 | 42.1 | 36.4 | 40.6 | 55.7 | 67.6 | 57.5 | 50.6 | 63.2 | 60.5 | 45.8 | 50.0 | 47.2 | 1'340 |
| N** | 1'168 | 477 | 1'645 | 223 | 90 | 313 | 95 | 33 | 128 | 194 | 34 | 228 | 77 | 280 | 357 | 1'864 | 972 | 2'836 | 2'836 |
| <i>dati mancanti</i> | 1'336 | 616 | 1'953 | 220 | 79 | 299 | 133 | 32 | 165 | 356 | 70 | 426 | 194 | 543 | 737 | 2'376 | 1'454 | 3'831 | 3'831 |

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili)

T10 Tipo di aiuto atteso dai pazienti (in rapporto al problema principale) e dai parenti o conoscenti all'entrata e base legale dell'intervento (2007)

| Tipo di aiuto atteso* | Pazienti: problema principale | | | | | | | | | | | | Parenti o conoscenti | | | Tutti gli interventi | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------------------|------------|------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Alcol | | | Oppiacei | | | Cocaina e derivati | | | Canapa | | | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | N |
| | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | | | | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | |
| Tipo di aiuto atteso* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| problemi di dipendenza | 78.6 | 84.1 | 80.2 | 85.3 | 91.7 | 87.0 | 80.0 | 86.8 | 81.8 | 72.9 | 61.1 | 71.1 | 60.2 | 52.8 | 54.5 | 76.5 | 73.1 | 75.3 | 2'455 |
| problemi somatici | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 5.4 | 8.3 | 6.2 | 4.8 | 7.9 | 5.6 | 1.5 | 2.8 | 1.7 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 123 |
| problemi psichici | 16.9 | 28.7 | 20.4 | 21.2 | 26.0 | 22.5 | 15.2 | 34.2 | 20.3 | 12.3 | 16.7 | 13.0 | 11.1 | 18.8 | 17.0 | 16.1 | 24.4 | 19.1 | 622 |
| problemi relazionali | 14.1 | 21.0 | 16.2 | 18.9 | 18.8 | 18.9 | 11.4 | 39.5 | 18.9 | 6.9 | 5.6 | 6.7 | 32.4 | 44.4 | 41.6 | 14.6 | 27.5 | 19.1 | 624 |
| problemi familiari | 8.5 | 16.0 | 10.8 | 12.7 | 17.7 | 14.1 | 10.5 | 34.2 | 16.8 | 13.3 | 13.9 | 13.4 | 38.0 | 44.9 | 43.3 | 10.9 | 25.9 | 16.3 | 530 |
| problemi finanziari | 6.9 | 5.0 | 6.3 | 17.4 | 20.8 | 18.3 | 10.5 | 23.7 | 14.0 | 4.9 | 2.8 | 4.6 | 7.4 | 4.8 | 5.4 | 8.6 | 7.1 | 8.1 | 263 |
| problemi professionali o di formazione | 12.2 | 9.8 | 11.5 | 16.6 | 12.5 | 15.5 | 11.4 | 36.8 | 18.2 | 13.3 | 5.6 | 12.1 | 4.6 | 3.4 | 3.7 | 12.0 | 8.4 | 10.7 | 350 |
| problemi di alloggio | 3.0 | 4.1 | 3.4 | 10.4 | 11.5 | 10.7 | 6.7 | 13.2 | 8.4 | 1.5 | 5.6 | 2.1 | 2.8 | 3.9 | 3.7 | 4.0 | 4.9 | 4.3 | 141 |
| problemi di violenza | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 3.1 | 1.7 | 0.0 | 5.3 | 1.4 | 0.5 | 2.8 | 0.8 | 4.6 | 3.9 | 4.1 | 1.4 | 2.4 | 1.7 | 57 |
| problemi giuridici | 9.9 | 3.6 | 8.0 | 8.9 | 10.4 | 9.3 | 20.0 | 5.3 | 16.1 | 16.3 | 8.3 | 15.1 | 5.6 | 3.1 | 3.7 | 10.4 | 4.1 | 8.1 | 265 |
| altro-i | 2.0 | 1.1 | 1.7 | 2.7 | 5.2 | 3.4 | 2.9 | 0.0 | 2.1 | 1.0 | 2.8 | 1.3 | 0.9 | 2.0 | 1.7 | 3.3 | 2.8 | 3.1 | 102 |
| nessuna richiesta | 11.9 | 7.5 | 10.6 | 4.6 | 2.1 | 3.9 | 8.6 | 2.6 | 7.0 | 14.8 | 33.3 | 17.6 | 3.7 | 0.8 | 1.5 | 11.0 | 5.7 | 9.1 | 297 |
| N** | 1'315 | 561 | 1'876 | 259 | 96 | 355 | 105 | 38 | 143 | 203 | 36 | 239 | 108 | 356 | 464 | 2'103 | 1'158 | 3'261 | 3'261 |
| <i>dati mancanti</i> | <i>1'189</i> | <i>532</i> | <i>1'722</i> | <i>184</i> | <i>73</i> | <i>257</i> | <i>123</i> | <i>27</i> | <i>150</i> | <i>347</i> | <i>68</i> | <i>415</i> | <i>163</i> | <i>467</i> | <i>630</i> | <i>2'137</i> | <i>1'268</i> | <i>3'406</i> | <i>3'406</i> |
| Base legale dell'intervento* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sospensione della procedura, rinuncia a infliggere una pena o un avvertimento (art. 19a cifra 2 Lstup) | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 8.8 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.5 | 1.0 | 30 |
| abbandono del perseguimento penale nel caso di un trattamento sotto sorveglianza medica (art. 19a cifra 3 Lstup) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| misure concernenti delinquenti mentalmente anormali (art. 43 CPS) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| trattamento delle persone dipendenti dall'alcol o dalle droghe (art. 44 CPS) | 2.1 | 1.2 | 1.8 | 0.9 | 2.3 | 1.3 | 4.2 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 39 |
| irresponsabilità (art. 10 CPS) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| responsabilità limitata (art 11 CPS) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| esecuzione di misure per tossicodipend. in un'istituzione di educazione al lavoro (art. 2a ord. 3 rel. al CPS SR 311.03) | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 2.1 | 0.0 | 1.5 | 7.9 | 11.8 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | 28 |
| altra | 10.4 | 4.3 | 8.6 | 4.8 | 7.0 | 5.4 | 20.8 | 2.9 | 16.2 | 23.6 | 14.7 | 22.2 | 3.5 | 0.7 | 1.3 | 11.2 | 3.6 | 8.6 | 250 |
| nessuna misura (trattamento volontario) | 86.4 | 94.1 | 88.7 | 92.2 | 89.5 | 91.5 | 72.9 | 97.1 | 79.2 | 62.3 | 64.7 | 62.7 | 96.5 | 99.3 | 98.7 | 84.6 | 94.7 | 88.1 | 2'573 |
| N** | 1'207 | 508 | 1'715 | 231 | 86 | 317 | 96 | 34 | 130 | 191 | 34 | 225 | 85 | 292 | 377 | 1'910 | 1'011 | 2'921 | 2'921 |
| <i>dati mancanti</i> | <i>1'297</i> | <i>585</i> | <i>1'883</i> | <i>212</i> | <i>83</i> | <i>295</i> | <i>132</i> | <i>31</i> | <i>163</i> | <i>359</i> | <i>70</i> | <i>429</i> | <i>186</i> | <i>531</i> | <i>717</i> | <i>2'330</i> | <i>1'415</i> | <i>3'746</i> | <i>3'746</i> |

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T11 Trattamenti/accompagnamenti dei pazienti prima dell'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2007)

| | Pazienti: problema principale | | | | | | | | | | | | Parenti o conoscenti | | | Tutti gli interventi | | | |
|----------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------------------|------------|------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Alcol | | | Oppiacei | | | Cocaina e derivati | | | Canapa | | | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | N |
| | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | | | | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| Interventi precedenti* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| no | 46.8 | 40.2 | 44.8 | 15.5 | 18.7 | 16.4 | 57.6 | 37.0 | 53.2 | 77.1 | 73.4 | 76.5 | 71.9 | 71.9 | 71.9 | 50.9 | 51.7 | 51.2 | 2'732 |
| si | 53.2 | 59.8 | 55.2 | 84.5 | 81.3 | 83.6 | 42.4 | 63.0 | 46.8 | 22.9 | 26.6 | 23.5 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 49.1 | 48.3 | 48.8 | 2'605 |
| N** | 1'983 | 880 | 2'863 | 374 | 139 | 513 | 198 | 54 | 252 | 484 | 94 | 578 | 185 | 594 | 779 | 3'433 | 1'904 | 5'337 | 5'337 |
| <i>dati mancanti</i> | 521 | 213 | 735 | 69 | 30 | 99 | 30 | 11 | 41 | 66 | 10 | 76 | 86 | 229 | 315 | 807 | 522 | 1'330 | 1'330 |
| Tipo di intervento*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| trattamento con prescriz. di eroina | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 5.1 | 6.1 | 5.4 | 0.0 | 3.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 42 |
| terapia sostitut. (metadone, subutex) | 3.5 | 4.1 | 3.7 | 63.9 | 66.7 | 64.6 | 20.8 | 46.2 | 27.6 | 5.0 | 4.3 | 4.8 | 0.0 | 4.2 | 3.0 | 15.6 | 13.1 | 14.8 | 348 |
| altro tratt. medicam. delle dipendenze | 10.6 | 8.1 | 9.8 | 9.9 | 6.1 | 8.8 | 8.3 | 3.8 | 7.1 | 1.0 | 8.7 | 2.4 | 2.1 | 0.8 | 1.2 | 9.4 | 6.6 | 8.4 | 199 |
| consulenza ambulatoriale | 66.4 | 66.6 | 66.4 | 59.5 | 62.6 | 60.3 | 61.1 | 76.9 | 65.3 | 78.2 | 65.2 | 75.8 | 78.7 | 87.4 | 84.9 | 66.2 | 70.1 | 67.6 | 1'594 |
| terapia residenziale | 48.4 | 55.4 | 50.7 | 48.2 | 35.4 | 44.8 | 40.3 | 38.5 | 39.8 | 22.8 | 39.1 | 25.8 | 19.1 | 11.8 | 13.9 | 44.9 | 44.6 | 44.8 | 1'057 |
| cura di disintossicazione | 41.4 | 46.8 | 43.2 | 55.1 | 44.4 | 52.3 | 41.7 | 38.5 | 40.8 | 12.9 | 17.4 | 13.7 | 12.8 | 9.2 | 10.2 | 40.6 | 37.9 | 39.7 | 936 |
| gruppo di aiuto reciproco/ autosost. | 5.6 | 6.5 | 5.9 | 2.6 | 0.0 | 1.9 | 1.4 | 7.7 | 3.1 | 2.0 | 4.3 | 2.4 | 2.1 | 8.4 | 6.6 | 4.6 | 5.7 | 5.0 | 117 |
| altro-i | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 1.8 | 5.1 | 2.7 | 2.8 | 3.8 | 3.1 | 3.0 | 13.0 | 4.8 | 8.5 | 3.4 | 4.8 | 2.5 | 3.3 | 2.8 | 66 |
| N** | 996 | 491 | 1'487 | 274 | 99 | 373 | 72 | 26 | 98 | 101 | 23 | 124 | 47 | 119 | 166 | 1'552 | 807 | 2'359 | 2'359 |
| <i>dati mancanti</i> | 58 | 35 | 93 | 42 | 14 | 56 | 12 | 8 | 20 | 10 | 2 | 12 | 5 | 48 | 53 | 133 | 113 | 246 | 246 |

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che sono già stati presi in carico in precedenza. Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

T12 Trattamento sostitutivo e altri interventi all'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2007)

| | Pazienti: problema principale | | | | | | | | | | | | Tutti i pazienti | | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Alcol | | | Oppiacei | | | Cocaina e derivati | | | Canapa | | | Uomini | donne | Totale | N |
| | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| Sostituzione o prescrizione di eroina* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| no | 98.3 | 97.7 | 98.1 | 56.7 | 45.6 | 53.6 | 92.4 | 78.3 | 89.4 | 99.3 | 100.0 | 99.4 | 93.0 | 91.3 | 92.5 | 3'649 |
| si | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 43.3 | 54.4 | 46.4 | 7.6 | 21.7 | 10.6 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 7.0 | 8.7 | 7.5 | 294 |
| N** | 1'694 | 738 | 2'432 | 328 | 125 | 453 | 171 | 46 | 217 | 444 | 84 | 528 | 2'822 | 1'121 | 3'943 | 3'943 |
| <i>dati mancanti</i> | 810 | 355 | 1'166 | 115 | 44 | 159 | 57 | 19 | 76 | 106 | 20 | 126 | 1'147 | 482 | 1'630 | 1'630 |
| Tipo di sostituzione*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| eroina | 3.8 | 6.3 | 4.8 | 4.3 | 3.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 10 |
| metadone | 57.7 | 62.5 | 59.5 | 87.9 | 92.4 | 89.4 | 92.3 | 100.0 | 95.7 | 66.7 | 0.0 | 66.7 | 83.9 | 88.3 | 85.4 | 245 |
| altri oppiacei | 11.5 | 6.3 | 9.5 | 6.4 | 4.5 | 5.8 | 7.7 | 0.0 | 4.3 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 7.8 | 4.3 | 6.6 | 19 |
| altre sostanze | 26.9 | 25.0 | 26.2 | 1.4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 13 |
| N** | 26 | 16 | 42 | 141 | 66 | 207 | 13 | 10 | 23 | 3 | 0 | 3 | 193 | 94 | 287 | 287 |
| <i>dati mancanti</i> | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 |
| Altro intervento parallelo* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| no | 87.2 | 80.0 | 85.1 | 75.5 | 78.6 | 76.3 | 88.0 | 79.1 | 85.6 | 94.1 | 100.0 | 95.0 | 86.9 | 81.7 | 85.5 | 2'321 |
| si | 12.8 | 20.0 | 14.9 | 24.5 | 21.4 | 23.7 | 12.0 | 20.9 | 14.4 | 5.9 | 0.0 | 5.0 | 13.1 | 18.3 | 14.5 | 395 |
| N** | 1'213 | 520 | 1'733 | 273 | 103 | 376 | 117 | 43 | 160 | 237 | 41 | 278 | 1'950 | 766 | 2'716 | 2'716 |
| <i>dati mancanti</i> | 1'291 | 573 | 1'865 | 170 | 66 | 236 | 111 | 22 | 133 | 313 | 63 | 376 | 2'019 | 837 | 2'857 | 2'857 |
| Tipo di intervento parallelo**** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| trattamento o consulenza ambulatoriale | 55.5 | 70.9 | 61.6 | 71.6 | 81.8 | 74.2 | 53.8 | 77.8 | 63.6 | 78.6 | 0.0 | 78.6 | 61.4 | 71.9 | 65.1 | 256 |
| terapia residenziale | 12.3 | 9.7 | 11.2 | 13.4 | 9.1 | 12.4 | 38.5 | 22.2 | 31.8 | 7.1 | 0.0 | 7.1 | 13.8 | 10.8 | 12.7 | 50 |
| gruppo di aiuto reciproco o di autosostegno | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 8 |
| altro-i | 30.3 | 21.4 | 26.7 | 16.4 | 9.1 | 14.6 | 7.7 | 0.0 | 4.5 | 14.3 | 0.0 | 14.3 | 24.0 | 18.7 | 22.1 | 87 |
| N** | 155 | 103 | 258 | 67 | 22 | 89 | 13 | 9 | 22 | 14 | 0 | 14 | 254 | 139 | 393 | 393 |
| <i>dati mancanti</i> | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che seguono un programma di sostituzione. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

**** I risultati si basano solamente sui clienti presi in carico parallelamente. Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

T13a Entrata in seguito a una cura di disintossicazione, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2007)

| | Pazienti: problema principale | | | | | | | | | | | | Tutti i pazienti | | | |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| | Alcol | | | Oppiacei | | | Cocaina e derivati | | | Canapa | | | Uomini | donne | Totale | N |
| | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | |
| Entrata in seguito a una cura di disintossicazione* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| no | 78.5 | 71.1 | 76.3 | 86.3 | 88.2 | 86.8 | 92.3 | 88.2 | 91.2 | 93.5 | 97.2 | 94.1 | 82.4 | 76.5 | 80.7 | 1'951 |
| disintossicazione nella stessa istituzione | 1.4 | 2.1 | 1.6 | 0.0 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 2.9 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.9 | 1.2 | 30 |
| disintossicazione in un'altra istituzione | 20.1 | 26.8 | 22.1 | 13.7 | 10.6 | 12.9 | 7.7 | 8.8 | 8.0 | 5.9 | 2.8 | 5.4 | 16.7 | 21.6 | 18.1 | 437 |
| N** | 1'120 | 485 | 1'605 | 226 | 85 | 311 | 91 | 34 | 125 | 186 | 36 | 222 | 1'723 | 695 | 2'418 | 2'418 |
| <i>dati mancanti</i> | <i>1'384</i> | <i>608</i> | <i>1'993</i> | <i>217</i> | <i>84</i> | <i>301</i> | <i>137</i> | <i>31</i> | <i>168</i> | <i>364</i> | <i>68</i> | <i>432</i> | <i>2'246</i> | <i>908</i> | <i>3'155</i> | <i>3'155</i> |

T13b Frequenza delle cure di disintossicazione senza aiuto professionale prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2007)

| Freq. disintossicazioni senza accompagnamento* | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Alcol | | | Oppiacei | | | Cocaina e derivati | | | Canapa | | | Uomini | donne | Totale | N |
| | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | | | | |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| mai | 62.7 | 53.8 | 59.9 | 11.2 | 19.0 | 13.2 | 46.7 | 28.6 | 42.0 | 77.3 | 73.3 | 76.7 | 56.0 | 51.2 | 54.6 | 676 |
| una volta | 8.0 | 7.6 | 7.9 | 7.2 | 11.9 | 8.4 | 5.0 | 14.3 | 7.4 | 10.2 | 13.3 | 10.7 | 7.8 | 9.1 | 8.2 | 101 |
| due o tre volte | 9.1 | 10.0 | 9.4 | 23.2 | 14.3 | 21.0 | 13.3 | 9.5 | 12.3 | 5.7 | 6.7 | 5.8 | 11.3 | 9.7 | 10.8 | 134 |
| più di tre volte | 20.3 | 28.5 | 22.8 | 58.4 | 54.8 | 57.5 | 35.0 | 47.6 | 38.3 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 25.0 | 29.9 | 26.4 | 327 |
| N** | 552 | 249 | 801 | 125 | 42 | 167 | 60 | 21 | 81 | 88 | 15 | 103 | 877 | 361 | 1'238 | 1'238 |
| <i>dati mancanti</i> | <i>1'952</i> | <i>844</i> | <i>2'797</i> | <i>318</i> | <i>127</i> | <i>445</i> | <i>168</i> | <i>44</i> | <i>212</i> | <i>462</i> | <i>89</i> | <i>551</i> | <i>3'092</i> | <i>1'242</i> | <i>4'335</i> | <i>4'335</i> |

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T14 Problema principale all'entrata (solamente pazienti) (2007)

| Tutti i pazienti | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Problema principale | Uomini | Donne | Totale | N | | Uomini | Donne | Totale | N |
| | % | % | % | | | % | % | % | |
| alcol | 63.1 | 68.2 | 64.6 | 3'598 | alcol | 63.1 | 68.2 | 64.6 | 3'598 |
| cocktail (eroina e cocaina) | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 29 | cocktail | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 29 |
| eroina | 9.7 | 9.2 | 9.6 | 533 | oppiacei | 10.6 | 10.2 | 10.5 | 583 |
| metadone | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 36 | | | | | |
| altri oppiacei | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 14 | cocaina e derivati | 5.7 | 4.1 | 5.3 | 293 |
| cocaina | 5.7 | 4.1 | 5.2 | 292 | | | | | |
| crack, freebase | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | stimolanti | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 20 |
| amfetamine | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 10 | | | | | |
| MDMA e affini (ecstasy) | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 10 | medicamenti | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 54 |
| altri stimolanti (per es., khat) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | | | | |
| barbiturici | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 8 | allucinogeni | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2 |
| benzodiazepine | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 42 | | | | | |
| altri sonniferi e tranquillanti | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | canapa | 13.9 | 6.5 | 11.7 | 654 |
| LSD | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2 | | | | | |
| altri allucinogeni | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | tabacco | 1.4 | 3.9 | 2.1 | 117 |
| canapa | 13.9 | 6.5 | 11.7 | 654 | | | | | |
| tabacco | 1.4 | 3.9 | 2.1 | 117 | altra/e sostanza/e | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 21 |
| sostanze volatili (per es., solventi) | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 3 | | | | | |
| altra/e sostanza/e | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 18 | problemi assimilabili a una dipendenza | 3.0 | 5.1 | 3.6 | 202 |
| gioco patologico | 2.2 | 1.4 | 2.0 | 109 | | | | | |
| disturbi alimentari | 0.1 | 2.6 | 0.8 | 46 | altri problemi assimilabili a una dipendenza | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 47 |
| altri problemi assimilabili a una dipendenza | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 47 | | | | | |
| N** | 3'969 | 1'603 | 5'573 | 5'573 | | 3'969 | 1'603 | 5'573 | 5'573 |
| <i>dati mancanti</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T15.1a Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso dei 30 ultimi giorni e dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata (2007), uomini

| Pazienti: principale sostanza problematica | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|---------------------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|----------------|
| Uomini | Alcol | Cocktail | Oppiacei | Coacaina e derivati | Stimolanti | Medicamenti | Allucinogeni | Canapa | Tabacco | Altre sostanze |
| Frequenza di consumo 30 ultimi giorni (%)* | | | | | | | | | | |
| mai | 27.6 | 40.0 | 24.8 | 29.4 | 30.8 | 30.8 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 16.7 |
| un giorno alla settimana o meno | 9.0 | 13.3 | 9.2 | 26.1 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 6.3 | 0.0 |
| 2 a 3 giorni alla settimana | 14.1 | 6.7 | 12.1 | 21.1 | 23.1 | 7.7 | 0.0 | 17.5 | 2.1 | 33.3 |
| 4 a 6 giorni alla settimana | 11.4 | 6.7 | 7.3 | 9.4 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 8.3 | 0.0 |
| una volta al giorno | 7.2 | 6.7 | 18.1 | 2.8 | 0.0 | 15.4 | 0.0 | 10.1 | 2.1 | 16.7 |
| più volte al giorno | 30.6 | 26.7 | 28.6 | 11.1 | 30.8 | 46.2 | 0.0 | 22.6 | 81.3 | 33.3 |
| N** | 1'483 | 15 | 315 | 180 | 13 | 26 | 0 | 464 | 48 | 6 |
| <i>dati mancanti</i> | 1'021 | 8 | 105 | 48 | 3 | 10 | 1 | 86 | 6 | 10 |
| Frequenza di consumo 6 ultimi mesi (%)* | | | | | | | | | | |
| mai | 7.8 | 13.3 | 15.8 | 11.8 | 11.1 | 4.5 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 9.1 |
| un giorno alla settimana o meno | 8.2 | 33.3 | 15.1 | 24.8 | 33.3 | 4.5 | 0.0 | 22.0 | 4.3 | 18.2 |
| 2 a 3 giorni alla settimana | 16.7 | 0.0 | 13.9 | 26.1 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 4.3 | 9.1 |
| 4 a 6 giorni alla settimana | 14.5 | 20.0 | 9.3 | 14.3 | 11.1 | 4.5 | 0.0 | 8.9 | 4.3 | 0.0 |
| una volta al giorno | 9.2 | 6.7 | 18.5 | 9.9 | 0.0 | 22.7 | 0.0 | 7.4 | 2.1 | 9.1 |
| più volte al giorno | 43.6 | 26.7 | 27.4 | 13.0 | 22.2 | 63.6 | 0.0 | 35.6 | 85.1 | 54.5 |
| N** | 1'430 | 15 | 259 | 161 | 9 | 22 | 0 | 404 | 47 | 11 |
| <i>dati mancanti</i> | 1'074 | 8 | 161 | 67 | 7 | 14 | 1 | 146 | 7 | 5 |

T15.1b Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso dei 30 ultimi giorni e dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata (2007), uomini

| Pazienti: problema principale | | | |
|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| Uomini | Gioco patologico | Disturbi alimentari | Altri problemi assimilabili a una dipendenza |
| Frequenza di manifestazione 30 ultimi giorni (%)* | | | |
| mai | 62.7 | 0.0 | 15.4 |
| 1 giorno alla settimana o meno | 17.9 | 0.0 | 7.7 |
| 2 a 3 giorni alla settimana | 9.0 | 0.0 | 15.4 |
| 4 a 6 giorni alla settimana | 1.5 | 0.0 | 15.4 |
| una volta al giorno | 1.5 | 50.0 | 15.4 |
| più volte al giorno | 7.5 | 50.0 | 30.8 |
| N** | 67 | 4 | 13 |
| <i>dati mancanti</i> | 20 | 1 | 16 |
| Frequenza di manifestazione 6 ultimi mesi (%)* | | | |
| mai | 43.4 | 0.0 | 0.0 |
| 1 giorno alla settimana o meno | 39.6 | 0.0 | 7.7 |
| 2 a 3 giorni alla settimana | 11.3 | 0.0 | 15.4 |
| 4 a 6 giorni alla settimana | 1.9 | 0.0 | 7.7 |
| una volta al giorno | 1.9 | 33.3 | 23.1 |
| più volte al giorno | 1.9 | 66.7 | 46.2 |
| N** | 53 | 3 | 13 |
| <i>dati mancanti</i> | 34 | 2 | 16 |

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T15.2a Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso dei 30 ultimi giorni e dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata (2007), donne

| Pazienti: principale sostanza problematica | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|------------|----------|------------|---------------------|------------|-------------|--------------|-----------|-----------|----------------|
| Donne | Alcol | Cocktail | Oppiacei | Coacaina e derivati | Stimolanti | Medicamenti | Allucinogeni | Canapa | Tabacco | Altre sostanze |
| Frequenza di consumo 30 ultimi giorni (%)* | | | | | | | | | | |
| mai | 24.7 | 16.7 | 21.8 | 30.2 | 50.0 | 30.8 | 100.0 | 14.6 | 0.0 | 0.0 |
| un giorno alla settimana o meno | 9.4 | 0.0 | 15.3 | 22.6 | 25.0 | 7.7 | 0.0 | 18.3 | 2.1 | 0.0 |
| 2 a 3 giorni alla settimana | 14.2 | 16.7 | 16.9 | 26.4 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 0.0 | 0.0 |
| 4 a 6 giorni alla settimana | 12.7 | 0.0 | 8.1 | 11.3 | 0.0 | 15.4 | 0.0 | 14.6 | 2.1 | 0.0 |
| una volta al giorno | 4.7 | 33.3 | 11.3 | 5.7 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 15.9 | 4.2 | 0.0 |
| più volte al giorno | 34.4 | 33.3 | 26.6 | 3.8 | 0.0 | 38.5 | 0.0 | 24.4 | 91.7 | 100.0 |
| N** | 663 | 6 | 124 | 53 | 4 | 13 | 1 | 82 | 48 | 1 |
| <i>dati mancanti</i> | 430 | 0 | 39 | 12 | 0 | 5 | 0 | 22 | 15 | 4 |
| Frequenza di consumo 6 ultimi mesi (%)* | | | | | | | | | | |
| mai | 8.5 | 16.7 | 15.4 | 4.7 | 33.3 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| un giorno alla settimana o meno | 6.9 | 16.7 | 17.3 | 32.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 2.1 | 33.3 |
| 2 a 3 giorni alla settimana | 18.2 | 0.0 | 15.4 | 34.9 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 0.0 | 0.0 |
| 4 a 6 giorni alla settimana | 12.4 | 0.0 | 7.7 | 14.0 | 0.0 | 13.3 | 0.0 | 6.8 | 2.1 | 0.0 |
| una volta al giorno | 6.2 | 33.3 | 15.4 | 9.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 2.1 | 0.0 |
| più volte al giorno | 47.8 | 33.3 | 28.8 | 4.7 | 0.0 | 86.7 | 0.0 | 41.9 | 93.6 | 66.7 |
| N** | 627 | 6 | 104 | 43 | 3 | 15 | 1 | 74 | 47 | 3 |
| <i>dati mancanti</i> | 466 | 0 | 59 | 22 | 1 | 3 | 0 | 30 | 16 | 2 |

T15.2b Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso dei 30 ultimi giorni e dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata (2007), donne

| Pazienti: problema principale | | | |
|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| Donne | Gioco patologico | Disturbi alimentari | Altri problemi assimilabili a una dipendenza |
| Frequenza di manifestazione 30 ultimi giorni (%)* | | | |
| mai | 52.6 | 7.7 | 20.0 |
| 1 giorno alla settimana o meno | 31.6 | 15.4 | 40.0 |
| 2 a 3 giorni alla settimana | 5.3 | 3.8 | 40.0 |
| 4 a 6 giorni alla settimana | 10.5 | 15.4 | 0.0 |
| una volta al giorno | 0.0 | 19.2 | 0.0 |
| più volte al giorno | 0.0 | 38.5 | 0.0 |
| N** | 19 | 26 | 5 |
| <i>dati mancanti</i> | 3 | 15 | 13 |
| Frequenza di manifestazione 6 ultimi mesi (%)* | | | |
| mai | 71.4 | 4.3 | 20.0 |
| 1 giorno alla settimana o meno | 14.3 | 13.0 | 20.0 |
| 2 a 3 giorni alla settimana | 7.1 | 8.7 | 60.0 |
| 4 a 6 giorni alla settimana | 7.1 | 21.7 | 0.0 |
| una volta al giorno | 0.0 | 13.0 | 0.0 |
| più volte al giorno | 0.0 | 39.1 | 0.0 |
| N** | 14 | 23 | 5 |
| <i>dati mancanti</i> | 8 | 18 | 13 |

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T15.3a Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso dei 30 ultimi giorni e dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata (2007), uomini e donne

| Pazienti: principale sostanza problematica | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|---------------------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|----------------|
| Uomini e donne | Alcol | Cocktail | Oppiacei | Coacaina e derivati | Stimolanti | Medicamenti | Allucinogeni | Canapa | Tabacco | Altre sostanze |
| Frequenza di consumo 30 ultimi giorni (%)* | | | | | | | | | | |
| mai | 26.7 | 33.3 | 23.9 | 29.6 | 35.3 | 30.8 | 100.0 | 20.9 | 0.0 | 14.3 |
| un giorno alla settimana o meno | 9.1 | 9.5 | 10.9 | 25.3 | 11.8 | 2.6 | 0.0 | 18.5 | 4.2 | 0.0 |
| 2 a 3 giorni alla settimana | 14.1 | 9.5 | 13.4 | 22.3 | 23.5 | 5.1 | 0.0 | 16.7 | 1.0 | 28.6 |
| 4 a 6 giorni alla settimana | 11.8 | 4.8 | 7.5 | 9.9 | 5.9 | 5.1 | 0.0 | 10.1 | 5.2 | 0.0 |
| una volta al giorno | 6.4 | 14.3 | 16.2 | 3.4 | 0.0 | 12.8 | 0.0 | 11.0 | 3.1 | 14.3 |
| più volte al giorno | 31.8 | 28.6 | 28.0 | 9.4 | 23.5 | 43.6 | 0.0 | 22.9 | 86.5 | 42.9 |
| N** | 2'146 | 21 | 439 | 233 | 17 | 39 | 1 | 546 | 96 | 7 |
| <i>dati mancanti</i> | 1'452 | 8 | 144 | 60 | 3 | 15 | 1 | 108 | 21 | 14 |
| Frequenza di consumo 6 ultimi mesi (%)* | | | | | | | | | | |
| mai | 8.0 | 14.3 | 15.7 | 10.3 | 16.7 | 2.7 | 100.0 | 5.6 | 0.0 | 7.1 |
| un giorno alla settimana o meno | 7.8 | 28.6 | 15.7 | 26.5 | 25.0 | 2.7 | 0.0 | 22.8 | 3.2 | 21.4 |
| 2 a 3 giorni alla settimana | 17.2 | 0.0 | 14.3 | 27.9 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 2.1 | 7.1 |
| 4 a 6 giorni alla settimana | 13.9 | 14.3 | 8.8 | 14.2 | 8.3 | 8.1 | 0.0 | 8.6 | 3.2 | 0.0 |
| una volta al giorno | 8.3 | 14.3 | 17.6 | 9.8 | 8.3 | 13.5 | 0.0 | 7.9 | 2.1 | 7.1 |
| più volte al giorno | 44.9 | 28.6 | 27.8 | 11.3 | 16.7 | 73.0 | 0.0 | 36.6 | 89.4 | 57.1 |
| N** | 2'057 | 21 | 363 | 204 | 12 | 37 | 1 | 478 | 94 | 14 |
| <i>dati mancanti</i> | 1'541 | 8 | 220 | 89 | 8 | 17 | 1 | 176 | 23 | 7 |

T15.3b Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso dei 30 ultimi giorni e dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata (2007), uomini e donne

| Pazienti: problema principale | | | |
|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| Uomini e donne | Gioco patologico | Disturbi alimentari | Altri problemi assimilabili a una dipendenza |
| Frequenza di manifestazione 30 ultimi giorni (%)* | | | |
| mai | 60.5 | 6.7 | 16.7 |
| 1 giorno alla settimana o meno | 20.9 | 13.3 | 16.7 |
| 2 a 3 giorni alla settimana | 8.1 | 3.3 | 22.2 |
| 4 a 6 giorni alla settimana | 3.5 | 13.3 | 11.1 |
| una volta al giorno | 1.2 | 23.3 | 11.1 |
| più volte al giorno | 5.8 | 40.0 | 22.2 |
| N** | 86 | 30 | 18 |
| <i>dati mancanti</i> | 23 | 16 | 29 |
| Frequenza di manifestazione 6 ultimi mesi (%)* | | | |
| mai | 49.3 | 3.8 | 5.6 |
| 1 giorno alla settimana o meno | 34.3 | 11.5 | 11.1 |
| 2 a 3 giorni alla settimana | 10.4 | 7.7 | 27.8 |
| 4 a 6 giorni alla settimana | 3.0 | 19.2 | 5.6 |
| una volta al giorno | 1.5 | 15.4 | 16.7 |
| più volte al giorno | 1.5 | 42.3 | 33.3 |
| N** | 67 | 26 | 18 |
| <i>dati mancanti</i> | 42 | 20 | 29 |

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T16.1a Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2007), uomini

| Pazienti: principale sostanza problematica | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|------------|----------|------------|---------------------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|----------------|
| <i>Uomini</i> | Alcol | Cocktail | Oppiacei | Coacaina e derivati | Stimolanti | Medicamenti | Allucinogeni | Canapa | Tabacco | Altre sostanze |
| Età all'epoca del primo consumo | | | | | | | | | | |
| media | 16.2 | 20.7 | 20.9 | 21.8 | 21.3 | 29.4 | 16.0 | 14.9 | 17.4 | 20.5 |
| deviazione standard | 3.5 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 9.5 | 17.4 | . | 2.5 | 5.7 | 13.7 |
| 1° quartile | 15.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 16.0 | 19.0 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 12.0 |
| mediana | 16.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 |
| 3° quartile | 18.0 | 24.0 | 23.0 | 24.0 | 21.0 | 31.0 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 26.9 |
| N* | 899 | 9 | 267 | 159 | 9 | 9 | 1 | 403 | 27 | 6 |
| <i>dati mancanti</i> | 1'605 | 14 | 153 | 69 | 7 | 27 | 0 | 147 | 27 | 10 |
| Età all'inizio del consumo regolare | | | | | | | | | | |
| media | 21.6 | 21.1 | 22.6 | 23.6 | 22.2 | 31.6 | 16.0 | 16.2 | 19.7 | 21.8 |
| deviazione standard | 6.6 | 6.1 | 6.6 | 6.6 | 9.1 | 16.3 | . | 3.1 | 6.2 | 14.8 |
| 1° quartile | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 16.0 | 20.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 14.0 |
| mediana | 20.0 | 19.0 | 21.0 | 22.0 | 21.0 | 25.0 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 16.0 |
| 3° quartile | 25.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 23.0 | 44.0 | 16.0 | 17.0 | 20.0 | 26.9 |
| N* | 935 | 9 | 256 | 156 | 9 | 10 | 1 | 357 | 23 | 5 |
| <i>dati mancanti</i> | 1'569 | 14 | 164 | 72 | 7 | 26 | 0 | 193 | 31 | 11 |
| Età all'inizio del consumo problematico | | | | | | | | | | |
| media | 31.0 | 21.3 | 23.0 | 25.3 | 24.6 | 35.3 | 16.0 | 16.9 | 21.1 | 36.0 |
| deviazione standard | 10.9 | 6.2 | 6.2 | 7.0 | 11.7 | 17.2 | . | 3.9 | 6.3 | 12.8 |
| 1° quartile | 22.0 | 17.0 | 19.0 | 20.0 | 19.0 | 24.0 | 16.0 | 15.0 | 18.0 | 26.9 |
| mediana | 30.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 20.0 | 29.0 | 16.0 | 16.0 | 20.0 | 36.0 |
| 3° quartile | 40.0 | 24.0 | 25.0 | 29.0 | 23.0 | 44.0 | 16.0 | 17.0 | 25.0 | 45.0 |
| N* | 735 | 7 | 171 | 114 | 5 | 6 | 1 | 253 | 21 | 2 |
| <i>dati mancanti</i> | 1'769 | 16 | 249 | 114 | 11 | 30 | 0 | 297 | 33 | 14 |
| Periodo di latenza (in anni)** | | | | | | | | | | |
| media | 23.5 | 26.3 | 8.7 | 6.7 | 4.4 | . | . | 5.7 | 21.7 | 6.5 |
| deviazione standard | 12.1 | . | 7.4 | 5.7 | 3.7 | . | . | 6.5 | 15.0 | 8.9 |
| 1° quartile | 14.6 | 26.3 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | . | . | 1.7 | 10.8 | 1.0 |
| mediana | 23.3 | 26.3 | 5.9 | 5.0 | 3.0 | . | . | 3.0 | 19.3 | 1.8 |
| 3° quartile | 32.7 | 26.3 | 15.3 | 9.9 | 8.0 | . | . | 7.6 | 30.5 | 16.7 |
| N* | 415 | 1 | 44 | 92 | 6 | 0 | 0 | 304 | 19 | 3 |
| <i>dati mancanti</i> | 514 | 1 | 12 | 22 | 1 | 10 | 0 | 69 | 16 | 3 |

* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

** Lasso di tempo tra il primo consumo della sostanza problematica e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

T16.1b Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2007), donne

| Pazienti: principale sostanza problematica | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|------------|----------|-----------|---------------------|------------|-------------|--------------|-----------|-----------|----------------|
| Donne | Alcol | Cocktail | Oppiacei | Coacaina e derivati | Stimolanti | Medicamenti | Allucinogeni | Canapa | Tabacco | Altre sostanze |
| Età all'epoca del primo consumo | | | | | | | | | | |
| media | 17.8 | 18.0 | 20.1 | 21.3 | 19.5 | 28.1 | 17.0 | 14.6 | 16.8 | 12.5 |
| deviazione standard | 6.6 | 1.4 | 6.4 | 5.9 | 7.0 | 12.0 | . | 2.7 | 7.2 | 2.1 |
| 1° quartile | 15.0 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 15.5 | 20.0 | 17.0 | 13.5 | 14.0 | 11.0 |
| mediana | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 20.0 | 16.5 | 27.0 | 17.0 | 14.0 | 15.0 | 12.5 |
| 3° quartile | 20.0 | 19.0 | 21.0 | 27.0 | 23.5 | 38.0 | 17.0 | 15.0 | 17.0 | 14.0 |
| N* | 327 | 2 | 95 | 46 | 4 | 10 | 1 | 72 | 26 | 2 |
| <i>dati mancanti</i> | 766 | 4 | 68 | 19 | 0 | 8 | 0 | 32 | 37 | 3 |
| Età all'inizio del consumo regolare | | | | | | | | | | |
| media | 26.8 | 18.5 | 21.6 | 23.1 | 21.7 | 30.9 | . | 16.2 | 18.3 | 15.0 |
| deviazione standard | 10.7 | 2.1 | 6.4 | 6.3 | 9.0 | 9.4 | . | 4.6 | 7.7 | 5.7 |
| 1° quartile | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 23.0 | . | 14.0 | 15.0 | 11.0 |
| mediana | 25.0 | 18.5 | 20.0 | 22.0 | 17.0 | 29.0 | . | 15.0 | 16.0 | 15.0 |
| 3° quartile | 33.0 | 20.0 | 24.0 | 27.0 | 32.0 | 38.0 | . | 17.0 | 18.0 | 19.0 |
| N* | 355 | 2 | 88 | 40 | 3 | 9 | 0 | 63 | 21 | 2 |
| <i>dati mancanti</i> | 738 | 4 | 75 | 25 | 1 | 9 | 1 | 41 | 42 | 3 |
| Età all'inizio del consumo problematico | | | | | | | | | | |
| media | 34.6 | 19.5 | 23.1 | 24.0 | 22.3 | 42.5 | . | 16.7 | 21.7 | . |
| deviazione standard | 12.2 | 3.5 | 8.0 | 5.8 | 10.1 | 27.6 | . | 3.8 | 9.9 | . |
| 1° quartile | 25.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 16.0 | 23.0 | . | 14.0 | 16.0 | . |
| mediana | 34.0 | 19.5 | 20.0 | 25.0 | 17.0 | 42.5 | . | 16.0 | 18.0 | . |
| 3° quartile | 43.0 | 22.0 | 28.0 | 27.0 | 34.0 | 62.0 | . | 17.0 | 24.0 | . |
| N* | 327 | 2 | 60 | 27 | 3 | 2 | 0 | 47 | 17 | 0 |
| <i>dati mancanti</i> | 766 | 4 | 103 | 38 | 1 | 16 | 1 | 57 | 46 | 5 |
| Periodo di latenza (in anni)** | | | | | | | | | | |
| media | 23.6 | . | 5.2 | 7.1 | 2.4 | 21.0 | 2.6 | 8.6 | 25.4 | 11.3 |
| deviazione standard | 11.2 | . | 4.9 | 7.0 | 1.8 | 13.2 | . | 13.3 | 17.0 | 11.7 |
| 1° quartile | 15.6 | . | 1.7 | 2.2 | 1.3 | 11.6 | 2.6 | 1.9 | 10.2 | 3.0 |
| mediana | 24.5 | . | 3.7 | 5.1 | 1.4 | 25.2 | 2.6 | 3.8 | 27.9 | 11.3 |
| 3° quartile | 32.5 | . | 7.8 | 9.7 | 4.6 | 30.4 | 2.6 | 8.0 | 39.0 | 19.5 |
| N* | 137 | 0 | 21 | 17 | 3 | 4 | 1 | 53 | 23 | 2 |
| <i>dati mancanti</i> | 217 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 13 | 0 |

* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

** Lasso di tempo tra il primo consumo della sostanza problematica e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

T16.1c Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2007), uomini e donne

| Pazienti: principale sostanza problematica | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|---------------------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|----------------|
| Uomini e donne | Alcol | Cocktail | Oppiacei | Coacaina e derivati | Stimolanti | Medicamenti | Allucinogeni | Canapa | Tabacco | Altre sostanze |
| Età all'epoca del primo consumo | | | | | | | | | | |
| media | 16.6 | 20.2 | 20.7 | 21.7 | 20.8 | 28.7 | 16.5 | 14.9 | 17.1 | 18.5 |
| deviazione standard | 4.6 | 5.6 | 6.3 | 6.4 | 8.6 | 14.4 | 0.7 | 2.5 | 6.5 | 12.2 |
| 1° quartile | 15.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 16.0 | 19.0 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 11.5 |
| mediana | 16.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 17.0 | 25.0 | 16.5 | 15.0 | 16.0 | 14.5 |
| 3° quartile | 18.0 | 24.0 | 22.0 | 25.0 | 21.0 | 38.0 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 22.0 |
| N* | 1'226 | 11 | 362 | 205 | 13 | 19 | 2 | 475 | 53 | 8 |
| <i>dati mancanti</i> | 2'372 | 18 | 221 | 88 | 7 | 35 | 0 | 179 | 64 | 13 |
| Età all'inizio del consumo regolare | | | | | | | | | | |
| media | 23.0 | 20.6 | 22.4 | 23.5 | 22.1 | 31.3 | 16.0 | 16.2 | 19.1 | 19.8 |
| deviazione standard | 8.3 | 5.6 | 6.5 | 6.5 | 8.7 | 13.1 | . | 3.3 | 6.9 | 12.8 |
| 1° quartile | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 16.0 | 20.0 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 11.0 |
| mediana | 20.0 | 19.0 | 20.0 | 22.0 | 19.0 | 26.0 | 16.0 | 15.0 | 17.5 | 16.0 |
| 3° quartile | 26.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 23.5 | 42.0 | 16.0 | 17.0 | 20.0 | 26.9 |
| N* | 1'290 | 11 | 344 | 196 | 12 | 19 | 1 | 420 | 44 | 7 |
| <i>dati mancanti</i> | 2'308 | 18 | 239 | 97 | 8 | 35 | 1 | 234 | 73 | 14 |
| Età all'inizio del consumo problematico | | | | | | | | | | |
| media | 32.1 | 20.9 | 23.0 | 25.1 | 23.8 | 37.1 | 16.0 | 16.9 | 21.4 | 36.0 |
| deviazione standard | 11.5 | 5.6 | 6.7 | 6.8 | 10.4 | 18.2 | . | 3.8 | 8.0 | 12.8 |
| 1° quartile | 23.0 | 17.0 | 18.0 | 20.0 | 16.5 | 23.5 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 26.9 |
| mediana | 30.0 | 20.0 | 21.0 | 24.0 | 19.5 | 29.0 | 16.0 | 16.0 | 19.5 | 36.0 |
| 3° quartile | 40.0 | 22.0 | 25.0 | 29.0 | 28.5 | 53.0 | 16.0 | 17.0 | 25.0 | 45.0 |
| N* | 1'062 | 9 | 231 | 141 | 8 | 8 | 1 | 300 | 38 | 2 |
| <i>dati mancanti</i> | 2'536 | 20 | 352 | 152 | 12 | 46 | 1 | 354 | 79 | 19 |
| Periodo di latenza (in anni)** | | | | | | | | | | |
| media | 23.6 | 26.3 | 7.6 | 6.7 | 3.7 | 21.0 | 2.6 | 6.1 | 23.7 | 8.4 |
| deviazione standard | 11.9 | . | 6.9 | 5.9 | 3.2 | 13.2 | . | 7.9 | 16.1 | 8.9 |
| 1° quartile | 14.9 | 26.3 | 2.1 | 2.2 | 1.4 | 11.6 | 2.6 | 1.7 | 10.8 | 1.8 |
| mediana | 23.4 | 26.3 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 25.2 | 2.6 | 3.1 | 23.1 | 3.0 |
| 3° quartile | 32.7 | 26.3 | 11.5 | 9.8 | 4.6 | 30.4 | 2.6 | 7.6 | 36.2 | 16.7 |
| N* | 552 | 1 | 65 | 109 | 9 | 4 | 1 | 357 | 42 | 5 |
| <i>dati mancanti</i> | 731 | 1 | 17 | 25 | 1 | 11 | 0 | 85 | 29 | 3 |

* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

** Lasso di tempo tra il primo consumo della sostanza problematica e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

T16.2a Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2007), uomini

| Pazienti: problema principale | | | |
|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| <i>Uomini</i> | Gioco patologico | Disturbi alimentari | Altri problemi assimilabili a una dipendenza |
| Età all'epoca della prima manifestazione | | | |
| media | 28.6 | 32.3 | 26.6 |
| deviazione standard | 9.2 | 16.6 | 14.9 |
| 1° quartile | 21.5 | 17.0 | 17.0 |
| mediana | 28.0 | 30.0 | 17.0 |
| 3° quartile | 34.5 | 50.0 | 33.0 |
| N* | 32 | 3 | 5 |
| <i>dati mancanti</i> | 55 | 2 | 24 |
| Età all'inizio della manifestazione regolare | | | |
| media | 30.6 | 32.7 | 28.6 |
| deviazione standard | 8.6 | 16.2 | 13.3 |
| 1° quartile | 23.0 | 18.0 | 19.0 |
| mediana | 28.0 | 30.0 | 28.0 |
| 3° quartile | 38.0 | 50.0 | 30.0 |
| N* | 31 | 3 | 5 |
| <i>dati mancanti</i> | 56 | 2 | 24 |
| Età all'inizio della manifestazione problematica | | | |
| media | 33.5 | 34.0 | 33.1 |
| deviazione standard | 11.8 | 22.6 | 12.1 |
| 1° quartile | 25.5 | 18.0 | 23.0 |
| mediana | 30.5 | 34.0 | 32.0 |
| 3° quartile | 39.5 | 50.0 | 40.0 |
| N* | 28 | 2 | 8 |
| <i>dati mancanti</i> | 59 | 3 | 21 |
| Periodo di latenza (in anni)** | | | |
| media | 8.6 | 6.4 | 10.3 |
| deviazione standard | 9.8 | 4.1 | 8.7 |
| 1° quartile | 3.0 | 2.4 | 3.8 |
| mediana | 4.4 | 6.2 | 7.6 |
| 3° quartile | 10.4 | 10.6 | 17.0 |
| N* | 32 | 3 | 5 |
| <i>dati mancanti</i> | 55 | 2 | 24 |

* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

** Lasso di tempo tra la prima manifestazione del comportamento problematico e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

T16.2b Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2007), donne

| Pazienti: problema principale | | | |
|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| Donne | Gioco patologico | Disturbi alimentari | Altri problemi assimilabili a una dipendenza |
| Età all'epoca della prima manifestazione | | | |
| media | 37.5 | 16.0 | 18.0 |
| deviazione standard | 12.9 | 4.1 | . |
| 1° quartile | 27.5 | 13.0 | 18.0 |
| mediana | 33.5 | 15.0 | 18.0 |
| 3° quartile | 49.5 | 16.0 | 18.0 |
| N* | 8 | 17 | 1 |
| <i>dati mancanti</i> | 14 | 24 | 17 |
| Età all'inizio della manifestazione regolare | | | |
| media | 38.3 | 17.2 | 26.5 |
| deviazione standard | 12.4 | 4.2 | 12.0 |
| 1° quartile | 32.0 | 14.0 | 18.0 |
| mediana | 35.0 | 16.0 | 26.5 |
| 3° quartile | 47.0 | 17.0 | 35.0 |
| N* | 9 | 17 | 2 |
| <i>dati mancanti</i> | 13 | 24 | 16 |
| Età all'inizio della manifestazione problematica | | | |
| media | 37.6 | 18.9 | 31.8 |
| deviazione standard | 12.7 | 6.3 | 12.9 |
| 1° quartile | 30.0 | 15.0 | 22.0 |
| mediana | 34.5 | 16.5 | 30.5 |
| 3° quartile | 48.0 | 22.0 | 41.5 |
| N* | 10 | 16 | 4 |
| <i>dati mancanti</i> | 12 | 25 | 14 |
| Periodo di latenza (in anni)** | | | |
| media | 6.1 | 9.5 | 9.7 |
| deviazione standard | 5.3 | 6.3 | . |
| 1° quartile | 3.3 | 4.7 | 9.7 |
| mediana | 4.2 | 8.2 | 9.7 |
| 3° quartile | 6.3 | 14.0 | 9.7 |
| N* | 8 | 17 | 1 |
| <i>dati mancanti</i> | 14 | 24 | 17 |

* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

** Lasso di tempo tra la prima manifestazione del comportamento problematico e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

T16.2c Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2007), uomini e donne

| Pazienti: problema principale | | | |
|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| <i>Uomini e donne</i> | Gioco patologico | Disturbi alimentari | Altri problemi assimilabili a una dipendenza |
| Età all'epoca della prima manifestazione | | | |
| media | 30.4 | 18.5 | 25.2 |
| deviazione standard | 10.5 | 8.9 | 13.8 |
| 1° quartile | 23.0 | 13.5 | 17.0 |
| mediana | 28.0 | 15.0 | 17.5 |
| 3° quartile | 36.5 | 19.5 | 33.0 |
| N* | 40 | 20 | 6 |
| <i>dati mancanti</i> | 69 | 26 | 41 |
| Età all'inizio della manifestazione regolare | | | |
| media | 32.4 | 19.5 | 28.0 |
| deviazione standard | 10.0 | 8.6 | 12.0 |
| 1° quartile | 24.0 | 14.0 | 18.0 |
| mediana | 32.0 | 16.0 | 28.0 |
| 3° quartile | 40.0 | 23.5 | 35.0 |
| N* | 40 | 20 | 7 |
| <i>dati mancanti</i> | 69 | 26 | 40 |
| Età all'inizio della manifestazione problematica | | | |
| media | 34.6 | 20.6 | 32.7 |
| deviazione standard | 12.0 | 9.4 | 11.8 |
| 1° quartile | 27.0 | 16.0 | 23.0 |
| mediana | 33.5 | 17.0 | 32.0 |
| 3° quartile | 40.0 | 24.0 | 40.0 |
| N* | 38 | 18 | 12 |
| <i>dati mancanti</i> | 71 | 28 | 35 |
| Periodo di latenza (in anni)** | | | |
| media | 8.1 | 9.1 | 10.2 |
| deviazione standard | 9.1 | 6.1 | 7.8 |
| 1° quartile | 3.1 | 4.5 | 3.8 |
| mediana | 4.4 | 8.0 | 8.6 |
| 3° quartile | 8.9 | 12.3 | 17.0 |
| N* | 40 | 20 | 6 |
| <i>dati mancanti</i> | 69 | 26 | 41 |

* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

** Lasso di tempo tra la prima manifestazione del comportamento problematico e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

T17 Modo di amministrazione della principale sostanza problematica nel corso dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata (2007)

| Pazienti: principale sostanza problematica | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------------|------------|-------------|
| Modo di amministrazione* | Eroina | | | Cocaina | | | Amfetamine | | | Canapa | | | Benzodiazepine | | |
| | Uomini % | Donne % | Totale % | Uomini % | Donne % | Totale % |
| iniettato | 35.5 | 30.0 | 34.1 | 5.3 | 12.5 | 7.0 | 33.3 | 0.0 | 16.7 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| fumato/inalato | 36.9 | 40.0 | 37.7 | 18.3 | 30.0 | 21.1 | 0.0 | 33.3 | 16.7 | 99.2 | 100.0 | 99.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ingerito /bevuto | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 16.7 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 88.2 | 100.0 | 92.9 |
| sniffato | 26.6 | 28.6 | 27.1 | 76.3 | 57.5 | 71.9 | 33.3 | 66.7 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 3.6 |
| altro | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 3.6 |
| N** | 203 | 70 | 273 | 131 | 40 | 171 | 3 | 3 | 6 | 356 | 69 | 425 | 17 | 11 | 28 |
| <i>dati mancanti</i> | 183 | 77 | 260 | 96 | 25 | 121 | 3 | 1 | 4 | 194 | 35 | 229 | 11 | 3 | 14 |

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T18 Prevalenza delle iniezioni a vita, nel corso dei 30 ultimi giorni e dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata, scambio di materiale d'iniezione nel corso dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata e età all'epoca della prima iniezione, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2007)

| | Pazienti: pricipale sostanza problematica | | | | | | | | | | | | Tutti i pazienti | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Alcol | | | Oppiacei | | | Cocaina e derivati | | | Canapa | | | Uomini | Donne | Totale | N |
| | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | |
| Iniezioni nel corso della vita* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sì | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 67.5 | 63.7 | 66.5 | 18.1 | 31.7 | 21.1 | 5.0 | 5.3 | 5.1 | 14.1 | 12.8 | 13.7 | 457 |
| no | 94.2 | 94.4 | 94.2 | 32.5 | 36.3 | 33.5 | 81.9 | 68.3 | 78.9 | 95.0 | 94.7 | 94.9 | 85.9 | 87.2 | 86.3 | 2'874 |
| N** | 1'405 | 624 | 2'029 | 280 | 102 | 382 | 149 | 41 | 190 | 418 | 76 | 494 | 2'385 | 946 | 3'331 | 3'331 |
| <i>dati mancanti</i> | 1'099 | 469 | 1'569 | 163 | 67 | 230 | 79 | 24 | 103 | 132 | 28 | 160 | 1'584 | 657 | 2'242 | 2'242 |
| Iniezioni nel corso dei 6 ultimi mesi* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sì | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 44.1 | 36.0 | 41.9 | 10.2 | 17.1 | 11.7 | 2.4 | 1.3 | 2.2 | 6.9 | 5.2 | 6.4 | 213 |
| no | 99.1 | 99.4 | 99.2 | 55.9 | 64.0 | 58.1 | 89.8 | 82.9 | 88.3 | 97.6 | 98.7 | 97.8 | 93.1 | 94.8 | 93.6 | 3'106 |
| N** | 1'405 | 625 | 2'030 | 272 | 100 | 372 | 147 | 41 | 188 | 417 | 76 | 493 | 2'374 | 945 | 3'319 | 3'319 |
| <i>dati mancanti</i> | 1'099 | 468 | 1'568 | 171 | 69 | 240 | 81 | 24 | 105 | 133 | 28 | 161 | 1'595 | 658 | 2'254 | 2'254 |
| Iniezioni nel corso dei 30 ultimi giorni* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sì | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 41.3 | 31.6 | 38.7 | 8.5 | 17.5 | 10.4 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 5.3 | 4.1 | 5.0 | 177 |
| no | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 58.7 | 68.4 | 61.3 | 91.5 | 82.5 | 89.6 | 99.5 | 100.0 | 99.6 | 94.7 | 95.9 | 95.0 | 3'380 |
| N** | 1'544 | 677 | 2'221 | 269 | 98 | 367 | 153 | 40 | 193 | 421 | 80 | 501 | 2'544 | 1'013 | 3'557 | 3'557 |
| <i>dati mancanti</i> | 960 | 416 | 1'377 | 174 | 71 | 245 | 75 | 25 | 100 | 129 | 24 | 153 | 1'425 | 590 | 2'016 | 2'016 |
| Scambio di materiale d'iniezione nel corso dei 6 ultimi mesi*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sì | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 23.5 | 15.2 | 20.0 | 0.0 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 16.7 | 11.8 | 14 |
| no | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 87.1 | 76.5 | 84.8 | 80.0 | 100.0 | 84.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 89.5 | 83.3 | 88.2 | 105 |
| N** | 10 | 2 | 12 | 62 | 17 | 79 | 10 | 3 | 13 | 9 | 1 | 10 | 95 | 24 | 119 | 119 |
| <i>dati mancanti</i> | 1 | 1 | 2 | 36 | 14 | 50 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43 | 18 | 61 | 61 |
| Età all'epoca della prima iniezione**** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| fino a 14 anni | 4.3 | 14.3 | 6.6 | 3.9 | 5.6 | 4.3 | 0.0 | 12.5 | 4.5 | 0.0 | 33.3 | 7.1 | 3.3 | 10.8 | 5.1 | 14 |
| da 15 a 16 anni | 14.9 | 14.3 | 14.8 | 6.3 | 16.7 | 8.5 | 14.3 | 12.5 | 13.6 | 9.1 | 33.3 | 14.3 | 8.6 | 15.4 | 10.2 | 28 |
| da 17 a 18 anni | 25.5 | 21.4 | 24.6 | 21.9 | 25.0 | 22.6 | 14.3 | 12.5 | 13.6 | 27.3 | 0.0 | 21.4 | 23.3 | 21.5 | 22.9 | 63 |
| da 19 a 20 anni | 17.0 | 21.4 | 18.0 | 21.1 | 27.8 | 22.6 | 42.9 | 0.0 | 27.3 | 27.3 | 33.3 | 28.6 | 21.9 | 23.1 | 22.2 | 61 |
| da 21 a 25 anni | 29.8 | 28.6 | 29.5 | 25.0 | 13.9 | 22.6 | 14.3 | 25.0 | 18.2 | 9.1 | 0.0 | 7.1 | 24.3 | 18.5 | 22.9 | 63 |
| da 26 a 30 anni | 8.5 | 0.0 | 6.6 | 10.9 | 11.1 | 11.0 | 7.1 | 37.5 | 18.2 | 27.3 | 0.0 | 21.4 | 11.0 | 10.8 | 10.9 | 30 |
| da 31 a 39 anni | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 6.1 | 7.1 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 4.4 | 12 |
| dai 40 anni in su | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 1.5 | 4 |
| N** | 47 | 14 | 61 | 128 | 36 | 164 | 14 | 8 | 22 | 11 | 3 | 14 | 210 | 65 | 275 | 275 |
| <i>dati mancanti</i> | 35 | 21 | 56 | 61 | 29 | 90 | 13 | 5 | 18 | 10 | 1 | 11 | 126 | 56 | 182 | 182 |

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che si sono iniettati una sostanza illegale nel corso dei 6 ultimi mesi. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

**** I risultati si basano solamente sui clienti che si sono iniettati una sostanza illegale nel corso della loro vita. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T19.1a Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2007), uomini

Uomini

| | Pazienti: principale sostanza problematica | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------|--------------------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|----------------|
| | Alcol | Cocktail | Oppiacei | Cocaina e derivati | Stimolanti | Medicamenti | Allucinogeni | Canapa | Tabacco | Altre sostanze |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Altri problemi* | | | | | | | | | | |
| alcol | | 33.3 | 34.6 | 42.1 | 41.7 | 29.6 | 0.0 | 25.0 | 30.0 | 21.4 |
| cocktail (eroina e cocaina) | 0.2 | | 8.3 | 0.6 | 8.3 | 11.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| eroina | 1.8 | 0.0 | 3.7 | 19.1 | 8.3 | 11.1 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 7.1 |
| metadone | 0.7 | 26.7 | 19.9 | 5.6 | 8.3 | 11.1 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
| altri oppiacei | 0.2 | 6.7 | 1.8 | 2.8 | 16.7 | 3.7 | 100.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| cocaina | 4.3 | 6.7 | 39.8 | 0.0 | 50.0 | 11.1 | 0.0 | 9.8 | 3.3 | 7.1 |
| crack, freebase | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| amfetamine | 0.4 | 0.0 | 4.9 | 2.8 | 8.3 | 0.0 | 100.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
| MDMA e affini (ecstasy) | 0.9 | 6.7 | 5.5 | 12.9 | 8.3 | 3.7 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 |
| altri stimolanti | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| barbiturici | 0.4 | 6.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| benzodiazepine | 3.8 | 20.0 | 21.7 | 7.3 | 8.3 | 3.7 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 7.1 |
| altri sonniferi e tranquillanti | 0.9 | 0.0 | 2.4 | 0.6 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| LSD | 0.4 | 0.0 | 4.0 | 4.5 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| altri allucinogeni | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 0.6 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 |
| sostanze volatili (per es., solventi) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 7.1 |
| canapa | 11.4 | 46.7 | 40.7 | 45.5 | 50.0 | 14.8 | 0.0 | | 6.7 | 28.6 |
| tabacco | 28.3 | 40.0 | 39.4 | 29.2 | 41.7 | 18.5 | 0.0 | 34.1 | | 7.1 |
| altra/e sostanza/e | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | |
| gioco patologico | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| disturbi alimentari | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| altri problemi assimilabili a una dipendenza | 0.2 | 6.7 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 6.7 | 0.0 |
| nessun altro problema di dipendenza | 58.7 | 13.3 | 15.0 | 24.2 | 25.0 | 37.0 | 0.0 | 46.0 | 66.7 | 42.9 |
| N** | 1'386 | 15 | 327 | 178 | 12 | 27 | 1 | 428 | 30 | 14 |
| <i>dati mancanti</i> | <i>1'118</i> | <i>8</i> | <i>93</i> | <i>50</i> | <i>4</i> | <i>9</i> | <i>0</i> | <i>122</i> | <i>23</i> | <i>2</i> |

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T19.1b Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2007), donne

Donne

| | Pazienti: principale sostanza problematica | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|------------|--------------------|------------|-------------|--------------|-----------|-----------|----------------|
| | Alcol | Cocktail | Oppiacei | Cocaina e derivati | Stimolanti | Medicamenti | Allucinogeni | Canapa | Tabacco | Altre sostanze |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Altri problemi* | | | | | | | | | | |
| alcol | | 40.0 | 31.7 | 50.0 | 100.0 | 21.4 | 0.0 | 29.5 | 7.4 | 0.0 |
| cocktail (eroina e cocaina) | 0.2 | | 5.8 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| eroina | 1.6 | 20.0 | 0.8 | 33.3 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 |
| metadone | 1.0 | 0.0 | 21.7 | 13.0 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| altri oppiacei | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| cocaina | 4.2 | 0.0 | 31.7 | 0.0 | 33.3 | 7.1 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 |
| crack, freebase | 0.0 | 20.0 | 0.8 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| amfetamine | 0.7 | 0.0 | 1.7 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 |
| MDMA e affini (ecstasy) | 1.1 | 0.0 | 1.7 | 20.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 |
| altri stimolanti | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| barbiturici | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| benzodiazepine | 7.5 | 40.0 | 19.2 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 3.7 | 0.0 |
| altri sonniferi e tranquillanti | 2.6 | 0.0 | 3.3 | 1.9 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 1.3 | 3.7 | 0.0 |
| LSD | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 |
| altri allucinogeni | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| sostanze volatili (per es., solventi) | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| canapa | 7.4 | 60.0 | 38.3 | 31.5 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | | 7.4 | 0.0 |
| tabacco | 32.0 | 40.0 | 35.8 | 33.3 | 33.3 | 21.4 | 0.0 | 35.9 | | 0.0 |
| altra/e sostanza/e | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 21.4 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | |
| gioco patologico | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| disturbi alimentari | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 3.7 | 0.0 |
| altri problemi assimilabili a una dipendenza | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| nessun altro problema di dipendenza | 54.6 | 20.0 | 21.7 | 14.8 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 41.0 | 77.8 | 100.0 |
| N** | 612 | 5 | 120 | 54 | 3 | 14 | 0 | 78 | 27 | 4 |
| <i>dati mancanti</i> | <i>481</i> | <i>1</i> | <i>43</i> | <i>11</i> | <i>1</i> | <i>4</i> | <i>1</i> | <i>26</i> | <i>36</i> | <i>1</i> |

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T19.1c Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2007), uomini e donne

Uomini e donne

| | Pazienti: principale sostanza problematica | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------|--------------------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|----------------|
| | Alcol | Cocktail | Oppiacei | Cocaina e derivati | Stimolanti | Medicamenti | Allucinogeni | Canapa | Tabacco | Altre sostanze |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Altri problemi* | | | | | | | | | | |
| alcol | | 35.0 | 33.8 | 44.0 | 53.3 | 26.8 | 0.0 | 25.7 | 19.3 | 16.7 |
| cocktail (eroina e cocaina) | 0.2 | | 7.6 | 0.9 | 6.7 | 7.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| eroina | 1.8 | 5.0 | 2.9 | 22.4 | 6.7 | 9.8 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 5.6 |
| metadone | 0.8 | 20.0 | 20.4 | 7.3 | 6.7 | 9.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| altri oppiacei | 0.3 | 5.0 | 1.3 | 2.2 | 13.3 | 2.4 | 100.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| cocaina | 4.3 | 5.0 | 37.6 | 0.0 | 46.7 | 9.8 | 0.0 | 9.7 | 1.8 | 5.6 |
| crack, freebase | 0.1 | 5.0 | 0.7 | 0.4 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| amfetamine | 0.5 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 6.7 | 0.0 | 100.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 |
| MDMA e affini (ecstasy) | 1.0 | 5.0 | 4.5 | 14.7 | 26.7 | 2.4 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 |
| altri stimolanti | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| barbiturici | 0.3 | 5.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| benzodiazepine | 5.0 | 25.0 | 21.0 | 9.5 | 6.7 | 2.4 | 0.0 | 1.2 | 1.8 | 5.6 |
| altri sonniferi e tranquillanti | 1.5 | 0.0 | 2.7 | 0.9 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | 0.0 |
| LSD | 0.4 | 0.0 | 3.1 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| altri allucinogeni | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 0.4 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 |
| sostanze volatili (per es., solventi) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 5.6 |
| canapa | 10.2 | 50.0 | 40.0 | 42.2 | 53.3 | 9.8 | 0.0 | | 7.0 | 22.2 |
| tabacco | 29.4 | 40.0 | 38.5 | 30.2 | 40.0 | 19.5 | 0.0 | 34.4 | | 5.6 |
| altra/e sostanza/e | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 7.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | |
| gioco patologico | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| disturbi alimentari | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.8 | 0.0 |
| altri problemi assimilabili a una dipendenza | 0.3 | 5.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.5 | 0.0 |
| nessun altro problema di dipendenza | 57.5 | 15.0 | 16.8 | 22.0 | 20.0 | 41.5 | 0.0 | 45.3 | 71.9 | 55.6 |
| N** | 1'998 | 20 | 447 | 232 | 15 | 41 | 1 | 506 | 57 | 18 |
| <i>dati mancanti</i> | <i>1'600</i> | <i>9</i> | <i>136</i> | <i>61</i> | <i>5</i> | <i>13</i> | <i>1</i> | <i>148</i> | <i>59</i> | <i>3</i> |

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T19.2a Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2007), uomini

Uomini

| Pazienti: problema principale | | | |
|----------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| | Gioco patologico | Disturbi alimentari | Altri problemi assimilabili a una dipendenza |
| | % | % | % |
| Altri problemi* | | | |
| alcol | 8.5 | 33.3 | 0.0 |
| cocktail (eroina e cocaina) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| eroina | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| metadone | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| altri oppiacei | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| cocaina | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
| crack, freebase | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| amfetamine | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MDMA e affini (ecstasy) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| altri stimolanti | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| barbiturici | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| benzodiazepine | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| altri sonniferi e tranquillanti | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LSD | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| altri allucinogeni | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sostanze volatili (per es., solventi) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| canapa | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
| tabacco | 15.3 | 33.3 | 8.3 |
| altra/e sostanza/e | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| gioco patologico | | 0.0 | 0.0 |
| disturbi alimentari | 0.0 | | 0.0 |
| altri problemi assimilabili a una dipendenza | 0.0 | 0.0 | |
| nessun altro problema di dipendenza | 76.3 | 33.3 | 91.7 |
| N** | 59 | 3 | 12 |
| <i>dati mancanti</i> | 28 | 2 | 17 |

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T19.2b Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2007), donne

Donne

| Pazienti: problema principale | | | |
|----------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| | Gioco patologico | Disturbi alimentari | Altri problemi assimilabili a una dipendenza |
| | % | % | % |
| Altri problemi* | | | |
| alcol | 16.7 | 13.6 | 0.0 |
| cocktail (eroina e cocaina) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| eroina | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| metadone | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| altri oppiacei | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| cocaina | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| crack, freebase | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| amfetamine | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MDMA e affini (ecstasy) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| altri stimolanti | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| barbiturici | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| benzodiazepine | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| altri sonniferi e tranquillanti | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LSD | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| altri allucinogeni | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sostanze volatili (per es., solventi) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| canapa | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| tabacco | 8.3 | 4.5 | 0.0 |
| altra/e sostanza/e | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| gioco patologico | | 0.0 | 0.0 |
| disturbi alimentari | 0.0 | | 0.0 |
| altri problemi assimilabili a una dipendenza | 0.0 | 0.0 | |
| nessun altro problema di dipendenza | 75.0 | 86.4 | 100.0 |
| N** | 12 | 22 | 5 |
| <i>dati mancanti</i> | 10 | 19 | 13 |

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T19.2c Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2007), uomini e donne

Uomini e donne

| Pazienti: problema principale | | | |
|----------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| | Gioco patologico | Disturbi alimentari | Altri problemi assimilabili a una dipendenza |
| | % | % | % |
| Altri problemi* | | | |
| alcol | 9.9 | 16.0 | 0.0 |
| cocktail (eroina e cocaina) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| eroina | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| metadone | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| altri oppiacei | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| cocaina | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
| crack, freebase | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| amfetamine | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MDMA e affini (ecstasy) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| altri stimolanti | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| barbiturici | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| benzodiazepine | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| altri sonniferi e tranquillanti | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LSD | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| altri allucinogeni | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| sostanze volatili (per es., solventi) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| canapa | 1.4 | 0.0 | 0.0 |
| tabacco | 14.1 | 8.0 | 5.9 |
| altra/e sostanza/e | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| gioco patologico | | 0.0 | 0.0 |
| disturbi alimentari | 0.0 | | 0.0 |
| altri problemi assimilabili a una dipendenza | 0.0 | 0.0 | |
| nessun altro problema di dipendenza | 76.1 | 80.0 | 94.1 |
| N** | 71 | 25 | 17 |
| <i>dati mancanti</i> | <i>38</i> | <i>21</i> | <i>30</i> |

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T20 Frequenza del consumo di alcol, numero di "bicchieri standard" al giorno e frequenza di forti consumi di alcol prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2007)

| | Pazienti: problema principale | | | | | | | | | | | | Tutti i pazienti | | | |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| | Alcol | | | Oppiacei | | | Cocaina e derivati | | | Canapa | | | Uomini | Donne | Totale | N |
| | Uomini | Donne | Totale | Uomini | donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | |
| Frequenza del consumo di alcol* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mai | 9.9 | 9.0 | 9.6 | 12.8 | 15.8 | 13.6 | 6.3 | 5.6 | 6.2 | 15.6 | 13.8 | 15.3 | 11.1 | 10.8 | 11.0 | 342 |
| 1 volta al mese o meno | 3.0 | 5.4 | 3.7 | 11.4 | 23.7 | 14.6 | 12.7 | 5.6 | 11.1 | 22.5 | 23.1 | 22.6 | 7.7 | 9.1 | 8.1 | 251 |
| 2 a 4 volte al mese | 6.7 | 5.9 | 6.4 | 18.5 | 13.2 | 17.1 | 27.8 | 22.2 | 26.5 | 34.4 | 36.9 | 34.8 | 14.0 | 10.4 | 13.0 | 405 |
| 2 a 3 volte alla settimana | 17.0 | 17.5 | 17.2 | 23.7 | 19.7 | 22.6 | 23.8 | 22.2 | 23.5 | 20.7 | 20.0 | 20.6 | 18.8 | 17.9 | 18.6 | 577 |
| 4 volte alla settimana o più | 63.4 | 62.2 | 63.1 | 33.6 | 27.6 | 32.1 | 29.4 | 44.4 | 32.7 | 6.9 | 6.2 | 6.8 | 48.4 | 51.8 | 49.4 | 1'535 |
| N** | 1'485 | 646 | 2'131 | 211 | 76 | 287 | 126 | 36 | 162 | 334 | 65 | 399 | 2'243 | 867 | 3'110 | 3'110 |
| <i>dati mancanti</i> | 1'019 | 447 | 1'467 | 232 | 93 | 325 | 102 | 29 | 131 | 216 | 39 | 255 | 1'726 | 736 | 2'463 | 2'463 |
| Numero di "bicchieri standard" al giorno*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 o 2 | 7.8 | 6.9 | 7.5 | 43.6 | 44.6 | 43.9 | 35.9 | 30.8 | 34.9 | 47.1 | 49.0 | 47.4 | 19.3 | 16.0 | 18.4 | 464 |
| 3 o 4 | 17.2 | 14.3 | 16.3 | 39.4 | 23.2 | 35.3 | 37.9 | 34.6 | 37.2 | 34.0 | 36.7 | 34.5 | 23.1 | 17.7 | 21.6 | 547 |
| 5 o 6 | 20.9 | 23.0 | 21.6 | 10.3 | 19.6 | 12.7 | 13.6 | 23.1 | 15.5 | 9.4 | 10.2 | 9.6 | 17.6 | 21.3 | 18.6 | 471 |
| 7 o 9 | 19.5 | 21.7 | 20.2 | 3.0 | 5.4 | 3.6 | 6.8 | 3.8 | 6.2 | 4.9 | 4.1 | 4.8 | 14.9 | 17.9 | 15.7 | 397 |
| 10 o più | 34.6 | 34.0 | 34.4 | 3.6 | 7.1 | 4.5 | 5.8 | 7.7 | 6.2 | 4.5 | 0.0 | 3.8 | 25.1 | 27.0 | 25.6 | 648 |
| N** | 1'252 | 538 | 1'790 | 165 | 56 | 221 | 103 | 26 | 129 | 244 | 49 | 293 | 1'828 | 699 | 2'527 | 2'527 |
| <i>dati mancanti</i> | 1'252 | 555 | 1'808 | 278 | 113 | 391 | 125 | 39 | 164 | 306 | 55 | 361 | 2'141 | 904 | 3'046 | 3'046 |
| Frequenza di forti consumi di alcol*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mai | 12.3 | 14.2 | 12.9 | 39.2 | 45.0 | 40.7 | 35.2 | 20.8 | 32.6 | 52.8 | 61.1 | 54.1 | 23.3 | 23.2 | 23.3 | 626 |
| meno di una volta al mese | 9.3 | 12.4 | 10.2 | 23.3 | 20.0 | 22.5 | 21.9 | 25.0 | 22.5 | 19.2 | 24.1 | 20.0 | 13.4 | 14.3 | 13.6 | 367 |
| 1 volta al mese | 11.5 | 8.5 | 10.6 | 14.2 | 18.3 | 15.3 | 16.2 | 16.7 | 16.3 | 14.7 | 7.4 | 13.5 | 12.3 | 9.4 | 11.5 | 310 |
| 1 volta alla settimana | 22.1 | 19.5 | 21.3 | 14.2 | 11.7 | 13.6 | 18.1 | 12.5 | 17.1 | 11.9 | 7.4 | 11.2 | 19.2 | 17.0 | 18.6 | 501 |
| quasi ogni giorno | 44.8 | 45.4 | 45.0 | 9.1 | 5.0 | 8.1 | 8.6 | 25.0 | 11.6 | 1.4 | 0.0 | 1.2 | 31.8 | 36.0 | 33.0 | 887 |
| N** | 1'308 | 564 | 1'872 | 176 | 60 | 236 | 105 | 24 | 129 | 286 | 54 | 340 | 1'950 | 741 | 2'691 | 2'691 |
| <i>dati mancanti</i> | 1'196 | 529 | 1'726 | 267 | 109 | 376 | 123 | 41 | 164 | 264 | 50 | 314 | 2'019 | 862 | 2'882 | 2'882 |

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che hanno indicato un consumo d'alcol. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T21 Frequenza del consumo di tabacco e numero di sigarette al giorno nel corso dei 30 ultimi giorni prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2007)

| | Pazienti: problema principale | | | | | | | | | | | | Tutti i pazienti | | | |
|------------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| | Alcol | | | Oppiacei | | | Cocaina e derivati | | | Canapa | | | Uomini | Donne | Totale | N |
| | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | |
| Frequenza del consumo di tabacco* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mai | 28.6 | 35.9 | 30.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 15.2 | 0.0 | 12.0 | 20.3 | 14.5 | 19.4 | 22.1 | 27.2 | 23.5 | 522 |
| 1 giorno alla settimana o meno | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 3.5 | 1.6 | 3.6 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 26 |
| 2 a 3 giorni alla settimana | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 6.7 | 2.1 | 3.0 | 3.6 | 3.1 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 29 |
| 4 a 6 giorni alla settimana | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 3.3 | 0.7 | 3.0 | 0.0 | 2.5 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 24 |
| 1 volta al giorno | 2.0 | 1.0 | 1.7 | 2.0 | 1.3 | 1.8 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 3.3 | 5.5 | 3.6 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 44 |
| più volte al giorno | 66.7 | 60.5 | 64.7 | 94.6 | 96.2 | 95.1 | 78.6 | 90.0 | 81.0 | 68.9 | 72.7 | 69.4 | 72.0 | 68.1 | 70.9 | 1'572 |
| N** | 858 | 390 | 1'248 | 205 | 79 | 284 | 112 | 30 | 142 | 305 | 55 | 360 | 1'581 | 636 | 2'217 | 2'217 |
| <i>dati mancanti</i> | 1'646 | 703 | 2'350 | 238 | 90 | 328 | 116 | 35 | 151 | 245 | 49 | 294 | 2'388 | 967 | 3'356 | 3'356 |
| Numero di sigarette al giorno*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 a 10 | 12.8 | 15.7 | 13.6 | 10.9 | 15.3 | 12.1 | 15.6 | 25.9 | 17.9 | 45.3 | 39.5 | 44.4 | 19.3 | 19.0 | 19.2 | 284 |
| 11 a 20 | 37.4 | 41.4 | 38.5 | 52.1 | 54.2 | 52.7 | 50.0 | 51.9 | 50.4 | 42.5 | 53.5 | 44.4 | 41.5 | 44.9 | 42.4 | 626 |
| 21 a 30 | 34.6 | 29.5 | 33.2 | 30.3 | 20.3 | 27.7 | 30.0 | 18.5 | 27.4 | 9.8 | 7.0 | 9.3 | 28.3 | 24.1 | 27.2 | 401 |
| 31 o più | 15.2 | 13.3 | 14.7 | 6.7 | 10.2 | 7.6 | 4.4 | 3.7 | 4.3 | 2.3 | 0.0 | 1.9 | 10.9 | 11.9 | 11.2 | 165 |
| N** | 538 | 210 | 748 | 165 | 59 | 224 | 90 | 27 | 117 | 214 | 43 | 257 | 1'082 | 394 | 1'476 | 1'476 |
| <i>dati mancanti</i> | 75 | 40 | 115 | 35 | 18 | 53 | 5 | 3 | 8 | 29 | 4 | 33 | 150 | 69 | 219 | 219 |

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che hanno indicato un consumo di tabacco. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T22a Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2007), uomini

| Pazienti: principale sostanza problematica | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------|--------------|----------|------------|--------------------|------------|-------------|--------------|------------|----------|----------------|
| | Alcol | Cocktail | Oppiacei | Cocaina e derivati | Stimolanti | Medicamenti | Allucinogeni | Canapa | Tabacco | Altre sostanze |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Obiettivo di consumo* | | | | | | | | | | |
| astinenza definitiva | 32.3 | 75.0 | 74.2 | 78.0 | 85.7 | 42.1 | 0.0 | 45.8 | 66.7 | 57.1 |
| astinenza limitata nel tempo | 24.4 | 0.0 | 2.3 | 5.5 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 9.4 | 16.7 | 0.0 |
| consumo controllato | 25.8 | 25.0 | 10.5 | 7.3 | 0.0 | 26.3 | 0.0 | 25.6 | 16.7 | 14.3 |
| non è prevista nessuna limitazione | 3.4 | 0.0 | 2.0 | 0.9 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 |
| nessuna decisione finora | 13.3 | 0.0 | 9.4 | 8.3 | 14.3 | 21.1 | 0.0 | 11.8 | 0.0 | 28.6 |
| altro | 0.8 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| N* | 1'129 | 4 | 256 | 109 | 7 | 19 | 0 | 203 | 6 | 7 |
| <i>dati mancanti</i> | 1'375 | 19 | 164 | 119 | 9 | 17 | 1 | 347 | 48 | 9 |

T22b Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2007), donne

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|
| Obiettivo di consumo* | | | | | | | | | | |
| astinenza definitiva | 40.0 | 100.0 | 66.7 | 69.2 | 100.0 | 64.3 | 0.0 | 31.4 | 66.7 | 50.0 |
| astinenza limitata nel tempo | 16.9 | 0.0 | 3.2 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 11.1 | 0.0 |
| consumo controllato | 29.1 | 0.0 | 10.8 | 7.7 | 0.0 | 28.6 | 0.0 | 31.4 | 11.1 | 0.0 |
| non è prevista nessuna limitazione | 1.7 | 0.0 | 1.1 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 11.1 | 0.0 |
| nessuna decisione finora | 12.0 | 0.0 | 17.2 | 10.3 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 22.9 | 0.0 | 50.0 |
| altro | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| N* | 467 | 1 | 93 | 39 | 1 | 14 | 0 | 35 | 9 | 2 |
| <i>dati mancanti</i> | 626 | 5 | 70 | 26 | 3 | 4 | 1 | 69 | 54 | 3 |

T22c Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2007), uomini e donne

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------|----------|------------|-----------|----------|
| Obiettivo di consumo* | | | | | | | | | | |
| astinenza definitiva | 34.6 | 80.0 | 72.2 | 75.7 | 87.5 | 51.5 | 0.0 | 43.7 | 66.7 | 55.6 |
| astinenza limitata nel tempo | 22.2 | 0.0 | 2.6 | 5.4 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 9.2 | 13.3 | 0.0 |
| consumo controllato | 26.8 | 20.0 | 10.6 | 7.4 | 0.0 | 27.3 | 0.0 | 26.5 | 13.3 | 11.1 |
| non è prevista nessuna limitazione | 2.9 | 0.0 | 1.7 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 7.1 | 6.7 | 0.0 |
| nessuna decisione finora | 12.9 | 0.0 | 11.5 | 8.8 | 12.5 | 15.2 | 0.0 | 13.4 | 0.0 | 33.3 |
| altro | 0.6 | 0.0 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| N* | 1'596 | 5 | 349 | 148 | 8 | 33 | 0 | 238 | 15 | 9 |
| <i>dati mancanti</i> | 2'002 | 24 | 234 | 145 | 12 | 21 | 2 | 416 | 102 | 12 |

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T23a Problemi psichici nel corso della vita (2007), uomini

Uomini

| | Pazienti: problema principale | | | | | | | | | |
|----------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------|--------------------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|----------------|
| | Alcol | Cocktail | Oppiacei | Cocaina e derivati | Stimolanti | Medicamenti | Allucinogeni | Canapa | Tabacco | Altre sostanze |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Problemi psichici* | | | | | | | | | | |
| depressione grave | 31.7 | 33.3 | 40.9 | 30.8 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 24.2 | 50.0 | 50.0 |
| stati ansiosi/tensione nervosa grave | 28.3 | 66.7 | 38.0 | 28.2 | 25.0 | 71.4 | 0.0 | 25.8 | 16.7 | 33.3 |
| diff. di compr./memoria/concentrazion. | 14.3 | 33.3 | 17.5 | 16.7 | 50.0 | 14.3 | 0.0 | 20.5 | 0.0 | 16.7 |
| allucinazioni | 3.6 | 16.7 | 7.6 | 9.0 | 25.0 | 0.0 | 100.0 | 6.8 | 0.0 | 16.7 |
| diff. a controllare comp. violenti | 12.4 | 33.3 | 15.8 | 16.7 | 25.0 | 21.4 | 0.0 | 22.7 | 0.0 | 16.7 |
| problemi psichici curati con medicine | 13.2 | 66.7 | 22.8 | 10.3 | 50.0 | 28.6 | 100.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 |
| pensieri suicidi seri | 12.5 | 16.7 | 15.8 | 11.5 | 0.0 | 28.6 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| tentativi di suicidio | 6.6 | 16.7 | 11.1 | 6.4 | 0.0 | 21.4 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 16.7 |
| altro/i problema/i psichico/i | 2.9 | 0.0 | 4.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 |
| nessuno | 41.0 | 0.0 | 25.1 | 42.3 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 46.2 | 33.3 | 33.3 |
| N** | 896 | 6 | 171 | 78 | 4 | 14 | 1 | 132 | 6 | 6 |
| <i>dati mancanti</i> | <i>1'608</i> | <i>17</i> | <i>249</i> | <i>150</i> | <i>12</i> | <i>22</i> | <i>0</i> | <i>418</i> | <i>48</i> | <i>10</i> |

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T23b Problemi psichici nel corso della vita (2007), donne

Donne

| | Pazienti: problema principale | | | | | | | | | |
|----------------------------------------|-------------------------------|----------|-----------|--------------------|------------|-------------|--------------|-----------|-----------|----------------|
| | Alcol | Cocktail | Oppiacei | Cocaina e derivati | Stimolanti | Medicamenti | Allucinogeni | Canapa | Tabacco | Altre sostanze |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Problemi psichici* | | | | | | | | | | |
| depressione grave | 47.6 | 0.0 | 41.7 | 32.1 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 35.7 | 27.3 | 33.3 |
| stati ansiosi/tensione nervosa grave | 41.6 | 0.0 | 36.1 | 60.7 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 46.4 | 18.2 | 33.3 |
| diff. di compr./memoria/concentrazion. | 13.9 | 0.0 | 18.1 | 10.7 | 0.0 | 41.7 | 0.0 | 10.7 | 0.0 | 0.0 |
| allucinazioni | 3.6 | 0.0 | 4.2 | 21.4 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 7.1 | 9.1 | 33.3 |
| diff. a controllare comp. violenti | 7.5 | 0.0 | 8.3 | 17.9 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 33.3 |
| problemi psichici curati con medicine | 22.6 | 100.0 | 25.0 | 32.1 | 100.0 | 25.0 | 0.0 | 7.1 | 18.2 | 0.0 |
| pensieri suicidi seri | 17.7 | 0.0 | 18.1 | 25.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 14.3 | 9.1 | 33.3 |
| tentativi di suicidio | 10.0 | 0.0 | 16.7 | 14.3 | 0.0 | 41.7 | 0.0 | 10.7 | 9.1 | 33.3 |
| altro/i problema/i psichico/i | 4.4 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 |
| nessuno | 18.8 | 0.0 | 30.6 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.7 | 54.5 | 66.7 |
| N** | 389 | 1 | 72 | 28 | 1 | 12 | 0 | 28 | 11 | 3 |
| <i>dati mancanti</i> | 703 | 5 | 91 | 37 | 3 | 6 | 1 | 76 | 52 | 2 |

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T23c Problemi psichici nel corso della vita (2007), uomini e donne

Uomini e donne

| | Pazienti: problema principale | | | | | | | | | |
|----------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------|--------------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|----------------|
| | Alcol | Cocktail | Oppiacei | Cocaina e derivati | Stimolanti | Medicamenti | Allucinogeni | Canapa | Tabacco | Altre sostanze |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Problemi psichici* | | | | | | | | | | |
| depressione grave | 36.5 | 28.6 | 41.2 | 31.1 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 26.3 | 35.3 | 44.4 |
| stati ansiosi/tensione nervosa grave | 32.4 | 57.1 | 37.4 | 36.8 | 20.0 | 69.2 | 0.0 | 29.4 | 17.6 | 33.3 |
| diff. di compr./memoria/concentrazion. | 14.2 | 28.6 | 17.7 | 15.1 | 40.0 | 26.9 | 0.0 | 18.8 | 0.0 | 11.1 |
| allucinazioni | 3.6 | 14.3 | 6.6 | 12.3 | 20.0 | 3.8 | 100.0 | 6.9 | 5.9 | 22.2 |
| diff. a controllare comp. violenti | 10.9 | 28.6 | 13.6 | 17.0 | 20.0 | 19.2 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 22.2 |
| problemi psichici curati con medicine | 16.0 | 71.4 | 23.5 | 16.0 | 60.0 | 26.9 | 100.0 | 5.0 | 11.8 | 0.0 |
| pensieri suicidi seri | 14.1 | 14.3 | 16.5 | 15.1 | 0.0 | 38.5 | 0.0 | 16.3 | 11.8 | 22.2 |
| tentativi di suicidio | 7.6 | 14.3 | 12.8 | 8.5 | 0.0 | 30.8 | 0.0 | 8.8 | 5.9 | 22.2 |
| altro/i problema/i psichico/i | 3.3 | 0.0 | 3.7 | 0.9 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 |
| nessuno | 34.2 | 0.0 | 26.7 | 36.8 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 44.4 | 47.1 | 44.4 |
| N** | 1'285 | 7 | 243 | 106 | 5 | 26 | 1 | 160 | 17 | 9 |
| <i>dati mancanti</i> | <i>2'312</i> | <i>22</i> | <i>340</i> | <i>187</i> | <i>15</i> | <i>28</i> | <i>1</i> | <i>494</i> | <i>100</i> | <i>12</i> |

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T24 Parenti/conoscenti: legame tra l'utente e la persona sintomatica (2007)

| Parenti o conoscenti | | | | |
|--------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | Uomini | Donne | Totale | |
| | % | % | % | N |
| L'utente è... * | | | | |
| madre/padre | 26.4 | 27.9 | 27.6 | 283 |
| figlio/figlia | 15.9 | 11.0 | 12.1 | 124 |
| sorella/fratello | 5.3 | 3.1 | 3.6 | 37 |
| partner | 33.0 | 47.5 | 44.3 | 455 |
| altro parente | 2.2 | 5.0 | 4.4 | 45 |
| collega/amico/a | 4.0 | 2.0 | 2.4 | 25 |
| datore di lavoro/docente | 2.6 | 1.1 | 1.5 | 15 |
| tutore/curatore | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| altro | 10.6 | 2.4 | 4.2 | 43 |
| N** | 227 | 800 | 1'027 | 1'027 |
| <i>dati mancanti</i> | 44 | 23 | 67 | 67 |

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T25 Parenti/conoscenti: problema principale e altri problemi della persona sintomatica (2007)

| Parenti o conoscenti | | | | | |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|------------|------------|
| | Totale | | | Totale | |
| | % | N | | % | N |
| Problema principale della persona sintomatica* | | | Altri problemi della persona sintomatica*** | | |
| alcol | 69.5 | 693 | alcol | 31.0 | 113 |
| cocktail (eroina e cocaina) | 0.3 | 3 | cocktail (eroina e cocaina) | 1.1 | 4 |
| eroina | 4.2 | 42 | eroina | 4.1 | 15 |
| metadone | 0.2 | 2 | metadone | 3.3 | 12 |
| altri oppiacei | 0.0 | 0 | altri oppiacei | 0.0 | 0 |
| cocaina | 4.1 | 41 | cocaina | 9.3 | 34 |
| crack, freebase | 0.0 | 0 | crack, freebase | 0.0 | 0 |
| amfetamine | 0.2 | 2 | amfetamine | 1.4 | 5 |
| MDMA e affini (ecstasy) | 0.3 | 3 | MDMA e affini (ecstasy) | 2.2 | 8 |
| altri stimolanti | 0.0 | 0 | altri stimolanti | 0.3 | 1 |
| barbiturici | 0.6 | 6 | barbiturici | 0.8 | 3 |
| benzodiazepine | 0.1 | 1 | benzodiazepine | 4.7 | 17 |
| altri sonniferi e tranquillanti | 0.1 | 1 | altri sonniferi e tranquillanti | 0.5 | 2 |
| LSD | 0.0 | 0 | LSD | 0.5 | 2 |
| altri allucinogeni | 0.9 | 9 | altri allucinogeni | 0.0 | 0 |
| sostanze volatili (per es., solventi) | 0.0 | 0 | sostanze volatili (per es., solventi) | 0.0 | 0 |
| canapa | 13.5 | 135 | canapa | 16.5 | 60 |
| tabacco | 0.7 | 7 | tabacco | 26.1 | 95 |
| altra/e sostanza/e | 0.2 | 2 | altra/e sostanza/e | 0.5 | 2 |
| gioco patologico | 0.8 | 8 | gioco patologico | 1.9 | 7 |
| disturbi alimentari | 1.6 | 16 | disturbi alimentari | 1.4 | 5 |
| altri problemi assimilabili a una dipendenza | 2.6 | 26 | altri problemi assimilabili a una dipendenza | 1.1 | 4 |
| | | | nessun altro problema di dipendenza | 30.8 | 112 |
| N** | 997 | 997 | N** | 364 | 364 |
| <i>dati mancanti</i> | <i>97</i> | <i>97</i> | <i>dati mancanti</i> | <i>730</i> | <i>730</i> |

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

*** Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

T26 Parenti/conoscenti: Problemi della persona di contatto legati ai problemi della persona sintomatica (2007)

| Parenti o conoscenti | | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | Uomini | Donne | Totale | N |
| | % | % | % | |
| propri problemi* | | | | |
| propri problemi di consumo | 7.8 | 9.2 | 8.9 | 34 |
| propri comportamenti di dipendenza | 0.0 | 2.0 | 1.6 | 6 |
| propri problemi somatici | 2.6 | 6.2 | 5.5 | 21 |
| propri problemi psichici | 27.3 | 40.8 | 38.1 | 146 |
| problemi con il/la partner | 42.9 | 45.4 | 44.9 | 172 |
| problemi di famiglia | 48.1 | 54.9 | 53.5 | 205 |
| problemi finanziari | 11.7 | 13.4 | 13.1 | 50 |
| propri problemi prof./di formazione | 7.8 | 3.6 | 4.4 | 17 |
| problemi di alloggio | 5.2 | 7.8 | 7.3 | 28 |
| problemi di violenza (vittima) | 7.8 | 7.2 | 7.3 | 28 |
| problemi per controllare la violenza | 3.9 | 1.3 | 1.8 | 7 |
| problemi giuridici | 6.5 | 2.6 | 3.4 | 13 |
| altro/i | 0.0 | 2.6 | 2.1 | 8 |
| nessuno | 23.4 | 12.4 | 14.6 | 56 |
| N** | 77 | 306 | 383 | 383 |
| <i>dati mancanti</i> | <i>194</i> | <i>517</i> | <i>711</i> | <i>711</i> |

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T27 Sesso e età dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale¹) e dei parenti o conoscenti (2007)

| | Pazienti: problema principale ¹ | | | | | | | | | | | | Parenti o conoscenti | | | Tutte le uscite | | | |
|-----------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------------------|------------|------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Alcol | | | Oppiacei | | | Cocaina e derivati | | | Canapa | | | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | N |
| | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | | | | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| Sesso* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| maschile | | | 71.7 | | | 72.7 | | | 74.1 | | | 82.8 | | | 22.2 | | | 63.2 | 3'163 |
| femminile | | | 28.3 | | | 25.2 | | | 22.4 | | | 15.8 | | | 77.5 | | | 36.4 | 1'821 |
| sex non noto | | | 0.0 | | | 2.2 | | | 3.4 | | | 1.4 | | | 0.2 | | | 0.5 | 23 |
| N** | 2'000 | 790 | 2'790 | 303 | 105 | 417 | 129 | 39 | 174 | 366 | 70 | 442 | 199 | 694 | 895 | 3'163 | 1'821 | 5'007 | 5'007 |
| Età (in anni)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| fino a 14 anni | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.9 | 2.3 | 3.6 | 0.9 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 35 |
| 15-19 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 8.6 | 3.2 | 10.1 | 17.9 | 11.8 | 53.3 | 52.9 | 53.2 | 10.3 | 2.5 | 4.2 | 8.7 | 5.1 | 7.4 | 368 |
| 20-24 | 4.1 | 3.7 | 4.0 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 21.7 | 25.6 | 22.5 | 18.6 | 21.4 | 19.0 | 7.2 | 5.2 | 5.7 | 8.3 | 6.7 | 7.7 | 383 |
| 25-29 | 6.3 | 4.6 | 5.8 | 19.9 | 21.9 | 20.4 | 27.1 | 15.4 | 24.3 | 9.6 | 10.0 | 9.6 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 9.1 | 7.6 | 8.6 | 425 |
| 30-34 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 19.2 | 13.3 | 17.7 | 15.5 | 15.4 | 16.0 | 7.7 | 4.3 | 7.1 | 4.6 | 9.4 | 8.4 | 9.1 | 8.9 | 9.0 | 449 |
| 35-39 | 12.6 | 9.9 | 11.9 | 26.5 | 18.1 | 24.3 | 13.2 | 12.8 | 13.0 | 5.5 | 1.4 | 4.8 | 6.2 | 9.4 | 8.7 | 13.0 | 10.4 | 12.1 | 599 |
| 40-44 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 9.6 | 16.2 | 11.3 | 10.9 | 7.7 | 10.1 | 1.4 | 2.9 | 1.6 | 12.9 | 14.9 | 14.5 | 12.3 | 14.0 | 12.9 | 641 |
| 45-49 | 16.6 | 17.3 | 16.8 | 6.3 | 2.9 | 5.4 | 1.6 | 5.1 | 2.4 | 1.4 | 2.9 | 1.6 | 16.5 | 17.0 | 16.9 | 12.8 | 14.8 | 13.5 | 672 |
| 50-54 | 11.9 | 15.1 | 12.8 | 2.0 | 2.9 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 8.7 | 11.4 | 9.6 | 479 |
| 55-59 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 9.7 | 8.7 | 7.7 | 9.2 | 8.3 | 411 |
| 60-64 | 7.2 | 6.1 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 5.7 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 247 |
| 65-69 | 3.4 | 4.4 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 3.8 | 4.0 | 2.6 | 3.5 | 2.9 | 146 |
| 70-74 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 2.2 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 65 |
| 75 e più | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.2 | 3.1 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 0.9 | 46 |
| N** | 1'994 | 787 | 2'781 | 302 | 105 | 407 | 129 | 39 | 169 | 366 | 70 | 436 | 194 | 690 | 884 | 3'151 | 1'814 | 4'966 | 4'966 |
| <i>dati mancanti</i> | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 11 | 12 | 7 | 41 | 41 |
| Età | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| media | 45.6 | 46.8 | 45.9 | 33.5 | 32.3 | 33.2 | 29.3 | 29.0 | 29.3 | 22.4 | 23.1 | 22.5 | 42.4 | 44.5 | 44.0 | 40.4 | 43.2 | 41.4 | |
| deviazione standard | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 7.6 | 9.2 | 8.0 | 7.2 | 8.7 | 7.5 | 7.5 | 11.6 | 8.3 | 17.3 | 13.7 | 14.6 | 14.4 | 14.1 | 14.4 | |
| 1° quartile | 37.3 | 39.2 | 37.6 | 27.3 | 25.2 | 26.3 | 24.1 | 22.0 | 23.5 | 17.2 | 17.4 | 17.2 | 26.6 | 34.9 | 33.8 | 29.0 | 33.0 | 30.3 | |
| mediana | 45.8 | 47.1 | 46.1 | 33.5 | 32.1 | 33.3 | 27.2 | 26.5 | 27.2 | 19.2 | 18.7 | 19.2 | 44.5 | 45.0 | 44.9 | 40.3 | 44.0 | 41.8 | |
| 3° quartile | 54.4 | 55.0 | 54.7 | 38.5 | 39.1 | 38.7 | 35.0 | 36.7 | 35.0 | 25.1 | 24.7 | 25.0 | 53.7 | 53.6 | 53.7 | 50.4 | 53.1 | 51.5 | |
| N** | 1'994 | 787 | 2'781 | 302 | 105 | 407 | 129 | 39 | 169 | 366 | 70 | 436 | 194 | 690 | 884 | 3'151 | 1'814 | 4'966 | |
| <i>dati mancanti</i> | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 11 | 12 | 7 | 41 | |

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T28 Stato civile e grado di urbanizzazione del domicilio dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale¹) e dei parenti o conoscenti (2007)

| | Pazienti: problema principale ¹ | | | | | | | | | | | | Parenti o conoscenti | | | Tutte le uscite | | | N |
|---------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------------------|------------|------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Alcol | | | Oppiacei | | | Cocaina e derivati | | | Canapa | | | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | |
| | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | | | | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| Stato civile* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| celibe/nubile | 37.5 | 28.0 | 34.8 | 78.4 | 70.3 | 76.5 | 78.2 | 70.3 | 76.5 | 93.3 | 90.0 | 92.8 | 39.2 | 24.7 | 27.7 | 50.7 | 34.1 | 44.8 | 2'099 |
| sposato | 35.6 | 32.3 | 34.7 | 10.8 | 11.9 | 10.9 | 11.3 | 13.5 | 11.4 | 4.8 | 7.1 | 5.1 | 51.7 | 53.4 | 53.0 | 29.2 | 37.1 | 31.9 | 1'496 |
| separato-a (giuridicamente) | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 0.7 | 3.0 | 1.3 | 5.6 | 2.7 | 5.4 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.9 | 3.0 | 3.9 | 4.4 | 4.1 | 192 |
| divorziato-a | 19.4 | 28.3 | 21.9 | 8.4 | 11.9 | 9.3 | 4.8 | 13.5 | 6.6 | 1.4 | 2.9 | 1.6 | 8.5 | 14.6 | 13.4 | 14.7 | 20.3 | 16.7 | 781 |
| vedovo-a | 1.8 | 5.4 | 2.8 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 3.3 | 2.7 | 1.2 | 3.9 | 2.2 | 103 |
| unione registrata | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 14 |
| N** | 1'863 | 736 | 2'599 | 287 | 101 | 396 | 124 | 37 | 166 | 357 | 70 | 432 | 176 | 644 | 822 | 2'962 | 1'703 | 4'685 | 4'685 |
| <i>dati mancanti</i> | 137 | 54 | 191 | 16 | 4 | 21 | 5 | 2 | 8 | 9 | 0 | 10 | 23 | 50 | 73 | 201 | 118 | 322 | 322 |
| Grado di urbanizzazione* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| grandi centri urbani | 11.2 | 12.6 | 11.6 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 11.4 | 11.7 | 8.0 | 10.0 | 8.7 | 407 |
| periferia dei grandi centri | 14.3 | 14.9 | 14.4 | 1.1 | 6.1 | 2.4 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 4.0 | 0.0 | 3.3 | 17.4 | 16.9 | 17.0 | 10.9 | 13.6 | 11.9 | 554 |
| città di media importanza | 14.2 | 15.2 | 14.5 | 31.2 | 18.2 | 27.7 | 14.9 | 21.1 | 16.4 | 16.2 | 23.9 | 17.5 | 16.3 | 12.6 | 13.4 | 16.8 | 15.9 | 16.5 | 767 |
| piccole città | 34.2 | 32.5 | 33.7 | 42.8 | 46.5 | 43.7 | 49.6 | 47.4 | 49.1 | 40.7 | 38.8 | 40.4 | 23.9 | 31.1 | 29.6 | 36.0 | 33.2 | 34.9 | 1'626 |
| campagna | 26.1 | 24.9 | 25.8 | 25.0 | 28.3 | 25.9 | 33.1 | 31.6 | 32.7 | 39.0 | 37.3 | 38.8 | 29.3 | 28.0 | 28.3 | 28.2 | 27.4 | 27.9 | 1'299 |
| N** | 1'836 | 732 | 2'568 | 276 | 99 | 375 | 121 | 38 | 159 | 351 | 67 | 418 | 184 | 668 | 852 | 2'931 | 1'722 | 4'653 | 4'653 |
| <i>dati mancanti</i> | 164 | 58 | 222 | 27 | 6 | 42 | 8 | 1 | 15 | 15 | 3 | 24 | 15 | 26 | 43 | 232 | 99 | 354 | 354 |

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T29 Tipo di nucleo familiare, situazione di domicilio e tipo di relazione di coppia dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale¹) e dei parenti o conoscenti (2007)

| | Pazienti: problema principale ¹ | | | | | | | | | | | | Parenti o conoscenti | | | Tutte le uscite | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------------------|------------|------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Alcol | | | Oppiacei | | | Cocaina e derivati | | | Canapa | | | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | N |
| | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | | | | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | |
| Tipo di nucleo familiare* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| da solo-a | 41.8 | 34.4 | 39.8 | 49.5 | 37.2 | 46.7 | 37.2 | 31.3 | 35.1 | 17.5 | 16.4 | 17.1 | 10.7 | 15.4 | 14.5 | 36.7 | 26.4 | 33.1 | 1'074 |
| con i genitori/un genitore | 6.7 | 4.5 | 6.1 | 10.9 | 9.0 | 10.8 | 21.3 | 12.5 | 19.1 | 62.3 | 34.4 | 57.8 | 19.6 | 5.1 | 8.3 | 17.0 | 7.8 | 13.9 | 450 |
| con figlio-a-i | 2.0 | 12.4 | 4.9 | 0.0 | 5.1 | 1.6 | 0.0 | 9.4 | 2.3 | 0.3 | 3.3 | 1.1 | 3.6 | 13.8 | 11.5 | 1.5 | 11.5 | 5.0 | 163 |
| con un-a partner (senza figli) | 22.2 | 29.7 | 24.3 | 13.2 | 17.9 | 14.1 | 13.8 | 28.1 | 17.6 | 4.9 | 13.1 | 6.4 | 19.6 | 26.2 | 24.6 | 18.0 | 25.8 | 20.7 | 671 |
| con un-a partner e figlio-a-i | 19.9 | 13.0 | 18.0 | 11.4 | 10.3 | 10.8 | 11.7 | 6.3 | 9.9 | 4.5 | 3.3 | 4.3 | 43.8 | 37.7 | 39.1 | 18.1 | 21.2 | 19.1 | 619 |
| con altri parenti-familiari | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 2.7 | 5.1 | 3.3 | 0.0 | 6.3 | 2.3 | 3.9 | 4.9 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 54 |
| con amici (comunità abitativa) | 2.4 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | 0.0 | 1.6 | 5.3 | 0.0 | 3.8 | 1.3 | 8.2 | 2.4 | 1.8 | 1.0 | 1.2 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 67 |
| altro | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 10.0 | 15.4 | 11.1 | 10.6 | 6.3 | 9.9 | 5.2 | 16.4 | 7.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 4.8 | 4.2 | 4.6 | 148 |
| N** | 1'245 | 485 | 1'730 | 220 | 78 | 306 | 94 | 32 | 131 | 308 | 61 | 374 | 112 | 390 | 504 | 2'099 | 1'127 | 3'246 | 3'246 |
| <i>dati mancanti</i> | 755 | 305 | 1'060 | 83 | 27 | 111 | 35 | 7 | 43 | 58 | 9 | 68 | 87 | 304 | 391 | 1'064 | 694 | 1'761 | 1'761 |
| Situazione di domicilio* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| domicilio fisso | 95.4 | 94.5 | 95.2 | 87.7 | 78.5 | 85.1 | 88.4 | 87.1 | 88.5 | 90.6 | 81.4 | 88.9 | 97.6 | 97.2 | 97.3 | 93.8 | 93.6 | 93.7 | 3'149 |
| senza domicilio fisso | 2.9 | 4.3 | 3.3 | 6.1 | 17.7 | 8.9 | 5.3 | 9.7 | 6.1 | 6.4 | 8.5 | 6.6 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 3.7 | 5.0 | 4.1 | 138 |
| istituzione | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 6.1 | 3.8 | 6.0 | 6.3 | 3.2 | 5.3 | 3.0 | 10.2 | 4.4 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 1.4 | 2.2 | 74 |
| N** | 1'290 | 511 | 1'801 | 228 | 79 | 315 | 95 | 31 | 131 | 297 | 59 | 361 | 125 | 424 | 551 | 2'154 | 1'187 | 3'361 | 3'361 |
| <i>dati mancanti</i> | 710 | 279 | 989 | 75 | 26 | 102 | 34 | 8 | 43 | 69 | 11 | 81 | 74 | 270 | 344 | 1'009 | 634 | 1'646 | 1'646 |
| Tipo di relazione di coppia* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| senza partner, sola-a | 29.7 | 30.0 | 29.8 | 42.3 | 28.1 | 40.1 | 37.7 | 23.1 | 34.7 | 56.9 | 30.6 | 51.8 | 15.3 | 14.7 | 15.0 | 33.0 | 24.5 | 30.1 | 764 |
| relazione-i saltuaria-e | 5.9 | 6.9 | 6.2 | 7.7 | 10.5 | 8.2 | 5.8 | 23.1 | 10.9 | 11.8 | 16.7 | 12.4 | 6.1 | 3.4 | 4.0 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 162 |
| relazione fissa, vivendo separat. | 10.6 | 11.3 | 10.8 | 13.7 | 15.8 | 14.2 | 17.4 | 7.7 | 14.9 | 13.7 | 16.7 | 15.0 | 5.1 | 11.2 | 9.8 | 11.3 | 11.6 | 11.5 | 292 |
| relazione fissa, vivendo insieme | 53.8 | 51.7 | 53.2 | 36.3 | 45.6 | 37.5 | 39.1 | 46.2 | 39.6 | 17.6 | 36.1 | 20.7 | 73.5 | 70.7 | 71.2 | 49.3 | 57.4 | 52.0 | 1'321 |
| N** | 1'007 | 406 | 1'413 | 168 | 57 | 232 | 69 | 26 | 101 | 153 | 36 | 193 | 98 | 348 | 448 | 1'587 | 933 | 2'539 | 2'539 |
| <i>dati mancanti</i> | 993 | 384 | 1'377 | 135 | 48 | 185 | 60 | 13 | 73 | 213 | 34 | 249 | 101 | 346 | 447 | 1'576 | 888 | 2'468 | 2'468 |

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

**T30 Più alta formazione portata a termine, fonte di reddito principale e attività principale dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale¹)
e dei parenti o conoscenti (2007)**

| | Pazienti: problema principale ¹ | | | | | | | | | | | | Parenti o conoscenti | | | Tutte le uscite | | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------------------|------------|------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Alcol | | | Oppiacei | | | Cocaina e derivati | | | Canapa | | | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | N |
| | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | | | | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | |
| Più alta formazione portata a termine** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nessuna form. terminata | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 8.3 | 13.9 | 9.6 | 5.0 | 13.9 | 7.3 | 17.6 | 18.5 | 17.8 | 9.2 | 4.0 | 5.3 | 8.6 | 7.2 | 8.1 | 251 |
| scuola dell'obbligo | 11.7 | 17.5 | 13.2 | 36.2 | 43.1 | 37.9 | 32.7 | 27.8 | 31.4 | 53.2 | 53.7 | 53.3 | 12.6 | 14.8 | 14.2 | 21.7 | 21.1 | 21.5 | 664 |
| scolarità complementare | 3.2 | 9.0 | 4.7 | 3.1 | 6.9 | 4.0 | 4.0 | 11.1 | 5.8 | 2.7 | 1.9 | 2.6 | 3.4 | 4.5 | 4.2 | 3.2 | 6.7 | 4.3 | 134 |
| apprendistato/ scuola profes. | 60.3 | 51.6 | 58.0 | 47.2 | 30.6 | 43.2 | 50.5 | 38.9 | 47.4 | 24.4 | 11.1 | 22.3 | 42.9 | 56.5 | 53.1 | 51.7 | 48.7 | 50.7 | 1'565 |
| liceo/diploma | 4.0 | 3.4 | 3.8 | 1.7 | 2.8 | 2.0 | 2.0 | 5.6 | 2.9 | 1.7 | 11.1 | 3.2 | 6.7 | 5.1 | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 3.9 | 119 |
| magistrale, scuola pedagogic. | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 1.9 | 0.6 | 1.7 | 2.8 | 2.5 | 0.7 | 1.8 | 1.1 | 33 |
| form. profession. superiore | 7.4 | 6.1 | 7.0 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 5.0 | 2.8 | 4.4 | 0.0 | 1.9 | 0.3 | 5.9 | 6.3 | 6.2 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 166 |
| scuola profession. superiore | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0.9 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 38 |
| alta scuola specializzata | 1.6 | 0.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 2.0 | 2.3 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 35 |
| università, politecnico | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 3.1 | 4.2 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 81 |
| N** | 1'218 | 446 | 1'664 | 229 | 72 | 301 | 101 | 36 | 137 | 295 | 54 | 349 | 119 | 352 | 471 | 2'057 | 1'029 | 3'086 | 3'086 |
| <i>dati mancanti</i> | 782 | 344 | 1'126 | 74 | 33 | 116 | 28 | 3 | 37 | 71 | 16 | 93 | 80 | 342 | 424 | 1'106 | 792 | 1'921 | 1'921 |
| Fonte di reddito principale* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| reddito da lavoro | 60.3 | 40.6 | 54.7 | 36.6 | 28.0 | 34.4 | 62.1 | 31.3 | 54.3 | 33.3 | 20.3 | 31.0 | 68.2 | 62.4 | 63.8 | 55.5 | 46.7 | 52.3 | 1'892 |
| risparmi | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | 2.4 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 28 |
| rendita (AVS/AI, ecc.) | 17.7 | 21.3 | 18.7 | 18.8 | 19.5 | 18.8 | 10.5 | 18.8 | 12.6 | 5.4 | 11.9 | 6.4 | 13.5 | 10.6 | 11.3 | 15.4 | 16.6 | 15.8 | 572 |
| assistenza/previdenza sociale | 10.6 | 11.3 | 10.8 | 35.3 | 35.4 | 35.4 | 11.6 | 28.1 | 15.7 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | 0.7 | 3.2 | 2.6 | 11.5 | 10.1 | 11.0 | 397 |
| assicurazione disoccupazione | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 4.5 | 6.1 | 4.9 | 4.2 | 9.4 | 5.5 | 4.0 | 5.1 | 4.2 | 2.0 | 1.5 | 1.6 | 5.4 | 4.1 | 4.9 | 177 |
| sostegno del/della partner | 0.8 | 15.7 | 5.1 | 0.4 | 3.7 | 1.3 | 1.1 | 6.3 | 2.4 | 0.0 | 3.4 | 0.6 | 2.0 | 17.8 | 14.0 | 0.8 | 14.6 | 5.8 | 209 |
| sosteg. genitori/familiari/amici | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 4.9 | 2.9 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 48.5 | 47.5 | 48.6 | 13.5 | 3.8 | 6.1 | 9.2 | 6.0 | 8.1 | 294 |
| spacciando/tagliando | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 3 |
| altre entrate illegali | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 |
| prostituzione | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| altra-e | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 3.2 | 0.0 | 2.4 | 1.0 | 5.1 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 41 |
| N** | 1'412 | 559 | 1'971 | 224 | 82 | 308 | 95 | 32 | 127 | 297 | 59 | 358 | 148 | 473 | 622 | 2'314 | 1'298 | 3'617 | 3'617 |
| <i>dati mancanti</i> | 588 | 231 | 819 | 79 | 23 | 109 | 34 | 7 | 47 | 69 | 11 | 84 | 51 | 221 | 273 | 849 | 523 | 1'390 | 1'390 |
| Attività principale (nel corso dei 30 ultimi giorni)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| att. a tempo pieno (70% o più) | 56.7 | 29.3 | 48.9 | 30.8 | 18.4 | 28.1 | 57.6 | 23.3 | 48.1 | 26.0 | 6.6 | 22.7 | 65.0 | 40.4 | 46.2 | 50.6 | 31.0 | 43.7 | 1'454 |
| attività a tempo parziale | 4.5 | 17.2 | 8.1 | 2.7 | 11.8 | 5.0 | 3.0 | 6.7 | 3.7 | 3.3 | 8.2 | 4.1 | 2.4 | 28.4 | 22.4 | 4.0 | 19.5 | 9.4 | 314 |
| varie attività occas. | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 5.4 | 3.9 | 5.0 | 1.0 | 3.3 | 2.2 | 1.7 | 0.0 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 2.1 | 1.6 | 2.0 | 65 |
| in formazione | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 3.9 | 2.3 | 7.1 | 10.0 | 8.1 | 48.7 | 45.9 | 48.4 | 16.3 | 4.9 | 7.7 | 10.1 | 6.6 | 9.0 | 299 |
| inattivo sul mercat. del lavor. | 19.8 | 34.0 | 23.8 | 29.9 | 27.6 | 29.1 | 13.1 | 30.0 | 18.5 | 5.0 | 14.8 | 6.8 | 11.4 | 21.4 | 18.9 | 17.7 | 27.6 | 21.2 | 706 |
| disoccup., ricerc. di un lavoro | 10.2 | 11.3 | 10.5 | 13.1 | 17.1 | 13.9 | 8.1 | 23.3 | 11.1 | 9.3 | 11.5 | 9.6 | 2.4 | 3.6 | 3.3 | 9.4 | 9.1 | 9.3 | 308 |
| disoccupato, lav. fut. garant. | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 7 |
| altra | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 16.3 | 17.1 | 16.2 | 10.1 | 3.3 | 8.1 | 5.3 | 13.1 | 6.6 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 5.7 | 4.5 | 5.3 | 175 |
| N** | 1'280 | 512 | 1'792 | 221 | 76 | 302 | 99 | 30 | 135 | 300 | 61 | 366 | 123 | 384 | 509 | 2'156 | 1'154 | 3'328 | 3'328 |
| <i>dati mancanti</i> | 720 | 278 | 998 | 82 | 29 | 115 | 30 | 9 | 39 | 66 | 9 | 76 | 76 | 310 | 386 | 1'007 | 667 | 1'679 | 1'679 |

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T31 Statuto professionale e reddito mensile netto dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale¹) e dei parenti o conoscenti (2007)

| | Pazienti: problema principale ¹ | | | | | | | | | | | | Parenti o conoscenti | | | Tutte le uscite | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------------------|------------|------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Alcol | | | Oppiacei | | | Cocaina e derivati | | | Canapa | | | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | N |
| | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | | | | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | |
| Statuto professionale* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| senza attività professionale | 29.2 | 44.1 | 33.5 | 55.5 | 67.5 | 57.0 | 25.0 | 61.1 | 35.9 | 12.0 | 53.8 | 16.8 | 14.1 | 28.5 | 24.9 | 29.4 | 39.9 | 33.1 | 602 |
| apprendista, praticante | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 2.5 | 1.0 | 5.4 | 0.0 | 3.8 | 30.6 | 0.0 | 26.4 | 5.1 | 0.9 | 1.9 | 4.5 | 1.7 | 3.5 | 64 |
| manovale, operaio-a ausiliar. | 4.2 | 5.9 | 4.7 | 3.9 | 2.5 | 3.5 | 3.6 | 5.6 | 3.8 | 4.6 | 7.7 | 4.8 | 2.6 | 3.4 | 3.2 | 4.1 | 4.8 | 4.3 | 78 |
| operaio-a con formaz. pratica | 5.3 | 5.9 | 5.5 | 11.0 | 10.0 | 10.5 | 19.6 | 5.6 | 15.4 | 9.3 | 0.0 | 8.0 | 1.3 | 7.7 | 6.1 | 7.1 | 6.7 | 6.9 | 125 |
| oper. con form. certif. (AFC) | 14.4 | 2.4 | 11.0 | 9.7 | 7.5 | 9.0 | 7.1 | 0.0 | 5.1 | 9.3 | 0.0 | 8.0 | 12.8 | 7.7 | 8.9 | 12.9 | 4.9 | 10.0 | 182 |
| caposquadra | 2.5 | 0.0 | 1.8 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 10.7 | 0.0 | 7.7 | 3.7 | 0.0 | 3.2 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 2.7 | 0.2 | 1.8 | 33 |
| impiegato-a non qualificato-a | 14.5 | 27.1 | 18.1 | 7.7 | 2.5 | 8.0 | 21.4 | 11.1 | 17.9 | 9.3 | 7.7 | 8.8 | 9.0 | 23.4 | 19.8 | 13.4 | 22.7 | 16.7 | 303 |
| impieg. qualif., quadro medio | 10.9 | 5.2 | 9.3 | 4.5 | 2.5 | 4.0 | 1.8 | 5.6 | 2.6 | 0.9 | 0.0 | 0.8 | 28.2 | 13.6 | 17.3 | 9.8 | 8.1 | 9.1 | 166 |
| imp. funz. dirett., quadr. sup. | 3.2 | 2.4 | 3.0 | 1.9 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 1.7 | 3.2 | 2.8 | 1.7 | 2.4 | 44 |
| indipendente | 11.7 | 3.5 | 9.4 | 2.6 | 0.0 | 2.0 | 1.8 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 7.7 | 9.6 | 9.0 | 4.6 | 7.4 | 134 |
| scolaro-a, studente | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 11.1 | 3.8 | 19.4 | 23.1 | 21.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 3.0 | 3.4 | 61 |
| altro statuto | 1.4 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 2.5 | 1.0 | 3.6 | 0.0 | 2.6 | 0.9 | 7.7 | 1.6 | 0.0 | 2.6 | 1.9 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 25 |
| N** | 715 | 288 | 1'003 | 155 | 40 | 200 | 56 | 18 | 78 | 108 | 13 | 125 | 78 | 235 | 313 | 1'173 | 631 | 1'817 | 1'817 |
| <i>dati mancanti</i> | <i>1'285</i> | <i>502</i> | <i>1'787</i> | <i>148</i> | <i>65</i> | <i>217</i> | <i>73</i> | <i>21</i> | <i>96</i> | <i>258</i> | <i>57</i> | <i>317</i> | <i>121</i> | <i>459</i> | <i>582</i> | <i>1'990</i> | <i>1'190</i> | <i>3'190</i> | <i>3'190</i> |
| Reddito mensile netto* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nessun reddito | 24.6 | 35.7 | 27.5 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.2 | 60.0 | 35.4 | 47.3 | 52.6 | 48.1 | 22.2 | 10.8 | 13.0 | 27.9 | 31.0 | 28.8 | 298 |
| fino a 1000 fr. | 3.5 | 6.5 | 4.3 | 15.7 | 17.2 | 16.1 | 9.1 | 6.7 | 8.3 | 27.7 | 21.1 | 26.7 | 11.1 | 5.4 | 6.5 | 9.5 | 7.6 | 8.9 | 92 |
| da 1001 a 2000 fr. | 9.0 | 11.7 | 9.7 | 21.7 | 17.2 | 20.5 | 6.1 | 6.7 | 6.3 | 7.1 | 10.5 | 7.6 | 5.6 | 8.1 | 7.6 | 9.9 | 11.1 | 10.3 | 106 |
| da 2001 a 3000 fr. | 11.4 | 24.0 | 14.7 | 21.7 | 27.6 | 23.2 | 9.1 | 20.0 | 12.5 | 3.6 | 10.5 | 4.6 | 5.6 | 27.0 | 22.8 | 10.4 | 24.7 | 14.8 | 153 |
| da 3001 a 4000 fr. | 14.2 | 13.0 | 13.8 | 7.2 | 10.3 | 8.0 | 18.2 | 6.7 | 14.6 | 7.1 | 0.0 | 6.1 | 5.6 | 20.3 | 17.4 | 12.4 | 12.7 | 12.5 | 129 |
| da 4001 a 5000 fr. | 15.1 | 5.2 | 12.5 | 2.4 | 0.0 | 1.8 | 15.2 | 0.0 | 10.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.0 | 14.9 | 12.0 | 11.7 | 6.6 | 10.2 | 105 |
| da 5001 a 6000 fr. | 13.2 | 2.6 | 10.4 | 4.8 | 0.0 | 3.6 | 12.1 | 0.0 | 8.3 | 1.8 | 0.0 | 1.5 | 11.1 | 5.4 | 6.5 | 10.9 | 3.2 | 8.5 | 88 |
| da 6001 a 8000 fr. | 7.0 | 1.3 | 5.5 | 1.2 | 0.0 | 0.9 | 6.1 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 6.8 | 7.6 | 5.2 | 2.5 | 4.4 | 45 |
| da 8001 a 10 000 fr. | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 1.2 | 3.4 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 1.4 | 5.4 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 11 |
| da 10 001 a 15 000 fr. | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 3 |
| più di 15 000 fr. | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 4 |
| N** | 431 | 154 | 585 | 83 | 29 | 112 | 33 | 15 | 48 | 112 | 19 | 131 | 18 | 74 | 92 | 718 | 316 | 1'034 | 1'034 |
| <i>dati mancanti</i> | <i>1'569</i> | <i>636</i> | <i>2'205</i> | <i>220</i> | <i>76</i> | <i>305</i> | <i>96</i> | <i>24</i> | <i>126</i> | <i>254</i> | <i>51</i> | <i>311</i> | <i>181</i> | <i>620</i> | <i>803</i> | <i>2'445</i> | <i>1'505</i> | <i>3'973</i> | <i>3'973</i> |

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T32a Ragione principale della fine del trattamento/accompagnamento dei pazienti (in rapporto al problema principale¹) e dei parenti o conoscenti (2007)

| | Pazienti: problema principale ¹ | | | | | | | | | | | | Parenti o conoscenti | | | Tutte le uscite | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------------------|------------|------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Alcol | | | Oppiacei | | | Cocaina e derivati | | | Canapa | | | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | N |
| | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | | | | | | | |
| Ragione principale* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| conclus. pianific. senza passag. | 48.4 | 45.0 | 47.4 | 20.0 | 17.6 | 20.0 | 34.1 | 25.6 | 32.8 | 60.7 | 65.7 | 61.6 | 66.5 | 61.7 | 62.8 | 48.0 | 50.6 | 49.0 | 2'416 |
| conclus. pianific. con passag. | 6.0 | 7.4 | 6.4 | 18.7 | 24.5 | 20.2 | 14.7 | 7.7 | 12.6 | 5.5 | 7.1 | 5.7 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | 348 |
| cambio di domicilio | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 7.7 | 6.9 | 7.3 | 6.2 | 5.1 | 5.7 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 2.0 | 1.2 | 1.4 | 3.4 | 2.2 | 3.0 | 146 |
| ospedalizzazione | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 39 |
| incarcerazione | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 3.7 | 1.0 | 2.9 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 20 |
| perdita di contatto | 23.6 | 25.8 | 24.2 | 26.7 | 27.5 | 26.3 | 29.5 | 35.9 | 31.6 | 18.4 | 10.0 | 17.0 | 16.8 | 21.1 | 20.1 | 23.0 | 23.4 | 23.1 | 1'140 |
| conclusione esplicita | 11.3 | 13.2 | 11.8 | 15.0 | 15.7 | 15.1 | 10.1 | 20.5 | 12.1 | 9.3 | 10.0 | 9.3 | 6.1 | 6.9 | 6.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 533 |
| decesso | 2.5 | 1.5 | 2.3 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 0.8 | 5.1 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 2.1 | 1.1 | 1.8 | 87 |
| altre cause | 4.0 | 3.6 | 3.9 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 0.0 | 2.3 | 4.1 | 5.7 | 4.3 | 4.6 | 5.3 | 5.1 | 4.0 | 4.5 | 4.1 | 204 |
| N** | 1'973 | 775 | 2'748 | 300 | 102 | 411 | 129 | 39 | 174 | 364 | 70 | 440 | 197 | 681 | 880 | 3'126 | 1'784 | 4'933 | 4'933 |
| <i>dati mancanti</i> | 27 | 15 | 42 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | 15 | 37 | 37 | 74 | 74 |

T32b Destinazione dei trasferimenti dei pazienti (in rapporto al problema principale¹) e dei parenti o conoscenti (2007)

| Destinazione dei trasferimenti*** | Alcol | | | Oppiacei | | | Cocaina e derivati | | | Canapa | | | Parenti o conoscenti | | | Tutte le uscite | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|------------|------------|
| | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | N |
| terapia residenziale | 39.5 | 28.9 | 36.1 | 37.7 | 50.0 | 41.1 | 33.3 | 0.0 | 27.8 | 28.6 | 20.0 | 26.3 | 0.0 | 14.3 | 11.8 | 36.5 | 31.0 | 34.7 | 87 |
| consulenza ambulatoriale | 44.4 | 47.4 | 45.4 | 47.2 | 45.0 | 46.6 | 53.3 | 100.0 | 61.1 | 50.0 | 40.0 | 47.4 | 100.0 | 71.4 | 76.5 | 47.9 | 52.4 | 49.4 | 124 |
| appartamento protetto | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 0.0 | 5.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.4 | 1.6 | 4 |
| altra istituzione specializzata | 13.6 | 21.1 | 16.0 | 15.1 | 0.0 | 11.0 | 13.3 | 0.0 | 11.1 | 21.4 | 40.0 | 26.3 | 0.0 | 14.3 | 11.8 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 36 |
| N** | 81 | 38 | 119 | 53 | 20 | 73 | 15 | 3 | 18 | 14 | 5 | 19 | 3 | 14 | 17 | 167 | 84 | 251 | 251 |
| <i>dati mancanti</i> | 38 | 19 | 57 | 3 | 5 | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 4 | 9 | 13 | 58 | 37 | 97 | 97 |

T32c Causa di decesso dei pazienti (in rapporto al problema principale¹) e dei parenti o conoscenti (2007)

| Cause di decesso**** | Alcol | | | Oppiacei | | | Cocaina e derivati | | | Canapa | | | Parenti o conoscenti | | | Tutte le uscite | | | |
|---------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------|----------|----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | N |
| suicidio | 11.1 | 33.3 | 15.2 | 20.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 23.1 | 14.6 | 7 |
| infortunio | 0.0 | 16.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 2.1 | 1 |
| malattia | 70.4 | 50.0 | 66.7 | 40.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 65.7 | 30.8 | 56.3 | 27 |
| overdose o intossicazione acuta | 3.7 | 0.0 | 3.0 | 40.0 | 66.7 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 30.8 | 16.7 | 8 |
| altre cause di decesso | 14.8 | 0.0 | 12.1 | 0.0 | 33.3 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 7.7 | 10.4 | 5 |
| N** | 27 | 6 | 33 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 13 | 48 | 48 |
| <i>dati mancanti</i> | 23 | 6 | 29 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 39 | 39 |

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti trasferiti. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

**** I risultati si basano solamente sui clienti deceduti durante l'intervento. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T33 Durata dell'intervento sui pazienti (in rapporto al problema principale¹) e sui parenti o conoscenti (2007)

| | Pazienti: problema principale ¹ | | | | | | | | | | | | Parenti o conoscenti | | | Tutte le uscite | | | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------------------|------------|------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Alcol | | | Oppiacei | | | Cocaina e derivati | | | Canapa | | | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | |
| | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | | | | | | | |
| Durata della presa in carico* (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 settimana o meno | 6.3 | 7.7 | 6.7 | 1.7 | 3.8 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 3.6 | 2.9 | 4.1 | 12.1 | 9.7 | 10.2 | 6.4 | 8.2 | 7.1 | 353 |
| > 1 settimana a 1 mese | 3.2 | 4.3 | 3.5 | 2.0 | 2.9 | 2.2 | 0.8 | 5.1 | 1.7 | 9.3 | 5.7 | 8.6 | 4.0 | 2.3 | 2.8 | 3.9 | 3.4 | 3.7 | 185 |
| > 1 a 2 mesi | 4.8 | 6.5 | 5.3 | 3.0 | 1.9 | 2.6 | 2.3 | 0.0 | 1.7 | 6.0 | 11.4 | 7.0 | 6.5 | 5.8 | 6.0 | 4.8 | 6.3 | 5.3 | 266 |
| > 2 a 3 mesi | 3.3 | 4.6 | 3.6 | 3.0 | 3.8 | 3.1 | 3.9 | 2.6 | 3.5 | 4.9 | 7.1 | 5.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.4 | 3.9 | 194 |
| > 3 a 6 mesi | 10.4 | 11.5 | 10.7 | 10.9 | 10.5 | 11.0 | 16.4 | 15.4 | 15.6 | 12.9 | 18.6 | 13.6 | 16.1 | 16.9 | 16.8 | 11.5 | 13.8 | 12.4 | 618 |
| > 6 mesi a 1 anno | 29.3 | 28.0 | 29.0 | 27.7 | 30.5 | 27.8 | 35.2 | 30.8 | 34.7 | 36.7 | 34.3 | 36.1 | 39.7 | 39.1 | 39.1 | 31.2 | 33.3 | 31.9 | 1'593 |
| > 1 a 2 anni | 23.1 | 22.2 | 22.8 | 25.7 | 20.0 | 24.5 | 23.4 | 30.8 | 25.4 | 21.6 | 15.7 | 20.6 | 13.6 | 15.3 | 14.8 | 21.9 | 18.6 | 20.7 | 1'035 |
| > 2 a 3 anni | 8.8 | 5.8 | 8.0 | 12.2 | 6.7 | 10.6 | 8.6 | 10.3 | 9.2 | 3.3 | 2.9 | 3.2 | 0.0 | 3.8 | 2.9 | 7.7 | 5.1 | 6.7 | 336 |
| > 3 a 5 anni | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 4.6 | 9.5 | 5.8 | 5.5 | 2.6 | 4.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 2.9 | 2.6 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 234 |
| > 5 a 10 anni | 4.0 | 2.7 | 3.6 | 7.6 | 8.6 | 8.2 | 1.6 | 0.0 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 2.5 | 0.4 | 0.9 | 3.6 | 1.8 | 3.0 | 148 |
| più di 10 anni | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 31 |
| N** | 1'994 | 790 | 2'784 | 303 | 105 | 417 | 128 | 39 | 173 | 365 | 70 | 441 | 199 | 688 | 889 | 3'155 | 1'815 | 4'993 | 4'993 |
| <i>dati mancanti</i> | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 8 | 6 | 14 | 14 |
| Durata (in settimane) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| media | 72.1 | 64.3 | 69.9 | 94.5 | 98.1 | 98.5 | 61.9 | 52.0 | 60.0 | 40.4 | 36.0 | 39.4 | 42.6 | 41.0 | 41.3 | 66.4 | 54.1 | 62.1 | |
| deviazione standard | 96.5 | 88.8 | 94.4 | 114.3 | 127.0 | 122.7 | 62.0 | 42.0 | 57.4 | 40.9 | 37.1 | 40.3 | 75.0 | 49.5 | 56.2 | 90.8 | 75.7 | 86.5 | |
| 1°quartile | 20.4 | 14.7 | 18.7 | 27.6 | 26.4 | 27.0 | 23.3 | 21.7 | 24.9 | 14.0 | 10.0 | 12.3 | 10.6 | 14.4 | 13.6 | 18.6 | 14.4 | 17.1 | |
| mediana | 43.1 | 38.2 | 41.6 | 54.6 | 45.4 | 53.3 | 41.1 | 39.3 | 41.1 | 31.7 | 27.1 | 31.1 | 27.3 | 28.6 | 28.3 | 39.1 | 33.0 | 37.0 | |
| 3°quartile | 85.4 | 77.0 | 82.6 | 107.1 | 112.6 | 112.6 | 78.1 | 68.0 | 77.6 | 53.1 | 48.0 | 52.1 | 41.9 | 49.2 | 47.9 | 77.6 | 62.0 | 71.1 | |
| N** | 1'994 | 790 | 2'784 | 303 | 105 | 417 | 128 | 39 | 173 | 365 | 70 | 441 | 199 | 688 | 889 | 3'155 | 1'815 | 4'993 | |
| <i>dati mancanti</i> | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 8 | 6 | 14 | |

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T34 Trattamento sostitutivo durante e immediatamente dopo l'intervento, in rapporto al problema principale¹ (solamente pazienti) (2007)

| | Pazienti: problema principale ¹ | | | | | | | | | | | | Tutti i pazienti | | | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| | Alcol | | | Oppiacei | | | Cocaina e derivati | | | Canapa | | | Uomini | Donne | Totale | N |
| | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| Sostituzione nel corso dell'intervento* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| no | 96.6 | 96.9 | 96.7 | 41.6 | 45.1 | 42.3 | 88.5 | 77.1 | 85.6 | 99.0 | 98.3 | 98.9 | 90.4 | 90.9 | 90.5 | 2'728 |
| sì | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 58.4 | 54.9 | 57.7 | 11.5 | 22.9 | 14.4 | 1.0 | 1.7 | 1.1 | 9.6 | 9.1 | 9.5 | 285 |
| N** | 1'407 | 546 | 1'953 | 243 | 82 | 326 | 104 | 35 | 139 | 311 | 60 | 371 | 2'198 | 814 | 3'013 | 3'013 |
| <i>dati mancanti</i> | 593 | 244 | 837 | 60 | 23 | 91 | 25 | 4 | 35 | 55 | 10 | 71 | 766 | 313 | 1'099 | 1'099 |
| Tipo di sostituzione*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| eroina | 2.1 | 0.0 | 1.5 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 2.7 | 3.2 | 9 |
| metadone | 45.8 | 58.8 | 49.2 | 88.7 | 91.1 | 89.3 | 91.7 | 100.0 | 95.0 | 66.7 | 100.0 | 75.0 | 78.9 | 83.6 | 80.2 | 227 |
| altri oppiacei | 4.2 | 0.0 | 3.1 | 4.3 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 1.4 | 3.2 | 9 |
| altre sostanze | 47.9 | 41.2 | 46.2 | 2.8 | 4.4 | 3.2 | 8.3 | 0.0 | 5.0 | 33.3 | 0.0 | 25.0 | 13.9 | 12.3 | 13.4 | 38 |
| N** | 48 | 17 | 65 | 141 | 45 | 187 | 12 | 8 | 20 | 3 | 1 | 4 | 209 | 73 | 283 | 283 |
| <i>dati mancanti</i> | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Sostituzione dopo l'intervento* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| no | 99.3 | 98.6 | 99.1 | 65.1 | 60.6 | 63.9 | 93.8 | 81.3 | 90.6 | 98.7 | 100.0 | 98.9 | 95.6 | 94.5 | 95.3 | 2'673 |
| sì | 0.7 | 1.4 | 0.9 | 34.9 | 39.4 | 36.1 | 6.3 | 18.8 | 9.4 | 1.3 | 0.0 | 1.1 | 4.4 | 5.5 | 4.7 | 131 |
| N** | 1'328 | 514 | 1'842 | 195 | 71 | 266 | 96 | 32 | 128 | 302 | 57 | 359 | 2'043 | 761 | 2'804 | 2'804 |
| <i>dati mancanti</i> | 672 | 276 | 948 | 108 | 34 | 151 | 33 | 7 | 46 | 64 | 13 | 83 | 921 | 366 | 1'308 | 1'308 |
| Tipo di sostituzione*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| prescrizione di eroina | 22.2 | 14.3 | 18.8 | 11.8 | 7.1 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 13.5 | 7.1 | 11.5 | 15 |
| trattamento sostitutivo | 77.8 | 85.7 | 81.3 | 88.2 | 92.9 | 89.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 86.5 | 92.9 | 88.5 | 116 |
| N** | 9 | 7 | 16 | 68 | 28 | 96 | 6 | 6 | 12 | 4 | 0 | 4 | 89 | 42 | 131 | 131 |
| <i>dati mancanti</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti ai quali è stata prescritta una sostituzione durante l'intervento. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T35 Postassistenza prevista e preparata, in rapporto al problema principale¹ (solamente pazienti) (2007)

| | Pazienti: problema principale ¹ | | | | | | | | | | | | Tutti i pazienti | | | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| | Alcol | | | Oppiacei | | | Cocaina e derivati | | | Canapa | | | Uomini | Donne | Totale | N |
| | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | |
| Postassistenza prevista e preparata* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| no | 87.8 | 80.1 | 85.8 | 64.7 | 55.0 | 62.4 | 84.1 | 84.6 | 84.3 | 89.3 | 76.9 | 87.8 | 85.3 | 78.0 | 83.4 | 1'789 |
| si | 12.2 | 19.9 | 14.2 | 35.3 | 45.0 | 37.6 | 15.9 | 15.4 | 15.7 | 10.7 | 23.1 | 12.2 | 14.7 | 22.0 | 16.6 | 356 |
| N** | 1'060 | 386 | 1'446 | 190 | 60 | 250 | 82 | 26 | 108 | 187 | 26 | 213 | 1'594 | 551 | 2'145 | 2'145 |
| <i>dati mancanti</i> | 940 | 404 | 1'344 | 113 | 45 | 167 | 47 | 13 | 66 | 179 | 44 | 229 | 1'370 | 576 | 1'967 | 1'967 |
| Tipo di postassistenza prevista*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| appartamento protetto dell'istituzione | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| servizio di postassistenza dell'istituzione | 1.9 | 3.4 | 2.4 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 2.3 | 7 |
| appartamento protetto esterno | 0.9 | 3.4 | 1.8 | 3.4 | 11.5 | 5.9 | 0.0 | 25.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 5.9 | 3.0 | 9 |
| servizio di postassistenza esterno | 10.4 | 6.8 | 9.1 | 10.2 | 11.5 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 4.0 | 9.0 | 9.9 | 9.3 | 28 |
| centro di consulenza per problemi inerenti all'alcol | 26.4 | 27.1 | 26.7 | 13.6 | 7.7 | 11.8 | 9.1 | 0.0 | 6.7 | 10.5 | 16.7 | 12.0 | 19.6 | 18.8 | 19.3 | 58 |
| centro di consulenza per problemi inerenti alle droghe | 0.0 | 1.7 | 0.6 | 23.7 | 38.5 | 28.2 | 27.3 | 0.0 | 20.0 | 10.5 | 0.0 | 8.0 | 10.1 | 10.9 | 10.3 | 31 |
| altri centri di consulenza | 12.3 | 18.6 | 14.5 | 6.8 | 7.7 | 7.1 | 27.3 | 50.0 | 33.3 | 15.8 | 33.3 | 20.0 | 12.1 | 16.8 | 13.7 | 41 |
| gruppo di aiuto reciproco e di autosostegno | 14.2 | 13.6 | 13.9 | 0.0 | 3.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 8.9 | 8.3 | 25 |
| gruppo di precedenti utenti del centro/ dell'istituzione | 1.9 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 2 |
| altro-i | 34.9 | 40.7 | 37.0 | 39.0 | 23.1 | 34.1 | 63.6 | 25.0 | 53.3 | 57.9 | 50.0 | 56.0 | 40.2 | 36.6 | 39.0 | 117 |
| N** | 106 | 59 | 165 | 59 | 26 | 85 | 11 | 4 | 15 | 19 | 6 | 25 | 199 | 101 | 300 | 300 |
| <i>dati mancanti</i> | 23 | 18 | 41 | 8 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 20 | 56 | 56 |

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti per i quali una postassistenza è prevista. Le categorie non sono esclusive (molte risposte possibili)

T36 Problemi di dipendenza all'uscita, in rapporto al problema principale¹ (solamente pazienti) (2007)

| | Pazienti: problema principale ¹ | | | | | | | | | | | | Tutti i pazienti | | | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| | Alcol | | | Oppiacei | | | Cocaina e derivati | | | Canapa | | | Uomini | Donne | Totale | N |
| | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | |
| Problemi di dipendenza* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| alcol | 57.1 | 60.3 | 58.0 | 20.9 | 26.8 | 22.5 | 15.9 | 28.0 | 18.7 | 12.3 | 15.7 | 12.8 | 42.3 | 46.4 | 43.5 | 1'098 |
| cocktail (eroina e cocaina) | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 5.2 | 7.0 | 5.7 | 3.7 | 4.0 | 3.7 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 24 |
| eroina | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 53.4 | 52.1 | 53.1 | 12.2 | 24.0 | 15.0 | 1.5 | 2.0 | 1.6 | 7.2 | 6.7 | 7.1 | 179 |
| metadone | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 29.3 | 25.4 | 28.2 | 4.9 | 20.0 | 8.4 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 91 |
| altri oppiacei | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 4.2 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 8 |
| cocaina | 1.7 | 0.8 | 1.4 | 14.7 | 19.7 | 16.0 | 35.4 | 52.0 | 39.3 | 2.3 | 3.9 | 2.6 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 116 |
| crack, freebase | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| amfetamine | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.8 | 0.8 | 0.0 | 4.0 | 0.9 | 0.0 | 3.9 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 8 |
| MDMA e affini (ecstasy) | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 0.4 | 1.2 | 12.0 | 3.7 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 8 |
| altri stimolanti | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| barbiturici | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 6 |
| benzodiazepine | 1.9 | 3.4 | 2.3 | 16.2 | 21.1 | 17.6 | 3.7 | 8.0 | 4.7 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 3.7 | 5.4 | 4.2 | 106 |
| altri sonniferi e tranquillanti | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 14 |
| LSD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 2 |
| altri allucinogeni | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| sostanze volatili (per es., solventi) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2 |
| canapa | 3.7 | 1.3 | 3.0 | 19.4 | 25.4 | 21.0 | 9.8 | 16.0 | 11.2 | 46.7 | 51.0 | 47.4 | 11.8 | 7.7 | 10.6 | 269 |
| tabacco | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 16.2 | 18.3 | 16.8 | 9.8 | 8.0 | 9.3 | 11.9 | 5.9 | 10.9 | 14.5 | 15.3 | 14.7 | 372 |
| altra/e sostanza/e | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 11 |
| gioco patologico | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 19 |
| disturbi alimentari | 0.1 | 2.7 | 0.8 | 0.0 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 4.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 5.0 | 1.5 | 37 |
| altri problemi assimilabili a una dipendenza | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 17 |
| nessuno | 39.1 | 34.0 | 37.6 | 26.2 | 15.5 | 23.3 | 42.7 | 20.0 | 37.4 | 43.3 | 45.1 | 43.6 | 38.5 | 31.8 | 36.7 | 926 |
| N** | 1'185 | 476 | 1'661 | 191 | 71 | 262 | 82 | 25 | 107 | 261 | 51 | 312 | 1'822 | 704 | 2'526 | 2'526 |
| <i>dati mancanti</i> | <i>815</i> | <i>314</i> | <i>1'129</i> | <i>112</i> | <i>34</i> | <i>155</i> | <i>47</i> | <i>14</i> | <i>67</i> | <i>105</i> | <i>19</i> | <i>130</i> | <i>1'142</i> | <i>423</i> | <i>1'586</i> | <i>1'586</i> |

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T37 Frequenza delle ricadute, sostanza o comportamento implicato e durata delle ricadute nel corso dell'intervento, in rapporto al problema principale¹ (solamente pazienti) (2007)

| | Pazienti: problema principale ¹ | | | | | | | | | | | | Tutti i pazienti | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| | Alcol | | | Oppiacei | | | Cocaina e derivati | | | Canapa | | | Uomini | Donne | Totale | N |
| | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | |
| Frequenza delle ricadute* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nessuna | 60.2 | 45.0 | 56.1 | 25.5 | 25.0 | 25.4 | 49.0 | 28.6 | 44.4 | 68.8 | 50.0 | 66.2 | 57.1 | 44.1 | 53.8 | 741 |
| 1 volta | 9.5 | 12.0 | 10.2 | 13.6 | 10.7 | 13.0 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 8.0 | 11.1 | 8.5 | 10.2 | 11.3 | 10.4 | 144 |
| 2 volte | 6.4 | 8.1 | 6.8 | 10.9 | 3.6 | 9.4 | 16.3 | 14.3 | 15.9 | 8.9 | 5.6 | 8.5 | 7.6 | 7.9 | 7.7 | 106 |
| 3 o 4 volte | 11.5 | 19.8 | 13.7 | 13.6 | 14.3 | 13.8 | 12.2 | 14.3 | 12.7 | 7.1 | 22.2 | 9.2 | 11.1 | 18.4 | 13.0 | 179 |
| 5 volte o più | 12.5 | 15.1 | 13.2 | 36.4 | 46.4 | 38.4 | 8.2 | 28.6 | 12.7 | 7.1 | 11.1 | 7.7 | 14.0 | 18.4 | 15.1 | 208 |
| N** | 706 | 258 | 964 | 110 | 28 | 138 | 49 | 14 | 63 | 112 | 18 | 130 | 1'024 | 354 | 1'378 | 1'378 |
| <i>dati mancanti</i> | 1'294 | 532 | 1'826 | 193 | 77 | 279 | 80 | 25 | 111 | 254 | 52 | 312 | 1'940 | 773 | 2'734 | 2'734 |
| Sostanza/comportamento comparabile a una dipendenza al momento delle ricadute*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| alcol | 95.4 | 97.0 | 96.0 | 28.4 | 35.0 | 29.8 | 29.2 | 40.0 | 32.4 | 11.8 | 12.5 | 11.9 | 70.0 | 76.3 | 72.0 | 426 |
| cocktail (eroina e cocaina) | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 6.8 | 5.0 | 6.4 | 4.2 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 9 |
| oppiacei | 3.8 | 1.5 | 3.0 | 81.1 | 85.0 | 81.9 | 16.7 | 80.0 | 35.3 | 8.8 | 12.5 | 9.5 | 19.7 | 15.6 | 18.4 | 109 |
| cocaina e derivati | 3.8 | 0.7 | 2.8 | 33.8 | 30.0 | 33.0 | 66.7 | 60.0 | 64.7 | 5.9 | 0.0 | 4.8 | 13.3 | 7.5 | 11.5 | 68 |
| stimolanti | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 1.1 | 8.3 | 10.0 | 8.8 | 11.8 | 12.5 | 11.9 | 2.0 | 1.1 | 1.7 | 10 |
| medicamenti | 2.3 | 3.7 | 2.8 | 18.9 | 20.0 | 19.1 | 8.3 | 20.0 | 11.8 | 2.9 | 0.0 | 2.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 38 |
| allucinogeni | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| canapa | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1 |
| tabacco | 6.5 | 1.5 | 4.8 | 17.6 | 15.0 | 17.0 | 16.7 | 20.0 | 17.6 | 67.6 | 62.5 | 66.7 | 14.0 | 6.5 | 11.7 | 69 |
| sostanze volatili | 3.4 | 2.2 | 3.0 | 5.4 | 10.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 4.8 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 22 |
| altra/e sostanza/e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| gioco patologico | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 9 |
| disturbi alimentari | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.8 | 1.5 | 9 |
| altri problemi assimilabili a una dipendenza | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 3 |
| N** | 263 | 134 | 397 | 74 | 20 | 94 | 24 | 10 | 34 | 34 | 8 | 42 | 406 | 186 | 592 | 592 |
| <i>dati mancanti</i> | 18 | 8 | 26 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 33 | 12 | 45 | 45 |
| Durata delle ricadute**** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 a 2 giorni | 33.9 | 27.8 | 32.0 | 23.3 | 33.3 | 24.2 | 42.9 | 66.7 | 50.0 | 37.5 | 0.0 | 30.0 | 33.5 | 30.8 | 32.8 | 76 |
| 3 a 6 giorni | 33.1 | 18.5 | 28.5 | 23.3 | 0.0 | 21.2 | 14.3 | 0.0 | 10.0 | 62.5 | 0.0 | 50.0 | 31.7 | 15.4 | 27.2 | 63 |
| 7 a 10 giorni | 7.6 | 20.4 | 11.6 | 10.0 | 0.0 | 9.1 | 14.3 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0 | 10.0 | 7.8 | 18.5 | 10.8 | 25 |
| >10 giorni a 2 settimane | 2.5 | 7.4 | 4.1 | 3.3 | 0.0 | 3.0 | 14.3 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 6.2 | 3.9 | 9 |
| > 2 a 4 settimane | 11.9 | 11.1 | 11.6 | 13.3 | 33.3 | 15.2 | 0.0 | 33.3 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 12.3 | 11.2 | 26 |
| >4 a 6 settimane | 5.9 | 3.7 | 5.2 | 3.3 | 33.3 | 6.1 | 14.3 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0 | 10.0 | 5.4 | 7.7 | 6.0 | 14 |
| >6 a 8 settimane | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 1 |
| > 2 mesi | 5.1 | 11.1 | 7.0 | 20.0 | 0.0 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 9.2 | 7.8 | 18 |
| N** | 118 | 54 | 172 | 30 | 3 | 33 | 7 | 3 | 10 | 8 | 2 | 10 | 167 | 65 | 232 | 232 |
| <i>dati mancanti</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che hanno indicato una o più ricadute. Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

**** I risultati si basano solamente sui clienti che hanno indicato una o più ricadute. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

**T38 Frequenza del consumo di tabacco e numero di sigarette al giorno nel corso dei 30 ultimi giorni precedenti l'uscita, in rapporto al problema principale¹
(solamente pazienti) (2007)**

| | Pazienti: problema principale ¹ | | | | | | | | | | | | Tutti i pazienti | | | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| | Alcol | | | Oppiacei | | | Cocaina e derivati | | | Canapa | | | Uomini | Donne | Totale | N |
| | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| Frequenza del consumo di tabacco* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mai | 33.5 | 37.4 | 34.6 | 4.3 | 0.0 | 3.3 | 23.9 | 0.0 | 18.6 | 8.6 | 15.4 | 9.4 | 27.5 | 30.6 | 28.3 | 316 |
| 1 giorno alla settimana o meno | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 2.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 9 |
| 2 a 3 giorni alla settimana | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 3.3 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.0 | 11 |
| 4 a 6 giorni alla settimana | 2.2 | 0.9 | 1.8 | 2.2 | 3.3 | 2.5 | 2.2 | 0.0 | 1.7 | 2.2 | 0.0 | 1.9 | 2.1 | 1.0 | 1.8 | 20 |
| una volta al giorno | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 5 |
| più volte al giorno | 62.2 | 60.3 | 61.7 | 92.4 | 90.0 | 91.8 | 73.9 | 100.0 | 79.7 | 83.9 | 84.6 | 84.0 | 68.3 | 66.0 | 67.7 | 756 |
| N** | 558 | 214 | 772 | 92 | 30 | 122 | 46 | 13 | 59 | 93 | 13 | 106 | 823 | 294 | 1'117 | 1'117 |
| <i>dati mancanti</i> | 1'442 | 576 | 2'018 | 211 | 75 | 295 | 83 | 26 | 115 | 273 | 57 | 336 | 2'141 | 833 | 2'995 | 2'995 |
| Numero di sigarette al giorno*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 a 10 sigarette al giorno | 14.5 | 23.9 | 16.9 | 8.6 | 11.1 | 9.2 | 15.0 | 11.1 | 13.8 | 38.5 | 16.7 | 36.2 | 16.8 | 22.0 | 18.1 | 97 |
| 11 a 20 sigarette al giorno | 46.9 | 44.3 | 46.3 | 44.8 | 61.1 | 48.7 | 55.0 | 66.7 | 58.6 | 42.3 | 50.0 | 43.1 | 46.9 | 47.7 | 47.1 | 253 |
| 21 a 30 sigarette al giorno | 28.6 | 19.3 | 26.3 | 41.4 | 16.7 | 35.5 | 25.0 | 22.2 | 24.1 | 13.5 | 33.3 | 15.5 | 28.1 | 18.2 | 25.7 | 138 |
| 31 sigarette al giorno o più | 9.9 | 12.5 | 10.6 | 5.2 | 11.1 | 6.6 | 5.0 | 0.0 | 3.4 | 5.8 | 0.0 | 5.2 | 8.1 | 12.1 | 9.1 | 49 |
| N** | 262 | 88 | 350 | 58 | 18 | 76 | 20 | 9 | 29 | 52 | 6 | 58 | 405 | 132 | 537 | 537 |
| <i>dati mancanti</i> | 109 | 46 | 155 | 30 | 12 | 42 | 15 | 4 | 19 | 33 | 5 | 38 | 192 | 72 | 264 | 264 |

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che hanno indicato un consumo di tabacco. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T39 Obiettivo di consumo all'uscita e pronostico, in rapporto alla principale sostanza problematica¹ (solamente pazienti) (2007)

| | Pazienti: sostanza problematica ¹ | | | | | | | | | | | | Tutti i pazienti | | | |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| | Alcol | | | Oppiacei | | | Cocaina e derivati | | | Canapa | | | Uomini | Donne | Totale | N |
| | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| Obiettivo di consumo* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| astinenza definitiva | 36.6 | 39.3 | 37.3 | 60.9 | 60.0 | 60.7 | 68.9 | 68.8 | 68.3 | 41.7 | 38.5 | 42.0 | 40.9 | 42.8 | 41.6 | 728 |
| astinenza limitata nel tempo | 17.8 | 12.0 | 16.3 | 0.7 | 2.2 | 1.0 | 1.6 | 0.0 | 1.2 | 5.6 | 7.7 | 5.7 | 13.0 | 9.2 | 11.9 | 209 |
| consumo controllato | 32.4 | 32.5 | 32.4 | 15.9 | 15.6 | 15.9 | 16.4 | 18.8 | 15.9 | 27.8 | 26.9 | 27.6 | 29.9 | 29.7 | 29.7 | 521 |
| nessuna limitazione nel consumo previsto | 3.6 | 4.5 | 3.9 | 6.0 | 2.2 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 11.5 | 11.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 84 |
| nessuna decisione per il momento | 8.2 | 10.7 | 8.8 | 15.9 | 17.8 | 15.9 | 11.5 | 12.5 | 13.4 | 12.5 | 15.4 | 12.6 | 10.1 | 11.4 | 10.4 | 183 |
| altro | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 2.2 | 1.0 | 1.6 | 0.0 | 1.2 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 27 |
| N** | 883 | 308 | 1'191 | 151 | 45 | 201 | 61 | 16 | 82 | 144 | 26 | 174 | 1'301 | 437 | 1'752 | 1'752 |
| <i>dati mancanti</i> | 1'117 | 482 | 1'599 | 152 | 60 | 216 | 68 | 23 | 92 | 222 | 44 | 268 | 1'663 | 690 | 2'360 | 2'360 |
| Pronostico* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pronostico molto positivo | 13.0 | 12.6 | 12.9 | 9.3 | 6.0 | 8.6 | 11.1 | 5.3 | 9.8 | 16.7 | 19.0 | 16.9 | 12.9 | 11.8 | 12.6 | 233 |
| pronostico positivo | 45.8 | 40.8 | 44.5 | 31.4 | 24.0 | 29.7 | 52.4 | 36.8 | 48.8 | 46.2 | 57.1 | 47.5 | 44.6 | 40.6 | 43.6 | 803 |
| pronostico piuttosto sfavorevole | 28.6 | 33.3 | 29.8 | 45.9 | 52.0 | 47.3 | 30.2 | 42.1 | 32.9 | 28.8 | 23.8 | 28.2 | 30.6 | 34.5 | 31.6 | 582 |
| pronostico negativo | 12.6 | 13.2 | 12.8 | 13.4 | 18.0 | 14.4 | 6.3 | 15.8 | 8.5 | 8.3 | 0.0 | 7.3 | 11.9 | 13.1 | 12.2 | 225 |
| N** | 920 | 333 | 1'253 | 172 | 50 | 222 | 63 | 19 | 82 | 156 | 21 | 177 | 1'377 | 466 | 1'843 | 1'843 |
| <i>dati mancanti</i> | 1'080 | 457 | 1'537 | 131 | 55 | 195 | 66 | 20 | 92 | 210 | 49 | 265 | 1'587 | 661 | 2'269 | 2'269 |

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto