

Intervento ambulatoriale nelle problematiche di dipendenza

Risultati dell'indagine presso gli utenti 2008

Raccolta di tabelle statistiche

Mariana Astudillo, Etienne Maffli

Ringraziamenti

Ringraziamo vivamente sia i collaboratori e le collaboratrici che i pazienti delle istituzioni che hanno partecipato e che hanno gentilmente accettato di riempire i questionari del monitoraggio *act-info*. Ringraziamo ugualmente i collaboratori e le collaboratrici dei servizi di consultazione che hanno effettuato i lavori di logistica e di registrazione dei dati. I nostri migliori ringraziamenti vanno anche all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) che finanzia e coordina l'insieme della rete *act-info*. Grazie anche a Edith Bacher e Christiane Gmel per la grafica e l'impaginazione di questo rapporto come pure a Marina Delgrande Jordan per la sua preziosa collaborazione nell'elaborazione delle procedure d'analisi.

Complementi d'informazione: Etienne Maffli, tel. 021 321 29 54, fax 021 321 29 40,
e-mail emaffli@sfa-ispa.ch

Realizzazione: Mariana Astudillo & Etienne Maffli, Istituto svizzero di prevenzione dell'alcolismo e altre tossicomanie (ISPA)

Diffusione: Libreria ISPA, casella postale 870, 1001 Losanna,
tel. 021 321 29 35, fax 021 321 29 40,
e-mail librairie@sfa-ispa.ch

Prezzo: Fr. 10.–

Lingua del testo originale : francese

Grafica/impaginazione: ISPA

Copyright: © ISPA-SFA Losanna 2009

Citazione raccomandata: Astudillo, M & Maffli, E. (2009). Intervento ambulatoriale nelle problematiche di dipendenza. Risultati dell'indagine presso gli utenti 2008 – Raccolta di tabelle statistiche. Losanna: Istituto svizzero di prevenzione dell'alcolismo e altre tossicomanie.

Indice

act-info – Information network on addiction care and therapy in Switzerland

act-info nel settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale nel campo delle dipendenze

ENTRATA

- T1 Sesso e età dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2008)
- T2 Stato civile e nazionalità dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2008)
- T3 Grado di urbanizzazione del domicilio, tipo di nucleo familiare e situazione di domicilio dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2008)
- T4 Tipo di relazione di coppia, numero di figli, e numero di figli che vivono nel nucleo familiare all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2008)
- T5 Più alta formazione portata a termine e statuto professionale dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2008)
- T6 Fonte di reddito principale e attività dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2008)
- T7 Reddito mensile netto e debiti dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2008)
- T8 Incarcerazione o detenzione preventiva prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2008)
- T9 Istanza d'invio principale e secondaria dei pazienti (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2008)
- T10 Tipo di aiuto atteso dai pazienti (in rapporto al problema principale) e dai parenti o conoscenti all'entrata e base legale dell'intervento (2008)
- T11 Trattamenti/accompagnamenti dei pazienti prima dell'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2008)
- T12 Trattamento sostitutivo e altri interventi all'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2008)
- T13a Entrata in seguito a una cura di disintossicazione, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2008)
- T13b Frequenza delle cure di disintossicazione senza aiuto professionale prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2008)
- T14 Problema principale all'entrata (solamente pazienti) (2008)
- T15.1a Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata (2008), uomini

- T15.1b Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata (2008), uomini
- T15.2a Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata (2008), donne
- T15.2b Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata (2008), donne
- T15.3a Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata (2008), uomini e donne
- T15.3b Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata (2008), uomini e donne
- T16.1a Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2008), uomini
- T16.1b Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2008), donne
- T16.1c Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2008), uomini e donne
- T16.2a Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2008), uomini
- T16.2b Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2008), donne
- T16.2c Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2008), uomini e donne
- T17 Modo di amministrazione della principale sostanza problematica nel corso dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata (2008)
- T18 Prevalenza a vita delle iniezioni, nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata, scambio di materiale d'iniezione nel corso degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata e età all'epoca della prima iniezione, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2008)
- T19.1a Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2008), uomini
- T19.1b Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2008), donne
- T19.1c Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2008), uomini e donne
- T19.2a Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2008), uomini
- T19.2b Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2008), donne

- T19.2c Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2008), uomini e donne
- T20 Frequenza del consumo di alcol, numero di "bicchieri standard" al giorno e frequenza di forti consumi di alcol prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2008)
- T21 Frequenza del consumo di tabacco e numero di sigarette al giorno nel corso dei 30 ultimi giorni prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2008)
- T22a Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2008), uomini
- T22b Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2008), donne
- T22c Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2008), uomini e donne
- T23a Problemi psichici nel corso della vita (2008), uomini
- T23b Problemi psichici nel corso della vita (2008), donne
- T23c Problemi psichici nel corso della vita (2008), uomini e donne
- T24 Parenti/conoscenti: legame tra l'utente e la persona sintomatica (2008)
- T25 Parenti/conoscenti: problema principale e altri problemi della persona sintomatica (2008)
- T26 Parenti/conoscenti: Problemi della persona di contatto legati ai problemi della persona sintomatica (2008)

USCITA

- T27 Sesso e età dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2008)
- T28 Stato civile e grado di urbanizzazione del domicilio dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2008)
- T29 Tipo di nucleo familiare, situazione di domicilio e tipo di relazione di coppia dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2008)
- T30 Più alta formazione portata a termine, fonte di reddito principale e attività principale dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2008)
- T31 Statuto professionale e reddito mensile netto dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2008)
- T32a Ragione principale della fine del trattamento/accompagnamento dei pazienti (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2008)
- T32b Destinazione dei trasferimenti dei pazienti (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2008)
- T32c Causa di decesso dei pazienti (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2008)

- T33 Durata dell'intervento sui pazienti (in rapporto al problema principale) e sui parenti o conoscenti (2008)
- T34 Trattamento sostitutivo durante e immediatamente dopo l'intervento, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2008)
- T35 Postassistenza prevista e preparata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2008)
- T36 Problemi di dipendenza all'uscita, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2008)
- T37 Frequenza delle ricadute, sostanza o comportamento implicato e durata delle ricadute nel corso dell'intervento, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2008)
- T38 Frequenza del consumo di tabacco e numero di sigarette al giorno nel corso dei 30 giorni precedenti l'uscita, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2008)
- T39 Obiettivo di consumo all'uscita e pronostico, in rapporto alla principale sostanza problematica (solamente pazienti) (2008)

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland

La Rete di monitoraggio degli interventi e dei trattamenti delle dipendenze in Svizzera (*act-info*) raccoglie nel suo seno i cinque sistemi statistici che erano realizzati in materia di intervento e di trattamento della dipendenza in Svizzera. Tali sistemi sono:

- SAMBAD (Statistica del settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale in materia di dipendenza)
- Residalc (Statistica dei trattamenti residenziali della dipendenza all'alcol in Svizzera)
- FOS (Statistica della Lega per la valutazione dei trattamenti residenziali della tossicomania)
- HegeBe (Statistica dei trattamenti con prescrizione di eroina)
- Metadone (Statistica nazionale dei trattamenti con prescrizione di metadone)

Dal 2004 queste cinque statistiche dispongono di strumenti armonizzati e ottimizzati. I dati comuni sono integrati in una banca dati centralizzata che permette di procedere ad analisi concernenti l'insieme dei settori. L'adozione degli standard europei (Treatment Demande Indicator) permette di garantire anche la comparabilità dei dati al livello internazionale.

act-info è finanziato e coordinato dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e l'analisi e la raccolta dei dati nei differenti campi dell'intervento è affidata all'Istituto di medicina sociale e preventiva dell'Università di Berna (ISPM), all'Istituto svizzero di prevenzione dell'alcolismo e altre tossicomanie a Losanna (ISPA) e all'Istituto di ricerca sulla salute pubblica e sulle dipendenze affiliato all'Università di Zurigo (ISGF).

act-info nel settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale in materia di dipendenza (SAMBAD)

Gli strumenti di monitoraggio *act-info* sono stati introdotti a partire dal 2004 nel settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale in materia di dipendenza e sostituiscono i vecchi questionari in vigore dal 1994. Solo alcuni servizi hanno ancora utilizzato i vecchi strumenti per rilevare i dati del 2008. La realizzazione di *act-info* in questo settore è affidata all'Istituto svizzero di prevenzione dell'alcolismo e altre tossicomanie (ISPA).

La statistica *act-info* SAMBAD dà una visione dell'utenza e delle attività di aiuto ambulatoriale in materia di dipendenza in Svizzera. I dati sono raccolti all'inizio e alla fine dell'intervento. Le informazioni rilevate al momento dell'entrata permettono di valutare particolarmente le caratteristiche socio-demografiche degli utenti, la eventuale presenza di trattamenti precedenti, le modalità di consumo e la presenza di problemi psicosociali precedenti l'intervento. Le informazioni finali rilevate al termine dell'intervento evidenziano particolarmente le caratteristiche socio-demografiche dell'utenza in quel preciso momento, le misure prese dalle persone curanti durante la presa in carico e le circostanze della fine di quest'ultima.

Nel 2008, 79 tra le 223 istituzioni registrate nel settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale in materia di dipendenza hanno partecipato al monitoraggio *act-info*. Queste istituzioni sono sia servizi deputati alla consultazione specialistica dei problemi inerenti all'alcol e/o alle droghe illegali, sia servizi polivalenti offrenti ugualmente un'aiuto per i problemi di dipendenza.

Qualche spiegazione riguardo alle tabelle

La presente statistica descrittiva dei dati dell'indagine act-info presso gli utenti del settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale in materia di dipendenza si basa su due tipi di tabelle:

- quando la domanda contiene delle categorie di risposte predefinite o ricodificate in parti distinte (per esempio « stato civile » o « età »), la tabella indica le percentuali delle differenti categorie di risposte
- quando la domanda non contiene delle categorie predefinite, ma richiede un valore numerico (per esempio « età all'inizio del consumo problematico »), la tabella presenta dei parametri di posizione (media, mediana) e dei parametri di dispersione (deviazione standard, 1° quartile, 3° quartile)

La maggior parte delle tabelle presenta i risultati in maniera distinta per i sottogruppi di pazienti che hanno menzionato l'**alcol**, un **oppiaceo** (eroina particolarmente), la **cocaina** (e derivati) o la **canapa** come problema principale al momento dell'entrata. I **parenti o conoscenti** che consultano per i problemi di un terzo sono ugualmente oggetto di analisi separate per gli aspetti socio-demografici. Invece, gli utenti (poco numerosi) che hanno menzionato altre sostanze come problema principale (per esempio un stimolante o le sostanze volatili) o un problema di dipendenza non inerente a una sostanza (per esempio gioco patologico), non sono differenziati nei risultati (eccetto nei temi direttamente inerenti ai modi di consumo o alle forme di comportamenti additivi non inerenti alle sostanze). Queste persone sono tuttavia incluse nelle analisi relative all'insieme degli interventi che figurano nei blocchi a destra delle tabelle rispettive. Tutte le analisi sono effettuate separatamente per gli uomini, per le donne e per i sessi riuniti (le colonne « Totale » comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è conosciuto).

Solo le risposte valide sono considerate nelle analisi. Cioè, le risposte « non noto » e le informazioni mancanti (missings) sono escluse dalle analisi. Il numero di risposte valide **N** rappresenta il numero esatto di casi sui quali sono calcolati le percentuali o altri parametri; esso viene indicato per ogni gruppo o sottogruppo. In basso alla tabella viene anche indicato il numero corrispondente di dati mancanti. La presenza di numerosi dati mancanti costringe a interpretare i risultati con particolare prudenza.

Le note in basso alla tabella danno informazioni sulle eventuali particolarità dei gruppi di riferimento e sul tipo di domanda. Quando sono possibili più risposte a una stessa domanda (per esempio nelle tabelle del tema T19, « altri problemi di dipendenza ») le percentuali ottenute non si possono addizionare.

T1 Sesso e età dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2008)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Sesso*																			
uomini			70.1			72.2			74.3			83.6			23.9			63.9	4'481
donne			29.9			27.8			25.7			16.4			76.1			36.1	2'533
nesso non noto			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	0
N**	2'548	1'085	3'633	496	191	687	248	86	334	642	126	768	268	852	1'120	4'481	2'533	7'014	7'014
Età (in anni)*																			
fino a 14	0.2	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	8.7	5.6	1.1	0.5	0.6	1.0	0.9	1.0	68
15-19	2.7	3.0	2.8	2.6	13.6	5.7	4.1	18.6	7.9	59.8	46.8	57.6	6.9	3.3	4.2	11.8	7.6	10.3	720
20-24	5.7	3.1	4.9	12.7	22.5	15.5	20.0	27.9	22.1	15.0	15.1	15.0	4.2	5.2	5.0	8.9	7.6	8.4	587
25-29	7.8	4.9	6.9	18.6	14.7	17.5	26.1	14.0	23.0	8.9	11.9	9.4	3.8	7.1	6.3	10.2	7.4	9.2	645
30-34	9.6	8.0	9.1	19.8	18.3	19.4	20.4	18.6	19.9	4.2	7.1	4.7	5.0	8.4	7.6	10.3	9.5	10.0	699
35-39	13.4	12.2	13.1	20.0	15.2	18.7	13.5	8.1	12.1	3.1	4.0	3.3	8.8	11.4	10.7	12.4	11.2	12.0	837
40-44	15.6	14.7	15.3	15.4	11.5	14.3	8.6	9.3	8.8	2.5	2.4	2.5	12.6	17.2	16.1	12.6	14.1	13.2	920
45-49	14.8	15.7	15.1	8.5	3.1	7.0	5.7	2.3	4.8	1.4	3.2	1.7	19.1	15.0	16.0	11.8	12.9	12.2	851
50-54	11.0	14.1	11.9	2.0	1.0	1.7	1.6	1.2	1.5	0.2	0.0	0.1	11.8	11.1	11.3	7.8	10.5	8.7	610
55-59	8.9	11.8	9.7	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	8.2	8.7	5.9	8.3	6.8	474
60-64	5.8	6.0	5.9	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	6.4	6.6	3.9	5.1	4.3	301
65-69	2.7	3.9	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	3.2	3.5	2.0	2.9	2.3	159
70-74	1.3	1.8	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	2.1	2.4	1.0	1.5	1.2	82
75 e più	0.6	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.1	1.1	0.9	1.0	0.4	0.6	0.5	32
N**	2'540	1'083	3'623	495	191	686	245	86	331	641	126	767	262	845	1'107	4'461	2'524	6'985	6'985
<i>dati mancanti</i>	8	2	10	1	0	1	3	0	3	1	0	1	6	7	13	20	9	29	29
Età																			
media	43.4	45.6	44.1	34.2	30.3	33.1	31.2	28.3	30.4	21.0	22.9	21.3	45.7	44.1	44.5	38.1	41.5	39.3	
deviazione standard	12.8	12.6	12.7	8.4	8.6	8.7	7.9	8.8	8.2	7.3	11.9	8.2	14.8	13.5	13.8	14.2	14.4	14.4	
1° quartile	34.5	37.9	35.5	27.5	23.3	26.0	25.5	22.0	24.0	16.5	16.6	16.5	38.0	35.2	36.0	26.5	30.6	27.8	
mediana	43.5	46.2	44.1	33.8	29.6	33.0	30.0	26.2	29.3	17.9	18.2	17.9	47.0	44.0	44.9	38.1	42.0	39.6	
3° quartile	52.1	54.4	52.9	40.5	37.3	39.4	35.69	34.5	35.5	23.0	26.2	23.6	55.3	53.0	53.7	48.3	51.5	49.3	
N**	2'540	1'083	3'623	495	191	686	245	86	331	641	126	767	262	845	1'107	4'461	2'524	6'985	
<i>dati mancanti</i>	8	2	10	1	0	1	3	0	3	1	0	1	6	7	13	20	9	29	

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T2 Stato civile e nazionalità dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2008)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Stato civile*																			
celibe/nubile	42.0	30.6	38.6	74.3	72.7	73.8	74.6	72.0	73.9	94.7	87.8	93.6	26.4	23.4	24.1	55.0	37.8	48.8	3'291
sposato-a	31.3	30.5	31.1	11.9	11.8	11.9	16.0	9.8	14.4	2.9	6.5	3.5	62.0	53.4	55.4	25.8	33.9	28.8	1'939
separato-a	5.5	7.0	5.9	4.0	4.3	4.1	1.2	3.7	1.8	1.1	3.3	1.5	0.8	4.5	3.6	4.0	5.3	4.5	303
divorziato-a	19.4	26.0	21.4	9.0	8.6	8.9	7.4	12.2	8.6	1.3	2.4	1.5	7.8	14.3	12.7	13.6	18.3	15.3	1'031
vedovo-a	1.8	5.6	2.9	0.2	1.6	0.6	0.0	2.4	0.6	0.0	0.0	0.0	2.3	3.2	3.0	1.2	4.0	2.2	149
unione registrata	0.1	0.3	0.1	0.6	1.1	0.8	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.8	1.2	1.1	0.3	0.7	0.4	30
N**	2'443	1'048	3'491	478	187	665	244	82	326	623	123	746	258	817	1'075	4'306	2'437	6'743	6'743
<i>dati mancanti</i>	105	37	142	18	4	22	4	4	8	19	3	22	10	35	45	175	96	271	271
Nazionalità*																			
CH	79.5	88.7	82.2	72.3	84.7	75.7	72.1	84.1	75.2	84.2	91.7	85.4	90.1	86.4	87.3	79.1	87.4	82.1	5'553
EU	12.7	7.5	11.2	18.6	14.3	17.4	16.0	8.5	14.1	8.5	5.8	8.0	6.3	8.3	7.9	12.7	8.4	11.1	751
altra	7.8	3.8	6.6	9.1	1.1	6.8	11.9	7.3	10.7	7.3	2.5	6.6	3.6	5.3	4.9	8.2	4.3	6.8	461
N**	2'454	1'049	3'503	483	189	672	244	82	326	627	121	748	252	817	1'069	4'322	2'443	6'765	6'765
<i>dati mancanti</i>	94	36	130	13	2	15	4	4	8	15	5	20	16	35	51	159	90	249	249

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T3 Grado di urbanizzazione del domicilio, tipo di nucleo familiare e situazione di domicilio dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2008)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Grado di urbanizzazione*																			
grandi centri urbani	8.2	9.9	8.7	0.0	0.0	0.0	1.0	1.4	1.1	0.0	0.0	0.0	6.6	9.6	8.9	5.2	7.6	6.1	396
periferia dei grandi centri	11.1	11.9	11.3	0.9	2.3	1.3	2.9	1.4	2.5	3.1	2.6	3.0	10.5	8.3	8.8	7.9	8.6	8.1	527
città di media importanza	17.0	19.1	17.6	27.9	23.3	26.6	26.7	32.9	28.3	29.1	21.4	27.8	19.8	21.7	21.2	21.1	21.3	21.2	1'372
piccole città	35.5	32.7	34.7	48.6	43.8	47.2	43.2	38.6	42.0	30.8	35.0	31.6	30.4	31.5	31.2	36.8	33.6	35.6	2'307
campagne	28.1	26.3	27.6	22.6	30.7	24.9	26.2	25.7	26.1	36.9	41.0	37.6	32.7	29.0	29.8	29.0	28.9	29.0	1'876
N**	2'360	1'006	3'366	430	176	606	206	70	276	577	117	694	257	822	1'079	4'098	2'380	6'478	6'478
<i>dati mancanti</i>	188	79	267	66	15	81	42	16	58	65	9	74	11	30	41	383	153	536	536
Tipo di nucleo familiare (30 ultimi giorni)*																			
da solo-a	39.8	34.3	38.2	40.8	23.6	36.3	35.8	23.9	32.7	12.7	18.2	13.6	13.2	13.3	13.3	33.4	25.3	30.5	1'704
con i genitori/un genitore	8.2	4.6	7.1	16.7	16.9	16.8	21.9	22.5	22.1	66.3	47.3	63.2	14.8	5.4	7.6	20.3	10.1	16.6	929
con figlio-a-i (senza partner)	1.9	13.0	5.3	0.5	10.1	3.0	1.0	7.0	2.6	0.7	8.2	1.9	3.3	12.5	10.4	1.5	11.9	5.2	291
con un-a partner (senza figli)	22.0	23.7	22.5	13.6	25.0	16.6	18.9	18.3	18.8	3.9	6.4	4.3	25.8	25.2	25.3	18.1	22.3	19.6	1'093
con un-a partner e figlio-a-i	18.6	16.2	17.9	9.5	10.8	9.8	14.4	5.6	12.1	2.0	4.5	2.4	40.7	40.9	40.8	15.9	22.4	18.2	1'018
con altri parenti/familiari	1.3	1.5	1.4	1.2	1.4	1.3	1.0	4.2	1.8	2.1	1.8	2.1	1.1	0.6	0.7	1.3	1.5	1.4	76
con amici (comunità abitativa)	2.2	1.5	2.0	3.9	2.0	3.4	1.5	8.5	3.3	2.3	2.7	2.4	0.5	1.3	1.1	2.4	1.9	2.2	123
altro	5.9	5.1	5.7	13.8	10.1	12.9	5.5	9.9	6.6	10.0	10.9	10.1	0.5	0.8	0.7	7.1	4.7	6.3	349
N**	2'014	874	2'888	412	148	560	201	71	272	561	110	671	182	624	806	3'603	1'980	5'583	5'583
<i>dati mancanti</i>	534	211	745	84	43	127	47	15	62	81	16	97	86	228	314	878	553	1'431	1'431
Situazione di domicilio (30 ultimi giorni)*																			
domicilio fisso	93.9	95.2	94.3	82.0	80.0	81.5	88.3	90.4	88.8	91.2	90.1	91.0	97.0	97.4	97.3	92.1	94.2	92.9	5'319
senza domicilio fisso	3.8	2.8	3.5	12.2	14.7	12.8	9.3	5.5	8.3	4.5	6.3	4.8	2.5	2.6	2.6	5.1	4.0	4.7	269
istituzione	2.2	2.0	2.2	5.8	5.3	5.7	2.4	4.1	2.9	4.3	3.6	4.2	0.5	0.0	0.1	2.8	1.8	2.4	140
N**	2'093	889	2'982	411	150	561	205	73	278	557	111	668	197	656	853	3'698	2'030	5'728	5'728
<i>dati mancanti</i>	455	196	651	85	41	126	43	13	56	85	15	100	71	196	267	783	503	1286	1'286

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T4 Tipo di relazione di coppia, numero di figli, di figli vivendo nel nucleo familiare dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2008)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
 Tipo di relazione di coppia*																			
senza partner, sola-a	33.3	34.5	33.6	46.5	25.5	40.6	35.8	39.7	36.9	65.8	60.0	64.8	14.6	16.4	16.0	38.3	30.1	35.3	1'694
relazione-i saltuaria-e	4.3	4.1	4.3	8.1	10.2	8.7	7.4	11.8	8.6	10.1	10.6	10.2	1.8	1.9	1.9	5.5	4.4	5.1	244
relazione fissa, vivendo separato-a	13.6	16.5	14.5	15.3	26.3	18.4	15.9	23.5	18.0	15.9	15.3	15.8	9.1	11.1	10.7	14.1	15.7	14.7	703
relazione fissa, vivendo insieme	48.8	44.9	47.6	30.1	38.0	32.3	40.9	25.0	36.5	8.2	14.1	9.2	74.4	70.6	71.4	42.2	49.8	45.0	2'157
N**	1'749	780	2'529	346	137	483	176	68	244	415	85	500	164	574	738	3'036	1'762	4'798	4'798
<i>dati mancanti</i>	799	305	1'104	150	54	204	72	18	90	227	41	268	104	278	382	1'445	771	2'216	2'216
 Numero di figli*																			
nessuno	45.7	36.2	42.7	69.2	60.3	66.7	65.3	60.0	63.9	94.7	81.9	92.6	31.6	26.1	27.3	56.9	39.1	50.4	2'814
1 figlio	18.0	22.3	19.3	17.5	23.1	19.1	20.7	22.9	21.3	3.1	7.6	3.9	15.3	17.4	17.0	15.3	19.9	17.0	950
2 figli	25.8	27.9	26.4	10.3	10.3	10.3	10.4	14.3	11.4	1.4	8.6	2.6	31.1	35.4	34.5	19.3	26.5	22.0	1'228
3 figli o più	10.6	13.6	11.6	3.0	6.4	4.0	3.6	2.9	3.4	0.8	1.9	1.0	21.9	21.1	21.3	8.4	14.5	10.7	596
N**	1'988	903	2'891	399	156	555	193	70	263	514	105	619	196	683	879	3'523	2'065	5'588	5'588
<i>dati mancanti</i>	560	182	742	97	35	132	55	16	71	128	21	149	72	169	241	958	468	1'426	1'426
 Numero dei figli vivendo nel nucleo familiare*																			
nessuno	74.2	63.8	70.9	85.0	66.7	79.7	78.9	72.6	77.1	70.9	62.4	69.3	45.2	41.7	42.5	73.3	56.8	67.0	3'375
1 figlio	11.7	19.4	14.1	6.8	22.9	11.5	11.8	17.7	13.5	6.8	10.9	7.6	21.3	20.8	20.9	11.0	19.6	14.3	718
2 figli	10.1	13.0	11.0	6.5	6.3	6.4	6.8	8.1	7.2	14.3	19.8	15.3	25.0	26.4	26.1	11.1	16.9	13.3	671
3 figli o più	4.1	3.9	4.0	1.7	4.2	2.4	2.5	1.6	2.2	7.9	6.9	7.8	8.5	11.0	10.5	4.6	6.7	5.4	273
N**	1'737	803	2'540	353	144	497	161	62	223	453	101	554	188	662	850	3'122	1'915	5'037	5'037
<i>dati mancanti</i>	811	282	1'093	143	47	190	87	24	111	189	25	214	80	190	270	1'359	618	1'977	1'977

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T5 Più alta formazione portata a termine e statuto professionale dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2008)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Più alta formazione portata a termine*																			
nessuna formazione terminata	3.6	6.7	4.5	5.4	8.2	6.1	6.5	4.4	6.0	20.5	17.4	20.0	4.3	4.0	4.1	7.1	6.7	7.0	366
scuola dell'obbligo	14.2	16.0	14.8	29.4	42.5	32.8	19.5	42.6	25.1	54.0	46.1	52.7	17.7	13.9	14.9	23.7	21.7	23.0	1'205
scolarità complementare	3.7	6.8	4.6	4.0	4.8	4.2	3.7	4.4	3.9	4.3	6.1	4.6	0.6	4.8	3.8	3.7	5.8	4.4	228
apprendistato/ scuola profes.	61.3	54.4	59.3	55.4	34.2	50.0	59.5	39.7	54.8	17.8	23.5	18.7	44.5	54.7	52.1	51.4	49.0	50.6	2'651
liceo/diploma	3.2	3.8	3.4	1.4	6.2	2.6	1.9	1.5	1.8	1.6	4.3	2.0	6.7	5.9	6.1	3.1	5.2	3.8	198
magistrale, scuola pedagogica	0.9	2.0	1.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.3	1.8	4.0	3.4	0.7	2.3	1.2	63
form. profession. superiore	6.0	5.2	5.7	1.4	1.4	1.4	3.7	7.4	4.6	1.2	0.9	1.2	15.2	6.7	8.9	4.9	5.0	5.0	260
scuola profession. superiore	0.9	1.5	1.1	1.2	0.0	0.9	1.9	0.0	1.4	0.3	0.0	0.3	1.2	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	49
alta scuola specializzata	2.4	1.1	2.0	0.2	0.7	0.3	1.9	0.0	1.4	0.2	0.0	0.1	3.0	2.3	2.5	1.8	1.2	1.6	84
università, politecnico	3.7	2.5	3.4	1.4	2.1	1.6	1.4	0.0	1.1	0.2	0.0	0.1	4.9	2.7	3.3	2.7	2.2	2.6	135
N**	1'909	794	2'703	428	146	574	215	68	283	580	115	695	164	475	639	3'505	1'734	5'239	5'239
<i>dati mancanti</i>	639	291	930	68	45	113	33	18	51	62	11	73	104	377	481	976	799	1'775	1'775
Statuto professionale*																			
senza attività professionale	34.1	49.2	38.5	55.7	63.9	58.0	31.0	52.8	36.2	22.3	15.6	21.4	17.4	26.5	24.3	34.5	43.3	37.4	1'058
apprendista, praticante	2.3	1.2	2.0	2.4	6.2	3.5	0.0	11.1	2.6	22.3	9.4	20.5	1.4	1.8	1.7	4.5	3.0	4.0	114
manovale, operaio-a ausiliare	3.9	3.7	3.8	6.1	3.1	5.2	3.4	0.0	2.6	2.0	3.1	2.2	0.0	2.3	1.7	3.8	3.2	3.6	102
operaio-a con formaz. pratica	7.6	5.1	6.9	11.8	9.3	11.1	7.8	5.6	7.2	2.5	9.4	3.5	4.3	6.4	5.9	7.8	6.0	7.2	203
oper. con formaz. certif. (AFC)	15.8	6.4	13.0	11.0	6.2	9.6	25.9	0.0	19.7	13.2	9.4	12.7	13.0	9.1	10.1	15.3	7.1	12.5	355
caposquadra	2.3	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	3.9	0.5	3.1	0.9	0.0	0.0	0.0	1.8	0.1	1.3	36
impiegato-a non qualificato-a	10.6	21.0	13.7	5.3	7.2	5.8	7.8	22.2	11.2	5.6	6.3	5.7	15.9	23.7	21.9	9.7	19.8	13.0	369
impieg. qualif., quadro medio	9.2	7.2	8.6	3.7	0.0	2.6	5.2	2.8	4.6	0.5	3.1	0.9	18.8	15.5	16.3	7.3	8.0	7.6	214
imp. funz. dirett., quadr. sup.	3.8	0.2	2.7	0.4	1.0	0.6	1.7	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	8.7	1.8	3.5	3.0	0.6	2.2	63
indipendente	8.3	3.7	7.0	0.8	1.0	0.9	7.8	0.0	5.9	1.0	0.0	0.9	15.9	7.8	9.7	6.6	4.2	5.8	164
scolaro-a, studente	1.2	1.4	1.3	1.2	2.1	1.5	2.6	5.6	3.3	29.9	40.6	31.4	4.3	3.2	3.5	4.9	3.9	4.6	129
altro statuto	0.8	0.8	0.8	1.6	0.0	1.2	1.7	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.4	0.8	0.9	0.8	23
N**	1'151	486	1'637	246	97	343	116	36	152	197	32	229	69	219	288	1'895	935	2'830	2'830
<i>dati mancanti</i>	1'397	599	1'996	250	94	344	132	50	182	445	94	539	199	633	832	2'586	1'598	4'184	4'184

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T6 Fonte di reddito principale e attività dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2008)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Fonte di reddito principale (nel corso dei 30 ultimi giorni)*																			
reddito da lavoro	59.4	40.2	53.7	32.2	23.2	29.7	60.1	40.3	55.3	25.0	27.8	25.4	69.7	57.8	60.8	51.5	44.4	49.0	2'896
risparmi	1.4	1.4	1.4	0.7	0.0	0.5	1.0	1.5	1.1	1.4	0.9	1.3	0.9	0.8	0.8	1.3	1.0	1.2	68
rendita (AVS/AI, ecc.)	14.8	16.7	15.4	11.8	14.6	12.6	9.1	4.5	8.0	3.6	5.2	3.9	14.0	11.7	12.3	12.3	13.9	12.9	760
assistenza/previdenza sociale	13.9	16.3	14.6	35.2	39.0	36.2	13.5	28.4	17.1	9.9	13.0	10.5	2.3	2.9	2.7	14.7	13.4	14.3	844
assicurazione disoccupazione	5.4	5.2	5.3	9.0	6.1	8.2	5.8	6.0	5.8	2.2	2.6	2.2	1.8	1.2	1.4	5.3	3.5	4.6	274
sostegno del/della partner	0.9	15.3	5.2	1.6	6.7	3.0	1.0	7.5	2.5	0.5	3.5	1.0	1.4	20.0	15.4	1.0	14.8	5.8	345
sosteg. genitori/familiari/amici	2.9	3.2	3.0	5.1	8.5	6.0	6.3	7.5	6.5	55.3	46.1	53.7	9.5	4.8	6.0	12.1	7.9	10.6	628
spacciando/tagliando	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	1.4	0.0	1.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	8
altre entrate illegali	0.1	0.1	0.1	1.2	0.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	10
prostituzione	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
altra-e	1.2	1.4	1.2	2.5	0.6	2.0	1.9	4.5	2.5	1.8	0.9	1.6	0.5	0.8	0.7	1.5	1.1	1.3	79
N**	2'152	902	3'054	432	164	596	208	67	275	553	115	668	221	664	885	3'827	2'086	5'913	5'913
<i>dati mancanti</i>	396	183	579	64	27	91	40	19	59	89	11	100	47	188	235	654	447	1'101	1'101
Attività principale (nel corso dei 30 ultimi giorni)*																			
att. a tempo pieno (70% o più)	52.7	25.2	44.6	27.3	16.6	24.4	53.0	31.3	47.5	20.9	18.5	20.5	68.0	37.9	45.5	45.3	28.8	39.7	2'391
attività a tempo parziale	4.7	18.8	8.9	5.7	10.7	7.1	5.1	6.3	5.4	2.1	8.4	3.2	3.0	27.7	21.5	4.3	19.1	9.4	564
varie attività occas.	1.5	1.0	1.4	1.3	2.4	1.6	2.1	6.3	3.2	1.0	1.7	1.1	0.5	1.2	1.0	1.4	1.4	1.4	86
in formazione	3.5	3.1	3.4	2.4	3.6	2.7	3.4	8.8	4.7	54.2	47.9	53.2	7.6	6.2	6.5	12.0	8.2	10.7	644
inattivo sul mercat. del lavoro	18.1	30.3	21.7	22.9	32.0	25.3	16.9	21.3	18.0	6.9	9.2	7.3	13.7	22.2	20.1	16.5	26.0	19.7	1'189
disoccup., ricerc. di un lavoro	12.7	14.8	13.3	25.3	22.5	24.5	12.3	15.0	13.0	8.2	3.4	7.4	5.6	2.4	3.2	13.0	10.1	12.0	724
disoccup., lav. futuro garantito	0.4	0.1	0.3	0.4	0.6	0.5	0.8	0.0	0.6	0.5	0.0	0.4	0.0	0.2	0.1	0.4	0.1	0.3	19
altra	6.5	6.8	6.6	14.7	11.8	13.9	6.4	11.3	7.6	6.1	10.9	6.9	1.5	2.2	2.0	7.1	6.2	6.8	409
N**	2'213	928	3'141	455	169	624	236	80	316	607	119	726	197	585	782	3'970	2'056	6'026	6'026
<i>dati mancanti</i>	335	157	492	41	22	63	12	6	18	35	7	42	71	267	338	511	477	988	988

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T7 Reddito mensile netto e debiti dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2008)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Reddito mensile netto (6 ultimi mesi)*																			
nessun reddito	21.7	39.5	26.7	32.6	28.3	31.6	29.4	30.0	29.6	45.5	50.0	46.2	23.5	16.5	17.7	26.5	33.1	28.4	440
fino a 1000 fr.	5.6	3.3	4.9	9.2	13.2	10.1	3.9	15.0	7.0	29.8	18.2	28.0	5.9	5.1	5.2	8.9	6.9	8.3	129
da 1001 a 2000 fr.	8.3	6.2	7.7	13.6	20.8	15.2	7.8	10.0	8.5	9.1	9.1	9.1	11.8	11.4	11.5	9.0	9.8	9.2	143
da 2001 a 3000 fr.	12.5	20.6	14.8	19.0	22.6	19.8	17.6	15.0	16.9	2.5	0.0	2.1	5.9	16.5	14.6	12.3	18.4	14.1	218
da 3001 a 4000 fr.	11.9	12.3	12.0	13.6	13.2	13.5	7.8	20.0	11.3	5.0	4.5	4.9	5.9	20.3	17.7	10.8	14.0	11.7	181
da 4001 a 5000 fr.	15.9	9.5	14.1	7.1	1.9	5.9	21.6	5.0	16.9	6.6	18.2	8.4	17.6	16.5	16.7	14.0	9.8	12.8	198
da 5001 a 6000 fr.	12.5	3.7	10.1	4.3	0.0	3.4	9.8	5.0	8.5	0.8	0.0	0.7	5.9	6.3	6.3	9.8	3.6	8.0	123
da 6001 a 8000 fr.	7.9	4.1	6.9	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.7	5.9	6.3	6.3	5.7	3.8	5.2	80
da 8001 a 10 000 fr.	2.1	0.8	1.7	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	11.8	0.0	2.1	1.6	0.4	1.3	20
da 10 001 a 15 000 fr.	1.6	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	1.0	1.2	0.0	0.8	13
più di 15 000 fr.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.0	0.1	0.2	0.1	2
N**	630	243	873	184	53	237	51	20	71	121	22	143	17	79	96	1'097	450	1'547	1'547
<i>dati mancanti</i>	1'918	842	2'760	312	138	450	197	66	263	521	104	625	251	773	1'024	3'384	2'083	5'467	5'467
Debiti*																			
nessun debito	64.1	77.2	67.8	32.9	49.3	36.8	37.0	54.1	41.9	86.3	90.8	87.0	87.8	89.3	88.9	63.6	78.4	68.3	1'763
fino a 5000 fr.	5.5	7.5	6.1	16.0	13.4	15.4	12.0	27.0	16.3	5.7	1.5	5.0	2.7	3.1	3.0	7.2	6.7	7.1	182
da 5001 a 10 000 fr.	7.2	7.0	7.1	12.2	11.9	12.1	17.4	2.7	13.2	3.3	3.1	3.2	1.4	3.1	2.7	7.2	5.7	6.7	173
da 10 001 a 25 000 fr.	8.2	5.6	7.4	21.6	16.4	20.4	13.0	8.1	11.6	2.7	0.0	2.2	1.4	2.7	2.3	9.0	5.5	7.9	204
da 25 001 a 50 000 fr.	6.3	0.8	4.7	8.9	6.0	8.2	5.4	5.4	5.4	1.8	3.1	2.0	4.1	0.9	1.7	5.6	1.8	4.4	113
da 50 001 a 100 000 fr.	4.2	0.8	3.2	6.1	3.0	5.4	9.8	2.7	7.8	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.7	3.9	1.0	2.9	76
più di 100 000 fr.	4.5	1.1	3.6	2.3	0.0	1.8	5.4	0.0	3.9	0.3	1.5	0.5	0.0	0.9	0.7	3.5	0.9	2.7	69
N**	905	359	1'264	213	67	280	92	37	129	336	65	401	74	224	298	1'760	820	2'580	2'580
<i>dati mancanti</i>	1'643	726	2'369	283	124	407	156	49	205	306	61	367	194	628	822	2'721	1'713	4'434	4'434

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T8 Incarcerazione o detenzione preventiva prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2008)

	Pazienti: problema principale												Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Incarcerazione o detenzione preventiva*																
nessuna	87.9	96.7	90.6	51.5	73.6	57.2	62.5	85.0	67.9	92.7	100.0	93.8	82.2	93.9	85.5	1'779
in prigione	6.3	1.2	4.8	20.1	11.1	17.8	21.9	5.0	17.9	1.3	0.0	1.1	8.5	2.4	6.7	140
in detenzione preventiva	3.4	1.6	2.9	13.7	8.3	12.3	9.4	5.0	8.3	4.6	0.0	3.9	5.0	2.4	4.3	89
in prigione e in detenzione preventiva	2.4	0.5	1.8	14.7	6.9	12.7	6.3	5.0	6.0	1.3	0.0	1.1	4.3	1.3	3.5	72
N**	978	425	1'403	204	72	276	64	20	84	151	27	178	1'487	593	2'080	2'080
<i>dati mancanti</i>	1'570	660	2'230	292	119	411	184	66	250	491	99	590	2'726	1'088	3'814	3'814
Durata totale di detenzione***																
fino a 1 mese	28.9	50.0	30.6	24.7	30.8	25.6	26.7	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	25.9	41.7	27.6	61
> 1 a 2 mesi	7.8	0.0	7.1	7.8	15.4	8.9	26.7	0.0	22.2	0.0	0.0	0.0	9.6	8.3	9.5	21
> 2 a 6 mesi	33.3	37.5	33.7	27.3	38.5	28.9	13.3	33.3	16.7	50.0	0.0	50.0	28.4	37.5	29.4	64
> 6 a 12 mesi	10.0	12.5	10.2	16.9	7.7	15.6	13.3	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	12.7	8.3	12.2	27
più di un anno	20.0	0.0	18.4	23.4	7.7	21.1	20.0	0.0	16.7	50.0	0.0	50.0	23.4	4.2	21.3	47
N**	90	8	98	76	13	89	15	3	18	4	0	4	196	24	220	220
<i>dati mancanti</i>	28	6	34	23	6	29	9	0	9	7	0	7	69	12	81	81

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che hanno vissuto un'esperienza di detenzione. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T9 Istanza d'invio principale e secondaria dei pazienti (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2008)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Coacaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Istanza d'invio principale*																			
propria iniziativa	30.5	39.1	33.1	50.6	45.7	49.3	34.3	31.3	33.5	15.4	37.1	19.0	64.3	72.4	70.5	33.1	51.2	39.6	2'659
coniuge/partner	5.3	3.0	4.6	2.9	3.3	3.0	10.5	3.6	8.7	2.4	1.6	2.3	5.9	2.7	3.5	4.8	2.8	4.1	273
famiglia	3.9	4.9	4.2	4.8	4.3	4.6	11.7	16.9	13.0	11.9	6.5	11.0	3.5	4.2	4.1	5.9	5.6	5.8	388
amici/colleghi/conoscenti	1.8	2.8	2.1	3.5	2.7	3.3	2.5	1.2	2.2	1.4	1.6	1.5	3.1	4.4	4.1	2.1	3.2	2.5	168
istituto ambulatoriale specializ.	1.9	2.3	2.0	3.9	3.3	3.7	0.4	6.0	1.9	0.6	0.0	0.5	1.6	1.2	1.3	1.8	1.9	1.8	121
istituto residenziale specializ.	4.7	5.6	4.9	2.7	6.5	3.7	5.4	2.4	4.7	1.1	1.6	1.2	0.8	0.9	0.9	3.6	3.4	3.5	237
studio medico	8.0	9.2	8.4	7.0	10.3	7.9	5.0	10.8	6.5	2.2	3.2	2.4	3.9	3.1	3.3	6.5	6.9	6.6	444
ospedale/clinica	11.3	15.5	12.5	3.9	2.2	3.4	4.2	7.2	5.0	2.5	1.6	2.4	2.0	1.5	1.6	7.8	8.0	7.9	529
servizi sociali	5.8	6.3	6.0	7.4	11.4	8.5	5.4	4.8	5.3	5.1	4.0	4.9	4.7	2.5	3.0	5.9	5.1	5.6	376
prov. penale/amministrativo	17.3	4.4	13.5	9.7	6.0	8.7	14.6	7.2	12.7	46.7	33.9	44.5	4.3	2.4	2.8	19.0	5.3	14.1	946
datore di lavoro	5.2	2.6	4.4	1.2	1.6	1.3	2.1	0.0	1.6	2.4	0.0	2.0	2.7	0.1	0.8	3.9	1.6	3.0	204
insegnante	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	1.9	4.0	2.3	0.8	1.2	1.1	0.6	1.0	0.7	50
altra	4.2	3.9	4.1	2.3	2.7	2.4	3.3	8.4	4.7	6.2	4.8	6.0	2.4	3.2	3.0	5.1	4.1	4.7	318
N**	2'422	1'038	3'460	484	184	668	239	83	322	628	124	752	255	801	1'056	4'301	2'412	6'713	6'713
<i>dati mancanti</i>	126	47	173	12	7	19	9	3	12	14	2	16	13	51	64	180	121	301	301
Istanza d'invio secondaria***																			
propria iniziativa	27.7	21.1	25.9	24.0	28.9	25.3	31.1	44.8	34.1	20.3	12.5	19.2	12.2	12.2	12.2	25.8	19.3	23.7	727
coniuge/partner	8.5	8.2	8.4	3.1	6.7	4.1	6.8	6.9	6.8	1.6	3.1	1.9	6.1	6.8	6.7	6.8	7.0	6.9	211
famiglia	4.5	5.9	4.9	6.3	8.9	7.0	6.8	13.8	8.3	7.1	9.4	7.5	9.8	8.3	8.6	5.2	7.0	5.8	178
amici/colleghi/conoscenti	1.8	3.1	2.1	2.4	5.6	3.2	3.9	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	2.4	5.0	4.4	1.9	3.7	2.5	76
istituto ambulatoriale specializ.	1.1	1.8	1.3	3.1	3.3	3.2	0.0	3.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.8	1.1	1.6	1.2	38
istituto residenziale specializ.	2.8	2.9	2.8	2.4	2.2	2.3	1.9	0.0	1.5	0.0	3.1	0.5	0.0	0.7	0.6	2.2	2.0	2.1	66
studio medico	5.5	5.9	5.6	13.4	12.2	13.1	4.9	3.4	4.5	1.1	12.5	2.8	1.2	3.6	3.1	5.5	6.3	5.8	177
ospedale/clinica	3.7	3.9	3.7	2.4	1.1	2.0	2.9	6.9	3.8	1.1	0.0	0.9	0.0	1.1	0.8	2.9	2.5	2.8	86
servizi sociali	1.5	2.7	1.8	5.1	3.3	4.7	3.9	10.3	5.3	0.5	3.1	0.9	2.4	2.2	2.2	2.0	2.8	2.3	70
prov. penale/amministrativo	4.0	1.8	3.4	2.8	0.0	2.0	8.7	0.0	6.8	0.5	0.0	0.5	1.2	0.7	0.8	3.6	1.1	2.8	86
datore di lavoro	3.2	1.2	2.7	1.2	0.0	0.9	1.0	0.0	0.8	1.6	3.1	1.9	1.2	0.0	0.3	2.4	0.7	1.9	57
insegnante	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	3.1	1.9	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.2	7
altra	2.4	3.5	2.7	1.2	2.2	1.5	2.9	10.3	4.5	2.7	6.3	3.3	1.2	3.6	3.1	2.4	3.7	2.8	87
nessuna	42.5	48.0	44.0	44.5	40.0	43.3	45.6	31.0	42.4	63.2	56.3	62.1	63.4	60.1	60.8	46.8	51.4	48.3	1'483
N**	1'312	488	1'800	254	90	344	103	29	132	182	32	214	82	278	360	2'080	990	3'070	3'070
<i>dati mancanti</i>	1'236	597	1'833	242	101	343	145	57	202	460	94	554	186	574	760	2'401	1'543	3'944	3'944

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili)

T10 Tipo di aiuto atteso dai pazienti (in rapporto al problema principale) e dai parenti o conoscenti all'entrata e base legale dell'intervento (2008)

Tipo di aiuto atteso*	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Tipo di aiuto atteso*																			
problemi di dipendenza	80.3	88.6	82.6	89.5	84.3	88.2	83.3	89.2	84.7	72.1	78.4	73.0	66.0	51.7	55.0	78.4	76.9	77.9	2'695
problemi somatici	5.2	5.3	5.2	5.9	7.8	6.4	0.8	2.7	1.3	0.9	0.0	0.8	2.1	1.9	2.0	4.3	4.3	4.3	150
problemi psichici	18.3	24.8	20.1	20.2	25.5	21.6	14.2	16.2	14.6	7.9	16.2	9.1	11.7	15.6	14.7	16.7	21.3	18.2	630
problemi relazionali	14.5	20.7	16.3	10.8	17.6	12.6	18.3	18.9	18.5	4.7	10.8	5.6	36.2	42.5	41.1	13.9	25.4	17.7	614
problemi familiari	8.4	16.0	10.5	11.1	13.7	11.8	11.7	21.6	14.0	7.4	21.6	9.5	38.3	48.3	46.0	10.2	24.7	15.0	520
problemi finanziari	6.3	7.4	6.6	19.9	19.6	19.8	15.0	13.5	14.6	4.7	0.0	4.0	4.3	7.3	6.6	8.4	8.3	8.4	290
problemi professionali o di formazione	13.4	12.0	13.0	17.1	12.7	15.9	14.2	18.9	15.3	12.1	13.5	12.3	6.4	4.4	4.9	13.1	9.8	12.0	415
problemi di alloggio	3.6	4.0	3.7	8.7	10.8	9.3	5.0	5.4	5.1	1.9	0.0	1.6	2.1	4.1	3.7	4.2	4.3	4.2	145
problemi di violenza	1.9	2.6	2.1	1.4	3.9	2.1	3.3	0.0	2.5	0.0	2.7	0.4	2.1	6.7	5.6	1.6	3.7	2.3	81
problemi giuridici	8.9	3.9	7.5	12.2	3.9	10.0	15.0	8.1	13.4	11.2	5.4	10.3	4.3	3.8	3.9	9.6	3.8	7.7	266
altro-i	2.2	0.5	1.7	2.4	2.9	2.6	2.5	2.7	2.5	3.7	2.7	3.6	3.2	2.9	2.9	4.3	2.4	3.7	127
nessuna richiesta	11.5	6.2	10.0	4.2	5.9	4.6	7.5	5.4	7.0	15.3	10.8	14.7	0.0	0.6	0.5	10.2	4.7	8.4	289
N**	1'435	569	2'004	287	102	389	120	37	157	215	37	252	94	315	409	2'311	1'150	3'461	3'461
<i>dati mancanti</i>	<i>1'113</i>	<i>516</i>	<i>1'629</i>	<i>209</i>	<i>89</i>	<i>298</i>	<i>128</i>	<i>49</i>	<i>177</i>	<i>427</i>	<i>89</i>	<i>516</i>	<i>174</i>	<i>537</i>	<i>711</i>	<i>2'170</i>	<i>1'383</i>	<i>3'553</i>	<i>3'553</i>
Base legale dell'intervento*																			
Sospensione della procedura, rinuncia a infliggere una pena o un avvertimento (art. 19a cifra 2 Lstup)	0.0	0.2	0.1	1.2	1.1	1.2	0.0	0.0	0.0	8.9	10.7	9.2	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.8	25
abbandono del perseguimento penale nel caso di un trattamento sotto sorveglianza medica (art. 19a cifra 3 Lstup)	0.3	0.0	0.2	0.4	0.0	0.3	1.0	0.0	0.8	1.1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	8
misure concernenti delinquenti mentalmente anormali (art. 43 CPS)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
trattamento delle persone dipendenti dall'alcol o dalle droghe (art. 44 CPS)	3.1	1.4	2.7	1.6	1.1	1.5	1.9	0.0	1.5	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	2.3	0.8	1.8	56
irresponsabilità (art. 10 CPS)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
responsabilità limitata (art 11 CPS)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
esecuzione di misure per tossicodipend. in un'istituzione di educazione al lavoro (art. 2a ord. 3 rel. al CPS SR 311.03)	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.5	8.9	3.6	8.2	0.0	0.0	0.0	1.1	0.2	0.8	25
altra	9.9	6.0	8.9	5.5	3.4	5.0	14.6	13.8	14.4	17.9	10.7	16.9	1.2	1.1	1.1	10.2	4.5	8.3	254
nessuna misura (trattamento volontario)	86.3	92.1	87.9	91.4	94.3	92.1	80.6	86.2	81.8	62.6	78.6	64.7	98.8	98.9	98.9	85.1	94.1	88.0	2'683
N**	1'310	496	1'806	256	87	343	103	29	132	179	28	207	85	276	361	2'068	982	3'050	3'050
<i>dati mancanti</i>	<i>1'238</i>	<i>589</i>	<i>1'827</i>	<i>240</i>	<i>104</i>	<i>344</i>	<i>145</i>	<i>57</i>	<i>202</i>	<i>463</i>	<i>98</i>	<i>561</i>	<i>183</i>	<i>576</i>	<i>759</i>	<i>2'413</i>	<i>1'551</i>	<i>3'964</i>	<i>3'964</i>

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T11 Trattamenti/accompagnamenti dei pazienti prima dell'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2008)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Interventi precedenti*																			
no	46.8	38.4	44.3	18.4	15.8	17.7	51.9	51.4	51.7	78.7	76.0	78.3	70.7	67.4	68.2	51.0	49.6	50.5	2'960
si	53.2	61.6	55.7	81.6	84.2	82.3	48.1	48.6	48.3	21.3	24.0	21.7	29.3	32.6	31.8	49.0	50.4	49.5	2'898
N**	2'161	906	3'067	435	165	600	212	74	286	555	104	659	198	642	840	3'808	2'050	5'858	5'858
<i>dati mancanti</i>	387	179	566	61	26	87	36	12	48	87	22	109	70	210	280	673	483	1'156	1'156
Tipo di intervento***																			
trattamento con prescriz. di eroina	1.3	1.2	1.3	5.7	2.8	5.0	1.3	0.0	0.9	1.1	0.0	0.9	5.0	1.4	2.2	2.3	1.3	1.9	47
terapia sostitut. (metadone, subutex)	4.6	4.3	4.5	67.6	75.7	69.7	30.4	34.4	31.5	4.3	9.1	5.2	5.0	2.1	2.8	18.7	14.2	17.1	414
altro tratt. medicam. delle dipendenze	9.9	9.6	9.8	10.8	5.6	9.4	3.8	9.4	5.4	0.0	4.5	0.9	5.0	1.4	2.2	9.2	7.6	8.6	209
consulenza ambulatoriale	66.5	66.1	66.3	52.7	52.3	52.6	70.9	78.1	73.0	79.8	81.8	80.2	80.0	84.4	83.4	65.4	68.7	66.5	1'609
terapia residenziale	47.3	53.0	49.2	40.5	40.2	40.4	43.0	34.4	40.5	18.1	27.3	19.8	22.5	10.6	13.3	42.8	41.5	42.3	1'024
cura di disintossicazione	40.0	44.8	41.6	49.0	57.0	51.1	43.0	46.9	44.1	14.9	13.6	14.7	10.0	9.9	9.9	38.8	37.6	38.4	928
gruppo di aiuto reciproco/ autosost.	6.6	9.4	7.5	3.7	3.7	3.7	1.3	0.0	0.9	1.1	0.0	0.9	5.0	2.1	2.8	5.3	6.4	5.7	138
altro-i	3.6	4.1	3.8	2.0	2.8	2.2	1.3	3.1	1.8	4.3	0.0	3.4	2.5	6.4	5.5	3.3	4.5	3.7	90
N**	990	489	1'479	296	107	403	79	32	111	94	22	116	40	141	181	1'572	846	2'418	2'418
<i>dati mancanti</i>	159	69	228	59	32	91	23	4	27	24	3	27	18	68	86	293	187	480	480

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che sono già stati presi in carico in precedenza. Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

T12 Trattamento sostitutivo e altri interventi all'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2008)

	Pazienti: problema principale												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Sostituzione o prescrizione di eroina*																
no	97.9	98.2	98.0	52.4	43.8	50.2	87.7	81.7	86.0	99.6	98.0	99.3	91.9	91.2	91.7	3'933
si	2.1	1.8	2.0	47.6	56.2	49.8	12.3	18.3	14.0	0.4	2.0	0.7	8.1	8.8	8.3	357
N**	1'849	763	2'612	374	130	504	162	60	222	508	98	606	3'109	1'181	4'290	4'290
<i>dati mancanti</i>	699	322	1'021	122	61	183	86	26	112	134	28	162	1'104	500	1'604	1'604
Tipo di sostituzione***																
eroina	7.9	16.7	10.0	4.6	2.8	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	4.1	4.3	15
metadone	78.9	75.0	78.0	85.1	93.1	87.4	89.5	100.0	93.1	100.0	100.0	100.0	84.3	91.8	86.5	300
altri oppiacei	2.6	0.0	2.0	7.4	1.4	5.7	10.5	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	5.5	19
altre sostanze	10.5	8.3	10.0	2.9	2.8	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	3.1	3.7	13
N**	38	12	50	175	72	247	19	10	29	2	1	3	249	98	347	347
<i>dati mancanti</i>	0	2	2	3	1	4	1	1	2	0	1	1	4	6	10	10
Altro intervento parallelo*																
no	88.0	82.1	86.4	81.7	78.8	81.0	84.6	76.2	82.6	94.4	97.2	94.8	88.0	82.5	86.6	2'675
si	12.0	17.9	13.6	18.3	21.2	19.0	15.4	23.8	17.4	5.6	2.8	5.2	12.0	17.5	13.4	415
N**	1'459	565	2'024	301	104	405	130	42	172	234	36	270	2'272	818	3'090	3'090
<i>dati mancanti</i>	1'089	520	1'609	195	87	282	118	44	162	408	90	498	1'941	863	2'804	2'804
Tipo di intervento parallelo****																
trattamento o consulenza ambulatoriale	58.4	63.4	60.2	65.5	68.2	66.2	50.0	50.0	50.0	92.3	100.0	92.9	60.7	63.6	61.7	255
terapia residenziale	21.4	15.8	19.3	20.0	13.6	18.2	10.0	30.0	16.7	0.0	0.0	0.0	19.6	16.8	18.6	77
gruppo di aiuto reciproco o di autosostegno	1.2	4.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.8	1.5	6
altro-i	26.6	21.8	24.8	18.2	18.2	18.2	40.0	30.0	36.7	7.7	0.0	7.1	24.8	21.7	23.7	98
N**	173	101	274	55	22	77	20	10	30	13	1	14	270	143	413	413
<i>dati mancanti</i>	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che seguono un programma di sostituzione. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

**** I risultati si basano solamente sui clienti presi in carico parallelamente. Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

T13a Entrata in seguito a una cura di disintossicazione, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2008)

	Pazienti: problema principale												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Entrata in seguito a una cura di disintossicazione*																
no	75.9	76.0	76.0	84.9	92.1	86.8	87.0	89.7	87.6	94.9	93.1	94.6	80.6	80.6	80.6	2'079
disintossicazione nella stessa istituzione	1.7	2.3	1.9	0.0	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.8	1.3	33
disintossicazione in un'altra istituzione	22.4	21.7	22.2	15.1	6.7	12.9	13.0	10.3	12.4	5.1	6.9	5.4	18.3	17.7	18.1	468
N**	1'239	470	1'709	251	89	340	100	29	129	175	29	204	1'901	679	2'580	2'580
<i>dati mancanti</i>	1'309	615	1'924	245	102	347	148	57	205	467	97	564	2'312	1'002	3'314	3'314

T13b Frequenza delle cure di disintossicazione senza aiuto professionale prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2008)

Freq. disintossicazioni senza accompagnamento*																
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Tutti i pazienti			
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	donne	Totale	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
mai	62.8	56.7	61.2	19.9	26.4	21.6	54.2	45.5	51.9	74.5	75.0	74.6	58.5	54.7	57.5	854
una volta	9.8	9.0	9.6	10.3	9.4	10.1	10.2	13.6	11.1	8.2	0.0	7.1	9.5	8.5	9.2	137
due o tre volte	9.2	7.8	8.8	19.9	26.4	21.6	10.2	13.6	11.1	9.1	6.3	8.7	10.5	10.1	10.4	154
più di tre volte	18.2	26.5	20.4	50.0	37.7	46.7	25.4	27.3	25.9	8.2	18.8	9.5	21.6	26.7	22.9	340
N**	716	268	984	146	53	199	59	22	81	110	16	126	1'099	386	1'485	1'485
<i>dati mancanti</i>	1'832	817	2'649	350	138	488	189	64	253	532	110	642	3'114	1'295	4'409	4'409

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T14 Problema principale all'entrata (solamente pazienti) (2008)

Tutti i pazienti										
Problema principale	Uomini	Donne	Totale	N		Uomini	Donne	Totale	N	
	%	%	%			%	%	%		
alcol	60.5	64.5	61.6	3'633	alcol	60.5	64.5	61.6	3'633	
cocktail (eroina e cocaina)	0.6	0.2	0.5	28	cocktail	0.6	0.2	0.5	28	
eroina	10.2	9.6	10.0	592	oppiacei	11.2	11.1	11.2	659	
metadone	0.8	1.2	0.9	55						
altri oppiacei	0.1	0.4	0.2	12	cocaina e derivati	5.9	5.1	5.7	334	
cocaina	5.9	5.1	5.6	332						
crack, freebase	0.0	0.1	0.0	2	stimolanti	0.5	0.9	0.6	37	
amfetamine	0.4	0.4	0.4	23						
MDMA e affini (ecstasy)	0.1	0.2	0.2	10	medicamenti	0.5	1.2	0.7	42	
altri stimolanti (per es., khat)	0.0	0.2	0.1	4						
barbiturici	0.1	0.1	0.1	4	allucinogeni	0.0	0.1	0.1	3	
benzodiazepine	0.4	0.8	0.5	28						
altri sonniferi e tranquillanti	0.1	0.4	0.2	10	canapa	15.2	7.5	13.0	768	
LSD	0.0	0.1	0.0	2						
altri allucinogeni	0.0	0.1	0.0	1	tabacco	1.4	3.1	1.9	112	
canapa	15.2	7.5	13.0	768						
tabacco	1.4	3.1	1.9	112	altra/e sostanza/e	0.6	0.6	0.6	35	
sostanze volatili (per es., solventi)	0.1	0.1	0.1	4						
altra/e sostanza/e	0.5	0.5	0.5	31	problemi assimilabili a una dipendenza	3.6	5.5	4.1	243	
gioco patologico	2.5	1.4	2.2	128						
disturbi alimentari	0.1	3.2	1.0	56	altri problemi assimilabili a una dipendenza	1.0	1.0	1.0	59	
altri problemi assimilabili a una dipendenza	1.0	1.0	1.0	59						
N**	4'213	1'681	5'894	5'894		4'213	1'681	5'894	5'894	
<i>dati mancanti</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T15.1a Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata (2008), uomini

Pazienti: principale sostanza problematica										
Uomini	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Coacaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
Frequenza di consumo 30 ultimi giorni (%)*										
mai	29.8	64.7	30.0	38.2	38.9	11.8	0.0	26.9	12.8	33.3
un giorno alla settimana o meno	8.4	17.6	10.4	17.2	11.1	5.9	100.0	18.5	0.0	33.3
2 a 3 giorni alla settimana	13.0	0.0	10.1	19.9	27.8	5.9	0.0	19.4	4.3	0.0
4 a 6 giorni alla settimana	12.0	5.9	9.0	8.6	11.1	5.9	0.0	6.4	6.4	11.1
una volta al giorno	5.4	0.0	11.7	2.2	5.6	5.9	0.0	7.1	0.0	11.1
più volte al giorno	31.4	11.8	28.9	14.0	5.6	64.7	0.0	21.8	76.6	11.1
N**	1'744	17	367	186	18	17	1	547	47	9
<i>dati mancanti</i>	804	7	105	62	4	4	0	95	13	16
Frequenza di consumo 6 ultimi mesi (%)*										
mai	9.2	6.3	17.1	13.6	15.0	7.1	0.0	7.0	2.2	25.0
un giorno alla settimana o meno	7.8	43.8	14.4	21.1	20.0	14.3	0.0	22.6	0.0	6.3
2 a 3 giorni alla settimana	17.5	0.0	14.7	27.2	25.0	21.4	100.0	20.6	4.3	12.5
4 a 6 giorni alla settimana	15.0	12.5	8.4	13.6	5.0	0.0	0.0	10.2	4.3	18.8
una volta al giorno	7.1	6.3	15.7	6.1	20.0	14.3	0.0	7.2	0.0	12.5
più volte al giorno	43.4	31.3	29.8	18.4	15.0	42.9	0.0	32.3	89.1	25.0
N**	1'543	16	299	147	20	14	1	470	46	16
<i>dati mancanti</i>	1'005	8	173	101	2	7	0	172	14	9

T15.1b Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata (2008), uomini

Pazienti: problema principale			
Uomini	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
Frequenza di manifestazione 30 ultimi giorni (%)*			
mai	63.2	0.0	28.6
1 giorno alla settimana o meno	14.9	0.0	19.0
2 a 3 giorni alla settimana	4.6	0.0	4.8
4 a 6 giorni alla settimana	3.4	0.0	0.0
una volta al giorno	4.6	0.0	4.8
più volte al giorno	9.2	100.0	42.9
N**	87	1	21
<i>dati mancanti</i>	18	2	21
Frequenza di manifestazione 6 ultimi mesi (%)*			
mai	50.0	0.0	0.0
1 giorno alla settimana o meno	27.9	0.0	10.0
2 a 3 giorni alla settimana	11.8	0.0	15.0
4 a 6 giorni alla settimana	1.5	0.0	5.0
una volta al giorno	2.9	0.0	10.0
più volte al giorno	5.9	100.0	60.0
N**	68	1	20
<i>dati mancanti</i>	37	2	22

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T15.2a Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata (2008), donne

Pazienti: principale sostanza problematica										
Donne	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Coacaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
Frequenza di consumo 30 ultimi giorni (%)*										
mai	24.3	0.0	30.8	27.5	38.5	21.4	0.0	18.2	0.0	0.0
un giorno alla settimana o meno	10.1	0.0	7.5	15.9	23.1	14.3	100.0	16.4	0.0	0.0
2 a 3 giorni alla settimana	14.6	33.3	5.8	31.9	23.1	0.0	0.0	15.5	0.0	0.0
4 a 6 giorni alla settimana	13.4	33.3	10.8	7.2	7.7	0.0	0.0	6.4	7.7	0.0
una volta al giorno	6.4	33.3	17.5	7.2	7.7	14.3	0.0	8.2	2.6	0.0
più volte al giorno	31.1	0.0	27.5	10.1	0.0	50.0	0.0	35.5	89.7	0.0
N**	732	3	120	69	13	14	1	110	39	0
<i>dati mancanti</i>	353	1	67	17	2	7	1	16	13	10
Frequenza di consumo 6 ultimi mesi (%)*										
mai	6.3	0.0	19.6	15.1	15.4	0.0	0.0	3.1	2.6	0.0
un giorno alla settimana o meno	9.7	33.3	9.3	18.9	30.8	8.3	100.0	24.0	2.6	20.0
2 a 3 giorni alla settimana	17.9	33.3	10.3	32.1	23.1	0.0	0.0	10.4	0.0	20.0
4 a 6 giorni alla settimana	15.7	0.0	12.4	15.1	30.8	0.0	0.0	7.3	2.6	20.0
una volta al giorno	8.0	33.3	11.3	9.4	0.0	8.3	0.0	6.3	2.6	0.0
più volte al giorno	42.3	0.0	37.1	9.4	0.0	83.3	0.0	49.0	89.5	40.0
N**	648	3	97	53	13	12	1	96	38	5
<i>dati mancanti</i>	437	1	90	33	2	9	1	30	14	5

T15.2b Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata (2008), donne

Pazienti: problema principale			
Donne	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
Frequenza di manifestazione 30 ultimi giorni (%)*			
mai	55.0	4.3	0.0
1 giorno alla settimana o meno	15.0	4.3	28.6
2 a 3 giorni alla settimana	0.0	21.7	0.0
4 a 6 giorni alla settimana	20.0	8.7	28.6
una volta al giorno	0.0	13.0	28.6
più volte al giorno	10.0	47.8	14.3
N**	20	23	7
<i>dati mancanti</i>	3	30	10
Frequenza di manifestazione 6 ultimi mesi (%)*			
mai	60.0	5.0	0.0
1 giorno alla settimana o meno	20.0	10.0	28.6
2 a 3 giorni alla settimana	0.0	15.0	28.6
4 a 6 giorni alla settimana	10.0	10.0	0.0
una volta al giorno	10.0	15.0	28.6
più volte al giorno	0.0	45.0	14.3
N**	10	20	7
<i>dati mancanti</i>	13	33	10

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T15.3a Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata (2008), uomini e donne

Pazienti: principale sostanza problematica										
Uomini e donne	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Coacaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
Frequenza di consumo 30 ultimi giorni (%)*										
mai	28.2	55.0	30.2	35.3	38.7	16.1	0.0	25.4	7.0	33.3
un giorno alla settimana o meno	8.9	15.0	9.7	16.9	16.1	9.7	100.0	18.1	0.0	33.3
2 a 3 giorni alla settimana	13.4	5.0	9.0	23.1	25.8	3.2	0.0	18.7	2.3	0.0
4 a 6 giorni alla settimana	12.4	10.0	9.4	8.2	9.7	3.2	0.0	6.4	7.0	11.1
una volta al giorno	5.7	5.0	13.1	3.5	6.5	9.7	0.0	7.3	1.2	11.1
più volte al giorno	31.3	10.0	28.5	12.9	3.2	58.1	0.0	24.0	82.6	11.1
N**	2'476	20	487	255	31	31	2	657	86	9
<i>dati mancanti</i>	1'157	8	172	79	6	11	1	111	26	26
Frequenza di consumo 6 ultimi mesi (%)*										
mai	8.4	5.3	17.7	14.0	15.2	3.8	0.0	6.4	2.4	19.0
un giorno alla settimana o meno	8.4	42.1	13.1	20.5	24.2	11.5	50.0	22.8	1.2	9.5
2 a 3 giorni alla settimana	17.6	5.3	13.6	28.5	24.2	11.5	50.0	18.9	2.4	14.3
4 a 6 giorni alla settimana	15.2	10.5	9.3	14.0	15.2	0.0	0.0	9.7	3.6	19.0
una volta al giorno	7.4	10.5	14.6	7.0	12.1	11.5	0.0	7.1	1.2	9.5
più volte al giorno	43.1	26.3	31.6	16.0	9.1	61.5	0.0	35.2	89.3	28.6
N**	2'191	19	396	200	33	26	2	566	84	21
<i>dati mancanti</i>	1'442	9	263	134	4	16	1	202	28	14

T15.3b Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata (2008), uomini e donne

Pazienti: problema principale			
Uomini e donne	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
Frequenza di manifestazione 30 ultimi giorni (%)*			
mai	61.7	4.2	21.4
1 giorno alla settimana o meno	15.0	4.2	21.4
2 a 3 giorni alla settimana	3.7	20.8	3.6
4 a 6 giorni alla settimana	6.5	8.3	7.1
una volta al giorno	3.7	12.5	10.7
più volte al giorno	9.3	50.0	35.7
N**	107	24	28
<i>dati mancanti</i>	21	32	31
Frequenza di manifestazione 6 ultimi mesi (%)*			
mai	51.3	4.8	0.0
1 giorno alla settimana o meno	26.9	9.5	14.8
2 a 3 giorni alla settimana	10.3	14.3	18.5
4 a 6 giorni alla settimana	2.6	9.5	3.7
una volta al giorno	3.8	14.3	14.8
più volte al giorno	5.1	47.6	48.1
N**	78	21	27
<i>dati mancanti</i>	50	35	32

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T16.1a Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2008), uomini

Pazienti: principale sostanza problematica										
Uomini	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Coacaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
Età all'epoca del primo consumo										
media	16.0	18.5	21.3	22.5	20.5	22.6	23.0	14.7	15.2	16.4
deviazione standard	3.7	5.1	5.8	6.9	4.3	5.8	.	2.0	2.7	4.3
1° quartile	14.0	14.0	18.0	18.0	18.0	17.0	23.0	13.5	13.0	15.0
mediana	16.0	17.0	20.0	20.0	18.0	22.0	23.0	15.0	15.0	16.0
3° quartile	17.0	20.0	24.0	26.0	25.0	28.0	23.0	16.0	16.0	17.0
N*	1'051	13	311	160	17	10	1	488	33	14
<i>dati mancanti</i>	1'497	11	161	88	5	11	0	154	27	11
Età all'inizio del consumo regolare										
media	22.2	19.8	22.5	24.7	20.9	24.4	23.0	15.9	16.9	21.0
deviazione standard	7.9	5.3	6.0	7.5	4.4	6.6	.	2.8	2.8	8.6
1° quartile	17.0	16.0	18.0	19.0	18.0	18.0	23.0	15.0	15.0	15.0
mediana	20.0	20.0	21.0	23.0	19.0	24.0	23.0	15.0	16.0	18.0
3° quartile	25.0	23.0	25.0	29.0	25.0	30.0	23.0	17.0	18.0	25.0
N*	1'104	13	298	149	15	11	1	423	36	11
<i>dati mancanti</i>	1'444	11	174	99	7	10	0	219	24	14
Età all'inizio del consumo problematico										
media	31.1	21.2	22.9	27.1	21.5	27.3	.	16.8	20.6	23.8
deviazione standard	11.6	5.1	5.8	8.3	4.6	8.6	.	3.3	9.1	9.4
1° quartile	21.0	18.0	19.0	20.0	18.0	20.0	.	15.0	15.0	18.0
mediana	30.0	20.0	22.0	25.0	20.0	30.0	.	16.0	18.0	18.0
3° quartile	40.0	23.0	25.0	33.0	25.0	33.0	.	17.0	22.0	29.0
N*	881	13	207	99	11	9	0	328	35	5
<i>dati mancanti</i>	1'667	11	265	149	11	12	1	314	25	20
Periodo di latenza (in anni)**										
media	24.0	16.3	9.4	8.2	4.8	13.7	7.4	4.6	14.3	8.9
deviazione standard	12.7	8.9	9.3	6.9	3.8	.	.	5.6	14.6	11.5
1° quartile	14.0	7.0	3.0	3.0	2.1	13.7	7.4	1.4	3.4	0.9
mediana	23.3	17.3	5.9	5.8	3.8	13.7	7.4	2.8	6.0	4.9
3° quartile	33.0	24.7	12.8	11.1	7.9	13.7	7.4	5.2	30.0	9.4
N*	492	3	57	86	10	1	1	380	22	7
<i>dati mancanti</i>	520	2	18	24	0	1	0	57	14	4

* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

** Lasso di tempo tra il primo consumo della sostanza problematica e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

T16.1b Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2008), donne

Pazienti: principale sostanza problematica										
Donne	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Coacaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
Età all'epoca del primo consumo										
media	17.5	22.0	20.3	19.0	19.8	24.4	18.0	15.0	14.3	19.3
deviazione standard	5.8	7.1	6.3	4.2	6.0	7.9	.	2.9	3.0	8.0
1° quartile	15.0	17.0	16.0	16.0	16.5	17.0	18.0	13.0	12.0	12.5
mediana	16.0	22.0	18.0	18.0	18.0	21.0	18.0	14.0	14.0	18.5
3° quartile	19.0	27.0	23.0	21.0	21.5	34.0	18.0	16.0	17.0	26.0
N*	415	2	111	63	12	7	1	95	18	4
<i>dati mancanti</i>	670	2	76	23	3	14	1	31	34	6
Età all'inizio del consumo regolare										
media	27.5	22.5	21.3	21.3	20.4	24.6	.	15.9	16.8	20.5
deviazione standard	11.0	6.4	6.3	6.3	6.0	7.4	.	3.1	4.1	8.7
1° quartile	19.0	18.0	17.0	17.0	17.0	19.0	.	14.0	14.5	13.0
mediana	25.0	22.5	20.0	20.0	18.0	22.5	.	15.0	15.5	21.0
3° quartile	31.0	27.0	24.0	23.0	24.0	31.5	.	16.0	19.0	28.0
N*	445	2	107	58	11	8	0	80	16	4
<i>dati mancanti</i>	640	2	80	28	4	13	2	46	36	6
Età all'inizio del consumo problematico										
media	34.4	18.0	21.6	23.4	21.5	24.6	.	17.6	20.8	.
deviazione standard	12.3	.	6.5	7.0	6.1	3.3	.	5.2	8.8	.
1° quartile	25.0	18.0	17.0	18.0	18.0	22.0	.	15.0	15.0	.
mediana	34.0	18.0	20.0	22.0	19.0	24.0	.	16.0	19.0	.
3° quartile	42.0	18.0	24.0	28.0	24.0	28.0	.	17.0	24.5	.
N*	379	1	80	45	10	5	0	64	16	0
<i>dati mancanti</i>	706	3	107	41	5	16	2	62	36	10
Periodo di latenza (in anni)**										
media	24.8	.	4.8	4.3	3.9	0.8	.	5.1	13.3	4.7
deviazione standard	13.4	.	5.7	4.7	5.9	.	.	5.3	14.9	1.0
1° quartile	15.0	.	0.8	1.1	0.4	0.8	.	1.1	1.4	4.1
mediana	24.0	.	2.3	3.0	1.7	0.8	.	2.5	6.6	4.7
3° quartile	33.0	.	6.1	6.0	4.9	0.8	.	8.2	22.9	5.4
N*	165	0	22	34	7	1	0	69	11	2
<i>dati mancanti</i>	183	0	4	4	1	3	0	10	18	4

* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

** Lasso di tempo tra il primo consumo della sostanza problematica e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

T16.1c Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2008), uomini e donne

Pazienti: principale sostanza problematica										
Uomini e donne	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Coacaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
Età all'epoca del primo consumo										
media	16.4	18.9	21.0	21.5	20.2	23.4	20.5	14.7	14.9	17.1
deviazione standard	4.5	5.2	6.0	6.4	5.0	6.6	3.5	2.2	2.8	5.2
1° quartile	14.0	14.0	17.0	17.0	17.0	17.0	18.0	13.0	13.0	14.0
mediana	16.0	17.0	20.0	20.0	18.0	21.0	20.5	15.0	15.0	16.0
3° quartile	18.0	23.0	23.0	25.0	24.0	28.0	23.0	16.0	16.0	18.0
N*	1'466	15	422	223	29	17	2	583	51	18
<i>dati mancanti</i>	2'167	13	237	111	8	25	1	185	61	17
Età all'inizio del consumo regolare										
media	23.7	20.2	22.2	23.7	20.7	24.5	23.0	15.9	16.9	20.9
deviazione standard	9.2	5.2	6.1	7.3	5.0	6.8	.	2.8	3.2	8.3
1° quartile	18.0	16.0	18.0	18.0	17.0	18.0	23.0	14.0	15.0	15.0
mediana	20.0	20.0	20.0	22.0	18.5	23.0	23.0	15.0	16.0	18.0
3° quartile	27.0	23.0	25.0	27.0	24.0	30.0	23.0	16.0	18.0	28.0
N*	1'549	15	405	207	26	19	1	503	52	15
<i>dati mancanti</i>	2'084	13	254	127	11	23	2	265	60	20
Età all'inizio del consumo problematico										
media	32.1	20.9	22.6	26.0	21.5	26.4	.	16.9	20.7	23.8
deviazione standard	11.9	5.0	6.0	8.1	5.2	7.1	.	3.7	8.9	9.4
1° quartile	22.0	18.0	18.0	20.0	18.0	21.0	.	15.0	15.0	18.0
mediana	30.0	20.0	21.0	24.0	19.0	26.0	.	16.0	18.0	18.0
3° quartile	40.0	23.0	25.0	31.0	24.0	30.0	.	17.0	22.0	29.0
N*	1'260	14	287	144	21	14	0	392	51	5
<i>dati mancanti</i>	2'373	14	372	190	16	28	3	376	61	30
Periodo di latenza (in anni)**										
media	24.2	16.3	8.1	7.1	4.4	7.3	7.4	4.7	14.0	7.9
deviazione standard	12.9	8.9	8.7	6.6	4.6	9.1	.	5.5	14.5	10.1
1° quartile	14.2	7.0	1.6	2.2	1.0	0.8	7.4	1.3	3.4	4.0
mediana	23.8	17.3	4.5	5.3	2.8	7.3	7.4	2.7	6.2	4.9
3° quartile	33.0	24.7	11.4	9.4	6.7	13.7	7.4	5.5	27.1	8.0
N*	657	3	79	120	17	2	1	449	33	9
<i>dati mancanti</i>	703	2	22	28	1	4	0	67	32	8

* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

** Lasso di tempo tra il primo consumo della sostanza problematica e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

T16.2a Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2008), uomini

Pazienti: problema principale			
<i>Uomini</i>	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
Età all'epoca della prima manifestazione			
media	30.7	19.0	18.2
deviazione standard	10.5	.	8.2
1° quartile	22.0	19.0	13.0
mediana	30.0	19.0	15.0
3° quartile	39.0	19.0	22.0
N*	45	1	9
<i>dati mancanti</i>	60	2	33
Età all'inizio della manifestazione regolare			
media	32.6	20.0	21.8
deviazione standard	10.3	.	15.9
1° quartile	24.0	20.0	15.0
mediana	33.5	20.0	16.0
3° quartile	40.0	20.0	20.0
N*	46	1	12
<i>dati mancanti</i>	59	2	30
Età all'inizio della manifestazione problematica			
media	33.1	20.0	24.5
deviazione standard	10.0	.	15.0
1° quartile	25.0	20.0	16.0
mediana	32.5	20.0	19.0
3° quartile	40.0	20.0	30.0
N*	50	1	14
<i>dati mancanti</i>	55	2	28
Periodo di latenza (in anni)**			
media	7.1	1.8	15.4
deviazione standard	7.6	.	14.4
1° quartile	1.7	1.8	5.2
mediana	3.9	1.8	6.9
3° quartile	8.9	1.8	31.3
N*	45	1	9
<i>dati mancanti</i>	60	2	33

* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

** Lasso di tempo tra la prima manifestazione del comportamento problematico e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

T16.2b Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2008), donne

Pazienti: problema principale			
Donne	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
Età all'epoca della prima manifestazione			
media	50.4	18.2	15.0
deviazione standard	17.4	4.8	0.0
1° quartile	54.0	15.0	15.0
mediana	55.0	18.0	15.0
3° quartile	61.0	20.0	15.0
N*	5	21	2
<i>dati mancanti</i>	18	32	15
Età all'inizio della manifestazione regolare			
media	43.4	20.7	24.3
deviazione standard	16.3	5.6	8.0
1° quartile	37.0	16.5	16.0
mediana	43.0	19.5	25.0
3° quartile	56.0	23.0	32.0
N*	5	20	3
<i>dati mancanti</i>	18	33	14
Età all'inizio della manifestazione problematica			
media	47.7	22.7	27.0
deviazione standard	13.9	6.8	6.8
1° quartile	40.0	19.0	25.0
mediana	53.0	20.5	30.0
3° quartile	56.0	30.0	32.0
N*	9	18	5
<i>dati mancanti</i>	14	35	12
Periodo di latenza (in anni)**			
media	2.1	7.7	16.0
deviazione standard	0.3	7.7	18.2
1° quartile	1.8	1.7	3.1
mediana	2.3	4.8	16.0
3° quartile	2.3	11.4	28.9
N*	5	21	2
<i>dati mancanti</i>	18	32	15

* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

** Lasso di tempo tra la prima manifestazione del comportamento problematico e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

T16.2c Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2008), uomini e donne

Pazienti: problema principale			
<i>Uomini e donne</i>	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
Età all'epoca della prima manifestazione			
media	32.7	18.2	17.6
deviazione standard	12.6	4.7	7.5
1° quartile	22.0	15.0	13.0
mediana	32.0	18.0	15.0
3° quartile	40.0	20.0	22.0
N*	50	22	11
<i>dati mancanti</i>	78	34	48
Età all'inizio della manifestazione regolare			
media	33.7	20.7	22.3
deviazione standard	11.2	5.5	14.5
1° quartile	24.0	17.0	15.0
mediana	34.0	20.0	16.0
3° quartile	41.0	23.0	25.0
N*	51	21	15
<i>dati mancanti</i>	77	35	44
Età all'inizio della manifestazione problematica			
media	35.4	22.6	25.2
deviazione standard	11.8	6.7	13.2
1° quartile	25.0	19.0	16.0
mediana	34.0	20.0	20.0
3° quartile	42.0	30.0	31.0
N*	59	19	19
<i>dati mancanti</i>	69	37	40
Periodo di latenza (in anni)**			
media	6.6	7.5	15.5
deviazione standard	7.4	7.6	14.1
1° quartile	1.8	1.7	3.6
mediana	3.3	4.0	6.9
3° quartile	8.8	11.4	31.3
N*	50	22	11
<i>dati mancanti</i>	78	34	48

* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

** Lasso di tempo tra la prima manifestazione del comportamento problematico e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

T17 Modo di amministrazione della principale sostanza problematica nel corso dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata (2008)

Pazienti: principale sostanza problematica															
	Eroina			Cocaina			Amfetamine			Canapa			Benzodiazepine		
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Modo di amministrazione*															
iniettato	32.7	33.3	32.9	7.8	17.3	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0
fumato/inalato	39.7	36.4	38.9	15.6	23.1	17.8	0.0	0.0	0.0	99.8	98.9	99.6	10.0	0.0	6.3
ingerito /bevuto	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	10.0	25.0	14.3	0.0	0.0	0.0	90.0	100.0	93.8
sniffato	26.6	30.3	27.5	76.6	59.6	71.7	90.0	75.0	85.7	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
altro	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N**	214	66	280	128	52	180	10	4	14	455	92	547	10	6	16
<i>dati mancanti</i>	217	95	312	119	33	152	6	3	9	187	34	221	5	7	12

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T18 Prevalenza a vita delle iniezioni, nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata, scambio di materiale d'iniezione nel corso degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata e età all'epoca della prima iniezione, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2008)

	Pazienti: pricipale sostanza problematica												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Iniezioni nel corso della vita*																
sì	6.7	5.0	6.1	66.3	64.5	65.8	15.6	29.1	19.5	4.9	1.0	4.2	14.5	12.1	13.8	501
no	93.3	95.0	93.9	33.7	35.5	34.2	84.4	70.9	80.5	95.1	99.0	95.8	85.5	87.9	86.2	3'127
N**	1'485	684	2'169	323	110	433	135	55	190	468	98	566	2'574	1'054	3'628	3'628
<i>dati mancanti</i>	1'063	401	1'464	173	81	254	113	31	144	174	28	202	1'639	627	2'266	2'266
Iniezioni nel corso dei 6 ultimi mesi*																
sì	0.7	0.9	0.8	39.6	36.2	38.7	11.9	20.4	14.3	3.6	1.0	3.2	6.5	5.4	6.2	223
no	99.3	99.1	99.2	60.4	63.8	61.3	88.1	79.6	85.7	96.4	99.0	96.8	93.5	94.6	93.8	3'391
N**	1'497	682	2'179	303	105	408	135	54	189	469	98	567	2'565	1'049	3'614	3'614
<i>dati mancanti</i>	1'051	403	1'454	193	86	279	113	32	145	173	28	201	1'648	632	2'280	2'280
Iniezioni nel corso dei 30 ultimi giorni*																
sì	0.3	0.3	0.3	34.1	35.7	34.5	7.9	17.9	10.7	0.0	1.0	0.2	4.4	4.7	4.5	172
no	99.7	99.7	99.7	65.9	64.3	65.5	92.1	82.1	89.3	100.0	99.0	99.8	95.6	95.3	95.5	3'660
N**	1'607	738	2'345	299	112	411	140	56	196	472	101	573	2'696	1'136	3'832	3'832
<i>dati mancanti</i>	941	347	1'288	197	79	276	108	30	138	170	25	195	1'517	545	2'062	2'062
Scambio di materiale d'iniezione nel corso dei 6 ultimi mesi***																
sì	0.0	100.0	12.5	9.5	15.8	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	17.4	8.3	10
no	100.0	0.0	87.5	90.5	84.2	89.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	93.8	82.6	91.7	110
N**	7	1	8	63	19	82	10	2	12	16	0	16	97	23	120	120
<i>dati mancanti</i>	2	5	7	35	12	47	4	6	10	1	0	1	43	23	66	66
Età all'epoca della prima iniezione****																
fino a 14 anni	4.4	7.7	5.2	3.4	12.5	5.7	8.3	18.2	13.0	0.0	0.0	0.0	3.7	13.2	6.2	18
da 15 a 16 anni	17.8	23.1	19.0	4.1	16.7	7.2	16.7	0.0	8.7	25.0	0.0	25.0	8.4	18.4	11.0	32
da 17 a 18 anni	17.8	46.2	24.1	21.2	16.7	20.1	33.3	9.1	21.7	0.0	0.0	0.0	20.5	19.7	20.3	59
da 19 a 20 anni	17.8	15.4	17.2	23.3	16.7	21.6	8.3	9.1	8.7	50.0	0.0	50.0	21.9	14.5	19.9	58
da 21 a 25 anni	24.4	7.7	20.7	32.9	25.0	30.9	8.3	54.5	30.4	25.0	0.0	25.0	29.3	25.0	28.2	82
da 26 a 30 anni	11.1	0.0	8.6	12.3	10.4	11.9	8.3	9.1	8.7	0.0	0.0	0.0	12.1	7.9	11.0	32
da 31 a 39 anni	6.7	0.0	5.2	2.1	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	1.3	2.4	7
dai 40 anni in su	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	16.7	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.0	3
N**	45	13	58	146	48	194	12	11	23	4	0	4	215	76	291	291
<i>dati mancanti</i>	54	21	75	68	23	91	9	5	14	19	1	20	158	52	210	210

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che si sono iniettati una sostanza illegale nel corso dei 6 ultimi mesi. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

**** I risultati si basano solamente sui clienti che si sono iniettati una sostanza illegale nel corso della loro vita. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T19.1a Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2008), uomini

Uomini

	Pazienti: principale sostanza problematica									
	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Altri problemi*										
alcol		50.0	32.0	45.7	31.6	50.0	0.0	22.1	5.4	27.3
cocktail (eroina e cocaina)	0.3		4.4	1.5	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
eroina	2.7	7.1	3.0	12.2	0.0	22.2	100.0	1.8	2.7	9.1
metadone	0.8	7.1	22.1	4.6	0.0	11.1	0.0	0.2	0.0	0.0
altri oppiacei	0.3	7.1	1.4	0.0	0.0	11.1	0.0	0.2	0.0	0.0
cocaina	5.6	7.1	33.9	0.5	26.3	38.9	0.0	7.4	0.0	9.1
crack, freebase	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amfetamine	0.7	0.0	2.5	7.1	5.3	0.0	100.0	2.5	0.0	4.5
MDMA e affini (ecstasy)	0.9	0.0	2.7	11.2	36.8	0.0	100.0	4.3	0.0	9.1
altri stimolanti	0.2	0.0	0.8	1.0	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
barbiturici	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazepine	2.7	14.3	19.1	5.1	0.0	16.7	0.0	1.2	2.7	0.0
altri sonniferi e tranquillanti	0.4	14.3	1.9	0.0	0.0	11.1	0.0	0.4	0.0	0.0
LSD	0.4	0.0	2.7	6.1	5.3	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0
altri allucinogeni	0.1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	100.0	1.2	0.0	0.0
sostanze volatili (per es., solventi)	0.1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
canapa	12.6	50.0	38.5	34.5	52.6	22.2	0.0		13.5	18.2
tabacco	30.9	35.7	36.3	35.5	31.6	22.2	0.0	33.4		9.1
altra/e sostanza/e	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.4	5.4	
gioco patologico	0.4	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
disturbi alimentari	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
altri problemi assimilabili a una dipendenza	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.7	0.0
nessun altro problema di dipendenza	57.7	21.4	19.9	24.9	21.1	5.6	0.0	51.6	81.1	59.1
N**	1'656	14	366	197	19	18	1	512	37	22
<i>dati mancanti</i>	892	10	106	51	3	3	0	130	23	3

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T19.1b Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2008), donne

Donne

	Pazienti: principale sostanza problematica									
	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Altri problemi*										
alcol		50.0	30.4	42.3	27.3	40.0	100.0	20.8	17.4	20.0
cocktail (eroina e cocaina)	0.3		5.9	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0
eroina	2.0	50.0	5.9	23.9	0.0	6.7	0.0	1.0	0.0	0.0
metadone	0.6	0.0	19.3	12.7	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	10.0
altri oppiacei	0.4	0.0	3.0	2.8	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaina	5.1	50.0	38.5	0.0	45.5	6.7	0.0	5.0	0.0	10.0
crack, freebase	0.0	0.0	1.5	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amfetamine	0.0	0.0	1.5	5.6	9.1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
MDMA e affini (ecstasy)	1.4	0.0	5.2	18.3	36.4	0.0	100.0	2.0	0.0	0.0
altri stimolanti	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
barbiturici	0.6	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
benzodiazepine	6.8	0.0	23.7	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0
altri sonniferi e tranquillanti	2.0	0.0	1.5	0.0	0.0	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.1	0.0	3.0	8.5	18.2	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
altri allucinogeni	0.1	0.0	0.7	4.2	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
sostanze volatili (per es., solventi)	0.1	0.0	0.7	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
canapa	5.4	0.0	30.4	36.6	45.5	13.3	0.0		4.3	10.0
tabacco	29.7	0.0	31.1	39.4	27.3	33.3	0.0	34.7		0.0
altra/e sostanza/e	0.1	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	
gioco patologico	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0
disturbi alimentari	2.4	0.0	2.2	4.2	0.0	13.3	0.0	2.0	13.0	0.0
altri problemi assimilabili a una dipendenza	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0
nessun altro problema di dipendenza	57.1	0.0	24.4	18.3	18.2	33.3	0.0	49.5	69.6	70.0
N**	704	2	135	71	11	15	1	101	23	10
<i>dati mancanti</i>	<i>381</i>	<i>2</i>	<i>52</i>	<i>15</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>1</i>	<i>25</i>	<i>29</i>	<i>0</i>

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T19.1c Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2008), uomini e donne

Uomini e donne

	Pazienti: principale sostanza problematica									
	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Altri problemi*										
alcol		50.0	31.5	44.8	30.0	45.5	50.0	21.9	10.0	25.0
cocktail (eroina e cocaina)	0.3		4.8	1.1	3.3	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
eroina	2.5	12.5	3.8	15.3	0.0	15.2	50.0	1.6	1.7	6.3
metadone	0.8	6.3	21.4	6.7	0.0	9.1	0.0	0.2	0.0	3.1
altri oppiacei	0.3	6.3	1.8	0.7	0.0	9.1	0.0	0.2	0.0	0.0
cocaina	5.4	12.5	35.1	0.4	33.3	24.2	0.0	7.0	0.0	9.4
crack, freebase	0.0	0.0	1.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amfetamine	0.5	0.0	2.2	6.7	6.7	0.0	50.0	2.3	0.0	3.1
MDMA e affini (ecstasy)	1.1	0.0	3.4	13.1	36.7	0.0	100.0	3.9	0.0	6.3
altri stimolanti	0.1	0.0	0.8	0.7	3.3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
barbiturici	0.2	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
benzodiazepine	3.9	12.5	20.4	7.1	0.0	9.1	0.0	1.0	1.7	3.1
altri sonniferi e tranquillanti	0.8	12.5	1.8	0.0	0.0	12.1	0.0	0.3	0.0	0.0
LSD	0.3	0.0	2.8	6.7	10.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0
altri allucinogeni	0.1	0.0	0.2	1.9	0.0	0.0	100.0	1.0	0.0	0.0
sostanze volatili (per es., solventi)	0.1	0.0	0.2	1.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
canapa	10.4	43.8	36.3	35.1	50.0	18.2	0.0		10.0	15.6
tabacco	30.5	31.3	34.9	36.6	30.0	27.3	0.0	33.6		6.3
altra/e sostanza/e	0.4	0.0	0.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	3.3	
gioco patologico	0.3	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	3.1
disturbi alimentari	1.0	0.0	0.8	1.1	0.0	6.1	0.0	0.3	5.0	0.0
altri problemi assimilabili a una dipendenza	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.2	1.7	0.0
nessun altro problema di dipendenza	57.5	18.8	21.2	23.1	20.0	18.2	0.0	51.2	76.7	62.5
N**	2'360	16	501	268	30	33	2	613	60	32
<i>dati mancanti</i>	<i>1'273</i>	<i>12</i>	<i>158</i>	<i>66</i>	<i>7</i>	<i>9</i>	<i>1</i>	<i>155</i>	<i>52</i>	<i>3</i>

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T19.2a Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2008), uomini

Uomini

Pazienti: problema principale			
	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
	%	%	%
Altri problemi*			
alcol	1.4	0.0	10.5
cocktail (eroina e cocaina)	0.0	0.0	0.0
eroina	0.0	0.0	0.0
metadone	0.0	0.0	0.0
altri oppiacei	0.0	0.0	0.0
cocaina	0.0	0.0	5.3
crack, freebase	0.0	0.0	0.0
amfetamine	0.0	0.0	0.0
MDMA e affini (ecstasy)	0.0	0.0	0.0
altri stimolanti	0.0	0.0	0.0
barbiturici	0.0	0.0	0.0
benzodiazepine	1.4	0.0	0.0
altri sonniferi e tranquillanti	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0
altri allucinogeni	0.0	0.0	0.0
sostanze volatili (per es., solventi)	0.0	0.0	0.0
canapa	1.4	0.0	5.3
tabacco	9.9	0.0	10.5
altra/e sostanza/e	1.4	0.0	0.0
gioco patologico		0.0	0.0
disturbi alimentari	0.0		0.0
altri problemi assimilabili a una dipendenza	0.0	0.0	
nessun altro problema di dipendenza	84.5	100.0	68.4
N**	71	1	19
<i>dati mancanti</i>	<i>34</i>	<i>2</i>	<i>23</i>

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T19.2b Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2008), donne

Donne

Pazienti: problema principale			
	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
	%	%	%
Altri problemi*			
alcol	0.0	25.8	0.0
cocktail (eroina e cocaina)	0.0	0.0	0.0
eroina	0.0	0.0	0.0
metadone	0.0	0.0	0.0
altri oppiacei	0.0	0.0	0.0
cocaina	0.0	0.0	0.0
crack, freebase	0.0	0.0	0.0
amfetamine	0.0	0.0	0.0
MDMA e affini (ecstasy)	0.0	0.0	0.0
altri stimolanti	0.0	0.0	0.0
barbiturici	0.0	0.0	0.0
benzodiazepine	0.0	3.2	25.0
altri sonniferi e tranquillanti	0.0	3.2	12.5
LSD	0.0	0.0	0.0
altri allucinogeni	0.0	0.0	0.0
sostanze volatili (per es., solventi)	0.0	0.0	0.0
canapa	0.0	0.0	0.0
tabacco	13.3	12.9	12.5
altra/e sostanza/e	0.0	0.0	0.0
gioco patologico		0.0	0.0
disturbi alimentari	0.0		25.0
altri problemi assimilabili a una dipendenza	0.0	3.2	
nessun altro problema di dipendenza	86.7	58.1	37.5
N**	15	31	8
<i>dati mancanti</i>	8	22	9

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T19.2c Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2008), uomini e donne

Uomini e donne

Pazienti: problema principale			
	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
	%	%	%
Altri problemi*			
alcol	1.2	25.0	7.4
cocktail (eroina e cocaina)	0.0	0.0	0.0
eroina	0.0	0.0	0.0
metadone	0.0	0.0	0.0
altri oppiacei	0.0	0.0	0.0
cocaina	0.0	0.0	3.7
crack, freebase	0.0	0.0	0.0
amfetamine	0.0	0.0	0.0
MDMA e affini (ecstasy)	0.0	0.0	0.0
altri stimolanti	0.0	0.0	0.0
barbiturici	0.0	0.0	0.0
benzodiazepine	1.2	3.1	7.4
altri sonniferi e tranquillanti	0.0	3.1	3.7
LSD	0.0	0.0	0.0
altri allucinogeni	0.0	0.0	0.0
sostanze volatili (per es., solventi)	0.0	0.0	0.0
canapa	1.2	0.0	3.7
tabacco	10.5	12.5	11.1
altra/e sostanza/e	1.2	0.0	0.0
gioco patologico		0.0	0.0
disturbi alimentari	0.0		7.4
altri problemi assimilabili a una dipendenza	0.0	3.1	
nessun altro problema di dipendenza	84.9	59.4	59.3
N**	86	32	27
<i>dati mancanti</i>	42	24	32

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T20 Frequenza del consumo di alcol, numero di "bicchieri standard" al giorno e frequenza di forti consumi di alcol prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2008)

	Pazienti: problema principale												Tutti i pazienti			N
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Frequenza del consumo di alcol*																
mai	10.8	9.4	10.4	18.5	20.2	18.9	6.7	8.3	7.1	13.0	18.4	13.9	12.3	12.3	12.3	425
1 volta al mese o meno	4.4	4.9	4.5	14.6	15.5	14.8	12.5	10.4	11.9	30.1	25.0	29.3	10.3	8.6	9.8	338
2 a 4 volte al mese	6.2	7.3	6.5	20.5	25.0	21.6	25.0	29.2	26.2	34.5	43.4	36.0	14.1	14.0	14.1	485
2 a 3 volte alla settimana	16.8	19.0	17.5	20.9	16.7	19.8	23.3	20.8	22.6	15.8	11.8	15.2	17.7	17.9	17.8	612
4 volte alla settimana o più	61.8	59.4	61.0	25.6	22.6	24.9	32.5	31.3	32.1	6.5	1.3	5.6	45.6	47.1	46.0	1'586
N**	1'593	699	2'292	254	84	338	120	48	168	385	76	461	2'474	972	3'446	3'446
<i>dati mancanti</i>	955	386	1'341	242	107	349	128	38	166	257	50	307	1'739	709	2'448	2'448
Numero di "bicchieri standard" al giorno***																
1 o 2	7.0	7.8	7.2	43.5	54.1	46.0	37.8	44.7	39.7	58.5	62.5	59.1	21.3	20.2	21.0	576
3 o 4	18.8	16.5	18.1	30.4	27.9	29.8	35.7	23.7	32.4	26.3	22.9	25.8	22.9	18.1	21.5	590
5 o 6	20.9	23.1	21.5	15.2	8.2	13.5	11.2	23.7	14.7	9.7	4.2	8.9	17.4	20.1	18.1	497
7 o 9	18.9	24.8	20.7	4.7	3.3	4.4	4.1	5.3	4.4	2.4	2.1	2.4	13.7	19.6	15.3	420
10 o più	34.5	27.8	32.5	6.3	6.6	6.3	11.2	2.6	8.8	3.1	8.3	3.9	24.7	22.0	24.0	656
N**	1'309	576	1'885	191	61	252	98	38	136	289	48	337	1'972	767	2'739	2'739
<i>dati mancanti</i>	1'239	509	1'748	305	130	435	150	48	198	353	78	431	2'241	914	3'155	3'155
Frequenza di forti consumi di alcol***																
mai	12.4	16.2	13.6	43.2	46.2	43.9	33.3	37.5	34.6	57.7	59.6	58.0	25.2	26.9	25.7	762
meno di una volta al mese	10.9	11.6	11.1	22.5	29.2	24.1	25.0	25.0	25.0	23.0	22.8	22.9	15.3	14.2	15.0	446
1 volta al mese	9.9	9.2	9.7	14.6	9.2	13.3	12.5	10.0	11.8	9.1	10.5	9.3	10.5	9.2	10.1	301
1 volta alla settimana	25.8	22.1	24.7	12.2	7.7	11.2	19.8	22.5	20.6	9.7	7.0	9.3	20.7	18.9	20.2	600
quasi ogni giorno	41.0	40.9	41.0	7.5	7.7	7.6	9.4	5.0	8.1	0.6	0.0	0.5	28.2	30.8	28.9	859
N**	1'394	606	2'000	213	65	278	96	40	136	331	57	388	2'138	830	2'968	2'968
<i>dati mancanti</i>	1'154	479	1'633	283	126	409	152	46	198	311	69	380	2'075	851	2'926	2'926

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che hanno indicato un consumo d'alcol. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T21 Frequenza del consumo di tabacco e numero di sigarette al giorno nel corso dei 30 ultimi giorni prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2008)

	Pazienti: problema principale												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Frequenza del consumo di tabacco*																
mai	27.9	36.7	30.5	3.3	5.3	3.8	12.6	7.1	10.9	24.2	17.3	23.1	23.0	27.9	24.4	596
1 giorno alla settimana o meno	1.5	0.7	1.3	0.5	0.0	0.3	1.1	4.8	2.2	2.8	5.3	3.2	1.6	1.3	1.5	37
2 a 3 giorni alla settimana	1.2	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.1	4.8	2.2	2.5	5.3	3.0	1.3	1.2	1.2	30
4 a 6 giorni alla settimana	0.8	1.2	0.9	0.9	0.0	0.7	1.1	0.0	0.7	2.2	1.3	2.1	1.2	1.3	1.2	30
1 volta al giorno	0.9	0.2	0.7	0.0	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	2.2	2.7	2.3	1.0	0.7	0.9	22
più volte al giorno	67.6	60.6	65.6	95.3	93.3	94.8	84.2	83.3	83.9	66.1	68.0	66.4	72.0	67.6	70.7	1'728
N**	973	406	1'379	213	75	288	95	42	137	363	75	438	1'758	685	2'443	2'443
<i>dati mancanti</i>	1'575	679	2'254	283	116	399	153	44	197	279	51	330	2'455	996	3'451	3'451
Numero di sigarette al giorno***																
0 a 10	15.9	17.2	16.2	7.9	13.8	9.4	17.5	36.1	24.2	45.8	39.2	44.6	20.6	21.0	20.7	326
11 a 20	39.3	45.6	41.0	45.8	48.3	46.4	50.8	41.7	47.5	42.4	43.1	42.5	41.6	44.0	42.3	667
21 a 30	28.8	24.7	27.7	35.6	29.3	34.0	19.0	13.9	17.2	8.5	9.8	8.7	25.3	22.9	24.7	389
31 o più	16.0	12.6	15.1	10.7	8.6	10.2	12.7	8.3	11.1	3.4	7.8	4.2	12.5	12.1	12.4	196
N**	605	215	820	177	58	235	63	36	99	236	51	287	1'158	420	1'578	1'578
<i>dati mancanti</i>	97	42	139	29	13	42	20	3	23	39	11	50	195	74	269	269

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che hanno indicato un consumo di tabacco. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T22a Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2008), uomini

Pazienti: principale sostanza problematica										
	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Obiettivo di consumo*										
astinenza definitiva	32.8	77.8	72.4	75.4	75.0	62.5	0.0	50.5	68.8	60.0
astinenza limitata nel tempo	23.1	0.0	2.9	5.6	0.0	12.5	100.0	6.1	0.0	20.0
consumo controllato	26.2	11.1	12.1	5.6	12.5	25.0	0.0	19.9	12.5	0.0
non è prevista nessuna limitazione	3.1	11.1	1.1	2.4	0.0	0.0	0.0	5.6	12.5	0.0
nessuna decisione finora	14.3	0.0	11.0	10.3	12.5	0.0	0.0	17.9	6.3	20.0
altro	0.5	0.0	0.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N*	1'340	9	272	126	8	8	1	196	16	15
<i>dati mancanti</i>	1'208	15	200	122	14	13	0	446	44	10

T22b Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2008), donne

Obiettivo di consumo*										
astinenza definitiva	37.3	100.0	67.0	62.5	50.0	66.7	0.0	46.7	0.0	42.9
astinenza limitata nel tempo	17.3	0.0	1.1	7.5	50.0	11.1	0.0	6.7	0.0	0.0
consumo controllato	30.3	0.0	11.0	15.0	0.0	22.2	0.0	33.3	50.0	28.6
non è prevista nessuna limitazione	1.2	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	25.0	14.3
nessuna decisione finora	13.0	0.0	16.5	15.0	0.0	0.0	0.0	10.0	25.0	14.3
altro	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N*	515	1	91	40	2	9	0	30	4	7
<i>dati mancanti</i>	570	3	96	46	13	12	2	96	48	3

T22c Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2008), uomini e donne

Obiettivo di consumo*										
astinenza definitiva	34.1	80.0	71.1	72.3	70.0	64.7	0.0	50.0	55.0	54.5
astinenza limitata nel tempo	21.5	0.0	2.5	6.0	10.0	11.8	100.0	6.2	0.0	13.6
consumo controllato	27.3	10.0	11.8	7.8	10.0	23.5	0.0	21.7	20.0	9.1
non è prevista nessuna limitazione	2.5	10.0	1.9	1.8	0.0	0.0	0.0	5.3	15.0	4.5
nessuna decisione finora	14.0	0.0	12.4	11.4	10.0	0.0	0.0	16.8	10.0	18.2
altro	0.6	0.0	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N*	1'855	10	363	166	10	17	1	226	20	22
<i>dati mancanti</i>	1'778	18	296	168	27	25	2	542	92	13

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T23a Problemi psichici nel corso della vita (2008), uomini

Uomini

	Pazienti: problema principale									
	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problemi psichici*										
depressione grave	33.3	14.3	39.2	31.6	37.5	66.7	100.0	26.2	37.5	33.3
stati ansiosi/tensione nervosa grave	30.5	14.3	37.3	32.9	37.5	44.4	0.0	16.6	12.5	26.7
diff. di compr./memoria/concentrazion.	12.5	14.3	19.1	14.5	12.5	44.4	0.0	15.9	12.5	26.7
allucinazioni	3.4	28.6	4.4	9.2	0.0	44.4	0.0	9.7	12.5	6.7
diff. a controllare comp. violenti	13.5	14.3	16.2	21.1	12.5	11.1	0.0	17.9	25.0	20.0
problemi psichici curati con medicine	17.6	28.6	15.2	13.2	0.0	44.4	0.0	8.3	25.0	6.7
pensieri suicidi seri	13.2	14.3	17.2	18.4	25.0	33.3	0.0	14.5	12.5	13.3
tentativi di suicidio	7.1	0.0	10.8	10.5	12.5	0.0	0.0	3.4	12.5	6.7
altro/i problema/i psichico/i	4.2	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	12.5	6.7
nessuno	36.7	57.1	31.9	42.1	50.0	0.0	0.0	51.7	50.0	46.7
N**	942	7	204	76	8	9	1	145	8	15
<i>dati mancanti</i>	<i>1'606</i>	<i>17</i>	<i>268</i>	<i>172</i>	<i>14</i>	<i>12</i>	<i>0</i>	<i>497</i>	<i>52</i>	<i>10</i>

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T23b Problemi psichici nel corso della vita (2008), donne

Donne

	Pazienti: problema principale									
	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problemi psichici*										
depressione grave	44.2	100.0	40.3	36.4	66.7	27.3	0.0	37.0	0.0	100.0
stati ansiosi/tensione nervosa grave	41.4	100.0	33.3	31.8	0.0	63.6	0.0	22.2	0.0	85.7
diff. di compr./memoria/concentrazion.	13.9	100.0	13.9	18.2	0.0	27.3	0.0	33.3	0.0	28.6
allucinazioni	3.0	0.0	4.2	0.0	0.0	9.1	0.0	14.8	0.0	14.3
diff. a controllare comp. violenti	10.2	0.0	13.9	4.5	33.3	9.1	0.0	18.5	0.0	28.6
problemi psichici curati con medicine	29.0	0.0	20.8	31.8	0.0	45.5	0.0	18.5	0.0	0.0
pensieri suicidi seri	20.1	0.0	18.1	4.5	0.0	27.3	0.0	29.6	0.0	42.9
tentativi di suicidio	11.9	0.0	19.4	9.1	33.3	27.3	0.0	18.5	0.0	14.3
altro/i problema/i psichico/i	3.7	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
nessuno	23.3	0.0	33.3	27.3	33.3	9.1	0.0	29.6	0.0	0.0
N**	403	1	72	22	3	11	0	27	1	7
<i>dati mancanti</i>	682	3	115	64	12	10	2	99	51	3

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T23c Problemi psichici nel corso della vita (2008), uomini e donne

Uomini e donne

	Pazienti: problema principale									
	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problemi psichici*										
depressione grave	36.6	25.0	39.5	32.7	45.5	45.0	100.0	27.9	33.3	54.5
stati ansiosi/tensione nervosa grave	33.8	25.0	36.2	32.7	27.3	55.0	0.0	17.4	11.1	45.5
diff. di compr./memoria/concentrazion.	12.9	25.0	17.8	15.3	9.1	35.0	0.0	18.6	11.1	27.3
allucinazioni	3.3	25.0	4.3	7.1	0.0	25.0	0.0	10.5	11.1	9.1
diff. a controllare comp. violenti	12.5	12.5	15.6	17.3	18.2	10.0	0.0	18.0	22.2	22.7
problemi psichici curati con medicine	21.0	25.0	16.7	17.3	0.0	45.0	0.0	9.9	22.2	4.5
pensieri suicidi seri	15.2	12.5	17.4	15.3	18.2	30.0	0.0	16.9	11.1	22.7
tentativi di suicidio	8.6	0.0	13.0	10.2	18.2	15.0	0.0	5.8	11.1	9.1
altro/i problema/i psichico/i	4.1	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	22.2	4.5
nessuno	32.7	50.0	32.2	38.8	45.5	5.0	0.0	48.3	44.4	31.8
N**	1'345	8	276	98	11	20	1	172	9	22
<i>dati mancanti</i>	<i>2'288</i>	<i>20</i>	<i>383</i>	<i>236</i>	<i>26</i>	<i>22</i>	<i>2</i>	<i>596</i>	<i>103</i>	<i>13</i>

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T24 Parenti/conoscenti: legame tra l'utente e la persona sintomatica (2008)

Parenti o conoscenti				
	Uomini	Donne	Totale	
	%	%	%	N
L'utente è... *				
madre/padre	34.5	31.4	32.1	354
figlio/figlia	10.7	9.7	10.0	110
sorella/fratello	3.4	4.8	4.4	49
partner	31.0	43.7	40.7	449
altro parente	3.4	3.3	3.4	37
collega/amico/a	2.7	2.9	2.8	31
datore di lavoro/docente	7.7	0.8	2.4	27
tutore/curatore	0.0	0.0	0.0	0
altro	6.5	3.4	4.2	46
N**	261	842	1'103	1'103
<i>dati mancanti</i>	7	10	17	17

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T25 Parenti/conoscenti: problema principale e altri problemi della persona sintomatica (2008)

Parenti o conoscenti					
	Totale			Totale	
	%	N		%	N
Problema principale della persona sintomatica*			Altri problemi della persona sintomatica***		
alcol	65.2	678	alcol	29.6	115
cocktail (eroina e cocaina)	1.1	11	cocktail (eroina e cocaina)	0.8	3
eroina	3.7	38	eroina	4.4	17
metadone	0.4	4	metadone	2.1	8
altri oppiacei	0.1	1	altri oppiacei	0.5	2
cocaina	5.0	52	cocaina	7.5	29
crack, freebase	0.0	0	crack, freebase	0.0	0
amfetamine	0.6	6	amfetamine	0.3	1
MDMA e affini (ecstasy)	0.7	7	MDMA e affini (ecstasy)	0.8	3
altri stimolanti	0.0	0	altri stimolanti	0.0	0
barbiturici	1.0	10	barbiturici	0.0	0
benzodiazepine	0.3	3	benzodiazepine	5.1	20
altri sonniferi e tranquillanti	0.6	6	altri sonniferi e tranquillanti	1.8	7
LSD	0.0	0	LSD	0.0	0
altri allucinogeni	0.2	2	altri allucinogeni	0.3	1
sostanze volatili (per es., solventi)	0.1	1	sostanze volatili (per es., solventi)	0.0	0
canapa	13.7	142	canapa	17.5	68
tabacco	1.1	11	tabacco	21.6	84
altra/e sostanza/e	0.5	5	altra/e sostanza/e	0.5	2
gioco patologico	2.0	21	gioco patologico	1.0	4
disturbi alimentari	1.1	11	disturbi alimentari	1.0	4
altri problemi assimilabili a una dipendenza	3.0	31	altri problemi assimilabili a una dipendenza	4.4	17
			nessun altro problema di dipendenza	31.4	122
N**	1'040	1'040	N**	389	389
<i>dati mancanti</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>dati mancanti</i>	<i>731</i>	<i>731</i>

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

*** Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

T26 Parenti/conoscenti: Problemi della persona di contatto legati ai problemi della persona sintomatica (2008)

Parenti o conoscenti				
	Uomini	Donne	Totale	
	%	%	%	N
propri problemi*				
propri problemi di consumo	7.9	8.6	8.5	33
propri comportamenti di dipendenza	0.0	0.7	0.5	2
propri problemi somatici	4.5	7.6	6.9	27
propri problemi psichici	23.6	37.2	34.1	133
problemi con il/la partner	34.8	43.9	41.8	163
problemi di famiglia	41.6	53.5	50.8	198
problemi finanziari	5.6	13.0	11.3	44
propri problemi prof./di formazione	4.5	3.3	3.6	14
problemi di alloggio	2.2	7.0	5.9	23
problemi di violenza (vittima)	1.1	11.6	9.2	36
problemi per controllare la violenza	2.2	1.7	1.8	7
problemi giuridici	2.2	3.7	3.3	13
altro/i	2.2	2.3	2.3	9
nessuno	27.0	11.6	15.1	59
N**	89	301	390	390
<i>dati mancanti</i>	<i>179</i>	<i>551</i>	<i>730</i>	<i>730</i>

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T27 Sesso e età dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale¹) e dei parenti o conoscenti (2008)

	Pazienti: problema principale ¹												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Sesso*																			
maschile			68.4			70.3			77.5			82.7			24.2			62.3	3'801
femminile			31.6			28.7			22.5			17.3			75.8			37.6	2'292
sex non noto			0.0			0.9			0.0			0.0			0.0			0.1	5
N**	2'173	1'002	3'175	382	156	543	213	62	275	555	116	671	248	775	1'023	3'801	2'292	6'098	6'098
Età (in anni)*																			
fino a 14 anni	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	6.0	3.4	1.2	0.3	0.5	0.6	0.5	0.5	32
15-19	2.3	3.0	2.5	1.1	4.5	2.1	2.8	17.7	6.2	63.9	52.6	61.9	8.2	2.7	4.0	12.2	6.8	10.2	618
20-24	4.1	2.2	3.5	15.3	18.6	16.3	20.8	25.8	21.9	14.1	11.2	13.6	5.7	5.2	5.3	8.1	6.3	7.5	454
25-29	7.3	5.7	6.8	20.3	16.7	19.3	24.1	21.0	23.4	8.3	10.3	8.7	6.5	6.7	6.7	9.9	8.0	9.2	557
30-34	9.2	7.4	8.6	15.0	20.5	16.6	21.2	8.1	18.2	4.9	7.8	5.4	6.1	7.9	7.5	9.8	8.8	9.5	575
35-39	12.2	10.6	11.7	22.4	18.6	21.3	16.0	11.3	15.0	2.9	2.6	2.8	12.2	10.9	11.2	11.9	10.6	11.5	696
40-44	14.1	14.5	14.2	15.0	12.2	14.2	7.1	9.7	7.7	1.1	3.4	1.5	9.0	15.7	14.1	11.4	13.5	12.2	740
45-49	15.1	16.9	15.7	7.1	6.4	6.9	5.7	3.2	5.1	1.3	4.3	1.8	17.1	16.2	16.4	11.7	14.3	12.7	773
50-54	12.1	13.5	12.5	1.8	2.6	2.1	2.4	1.6	2.2	0.4	0.9	0.4	11.4	13.5	13.0	8.5	11.2	9.5	579
55-59	10.1	10.8	10.3	1.3	0.0	0.9	0.0	1.6	0.4	0.4	0.0	0.3	8.6	8.7	8.7	6.9	8.3	7.4	451
60-64	7.5	7.8	7.6	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	5.3	5.5	4.8	5.6	5.1	310
65-69	3.5	5.8	4.2	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	3.5	3.9	2.5	4.0	3.0	185
70-74	1.7	1.4	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	2.3	2.2	1.1	1.5	1.3	77
75 e più	0.8	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.1	0.8	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	31
N**	2'172	1'000	3'172	379	156	535	212	62	274	554	116	670	245	771	1'016	3'792	2'286	6'078	6'078
<i>dati mancanti</i>	1	2	3	3	0	8	1	0	1	1	0	1	3	4	7	9	6	20	20
Età																			
media	45.2	46.5	45.6	34.5	32.8	34.0	31.6	29.0	31.0	21.1	23.7	21.5	43.5	44.8	44.5	39.2	42.6	40.5	
deviazione standard	13.0	12.6	12.9	8.7	8.7	8.7	8.0	9.5	8.4	7.0	12.8	8.4	14.9	13.3	13.7	14.7	14.3	14.6	
1° quartile	36.0	38.7	36.8	27.3	25.7	26.7	25.6	21.6	24.2	17.0	16.8	17.0	31.9	35.9	35.5	27.1	31.7	28.9	
mediana	45.2	46.6	45.8	34.6	33.1	34.0	30.6	26.5	29.8	18.3	18.8	18.3	45.6	45.1	45.2	38.9	43.3	40.7	
3° quartile	54.4	55.6	54.6	40.2	38.9	39.9	36.2	36.0	36.2	22.8	27.0	23.3	54.0	53.1	53.4	49.7	52.5	51.0	
N**	2'172	1'000	3'172	379	156	535	212	62	274	554	116	670	245	771	1'016	3'792	2'286	6'078	
<i>dati mancanti</i>	1	2	3	3	0	8	1	0	1	1	0	1	3	4	7	9	6	20	

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T28 Stato civile e grado di urbanizzazione del domicilio dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale¹) e dei parenti o conoscenti (2008)

	Pazienti: problema principale ¹												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			N
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Stato civile*																			
celibe/nubile	38.3	30.4	35.8	75.8	67.6	73.2	70.8	75.9	71.9	95.0	90.8	94.3	35.4	21.1	24.5	53.3	36.1	46.9	2'669
sposato	34.4	31.0	33.3	10.1	10.8	10.2	15.8	8.6	14.2	3.5	5.5	3.9	51.6	54.9	54.1	27.0	34.9	29.9	1'705
separato-a (giuridicamente)	5.4	6.5	5.7	2.5	3.4	3.0	3.0	3.4	3.1	0.4	1.8	0.6	2.2	4.0	3.5	3.9	4.9	4.3	245
divorziato-a	19.8	26.1	21.8	10.4	14.2	11.6	9.9	10.3	10.0	0.9	1.8	1.1	7.2	14.6	12.8	14.0	19.0	15.9	905
vedovo-a	2.0	5.4	3.1	0.6	2.0	1.0	0.5	1.7	0.8	0.0	0.0	0.0	2.7	3.8	3.5	1.4	4.3	2.5	140
unione registrata	0.2	0.5	0.3	0.6	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.9	1.7	1.5	0.3	0.9	0.6	32
N**	2'032	936	2'968	356	148	508	202	58	260	537	109	646	223	707	930	3'566	2'126	5'696	5'696
<i>dati mancanti</i>	141	66	207	26	8	35	11	4	15	18	7	25	25	68	93	235	166	402	402
Grado di urbanizzazione*																			
grandi centri urbani	10.9	11.9	11.2	0.3	0.0	0.2	1.1	1.9	1.2	0.0	0.0	0.0	9.5	10.8	10.5	7.1	8.9	7.8	450
periferia dei grandi centri	13.3	16.9	14.5	1.7	2.1	1.8	4.8	0.0	3.7	3.0	0.9	2.6	15.8	11.7	12.7	9.7	12.1	10.6	615
città di media importanza	13.5	15.8	14.2	24.9	26.4	25.4	28.3	22.2	27.0	32.0	22.7	30.4	17.4	20.0	19.4	19.2	19.2	19.2	1'112
piccole città	35.7	30.5	34.0	51.3	48.6	50.5	44.4	50.0	45.6	30.1	43.6	32.4	31.5	30.8	31.0	36.9	33.1	35.5	2'055
campagna	26.7	24.9	26.1	21.8	22.9	22.1	21.4	25.9	22.4	35.0	32.7	34.6	25.7	26.6	26.4	27.1	26.7	26.9	1'559
N**	2'055	962	3'017	349	140	489	187	54	241	532	110	642	241	759	1'000	3'588	2'203	5'791	5'791
<i>dati mancanti</i>	118	40	158	33	16	54	26	8	34	23	6	29	7	16	23	213	89	307	307

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T29 Tipo di nucleo familiare, situazione di domicilio e tipo di relazione di coppia dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale¹) e dei parenti o conoscenti (2008)

	Pazienti: problema principale ¹												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			N
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Tipo di nucleo familiare*																			
da solo-a	38.4	34.6	37.2	43.8	32.4	40.8	35.9	34.9	35.7	10.5	15.8	11.4	15.6	14.4	14.6	32.7	26.1	30.3	1'310
con i genitori/un genitore	6.6	4.9	6.1	13.5	9.0	12.1	19.0	23.3	19.9	71.2	44.6	66.4	22.2	6.1	9.5	20.3	9.9	16.5	711
con figlio-a-i	1.7	12.0	4.9	0.4	12.6	3.8	0.7	4.7	1.5	0.2	0.0	0.2	4.4	14.0	11.9	1.4	11.6	5.1	220
con un-a partner (senza figli)	26.7	29.3	27.5	13.9	20.7	16.1	15.7	18.6	16.3	4.1	10.9	5.4	17.0	25.3	23.5	20.2	25.2	22.0	953
con un-a partner e figlio-a-i	20.1	13.0	17.9	10.3	9.9	10.1	11.8	2.3	9.7	2.4	3.0	2.5	38.5	38.3	38.3	16.6	20.2	17.9	772
con altri parenti-familiari	1.0	1.0	1.0	3.2	2.7	3.0	2.0	0.0	1.5	1.7	5.0	2.3	0.0	0.2	0.2	1.3	1.1	1.2	53
con amici (comunità abitativa)	1.7	2.0	1.8	3.9	1.8	3.3	3.9	4.7	4.1	1.7	3.0	2.0	1.5	1.0	1.1	2.1	1.8	2.0	86
altro	3.7	3.3	3.6	11.0	10.8	10.8	11.1	11.6	11.2	8.1	17.8	9.8	0.7	0.8	0.8	5.5	4.2	5.0	217
N**	1'548	694	2'242	281	111	397	153	43	196	459	101	560	135	494	629	2'739	1'578	4'322	4'322
<i>dati mancanti</i>	625	308	933	101	45	146	60	19	79	96	15	111	113	281	394	1'062	714	1'776	1'776
Situazione di domicilio*																			
domicilio fisso	94.5	95.1	94.7	82.9	79.5	82.1	85.3	83.3	84.8	92.1	86.0	91.1	97.4	97.0	97.1	92.7	93.9	93.2	4'081
senza domicilio fisso	3.9	3.4	3.8	11.6	12.5	11.7	11.3	12.5	11.6	4.6	10.8	5.7	2.6	2.8	2.7	5.1	4.4	4.8	212
istituzione	1.6	1.4	1.5	5.5	8.0	6.1	3.3	4.2	3.5	3.2	3.2	3.2	0.0	0.2	0.1	2.2	1.7	2.0	87
N**	1'579	700	2'279	275	112	392	150	48	198	433	93	526	152	542	694	2'751	1'624	4'380	4'380
<i>dati mancanti</i>	594	302	896	107	44	151	63	14	77	122	23	145	96	233	329	1'050	668	1'718	1'718
Tipo di relazione di coppia*																			
senza partner, sola-a	29.9	34.9	31.5	45.7	27.3	39.9	40.7	29.7	38.0	66.3	47.7	62.8	14.7	16.8	16.4	36.0	29.2	33.3	1'153
relazione-i saltuaria-e	4.7	4.8	4.7	8.1	13.6	10.2	8.0	21.6	11.3	9.1	9.2	9.1	3.7	2.5	2.7	5.6	5.3	5.5	192
relazione fissa, vivendo separat.	9.3	10.8	9.8	11.9	20.5	14.2	16.8	24.3	18.7	13.8	12.3	13.5	11.9	12.8	12.6	10.6	12.5	11.4	393
relazione fissa, vivendo insieme	56.0	49.5	54.0	34.3	38.6	35.6	34.5	24.3	32.0	10.9	30.8	14.7	69.7	68.0	68.3	47.8	53.0	49.8	1'723
N**	1'290	584	1'874	210	88	303	113	37	150	276	65	341	109	447	556	2'125	1'331	3'461	3'461
<i>dati mancanti</i>	883	418	1'301	172	68	240	100	25	125	279	51	330	139	328	467	1'676	961	2'637	2'637

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

**T30 Più alta formazione portata a termine, fonte di reddito principale e attività principale dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale¹)
e dei parenti o conoscenti (2008)**

	Pazienti: problema principale ¹												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Più alta formazione portata a termine**																			
nessuna form. terminata	7.5	8.2	7.7	7.5	11.1	8.4	4.0	0.0	3.2	21.2	22.3	21.4	10.5	5.5	6.8	10.0	8.9	9.6	376
scuola dell'obbligo	13.9	20.2	15.7	32.1	43.4	35.1	18.7	45.0	24.2	54.1	53.2	54.0	14.3	12.3	12.8	24.1	23.4	23.9	932
scolarità complementare	3.5	5.9	4.2	4.1	2.0	3.5	4.0	0.0	3.2	6.1	6.4	6.1	1.5	5.5	4.5	3.9	5.4	4.4	173
apprendistato/ scuola profes.	56.7	49.6	54.6	51.5	34.3	46.9	61.3	45.0	57.9	15.4	16.0	15.5	42.9	52.0	49.6	47.6	45.1	46.8	1'827
liceo/diploma	3.1	3.2	3.1	1.9	7.1	3.3	2.7	5.0	3.2	1.9	2.1	2.0	5.3	6.0	5.8	2.9	4.6	3.5	137
magistrale, scuola pedagogic.	0.3	2.4	0.9	0.0	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	3.0	3.4	3.3	0.4	2.6	1.2	45
form. profession. superiore	7.0	6.1	6.7	0.7	1.0	0.8	6.0	5.0	5.8	0.6	0.0	0.5	11.3	8.1	8.9	5.2	5.7	5.4	210
scuola profession. superiore	0.8	0.8	0.8	1.1	0.0	0.8	1.3	0.0	1.1	0.4	0.0	0.4	2.3	0.5	1.0	0.9	0.5	0.8	30
alta scuola specializzata	2.5	0.8	2.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	2.3	3.1	2.9	1.7	1.3	1.5	60
università, politecnico	4.7	2.9	4.2	1.1	0.0	0.8	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	6.8	3.4	4.3	3.3	2.4	3.0	117
N**	1'435	595	2'030	268	99	367	150	40	190	462	94	556	133	381	514	2'593	1'314	3'907	3'907
<i>dati mancanti</i>	738	407	1'145	114	57	176	63	22	85	93	22	115	115	394	509	1'208	978	2'191	2'191
Fonte di reddito principale*																			
reddito da lavoro	60.3	40.9	54.3	37.3	25.7	33.9	62.8	48.9	59.4	25.6	18.3	24.4	72.3	59.4	62.5	53.1	45.2	50.2	2'261
risparmi	1.1	1.0	1.1	0.4	0.9	0.5	1.4	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.6	0.8	0.8	0.8	36
rendita (AVS/AI, ecc.)	18.4	24.1	20.2	17.2	24.8	19.5	10.3	8.5	9.9	3.1	8.6	4.0	9.8	13.6	12.7	14.6	18.8	16.2	728
assistenza/previdenza sociale	10.3	13.3	11.2	33.0	36.7	33.9	14.5	19.1	15.6	8.4	20.4	10.4	4.0	2.4	2.8	12.0	11.7	11.9	536
assicurazione disoccupazione	5.6	3.4	4.9	7.5	3.7	6.4	4.8	4.3	4.7	2.4	2.2	2.4	1.2	0.7	0.8	5.0	2.3	4.0	180
sostegno del/della partner	1.1	13.0	4.8	1.1	1.8	1.3	0.7	0.0	0.5	0.4	3.2	0.9	0.6	17.4	13.4	0.9	12.5	5.2	234
sosteg. genitori/familiari/amici	2.7	3.3	2.9	1.1	3.7	1.8	5.5	12.8	7.3	59.8	46.2	57.5	12.1	5.1	6.8	12.9	7.7	11.0	495
spacciando/tagliando	0.1	0.0	0.0	0.7	0.9	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	6
altre entrate illegali	0.1	0.1	0.1	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	3
prostituzione	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
altra-e	0.4	0.8	0.6	1.1	1.8	1.3	0.0	6.4	1.6	0.2	0.0	0.2	0.0	0.6	0.4	0.5	0.8	0.6	27
N**	1'612	729	2'341	279	109	389	145	47	192	453	93	546	173	545	718	2'841	1'665	4'507	4'507
<i>dati mancanti</i>	561	273	834	103	47	154	68	15	83	102	23	125	75	230	305	960	627	1'591	1'591
Attività principale (nel corso dei 30 ultimi giorni)*																			
att. a tempo pieno (70% o più)	55.2	27.9	47.0	34.5	17.1	29.9	59.9	51.1	57.9	21.6	12.6	20.0	67.6	39.2	46.0	48.4	30.8	42.2	1'774
attività a tempo parziale	5.4	18.6	9.4	7.6	14.3	9.4	3.3	4.4	3.6	2.2	2.1	2.2	3.6	28.9	22.9	4.8	19.4	9.9	417
varie attività occas.	1.6	1.5	1.6	2.5	3.8	2.9	1.3	0.0	1.0	2.0	4.2	2.4	0.0	0.9	0.7	1.7	1.5	1.6	67
in formazione	2.5	3.5	2.8	1.1	5.7	2.3	6.6	8.9	7.1	60.4	50.5	58.6	11.5	6.5	7.7	13.2	9.1	11.8	494
inattivo sul mercat. del lavor.	20.6	34.5	24.8	25.5	37.1	29.1	15.1	22.2	16.8	3.1	9.5	4.2	10.8	21.5	19.0	17.0	28.2	21.0	883
disoccup., ricerc. di un lavoro	9.7	9.5	9.6	16.0	7.6	13.5	9.2	6.7	8.6	4.0	9.5	5.0	2.2	1.1	1.4	8.9	6.4	8.0	337
disoccupato, lav. fut. garant.	0.2	0.5	0.3	0.4	1.0	0.5	0.7	0.0	0.5	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	11
altra	4.7	4.1	4.5	12.4	13.3	12.5	3.9	6.7	4.6	6.5	11.6	7.4	4.3	1.6	2.2	5.7	4.3	5.2	220
N**	1'531	656	2'187	275	105	385	152	45	197	449	95	544	139	446	585	2'718	1'480	4'203	4'203
<i>dati mancanti</i>	642	346	988	107	51	158	61	17	78	106	21	127	109	329	438	1'083	812	1'895	1'895

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T31 Statuto professionale e reddito mensile netto dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale¹) e dei parenti o conoscenti (2008)

	Pazienti: problema principale ¹												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Statuto professionale*																			
senza attività professionale	31.7	45.0	35.8	58.7	61.4	60.0	32.8	31.8	32.6	14.6	37.5	17.6	14.3	25.8	23.5	32.3	39.4	35.0	682
apprendista, praticante	1.8	1.1	1.6	0.0	1.8	0.5	4.7	13.6	7.0	33.0	6.3	29.4	0.0	2.2	1.8	4.4	2.2	3.6	70
manovale, operaio-a ausiliar.	4.5	4.6	4.5	11.6	8.8	10.7	3.1	0.0	2.3	1.0	0.0	0.8	1.8	4.0	3.6	4.8	4.5	4.7	91
operaio-a con formaz. pratica	6.9	6.3	6.7	8.4	3.5	7.0	7.8	13.6	9.3	2.9	0.0	2.5	3.6	4.0	3.9	6.8	6.0	6.5	127
oper. con form. certif. (AFC)	11.7	3.4	9.2	7.7	3.5	6.5	20.3	9.1	17.4	1.0	6.3	1.7	3.6	7.6	6.8	10.2	4.9	8.2	160
caposquadra	2.3	0.0	1.6	3.2	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	3.4	1.8	0.0	0.4	2.3	0.0	1.4	28
impiegato-a non qualificato-a	14.6	24.2	17.6	6.5	12.3	7.9	15.6	27.3	18.6	6.8	18.8	8.4	25.0	31.6	30.2	14.1	25.0	18.1	353
impieg. qualif., quadro medio	11.7	6.6	10.1	1.9	5.3	2.8	7.8	4.5	7.0	2.9	0.0	2.5	21.4	13.3	14.9	10.0	8.2	9.3	182
imp. funz. dirett., quadr. sup.	2.8	0.6	2.1	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	7.1	1.8	2.8	2.4	0.8	1.8	36
indipendente	9.8	6.6	8.8	1.3	1.8	1.4	1.6	0.0	1.2	2.9	0.0	2.5	16.1	7.1	8.9	8.0	5.7	7.1	139
scolaro-a, studente	0.9	1.1	1.0	0.0	1.8	0.5	3.1	0.0	2.3	29.1	31.3	29.4	3.6	2.2	2.5	3.7	2.7	3.3	65
altro statuto	1.1	0.6	1.0	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.7	1.8	0.4	0.7	1.1	0.6	0.9	17
N**	792	351	1'143	155	57	215	64	22	86	103	16	119	56	225	281	1'231	716	1'950	1'950
<i>dati mancanti</i>	<i>1'381</i>	<i>651</i>	<i>2'032</i>	<i>227</i>	<i>99</i>	<i>328</i>	<i>149</i>	<i>40</i>	<i>189</i>	<i>452</i>	<i>100</i>	<i>552</i>	<i>192</i>	<i>550</i>	<i>742</i>	<i>2'570</i>	<i>1'576</i>	<i>4'148</i>	<i>4'148</i>
Reddito mensile netto*																			
nessun reddito	28.5	33.3	29.7	31.0	27.8	30.3	39.5	33.3	37.7	39.5	71.4	44.3	7.7	19.4	17.3	30.1	33.2	31.0	362
fino a 1000 fr.	4.9	3.6	4.6	15.5	2.8	12.5	5.3	6.7	5.7	35.3	23.8	33.6	7.7	11.3	10.7	10.9	6.4	9.7	113
da 1001 a 2000 fr.	5.5	9.1	6.4	14.7	13.9	14.5	2.6	6.7	3.8	4.2	0.0	3.6	15.4	9.7	10.7	6.5	9.1	7.3	85
da 2001 a 3000 fr.	10.8	17.6	12.5	15.5	41.7	21.7	10.5	20.0	13.2	0.8	4.8	1.4	15.4	17.7	17.3	9.8	19.5	12.5	146
da 3001 a 4000 fr.	10.2	14.5	11.3	7.8	11.1	8.6	13.2	26.7	17.0	8.4	0.0	7.1	15.4	16.1	16.0	10.0	14.6	11.3	132
da 4001 a 5000 fr.	16.1	10.9	14.8	9.5	2.8	7.9	21.1	0.0	15.1	7.6	0.0	6.4	0.0	6.5	5.3	14.1	7.6	12.3	144
da 5001 a 6000 fr.	11.6	6.7	10.4	5.2	0.0	3.9	5.3	6.7	5.7	2.5	0.0	2.1	15.4	12.9	13.3	9.3	6.1	8.4	98
da 6001 a 8000 fr.	6.9	3.6	6.1	0.9	0.0	0.7	2.6	0.0	1.9	1.7	0.0	1.4	7.7	4.8	5.3	5.4	2.7	4.6	54
da 8001 a 10 000 fr.	3.9	0.6	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	1.6	4.0	2.7	0.6	2.1	25
da 10 001 a 15 000 fr.	1.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	6
più di 15 000 fr.	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	4
N**	491	165	656	116	36	152	38	15	53	119	21	140	13	62	75	841	328	1'169	1'169
<i>dati mancanti</i>	<i>1'682</i>	<i>837</i>	<i>2'519</i>	<i>266</i>	<i>120</i>	<i>391</i>	<i>175</i>	<i>47</i>	<i>222</i>	<i>436</i>	<i>95</i>	<i>531</i>	<i>235</i>	<i>713</i>	<i>948</i>	<i>2'960</i>	<i>1'964</i>	<i>4'929</i>	<i>4'929</i>

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T32a Ragione principale della fine del trattamento/accompagnamento dei pazienti (in rapporto al problema principale¹) e dei parenti o conoscenti (2008)

	Pazienti: problema principale ¹												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Ragione principale*																			
conclus. pianific. senza passag.	47.5	48.7	47.9	23.9	23.5	24.1	33.7	42.1	35.5	67.7	51.4	64.9	67.5	68.0	67.8	49.4	54.1	51.2	3'005
conclus. pianific. con passag.	5.8	6.8	6.1	16.9	15.4	16.3	11.2	7.0	10.3	6.2	7.2	6.4	4.1	3.5	3.6	7.2	6.5	6.9	407
cambio di domicilio	2.7	1.9	2.4	6.7	12.8	8.4	6.8	3.5	6.1	0.9	10.8	2.6	0.4	0.5	0.5	2.8	2.6	2.7	161
ospedalizzazione	0.6	1.8	1.0	1.1	1.3	1.1	1.0	1.8	1.1	0.6	1.8	0.8	0.4	0.4	0.4	0.7	1.2	0.9	51
incarcerazione	0.1	0.1	0.1	1.9	0.0	1.3	1.0	0.0	0.8	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	15
perdita di contatto	24.9	25.9	25.2	29.3	24.8	27.8	27.3	31.6	28.2	14.3	14.4	14.3	16.5	17.8	17.4	22.9	21.7	22.4	1'316
conclusione esplicita	12.9	8.9	11.7	12.6	18.1	14.1	12.7	7.0	11.5	6.8	9.9	7.3	7.0	6.1	6.4	11.2	8.7	10.3	603
decesso	2.9	2.0	2.6	3.8	1.3	3.4	2.4	1.8	2.3	0.2	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	2.2	1.1	1.9	109
altre cause	2.4	3.9	2.9	3.8	2.7	3.4	3.9	5.3	4.2	2.9	4.5	3.2	4.1	3.6	3.7	3.2	3.9	3.5	204
N**	2'095	948	3'043	372	149	526	205	57	262	545	111	656	243	749	992	3'679	2'187	5'871	5'871
<i>dati mancanti</i>	78	54	132	10	7	17	8	5	13	10	5	15	5	26	31	122	105	227	227

T32b Destinazione dei trasferimenti dei pazienti (in rapporto al problema principale¹) e dei parenti o conoscenti (2008)

Destinazione dei trasferimenti***	Pazienti: problema principale ¹												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
terapia residenziale	40.9	26.7	36.2	46.3	36.8	43.8	55.0	100.0	62.5	33.3	42.9	35.5	22.2	26.3	25.0	42.2	31.1	38.5	120
consulenza ambulatoriale	51.6	62.2	55.1	38.9	52.6	42.5	40.0	0.0	33.3	50.0	28.6	45.2	55.6	63.2	60.7	47.1	57.5	50.6	158
appartamento protetto	2.2	0.0	1.4	1.9	0.0	1.4	5.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.9	1.6	5
altra istituzione specializzata	5.4	11.1	7.2	13.0	10.5	12.3	0.0	0.0	0.0	16.7	28.6	19.4	22.2	10.5	14.3	8.7	10.4	9.3	29
N**	93	45	138	54	19	73	20	4	24	24	7	31	9	19	28	206	106	312	312
<i>dati mancanti</i>	29	19	48	9	4	13	3	0	3	10	1	11	1	7	8	59	36	95	95

T32c Causa di decesso dei pazienti (in rapporto al problema principale¹) e dei parenti o conoscenti (2008)

Cause di decesso****	Pazienti: problema principale ¹												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
suicidio	14.0	13.3	13.8	20.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	10.5	12.5	9
infortunio	9.3	13.3	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	10.5	8.3	6
malattia	69.8	60.0	67.2	60.0	100.0	66.7	33.3	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	66.0	63.2	65.3	47
overdose o intossicazione acuta	7.0	6.7	6.9	20.0	0.0	16.7	66.7	100.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	10.5	11.1	8
altre cause di decesso	0.0	6.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	1.9	5.3	2.8	2
N**	43	15	58	5	1	6	3	1	4	1	0	1	0	1	1	53	19	72	72
<i>dati mancanti</i>	18	4	22	9	1	12	2	0	2	0	0	0	0	0	0	29	6	37	37

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti trasferiti. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

**** I risultati si basano solamente sui clienti deceduti durante l'intervento. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T33 Durata dell'intervento sui pazienti (in rapporto al problema principale¹) e sui parenti o conoscenti (2008)

	Pazienti: problema principale ¹												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite					
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale									
Durata della presa in carico* (%)																					
1 settimana o meno	4.5	4.7	4.5	3.4	2.6	3.1	2.8	3.2	2.9	5.8	2.6	5.2	11.3	10.2	10.5	5.5	6.3	5.8	354		
> 1 settimana a 1 mese	3.0	3.8	3.3	1.8	3.2	2.2	2.8	4.8	3.3	7.2	5.2	6.9	4.8	4.1	4.3	3.7	4.0	3.8	231		
> 1 a 2 mesi	4.3	5.4	4.6	2.6	1.3	2.2	4.7	4.8	4.7	9.0	7.8	8.8	6.9	5.3	5.7	5.0	5.2	5.1	308		
> 2 a 3 mesi	4.6	4.8	4.7	2.4	9.0	4.2	3.3	4.8	3.6	4.9	9.6	5.7	7.3	5.2	5.7	4.6	5.4	4.9	300		
> 3 a 6 mesi	12.0	12.3	12.1	7.3	12.8	8.8	11.7	8.1	10.9	13.5	15.7	13.9	16.9	15.6	15.9	12.1	13.8	12.8	777		
> 6 mesi a 1 anno	28.0	26.8	27.6	27.2	23.7	26.0	28.2	27.4	28.0	35.3	36.5	35.5	31.9	35.1	34.3	29.7	30.6	30.0	1'830		
> 1 a 2 anni	23.7	25.3	24.2	25.1	22.4	24.1	29.6	35.5	30.9	18.0	13.0	17.2	13.3	16.8	15.9	22.2	21.3	21.9	1'331		
> 2 a 3 anni	8.5	7.8	8.3	12.6	10.9	12.0	12.7	6.5	11.3	4.3	4.3	4.3	6.0	4.8	5.1	8.1	6.7	7.5	459		
> 3 a 5 anni	6.7	5.7	6.4	8.1	7.1	7.7	3.3	3.2	3.3	1.6	3.5	1.9	1.2	2.2	2.0	5.2	4.2	4.9	296		
> 5 a 10 anni	4.1	2.9	3.7	6.3	3.8	6.1	0.9	1.6	1.1	0.2	1.7	0.4	0.4	0.8	0.7	3.1	2.0	2.7	165		
più di 10 anni	0.6	0.6	0.6	3.1	3.2	3.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	0.5	0.7	40		
N**	2'168	1'001	3'169	382	156	543	213	62	275	555	115	670	248	775	1'023	3'796	2'290	6'091	6'091		
<i>dati mancanti</i>	5	1	6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	5	2	7	7		
Durata (in settimane)																					
media	73.2	67.9	71.5	107.9	93.2	107.2	61.2	58.0	60.5	38.8	46.8	40.2	35.6	41.5	40.1	66.2	57.8	63.4			
deviazione standard	91.0	95.3	92.4	139.6	133.4	143.2	54.6	62.0	56.2	43.7	65.9	48.3	39.4	52.1	49.4	88.0	82.8	87.1			
1° quartile	20.6	18.0	19.9	30.6	19.9	28.1	24.0	24.0	24.0	10.7	11.9	11.0	9.0	12.1	11.1	18.4	15.3	17.1			
mediana	44.0	42.1	43.4	60.6	45.7	56.7	49.1	43.6	48.1	29.1	28.4	29.1	25.7	28.3	28.0	39.1	35.0	37.9			
3° quartile	89.9	81.3	86.3	124.3	107.1	122.6	86.6	74.7	82.6	51.3	45.7	50.4	46.6	50.9	50.0	79.8	69.0	75.3			
N**	2'168	1'001	3'169	382	156	543	213	62	275	555	115	670	248	775	1'023	3'796	2'290	6'091			
<i>dati mancanti</i>	5	1	6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	5	2	7			

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T34 Trattamento sostitutivo durante e immediatamente dopo l'intervento, in rapporto al problema principale¹ (solamente pazienti) (2008)

	Pazienti: problema principale ¹												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Sostituzione nel corso dell'intervento*																
no	98.1	97.8	98.0	44.1	36.7	42.2	92.7	85.7	91.1	99.2	97.9	99.0	92.0	91.1	91.8	3'547
sì	1.9	2.2	2.0	55.9	63.3	57.8	7.3	14.3	8.9	0.8	2.1	1.0	8.0	8.9	8.2	318
N**	1'643	721	2'364	299	109	408	150	42	192	476	97	573	2'759	1'106	3'865	3'865
<i>dati mancanti</i>	530	278	808	83	47	135	63	20	83	77	19	96	792	407	1'204	1'204
Tipo di sostituzione***																
eroina	6.3	6.3	6.3	4.2	4.5	4.3	0.0	0.0	0.0	25.0	50.0	33.3	4.6	5.3	4.8	15
metadone	62.5	25.0	50.0	88.5	87.9	88.3	90.0	100.0	93.8	50.0	50.0	50.0	84.3	77.9	82.4	257
altri oppiacei	0.0	6.3	2.1	5.5	6.1	5.6	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	16.7	4.6	5.3	4.8	15
altre sostanze	31.3	62.5	41.7	1.8	1.5	1.7	10.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	6.5	11.6	8.0	25
N**	32	16	48	165	66	231	10	6	16	4	2	6	217	95	312	312
<i>dati mancanti</i>	0	0	0	2	3	5	1	0	1	0	0	0	3	3	6	6
Sostituzione dopo l'intervento*																
no	99.5	99.1	99.4	67.5	61.8	66.0	93.2	92.9	93.1	99.6	97.9	99.3	96.0	95.4	95.8	3'516
sì	0.5	0.9	0.6	32.5	38.2	34.0	6.8	7.1	6.9	0.4	2.1	0.7	4.0	4.6	4.2	154
N**	1'578	687	2'265	252	89	341	147	42	189	466	94	560	2'627	1'043	3'670	3'670
<i>dati mancanti</i>	595	312	907	130	67	202	66	20	86	87	22	109	924	470	1'399	1'399
Tipo di sostituzione***																
prescrizione di eroina	12.5	33.3	21.4	11.0	14.7	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	14.6	11.0	17
trattamento sostitutivo	87.5	66.7	78.6	89.0	85.3	87.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	90.6	85.4	89.0	137
N**	8	6	14	82	34	116	10	3	13	2	2	4	106	48	154	154
<i>dati mancanti</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti ai quali è stata prescritta una sostituzione durante l'intervento. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T35 Postassistenza prevista e preparata, in rapporto al problema principale¹ (solamente pazienti) (2008)

	Pazienti: problema principale ¹												Tutti i pazienti			N
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Postassistenza prevista e preparata*																
no	88.6	85.2	87.6	69.3	72.1	70.0	84.6	87.5	85.2	89.3	84.2	88.3	86.2	82.8	85.3	2'019
si	11.4	14.8	12.4	30.7	27.9	30.0	15.4	12.5	14.8	10.7	15.8	11.7	13.8	17.2	14.7	349
N**	1'131	474	1'605	205	68	273	91	24	115	168	38	206	1'701	667	2'368	2'368
<i>dati mancanti</i>	1'042	525	1'567	177	88	270	122	38	160	385	78	463	1'850	846	2'701	2'701
Tipo di postassistenza prevista***																
appartamento protetto dell'istituzione	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
servizio di postassistenza dell'istituzione	0.9	1.6	1.1	8.5	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	1.9	2.5	8
appartamento protetto esterno	2.6	1.6	2.2	6.8	11.1	7.8	7.7	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	3.8	3.8	3.8	12
servizio di postassistenza esterno	9.6	6.3	8.4	22.0	27.8	23.4	7.7	33.3	12.5	25.0	0.0	19.0	14.1	13.2	13.8	44
centro di consulenza per problemi inerenti all'alcol	22.6	15.6	20.1	6.8	5.6	6.5	7.7	0.0	6.3	18.8	20.0	19.0	16.0	12.3	14.7	47
centro di consulenza per problemi inerenti alle droghe	5.2	1.6	3.9	23.7	22.2	23.4	15.4	0.0	12.5	6.3	0.0	4.8	11.7	4.7	9.4	30
altri centri di consulenza	15.7	20.3	17.3	10.2	16.7	11.7	7.7	66.7	18.8	18.8	0.0	14.3	14.6	19.8	16.3	52
gruppo di aiuto reciproco e di autosostegno	7.0	6.3	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	3.8	4.1	13
gruppo di precedenti utenti del centro/ dell'istituzione	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	1
altro-i	40.9	54.7	45.8	28.8	16.7	26.0	46.2	33.3	43.8	31.3	80.0	42.9	36.6	47.2	40.1	128
N**	115	64	179	59	18	77	13	3	16	16	5	21	213	106	319	319
<i>dati mancanti</i>	14	6	20	4	1	5	1	0	1	2	1	3	21	9	30	30

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti per i quali una postassistenza è prevista. Le categorie non sono esclusive (molte risposte possibili)

T36 Problemi di dipendenza all'uscita, in rapporto al problema principale¹ (solamente pazienti) (2008)

Problemi di dipendenza*	Pazienti: problema principale ¹												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
alcol	56.9	61.3	58.3	20.9	26.6	22.4	22.0	27.0	23.1	5.7	11.6	6.7	38.7	45.2	40.6	1'348
cocktail (eroina e cocaina)	0.1	0.3	0.2	6.8	2.1	5.6	1.6	5.4	2.5	0.2	1.2	0.4	1.0	0.7	0.9	31
eroina	1.1	0.5	0.9	48.7	58.5	51.3	3.3	5.4	3.8	0.5	4.7	1.2	6.5	6.8	6.6	218
metadone	0.3	0.3	0.3	18.6	14.9	17.6	4.9	0.0	3.8	0.2	2.3	0.6	2.6	2.1	2.4	80
altri oppiacei	0.1	0.2	0.1	1.5	2.1	1.7	0.8	0.0	0.6	0.2	0.0	0.2	0.3	0.4	0.3	11
cocaina	1.8	1.6	1.7	13.7	13.8	13.7	43.1	48.6	44.4	1.2	4.7	1.8	5.1	4.8	5.0	167
crack, freebase	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
amfetamine	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.6	0.8	2.7	1.3	0.5	1.2	0.6	0.3	0.3	0.3	11
MDMA e affini (ecstasy)	0.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.8	0.0	0.6	0.5	0.0	0.4	0.3	0.2	0.2	8
altri stimolanti	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	2
barbiturici	0.1	0.3	0.2	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	5
benzodiazepine	1.4	3.8	2.1	12.9	14.9	13.4	1.6	0.0	1.3	0.2	2.3	0.6	2.6	4.4	3.2	105
altri sonniferi e tranquillanti	0.4	1.1	0.6	0.8	3.2	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	0.6	21
LSD	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	2
altri allucinogeni	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
sostanze volatili (per es., solventi)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	0.1	0.0	0.1	2
canapa	3.0	1.6	2.6	14.8	13.8	14.6	15.4	8.1	13.8	43.1	57.0	45.5	12.3	7.8	11.0	364
tabacco	12.1	12.1	12.1	20.2	16.0	19.0	8.9	13.5	10.0	8.6	11.6	9.1	12.8	14.0	13.1	435
altra/e sostanza/e	0.2	0.2	0.2	0.4	2.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	0.4	0.4	0.5	0.4	14
gioco patologico	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.1	1.0	33
disturbi alimentari	0.1	1.3	0.4	0.0	1.1	0.3	0.0	2.7	0.6	0.0	1.2	0.2	0.1	4.4	1.4	46
altri problemi assimilabili a una dipendenza	0.1	0.5	0.2	0.0	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	0.5	16
nessuno	39.5	35.8	38.4	27.4	13.8	23.8	40.7	35.1	39.4	52.1	34.9	49.2	41.0	33.3	38.7	1'285
N**	1'392	636	2'028	263	94	357	123	37	160	420	86	506	2'344	974	3'318	3'318
<i>dati mancanti</i>	<i>781</i>	<i>363</i>	<i>1'144</i>	<i>119</i>	<i>62</i>	<i>186</i>	<i>90</i>	<i>25</i>	<i>115</i>	<i>133</i>	<i>30</i>	<i>163</i>	<i>1'207</i>	<i>539</i>	<i>1'751</i>	<i>1'751</i>

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T37 Frequenza delle ricadute, sostanza o comportamento implicato e durata delle ricadute nel corso dell'intervento, in rapporto al problema principale ¹ (solamente pazienti) (2008)

	Pazienti: problema principale ¹												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Frequenza delle ricadute*																
nessuna	55.9	46.3	53.0	30.5	22.9	28.3	52.9	65.0	56.3	68.8	56.5	66.7	55.4	46.0	52.7	806
1 volta	9.4	11.3	10.0	9.3	16.7	11.4	13.7	10.0	12.7	8.3	13.0	9.1	9.5	12.0	10.2	156
2 volte	8.7	9.4	8.9	8.5	10.4	9.0	5.9	0.0	4.2	4.6	0.0	3.8	8.0	8.4	8.1	124
3 o 4 volte	9.4	13.8	10.7	11.9	22.9	15.1	11.8	10.0	11.3	9.2	21.7	11.4	9.4	14.3	10.8	165
5 volte o più	16.6	19.4	17.4	39.8	27.1	36.1	15.7	15.0	15.5	9.2	8.7	9.1	17.7	19.3	18.2	278
N**	755	320	1'075	118	48	166	51	20	71	109	23	132	1'088	441	1'529	1'529
<i>dati mancanti</i>	1'418	679	2'097	264	108	377	162	42	204	444	93	537	2'463	1'072	3'540	3'540
Sostanza/comportamento comparabile a una dipendenza al momento delle ricadute***																
alcol	97.8	99.4	98.4	31.1	31.4	31.2	26.1	28.6	26.7	21.2	0.0	17.1	76.1	79.5	77.2	528
cocktail (eroina e cocaina)	0.0	0.6	0.2	9.5	2.9	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.9	1.3	9
oppiacei	2.8	1.2	2.3	82.4	88.6	84.4	8.7	42.9	16.7	0.0	12.5	2.4	15.9	17.0	16.2	111
cocaina e derivati	2.2	2.4	2.3	28.4	20.0	25.7	78.3	71.4	76.7	6.1	12.5	7.3	10.9	8.0	9.9	68
stimolanti	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	12.5	9.8	0.7	0.4	0.6	4
medicamenti	2.2	3.0	2.5	23.0	22.9	22.9	8.7	0.0	6.7	0.0	12.5	2.4	6.1	7.6	6.6	45
allucinogeni	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
canapa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	1
tabacco	2.2	1.2	1.9	23.0	20.0	22.0	8.7	0.0	6.7	84.8	87.5	85.4	11.7	7.6	10.4	71
sostanze volatili	2.5	1.2	2.1	17.6	11.4	15.6	0.0	0.0	0.0	3.0	12.5	4.9	5.0	3.6	4.5	31
altra/e sostanza/e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	1
gioco patologico	0.0	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.4	0.7	5
disturbi alimentari	0.0	1.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.9	6
altri problemi assimilabili a una dipendenza	0.9	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.7	0.4	0.6	4
N**	321	164	485	74	35	109	23	7	30	33	8	41	460	224	684	684
<i>dati mancanti</i>	12	8	20	8	2	10	1	0	1	1	2	3	25	14	39	39
Durata delle ricadute****																
1 a 2 giorni	30.0	31.5	30.5	25.0	20.0	23.3	45.5	40.0	43.8	40.0	50.0	41.7	31.3	30.9	31.1	84
3 a 6 giorni	33.1	28.8	31.5	15.0	30.0	20.0	18.2	20.0	18.8	40.0	0.0	33.3	29.5	26.6	28.5	77
7 a 10 giorni	12.3	11.0	11.8	20.0	10.0	16.7	0.0	20.0	6.3	20.0	0.0	16.7	13.1	12.8	13.0	35
>10 giorni a 2 settimane	3.1	2.7	3.0	5.0	0.0	3.3	9.1	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	3.4	3.2	3.3	9
> 2 a 4 settimane	6.9	9.6	7.9	10.0	0.0	6.7	9.1	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	6.8	7.4	7.0	19
>4 a 6 settimane	8.5	5.5	7.4	5.0	0.0	3.3	9.1	20.0	12.5	0.0	50.0	8.3	7.4	6.4	7.0	19
>6 a 8 settimane	1.5	5.5	3.0	5.0	30.0	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	7.4	3.7	10
> 2 mesi	4.6	5.5	4.9	15.0	10.0	13.3	9.1	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	6.8	5.3	6.3	17
N**	130	73	203	20	10	30	11	5	16	10	2	12	176	94	270	270
<i>dati mancanti</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che hanno indicato una o più ricadute. Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

**** I risultati si basano solamente sui clienti che hanno indicato una o più ricadute. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T38 Frequenza del consumo di tabacco e numero di sigarette al giorno nel corso dei 30 giorni precedenti l'uscita, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2008)

	Pazienti: problema principale ¹												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Frequenza del consumo di tabacco*																
mai	32.3	39.6	34.5	1.7	7.5	3.1	17.4	7.1	15.0	17.8	0.0	15.3	26.4	34.4	28.7	368
1 giorno alla settimana o meno	1.2	0.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	5.9	3.4	1.1	0.8	1.0	13
2 a 3 giorni alla settimana	1.2	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	5.9	1.7	0.9	0.3	0.7	9
4 a 6 giorni alla settimana	1.3	0.8	1.2	0.0	2.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.1	0.9	12
una volta al giorno	0.5	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.8	0.4	0.3	0.4	5
più volte al giorno	63.6	58.5	62.0	98.3	90.0	96.2	82.6	92.9	85.0	77.2	88.2	78.8	70.3	63.1	68.3	875
N**	604	265	869	119	40	159	46	14	60	101	17	118	916	366	1'282	1'282
<i>dati mancanti</i>	1'569	734	2'303	263	116	384	167	48	215	452	99	551	2'635	1'147	3'787	3'787
Numero di sigarette al giorno***																
0 a 10 sigarette al giorno	15.6	16.0	15.7	4.2	7.4	5.1	12.5	22.2	15.2	52.9	27.3	48.4	17.5	16.1	17.1	107
11 a 20 sigarette al giorno	45.5	46.2	45.7	43.1	40.7	42.4	54.2	66.7	57.6	29.4	36.4	30.6	44.3	44.8	44.5	278
21 a 30 sigarette al giorno	28.5	26.9	28.0	44.4	44.4	44.4	33.3	11.1	27.3	11.8	27.3	14.5	29.3	28.7	29.1	182
31 sigarette al giorno o più	10.4	10.9	10.6	8.3	7.4	8.1	0.0	0.0	0.0	5.9	9.1	6.5	8.9	10.3	9.3	58
N**	288	119	407	72	27	99	24	9	33	51	11	62	451	174	625	625
<i>dati mancanti</i>	121	41	162	45	10	55	14	4	18	32	6	38	223	66	289	289

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che hanno indicato un consumo di tabacco. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T39 Obiettivo di consumo all'uscita e pronostico, in rapporto alla principale sostanza problematica¹ (solamente pazienti) (2008)

	Pazienti: sostanza problematica ¹												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Obiettivo di consumo*																
astinenza definitiva	34.7	40.3	36.4	61.4	60.7	61.2	74.0	70.8	73.2	46.8	29.4	43.6	40.5	43.0	41.2	843
astinenza limitata nel tempo	14.2	12.9	13.8	2.3	3.3	2.5	6.8	4.2	6.2	6.5	2.9	5.9	10.7	9.8	10.4	213
consumo controllato	35.1	34.7	35.0	13.1	11.5	13.2	9.6	12.5	10.3	32.5	38.2	33.5	32.3	30.8	31.9	652
nessuna limitazione nel consumo previsto	6.4	3.9	5.6	8.0	3.3	6.6	2.7	4.2	3.1	4.5	11.8	5.9	6.4	4.3	5.8	118
nessuna decisione per il momento	8.4	6.8	7.9	14.8	19.7	15.7	6.8	8.3	7.2	9.1	17.6	10.6	9.1	9.5	9.2	188
altro	1.3	1.5	1.3	0.6	1.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	1.0	2.7	1.5	30
N**	960	412	1'372	176	61	242	73	24	97	154	34	188	1'457	582	2'044	2'044
<i>dati mancanti</i>	1'213	587	1'800	206	95	301	140	38	178	399	82	481	2'094	931	3'025	3'025
Pronostico*																
pronostico molto positivo	11.9	12.5	12.1	8.3	6.7	7.9	13.3	14.3	13.5	16.8	6.3	14.9	12.0	11.4	11.8	247
pronostico positivo	46.3	44.5	45.7	33.1	35.0	33.6	45.3	52.4	46.9	56.4	50.0	55.2	46.3	45.5	46.1	965
pronostico piuttosto sfavorevole	30.7	31.0	30.8	37.9	41.7	38.9	33.3	28.6	32.3	24.2	21.9	23.8	30.8	31.0	30.9	647
pronostico negativo	11.2	12.0	11.4	20.7	16.7	19.7	8.0	4.8	7.3	2.7	21.9	6.1	10.9	12.2	11.3	236
N**	1'001	449	1'450	169	60	229	75	21	96	149	32	181	1'479	616	2'095	2'095
<i>dati mancanti</i>	1'172	550	1'722	213	96	314	138	41	179	404	84	488	2'072	897	2'974	2'974

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto