

# Intervento ambulatoriale nelle problematiche di dipendenza

## Risultati dell'indagine presso gli utenti 2012

### Raccolta di tabelle statistiche

Luca Notari, Etienne Maffli, Mariana Astudillo

## Ringraziamenti

Ringraziamo vivamente sia i collaboratori e le collaboratrici che i pazienti delle istituzioni che hanno partecipato e che hanno gentilmente accettato di riempire i questionari del monitoraggio act-info. Ringraziamo ugualmente i collaboratori e le collaboratrici dei servizi di consultazione che hanno effettuato i lavori di logistica e di registrazione dei dati. I nostri migliori ringraziamenti vanno anche all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) che finanzia l'insieme della rete act-info. Grazie anche a Edith Bacher e Christiane Gmel per la grafica e l'impaginazione di questo rapporto come pure a Marina Delgrande Jordan per la sua preziosa collaborazione nell'elaborazione delle procedure d'analisi.

---

Complementi d'informazione: Etienne Maffli, tel. 021 321 29 54, fax 021 321 29 40,  
e-mail [emaffli@addictionsuisse.ch](mailto:emaffli@addictionsuisse.ch)

Realizzazione: Luca Notari, Etienne Maffli & Mariana Astudillo  
Dipendenze Svizzera

Diffusione: Ricerca, Dipendenze Svizzera, casella postale 870, 1001  
Losanna,  
tel. 021 321 29 46, fax 021 321 29 40,  
e-mail [ebacher@addictionsuisse.ch](mailto:ebacher@addictionsuisse.ch)

Prezzo: Fr. 10.–

Lingua del testo originale : tedesco

Grafica/impaginazione: Dipendenze Svizzera

Copyright: © Dipendenze Svizzera, Losanna 2013

Citazione raccomandata: Notari, L., Maffli, E. & Astudillo, M. (2013). Intervento ambulatoriale nelle problematiche di dipendenza. Risultati dell'indagine presso gli utenti 2012 – Raccolta di tabelle statistiche. Losanna: Dipendenze Svizzera.

---

## Indice

act- <i>info</i> –addiction care and therapy information .....	7
act- <i>info</i> nel settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale nel campo delle dipendenze.....	7

## ENTRATA

T1	Sesso e età dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2012)
T2	Stato civile e nazionalità dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2012)
T3	Grado di urbanizzazione del domicilio, tipo di nucleo familiare e situazione di domicilio dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2012)
T4	Tipo di relazione di coppia, numero di figli, e numero di figli che vivono nel nucleo familiare all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2012)
T5	Più alta formazione portata a termine e statuto professionale dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2012)
T6	Fonte di reddito principale e attività dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2012)
T7	Reddito mensile netto e debiti dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2012)
T8	Incarcerazione o detenzione preventiva prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2012)
T9	Istanza d'invio principale e secondaria dei pazienti (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2012)
T10	Tipo di aiuto atteso dai pazienti (in rapporto al problema principale) e dai parenti o conoscenti all'entrata e base legale dell'intervento (2012)
T11	Trattamenti/accompagnamenti dei pazienti prima dell'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2012)
T12	Trattamento sostitutivo e altri interventi all'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2012)
T13a	Entrata in seguito a una cura di disintossicazione, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2012)
T13b	Frequenza delle cure di disintossicazione senza aiuto professionale prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2012)
T14	Problema principale all'entrata (solamente pazienti) (2012)

- T15.1a Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata (2012), uomini
- T15.1b Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata (2012), uomini
- T15.2a Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata (2012), donne
- T15.2b Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata (2012), donne
- T15.3a Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata (2012), uomini e donne
- T15.3b Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata (2012), uomini e donne
- T16.1a Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2012), uomini
- T16.1b Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2012), donne
- T16.1c Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2012), uomini e donne
- T16.2a Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2012), uomini
- T16.2b Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2012), donne
- T16.2c Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2012), uomini e donne
- T17 Modo di amministrazione della principale sostanza problematica nel corso dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata (2012)
- T18 Prevalenza a vita delle iniezioni, nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata, scambio di materiale d'iniezione nel corso degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata e età all'epoca della prima iniezione, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2012)
- T19.1a Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2012), uomini
- T19.1b Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2012), donne
- T19.1c Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2012), uomini e donne
- T19.2a Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2012), uomini

- T19.2b Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2012), donne
- T19.2c Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2012), uomini e donne
- T20 Frequenza del consumo di alcol, numero di "bicchieri standard" al giorno e frequenza di forti consumi di alcol prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti ) (2012)
- T21 Frequenza del consumo di tabacco e numero di sigarette al giorno nel corso dei 30 ultimi giorni prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2012)
- T22a Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2012), uomini
- T22b Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2012), donne
- T22c Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2012), uomini e donne
- T23a Problemi psichici nel corso della vita (2012), uomini
- T23b Problemi psichici nel corso della vita (2012), donne
- T23c Problemi psichici nel corso della vita (2012), uomini e donne
- T24 Parenti/conoscenti: legame tra l'utente e la persona sintomatica (2012)
- T25 Parenti/conoscenti: problema principale e altri problemi della persona sintomatica (2012)
- T26 Parenti/conoscenti: Problemi della persona di contatto legati ai problemi della persona sintomatica (2012)

## USCITA

- T27 Sesso e età dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2012)
- T28 Stato civile e grado di urbanizzazione del domicilio dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2012)
- T29 Tipo di nucleo familiare, situazione di domicilio e tipo di relazione di coppia dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2012)
- T30 Più alta formazione portata a termine, fonte di reddito principale e attività principale dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2012)
- T31 Statuto professionale e reddito mensile netto dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2012)
- T32a Ragione principale della fine del trattamento/accompagnamento dei pazienti (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2012)

T32b	Destinazione dei trasferimenti dei pazienti (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2012)
T32c	Causa di decesso dei pazienti (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2012)
T33	Durata dell'intervento sui pazienti (in rapporto al problema principale) e sui parenti o conoscenti (2012)
T34	Trattamento sostitutivo durante e immediatamente dopo l'intervento, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2012)
T35	Postassistenza prevista e preparata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2012)
T36	Problemi di dipendenza all'uscita, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2012)
T37	Frequenza delle ricadute, sostanza o comportamento implicato e durata delle ricadute nel corso dell'intervento, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2012)
T38	Frequenza del consumo di tabacco e numero di sigarette al giorno nel corso dei 30 giorni precedenti l'uscita, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2012)
T39	Obiettivo di consumo all'uscita e pronostico, in rapporto alla principale sostanza problematica (solamente pazienti) (2012)

## Allegati

Dati di base delle istituzioni che non partecipano al monitoraggio *act-info*

A1	Sesso e età all'entrata, in funzione del problema principale (2012)
A2	Problema principale all'entrata (2012)

## act-info - addiction care and therapy information

La Rete di monitoraggio degli interventi e dei trattamenti delle dipendenze in Svizzera (*act-info*) raccoglie nel suo seno i cinque sistemi statistici che erano realizzati in materia di intervento e di trattamento della dipendenza in Svizzera. Tali sistemi sono:

- SAMBAD (Statistica del settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale in materia di dipendenza)
- Residalc (Statistica dei trattamenti residenziali della dipendenza all'alcol in Svizzera)
- FOS (Statistica della Lega per la valutazione dei trattamenti residenziali della tossicomania)
- HeGeBe (Statistica dei trattamenti con prescrizione di eroina)
- Metadone (Statistica nazionale dei trattamenti con prescrizione di metadone)

Dal 2004 queste cinque statistiche dispongono di strumenti armonizzati e ottimizzati. I dati comuni sono integrati in una banca dati centralizzata che permette di procedere ad analisi concernenti l'insieme dei settori. L'adozione degli standard europei (Treatment Demande Indicator) permette di garantire anche la comparabilità dei dati al livello internazionale.

*act-info* è finanziato dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e l'analisi e la raccolta dei dati nei differenti campi di trattamento sono affidate a Dipendenze Info Svizzera di Losanna e all'Istituto di ricerca sulla salute pubblica e sulle dipendenze affiliato all'Università di Zurigo (ISGF).

### act-info nel settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale in materia di dipendenza (SAMBAD)

Gli strumenti di monitoraggio *act-info* sono stati introdotti a partire dal 2004 nel settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale in materia di dipendenza e hanno rimpiazzato i vecchi questionari in vigore dal 1994. La realizzazione di *act-info* in questo settore è affidata a Dipendenze Info Svizzera.

La statistica *act-info* SAMBAD dà una visione dell'utenza e delle attività di aiuto ambulatoriale in materia di dipendenza in Svizzera. I dati sono raccolti all'inizio e alla fine dell'intervento. Le informazioni rilevate al momento dell'entrata permettono di valutare in particolare le caratteristiche socio-demografiche degli utenti, l'eventuale presenza di trattamenti precedenti, le modalità di consumo e la presenza di problemi psicosociali precedenti l'intervento. Le informazioni finali rilevate al termine dell'intervento evidenziano in particolare le caratteristiche socio-demografiche dell'utenza in quel preciso momento, le misure prese dalle persone curanti durante la presa in carico e le circostanze della fine di quest'ultima.

Nel 2012, 79 tra le 198 istituzioni registrate nel settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale in materia di dipendenza hanno partecipato al monitoraggio *act-info*. Queste istituzioni sono sia servizi deputati alla consultazione specialistica dei problemi inerenti all'alcol e/o alle droghe illegali, sia servizi polivalenti offrenti ugualmente un aiuto per i problemi di dipendenza.

## Qualche spiegazione riguardo alle tabelle

La presente statistica descrittiva dei dati dell'indagine act-*info* presso gli utenti del settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale in materia di dipendenza si basa su due tipi di tabelle:

- quando la domanda contiene delle categorie di risposte predefinite o ricodificate in parti distinte (per esempio « stato civile » o « età »), la tabella indica le percentuali delle differenti categorie di risposte
- quando la domanda non contiene delle categorie predefinite, ma richiede un valore numerico (per esempio « età all'inizio del consumo problematico »), la tabella presenta dei parametri di posizione (media, mediana) e dei parametri di dispersione (deviazione standard, 1° quartile, 3° quartile)

La maggior parte delle tabelle presenta i risultati in maniera distinta per i sottogruppi di pazienti che hanno menzionato l'alcol, un oppiaceo (eroina in particolare), la cocaina (e derivati) o la canapa come problema principale al momento dell'entrata. I parenti o conoscenti che consultano per i problemi di un terzo sono ugualmente oggetto di analisi separate per gli aspetti socio-demografici. Invece, gli utenti (poco numerosi) che hanno menzionato altre sostanze come problema principale (per esempio un stimolante o le sostanze volatili) o un problema di dipendenza non inerente a una sostanza (per esempio gioco patologico), non sono differenziati nei risultati (eccetto nei temi direttamente inerenti ai modi di consumo o alle forme di comportamenti additivi non inerenti alle sostanze). Queste persone sono tuttavia incluse nelle analisi relative all'insieme degli interventi che figurano nei blocchi a destra delle tabelle rispettive. Tutte le analisi sono effettuate separatamente per gli uomini, per le donne e per i sessi riuniti (nel caso in cui ci fossero persone il cui sesso non è conosciuto, queste saranno comprese nella colonna « Totale »).

Solo le risposte valide sono considerate nelle analisi. Cioè, le risposte « non noto » e le informazioni mancanti (missings) sono escluse dalle analisi. Il numero di risposte valide  $N$  rappresenta il numero esatto di casi sui quali sono calcolati le percentuali o altri parametri; esso viene indicato per ogni gruppo o sottogruppo. In basso alla tabella viene anche indicato il numero corrispondente di dati mancanti. La presenza di numerosi dati mancanti costringe a interpretare i risultati con particolare prudenza.

Le note in basso alla tabella danno informazioni sulle eventuali particolarità dei gruppi di riferimento e sul tipo di domanda. Quando sono possibili più risposte a una stessa domanda (per esempio nelle tabelle del tema T19, « altri problemi di dipendenza ») le percentuali ottenute non si possono addizionare.

Le istituzioni che non partecipano al monitoraggio act-*info* sono state invitate a fornire i dati di base (età, sesso e problema principale all'entrata). Tra queste istituzioni, 17 hanno risposto e i dati di 12 di queste si sono rivelati compatibili con la definizione del problema principale. I dati di queste 12 istituzioni sono stati analizzati separatamente e i risultati sono presenti in allegato.



## T1 Sesso e età dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2012)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Sesso*</b>																			
uomini			68.9			77.2			82.0			79.8			21.5			63.5	4'479
donne			31.1			22.8			18.0			20.2			77.1			36.3	2'562
sex non noto			0.0			0.0			0.0			0.0			1.3			0.2	14
<b>N**</b>	<b>2'554</b>	<b>1'152</b>	<b>3'706</b>	<b>288</b>	<b>85</b>	<b>373</b>	<b>209</b>	<b>46</b>	<b>255</b>	<b>810</b>	<b>205</b>	<b>1'015</b>	<b>228</b>	<b>817</b>	<b>1'059</b>	<b>4'479</b>	<b>2'562</b>	<b>7'055</b>	<b>7'055</b>
<b>Età (in anni)*</b>																			
fino a 14	0.2	0.9	0.4	0.3	0.0	0.3	0.0	2.2	0.4	6.4	3.9	5.9	3.9	1.3	1.9	2.1	1.4	1.8	130
15-19	2.2	1.2	1.9	1.4	7.1	2.7	4.8	2.2	4.3	55.2	58.5	55.9	5.7	2.7	3.4	13.6	8.3	11.6	818
20-24	4.1	3.6	4.0	6.9	14.1	8.6	17.2	23.9	18.4	15.9	14.6	15.7	4.4	5.4	5.2	7.7	6.5	7.3	511
25-29	7.8	6.4	7.4	16.7	17.6	16.9	23.4	30.4	24.7	8.4	8.3	8.4	3.5	6.0	5.5	9.7	7.8	9.0	632
30-34	11.1	8.9	10.4	19.8	14.1	18.5	25.4	13.0	23.1	6.0	4.9	5.8	7.9	8.8	8.6	11.2	8.6	10.3	722
35-39	10.2	9.2	9.9	15.3	11.8	14.5	11.0	2.2	9.4	3.5	4.4	3.6	7.0	10.7	9.9	8.9	9.0	8.9	628
40-44	14.1	13.5	13.9	21.5	18.8	20.9	10.5	15.2	11.4	1.9	2.9	2.1	5.7	14.1	12.3	11.6	12.7	12.0	842
45-49	15.4	18.4	16.3	10.1	14.1	11.0	6.7	6.5	6.7	1.4	1.5	1.4	15.8	17.4	17.1	11.2	15.4	12.7	894
50-54	13.0	12.7	12.9	5.2	2.4	4.6	0.5	0.0	0.4	1.2	1.0	1.2	18.4	13.4	14.5	9.4	10.8	9.9	698
55-59	10.2	11.0	10.5	1.7	0.0	1.3	0.5	4.3	1.2	0.1	0.0	0.1	8.8	7.6	7.9	6.8	8.1	7.2	508
60-64	5.6	7.1	6.1	1.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	4.3	5.1	3.8	5.0	4.3	301
65-69	3.7	4.7	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	3.8	4.0	2.5	3.6	2.9	204
70-74	1.4	1.5	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	2.9	3.1	1.0	1.8	1.3	89
75 e più	0.8	1.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	1.5	1.7	0.6	0.9	0.7	51
<b>N**</b>	<b>2'548</b>	<b>1'147</b>	<b>3'695</b>	<b>288</b>	<b>85</b>	<b>373</b>	<b>209</b>	<b>46</b>	<b>255</b>	<b>810</b>	<b>205</b>	<b>1'015</b>	<b>228</b>	<b>815</b>	<b>1'043</b>	<b>4'473</b>	<b>2'555</b>	<b>7'028</b>	<b>7'028</b>
<i>dati mancanti</i>	6	5	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16	6	7	27	27
<b>Età</b>																			
media	44.6	46.2	45.1	36.9	34.3	36.3	31.7	31.8	31.7	21.6	21.6	21.6	45.9	44.6	44.9	38.3	42.0	39.7	
deviazione standard	12.9	12.9	12.9	9.2	9.6	9.4	8.2	9.8	8.5	8.1	8.2	8.1	16.2	13.8	14.4	15.1	14.9	15.1	
1° quartile	34.8	37.7	35.6	29.9	26.1	29.2	25.8	24.9	25.5	16.5	16.4	16.4	34.8	35.6	35.5	26.0	30.6	27.4	
mediana	45.0	46.7	45.6	37.0	33.6	36.6	30.6	28.7	30.4	17.9	17.8	17.9	47.8	45.3	46.1	38.2	43.4	40.4	
3° quartile	53.6	55.1	54.1	42.9	42.6	42.8	36.87	40.6	37.1	24.4	23.6	24.3	57.1	52.8	53.9	49.4	52.2	50.6	
<b>N**</b>	<b>2'548</b>	<b>1'147</b>	<b>3'695</b>	<b>288</b>	<b>85</b>	<b>373</b>	<b>209</b>	<b>46</b>	<b>255</b>	<b>810</b>	<b>205</b>	<b>1'015</b>	<b>228</b>	<b>815</b>	<b>1'043</b>	<b>4'473</b>	<b>2'555</b>	<b>7'028</b>	
<i>dati mancanti</i>	6	5	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16	6	7	27	

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

## T2 Stato civile e nazionalità dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2012)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Stato civile*</b>																			
celibe/nubile	41.0	33.2	38.5	74.5	72.4	74.1	74.5	79.5	75.4	94.2	92.2	93.8	31.1	25.1	27.5	56.0	40.2	50.3	3'315
sposato-a	31.1	30.2	30.8	14.4	7.9	13.0	14.3	11.4	13.8	3.8	3.1	3.7	50.0	52.8	51.4	24.4	32.9	27.5	1'809
separato-a	6.1	5.3	5.9	1.5	1.3	1.4	4.1	0.0	3.3	0.8	1.0	0.8	3.4	3.6	3.5	4.3	3.9	4.1	272
divorziato-a	19.7	26.1	21.7	8.5	11.8	9.2	7.1	9.1	7.5	0.7	2.6	1.1	12.1	16.3	15.2	13.6	19.2	15.6	1'029
vedovo-a	1.7	4.3	2.5	0.7	2.6	1.2	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	0.3	2.4	1.5	1.7	1.2	3.0	1.9	122
unione registrata	0.4	0.9	0.6	0.4	3.9	1.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	1.0	0.7	0.7	0.5	0.8	0.6	38
<b>N**</b>	<b>2'392</b>	<b>1'095</b>	<b>3'487</b>	<b>271</b>	<b>76</b>	<b>347</b>	<b>196</b>	<b>44</b>	<b>240</b>	<b>759</b>	<b>193</b>	<b>952</b>	<b>206</b>	<b>748</b>	<b>968</b>	<b>4'170</b>	<b>2'401</b>	<b>6'585</b>	<b>6'585</b>
<i>dati mancanti</i>	162	57	219	17	9	26	13	2	15	51	12	63	22	69	91	309	161	470	470
<b>Nazionalità*</b>																			
CH	79.1	85.1	81.0	68.6	82.5	72.0	73.2	88.9	76.3	82.9	87.8	83.9	88.3	89.0	88.9	79.5	86.9	82.3	5'307
EU	14.2	11.3	13.3	19.8	13.8	18.3	16.8	11.1	15.6	8.9	7.2	8.5	8.7	8.1	8.2	13.3	9.6	11.9	769
altra	6.6	3.6	5.7	11.6	3.8	9.6	10.1	0.0	8.0	8.2	5.0	7.5	2.9	2.9	3.0	7.2	3.5	5.8	376
<b>N**</b>	<b>2'367</b>	<b>1'078</b>	<b>3'445</b>	<b>242</b>	<b>80</b>	<b>322</b>	<b>179</b>	<b>45</b>	<b>224</b>	<b>733</b>	<b>181</b>	<b>914</b>	<b>206</b>	<b>727</b>	<b>942</b>	<b>4'087</b>	<b>2'356</b>	<b>6'452</b>	<b>6'452</b>
<i>dati mancanti</i>	187	74	261	46	5	51	30	1	31	77	24	101	22	90	117	392	206	603	603

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

## T3 Grado di urbanizzazione del domicilio, tipo di nucleo familiare e situazione di domicilio dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2012)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			N
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Grado di urbanizzazione*</b>																			
grandi centri urbani	8.0	7.8	7.9	1.4	1.2	1.4	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.9	10.0	9.5	9.5	5.3	6.6	5.8	389
periferia dei grandi centri	12.6	14.5	13.2	6.5	7.1	6.6	8.8	11.9	9.3	6.9	8.9	7.3	13.7	14.3	14.0	10.5	12.6	11.2	757
città di media importanza	15.6	15.5	15.6	10.8	15.3	11.8	19.5	23.8	20.2	23.4	19.8	22.6	16.1	16.3	16.1	17.1	17.5	17.2	1'159
piccole città	34.0	30.8	33.0	52.3	45.9	50.8	48.8	33.3	46.2	34.3	34.2	34.3	34.6	30.3	31.7	36.7	32.4	35.2	2'373
campagne	29.8	31.5	30.3	29.0	30.6	29.4	22.9	31.0	24.3	34.4	36.6	34.9	25.6	29.6	28.7	30.4	30.8	30.5	2'057
<b>N**</b>	<b>2'435</b>	<b>1'092</b>	<b>3'527</b>	<b>279</b>	<b>85</b>	<b>364</b>	<b>205</b>	<b>42</b>	<b>247</b>	<b>779</b>	<b>202</b>	<b>981</b>	<b>211</b>	<b>756</b>	<b>981</b>	<b>4'292</b>	<b>2'429</b>	<b>6'735</b>	<b>6'735</b>
dati mancanti	119	60	179	9	0	9	4	4	8	31	3	34	17	61	78	187	133	320	320
<b>Tipo di nucleo familiare (30 ultimi giorni)*</b>																			
da solo-a	40.3	34.2	38.4	37.2	32.3	36.0	36.8	29.4	35.4	13.3	10.4	12.7	12.4	9.2	9.7	31.7	24.0	28.9	1'527
con i genitori/un genitore	6.1	2.1	4.9	17.4	7.7	15.2	16.1	20.6	16.9	63.6	54.9	61.8	15.2	5.6	8.8	21.6	10.7	17.8	942
con figlio-a-i (senza partner)	1.8	11.2	4.7	2.8	7.7	3.9	0.6	11.8	2.6	0.5	6.0	1.7	5.5	13.2	11.4	1.7	10.6	4.9	257
con un-a partner (senza figli)	23.4	26.6	24.4	13.3	38.5	19.1	16.1	23.5	17.5	4.7	7.7	5.3	22.1	27.6	26.1	18.0	24.8	20.4	1'077
con un-a partner e figlio-a-i	18.7	16.1	17.9	10.6	4.6	9.2	15.5	2.9	13.2	2.9	3.8	3.1	38.6	41.7	40.5	15.5	21.2	17.5	924
con altri parenti/familiari	1.2	1.3	1.2	2.8	1.5	2.5	2.6	2.9	2.6	2.4	2.2	2.4	2.1	0.7	1.0	1.8	1.4	1.7	89
con amici (comunità abitativa)	2.5	2.6	2.6	3.7	1.5	3.2	6.5	2.9	5.8	3.9	1.6	3.4	2.8	1.6	1.8	3.2	2.3	2.9	151
altro	5.9	5.8	5.9	12.4	6.2	11.0	5.8	5.9	5.8	8.6	13.2	9.6	1.4	0.4	0.6	6.6	4.9	6.0	315
<b>N**</b>	<b>1'903</b>	<b>839</b>	<b>2'742</b>	<b>218</b>	<b>65</b>	<b>283</b>	<b>155</b>	<b>34</b>	<b>189</b>	<b>660</b>	<b>182</b>	<b>842</b>	<b>145</b>	<b>554</b>	<b>708</b>	<b>3'383</b>	<b>1'890</b>	<b>5'282</b>	<b>5'282</b>
dati mancanti	651	313	964	70	20	90	54	12	66	150	23	173	83	263	351	1'096	672	1'773	1'773
<b>Situazione di domicilio (30 ultimi giorni)*</b>																			
domicilio fisso	93.1	94.3	93.5	86.5	77.3	84.2	88.7	87.5	88.5	91.8	93.4	92.2	95.9	97.1	96.9	92.5	94.4	93.2	4'732
senza domicilio fisso	4.4	3.7	4.2	9.8	21.2	12.7	8.3	12.5	9.1	5.2	3.6	4.9	3.4	2.9	3.0	5.0	4.2	4.7	240
istituzione	2.5	2.0	2.3	3.6	1.5	3.1	3.0	0.0	2.4	2.9	3.0	2.9	0.7	0.0	0.1	2.4	1.4	2.0	104
<b>N**</b>	<b>1'864</b>	<b>814</b>	<b>2'678</b>	<b>193</b>	<b>66</b>	<b>259</b>	<b>133</b>	<b>32</b>	<b>165</b>	<b>613</b>	<b>167</b>	<b>780</b>	<b>148</b>	<b>546</b>	<b>703</b>	<b>3'235</b>	<b>1'832</b>	<b>5'076</b>	<b>5'076</b>
dati mancanti	690	338	1028	95	19	114	76	14	90	197	38	235	80	271	356	1244	730	1979	1'979

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

## T4 Tipo di relazione di coppia, numero di figli, di figli vivendo nel nucleo familiare dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2012)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Tipo di relazione di coppia*</b>																			
senza partner, sola-a	35.3	34.9	35.2	44.7	15.5	36.7	34.1	35.3	34.4	68.3	48.2	64.5	18.2	11.5	12.8	41.5	29.0	36.7	1'617
relazione-i saltuaria-e	3.8	3.3	3.6	4.6	12.1	6.7	11.4	17.6	12.7	5.6	13.6	7.1	5.8	2.2	2.9	4.5	4.5	4.5	198
relazione fissa, vivendo separato-a	11.8	13.9	12.5	19.7	22.4	20.5	20.3	26.5	21.7	15.3	18.2	15.9	5.8	10.3	9.6	12.9	13.9	13.3	587
relazione fissa, vivendo insieme	49.1	47.9	48.7	30.9	50.0	36.2	34.1	20.6	31.2	10.8	20.0	12.5	70.2	76.0	74.8	41.1	52.6	45.5	2'005
<b>N**</b>	<b>1'642</b>	<b>791</b>	<b>2'433</b>	<b>152</b>	<b>58</b>	<b>210</b>	<b>123</b>	<b>34</b>	<b>157</b>	<b>464</b>	<b>110</b>	<b>574</b>	<b>121</b>	<b>504</b>	<b>626</b>	<b>2'721</b>	<b>1'685</b>	<b>4'407</b>	<b>4'407</b>
<i>dati mancanti</i>	912	361	1'273	136	27	163	86	12	98	346	95	441	107	313	433	1'758	877	2'648	2'648
<b>Numero di figli*</b>																			
nessuno	41.3	35.3	39.4	64.5	50.8	61.2	59.0	68.8	60.8	91.2	84.2	89.6	31.3	20.5	23.7	53.6	38.5	48.0	2'444
1 figlio	18.8	22.1	19.9	20.7	36.9	24.6	21.6	12.5	19.9	5.3	9.9	6.3	17.3	20.2	19.4	16.1	20.0	17.5	893
2 figli	27.3	29.9	28.1	13.3	3.1	10.8	15.1	9.4	14.0	2.9	3.9	3.2	33.3	40.2	38.4	21.0	28.4	23.8	1'210
3 figli o più	12.6	12.7	12.6	1.5	9.2	3.4	4.3	9.4	5.3	0.6	2.0	0.9	18.0	19.0	18.6	9.3	13.1	10.7	545
<b>N**</b>	<b>1'881</b>	<b>873</b>	<b>2'754</b>	<b>203</b>	<b>65</b>	<b>268</b>	<b>139</b>	<b>32</b>	<b>171</b>	<b>543</b>	<b>152</b>	<b>695</b>	<b>150</b>	<b>584</b>	<b>743</b>	<b>3'180</b>	<b>1'903</b>	<b>5'092</b>	<b>5'092</b>
<i>dati mancanti</i>	673	279	952	85	20	105	70	14	84	267	53	320	78	233	316	1'299	659	1'963	1'963
<b>Numero dei figli vivendo nel nucleo familiare*</b>																			
nessuno	73.2	63.8	70.1	76.6	71.4	75.2	79.8	78.1	79.4	65.8	52.4	62.8	47.7	35.4	38.4	70.7	56.0	65.1	2'891
1 figlio	11.7	19.1	14.1	14.6	21.4	16.4	7.3	12.5	8.5	8.6	19.6	11.0	21.2	26.6	25.4	11.4	20.3	14.8	659
2 figli	10.5	13.2	11.4	7.6	3.6	6.5	8.3	6.3	7.8	20.0	20.3	20.1	20.5	28.3	26.3	12.6	17.6	14.5	642
3 figli o più	4.7	3.9	4.4	1.3	3.6	1.9	4.6	3.1	4.3	5.6	7.7	6.1	10.6	9.6	9.9	5.2	6.2	5.6	249
<b>N**</b>	<b>1'596</b>	<b>773</b>	<b>2'369</b>	<b>158</b>	<b>56</b>	<b>214</b>	<b>109</b>	<b>32</b>	<b>141</b>	<b>500</b>	<b>143</b>	<b>643</b>	<b>132</b>	<b>508</b>	<b>649</b>	<b>2'735</b>	<b>1'697</b>	<b>4'441</b>	<b>4'441</b>
<i>dati mancanti</i>	958	379	1'337	130	29	159	100	14	114	310	62	372	96	309	410	1'744	865	2'614	2'614

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

## T5 Più alta formazione portata a termine e statuto professionale dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2012)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Più alta formazione portata a termine*</b>																			
nessuna formazione terminata	2.8	5.6	3.6	4.5	3.2	4.2	1.4	5.0	2.2	21.7	19.7	21.3	7.4	4.3	5.3	8.0	6.8	7.6	366
scuola dell'obbligo	13.0	15.0	13.6	35.8	37.1	36.1	22.9	30.0	24.5	50.5	56.6	51.8	12.5	13.6	14.4	23.9	21.0	23.0	1'108
scolarità complementare	3.4	5.6	4.1	2.5	12.9	4.9	2.1	7.5	3.3	4.1	5.8	4.5	2.2	3.1	2.8	3.4	5.3	4.1	196
apprendistato/ scuola profes.	60.4	52.2	57.9	50.7	41.9	48.7	59.7	52.5	58.2	20.5	16.8	19.7	46.3	46.5	45.7	49.0	45.3	47.6	2'296
liceo/diploma	3.6	4.6	3.9	2.0	1.6	1.9	4.2	2.5	3.8	0.6	0.0	0.5	2.9	4.8	4.3	3.0	5.0	3.7	178
magistrale, scuola pedagogica	0.5	1.8	0.9	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	0.3	0.0	0.2	3.7	5.0	4.6	0.6	2.2	1.2	56
form. profession. superiore	7.7	6.3	7.3	1.0	1.6	1.1	5.6	2.5	4.9	0.8	0.0	0.6	10.3	8.6	8.9	5.5	6.0	5.7	273
scuola profession. superiore	1.6	1.3	1.5	0.5	1.6	0.8	0.7	0.0	0.5	0.2	0.0	0.1	1.5	3.3	2.8	1.1	1.5	1.3	61
alta scuola specializzata	2.1	1.7	2.0	1.5	0.0	1.1	0.7	0.0	0.5	0.6	0.6	0.6	4.4	3.6	3.7	1.7	2.0	1.8	87
università, politecnico	4.8	6.0	5.2	1.5	0.0	1.1	2.1	0.0	1.6	0.6	0.6	0.6	8.8	7.2	7.4	3.8	4.8	4.1	199
<b>N**</b>	<b>1'741</b>	<b>767</b>	<b>2'508</b>	<b>201</b>	<b>62</b>	<b>263</b>	<b>144</b>	<b>40</b>	<b>184</b>	<b>653</b>	<b>173</b>	<b>826</b>	<b>136</b>	<b>419</b>	<b>564</b>	<b>3'156</b>	<b>1'655</b>	<b>4'820</b>	<b>4'820</b>
<i>dati mancanti</i>	813	385	1'198	87	23	110	65	6	71	157	32	189	92	398	495	1'323	907	2'235	2'235
<b>Statuto professionale*</b>																			
senza attività professionale	30.4	37.9	32.7	49.1	55.6	50.4	25.6	47.6	30.3	22.9	28.3	23.8	15.8	27.9	25.2	29.0	34.6	30.8	687
apprendista, praticante	2.8	0.5	2.1	8.3	3.7	7.4	7.7	4.8	7.1	24.9	34.0	26.5	1.8	3.0	2.8	8.0	4.5	6.8	152
manovale, operaio-a ausiliare	2.8	5.1	3.5	4.6	7.4	5.2	2.6	4.8	3.0	4.1	0.0	3.4	0.0	3.0	2.4	2.9	4.1	3.3	73
operaio-a con formaz. pratica	6.2	4.6	5.7	13.0	11.1	12.6	11.5	0.0	9.1	3.7	1.9	3.4	0.0	4.6	3.5	6.1	4.6	5.6	125
oper. con formaz. certif. (AFC)	16.2	10.7	14.5	14.8	14.8	14.8	28.2	9.5	24.2	11.0	7.5	10.4	14.0	5.1	7.1	15.7	10.0	13.8	308
caposquadra	2.9	0.3	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.7	1.8	0.0	0.4	2.0	0.3	1.4	32
impiegato-a non qualificato-a	14.0	19.6	15.7	5.6	3.7	5.2	11.5	19.0	13.1	7.3	1.9	6.4	12.3	28.9	25.2	11.9	19.6	14.5	322
impieg. qualif., quadro medio	9.0	8.7	8.9	2.8	3.7	3.0	6.4	4.8	6.1	2.9	1.9	2.7	22.8	10.2	13.0	7.7	8.0	7.8	174
imp. funz. dirett., quadr. sup.	4.7	2.5	4.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	10.5	2.0	3.9	3.6	1.9	3.1	68
indipendente	9.6	6.9	8.8	1.9	0.0	1.5	3.8	0.0	3.0	0.8	1.9	1.0	14.0	9.1	10.2	7.3	6.2	6.9	154
scolaro-a, studente	0.8	1.8	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	2.0	21.6	22.6	21.8	7.0	6.1	6.3	5.1	5.5	5.3	117
altro statuto	0.8	1.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.8	0.7	15
<b>N**</b>	<b>902</b>	<b>393</b>	<b>1'295</b>	<b>108</b>	<b>27</b>	<b>135</b>	<b>78</b>	<b>21</b>	<b>99</b>	<b>245</b>	<b>53</b>	<b>298</b>	<b>57</b>	<b>197</b>	<b>254</b>	<b>1'487</b>	<b>740</b>	<b>2'227</b>	<b>2'227</b>
<i>dati mancanti</i>	1'652	759	2'411	180	58	238	131	25	156	565	152	717	171	620	805	2'992	1'822	4'828	4'828

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

## T6 Fonte di reddito principale e attività dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2012)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Fonte di reddito principale (nel corso dei 30 ultimi giorni)*</b>																			
reddito da lavoro	56.6	43.6	52.6	36.5	25.0	33.8	58.8	38.1	55.1	28.7	24.7	27.9	66.5	59.6	60.5	49.8	45.3	48.2	2'939
risparmi	2.1	0.8	1.7	0.8	0.0	0.6	3.6	0.0	3.0	0.7	0.0	0.5	1.1	0.6	0.7	1.7	0.6	1.3	79
rendita (AVS/AI, ecc.)	13.9	18.5	15.3	17.3	15.8	16.9	5.7	11.9	6.8	5.1	6.2	5.3	16.8	11.1	12.2	11.6	15.0	12.8	781
assistenza/previdenza sociale	14.9	13.0	14.3	32.5	50.0	36.6	13.9	26.2	16.1	10.0	11.3	10.3	2.7	1.7	1.9	14.1	10.8	12.9	789
assicurazione disoccupazione	7.3	6.2	7.0	6.8	3.9	6.2	7.2	7.1	7.2	2.3	2.6	2.4	1.1	2.1	1.9	6.1	4.3	5.4	332
sostegno del/della partner	0.9	13.3	4.7	0.8	1.3	0.9	1.5	4.8	2.1	0.4	2.6	0.9	0.5	19.7	15.2	0.8	12.9	5.1	311
sosteg. genitori/familiari/amici	2.8	2.6	2.7	3.2	3.9	3.4	6.7	11.9	7.6	51.6	51.5	51.6	10.3	4.8	6.9	14.3	9.7	12.8	781
spacciando/tagliando	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.6	0.5	0.0	0.4	0.1	0.0	0.1	0.5	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	8
altre entrate illegali	0.1	0.1	0.1	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	8
prostituzione	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	3
altra-e	1.3	1.5	1.4	0.4	0.0	0.3	2.1	0.0	1.7	0.8	1.0	0.9	0.5	0.5	0.5	1.1	1.2	1.1	70
<b>N**</b>	<b>2'226</b>	<b>984</b>	<b>3'210</b>	<b>249</b>	<b>76</b>	<b>325</b>	<b>194</b>	<b>42</b>	<b>236</b>	<b>732</b>	<b>194</b>	<b>926</b>	<b>185</b>	<b>631</b>	<b>825</b>	<b>3'924</b>	<b>2'168</b>	<b>6'101</b>	<b>6'101</b>
<i>dati mancanti</i>	328	168	496	39	9	48	15	4	19	78	11	89	43	186	234	555	394	954	954
<b>Attività principale (nel corso dei 30 ultimi giorni)*</b>																			
att. a tempo pieno (70% o più)	50.1	29.2	43.8	32.7	17.1	29.0	53.6	25.6	48.5	23.6	13.8	21.6	61.6	34.7	40.2	43.5	28.5	38.2	2'231
attività a tempo parziale	5.2	19.7	9.6	2.4	10.5	4.4	1.0	7.0	2.1	1.9	7.2	3.0	3.8	30.6	24.3	4.1	19.9	9.6	560
varie attività occas.	0.9	1.1	0.9	0.8	2.6	1.2	0.5	4.7	1.3	0.7	2.1	1.0	0.0	1.3	1.0	0.7	1.3	0.9	54
in formazione	3.1	3.3	3.2	1.6	0.0	1.2	6.3	4.7	6.0	51.4	54.9	52.1	11.3	5.6	7.8	14.7	11.1	13.5	790
inattivo sul mercat. del lavoro	17.8	28.9	21.2	32.7	32.9	32.7	10.4	20.9	12.3	6.2	9.7	7.0	17.6	22.2	20.9	15.3	24.7	18.6	1'083
disoccup., ricerc. di un lavoro	14.3	11.6	13.5	22.4	17.1	21.2	17.2	16.3	17.0	9.2	6.7	8.7	1.9	4.2	3.7	13.2	8.9	11.7	683
disoccup., lav. futuro garantito	0.6	0.0	0.4	0.4	0.0	0.3	1.0	0.0	0.9	0.7	0.0	0.5	0.0	0.2	0.1	0.6	0.1	0.4	25
altra	8.0	6.2	7.5	6.9	19.7	10.0	9.9	20.9	11.9	6.2	5.6	6.1	3.8	1.3	1.9	7.9	5.5	7.0	411
<b>N**</b>	<b>2'131</b>	<b>931</b>	<b>3'062</b>	<b>245</b>	<b>76</b>	<b>321</b>	<b>192</b>	<b>43</b>	<b>235</b>	<b>737</b>	<b>195</b>	<b>932</b>	<b>159</b>	<b>553</b>	<b>721</b>	<b>3'795</b>	<b>2'033</b>	<b>5'837</b>	<b>5'837</b>
<i>dati mancanti</i>	423	221	644	43	9	52	17	3	20	73	10	83	69	264	338	684	529	1'218	1'218

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

## T7 Reddito mensile netto e debiti dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2012)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			N
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Reddito mensile netto (6 ultimi mesi)*</b>																			
nessun reddito	24.8	32.0	26.7	21.1	12.5	19.8	14.9	50.0	22.0	41.3	44.2	41.9	24.0	14.3	16.3	26.9	30.6	28.0	388
fino a 1000 fr.	6.5	6.8	6.6	17.8	31.3	19.8	10.6	8.3	10.2	25.1	27.9	25.7	20.0	11.2	13.0	11.9	11.4	11.7	163
da 1001 a 2000 fr.	5.5	10.2	6.7	18.9	12.5	17.9	10.6	0.0	8.5	7.2	16.3	9.0	0.0	15.3	12.2	6.9	11.7	8.3	115
da 2001 a 3000 fr.	9.9	15.5	11.4	11.1	25.0	13.2	8.5	25.0	11.9	8.4	9.3	8.6	4.0	11.2	9.8	9.2	14.2	10.7	148
da 3001 a 4000 fr.	12.8	14.1	13.1	12.2	12.5	12.3	6.4	16.7	8.5	1.2	0.0	1.0	12.0	15.3	14.6	11.1	12.7	11.5	160
da 4001 a 5000 fr.	18.5	7.8	15.7	12.2	6.3	11.3	21.3	0.0	16.9	10.2	2.3	8.6	16.0	9.2	10.6	16.1	6.7	13.4	186
da 5001 a 6000 fr.	10.4	9.2	10.1	4.4	0.0	3.8	12.8	0.0	10.2	3.0	0.0	2.4	12.0	9.2	9.8	8.3	7.0	7.9	110
da 6001 a 8000 fr.	7.5	3.4	6.4	2.2	0.0	1.9	10.6	0.0	8.5	3.0	0.0	2.4	4.0	10.2	8.9	6.3	4.2	5.7	79
da 8001 a 10 000 fr.	2.9	0.5	2.3	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	3.4	0.6	0.0	0.5	0.0	3.1	2.4	2.2	1.0	1.9	26
da 10 001 a 15 000 fr.	1.0	0.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	1.0	2.4	1.0	0.5	0.9	12
più di 15 000 fr.	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	1
<b>N**</b>	<b>585</b>	<b>206</b>	<b>791</b>	<b>90</b>	<b>16</b>	<b>106</b>	<b>47</b>	<b>12</b>	<b>59</b>	<b>167</b>	<b>43</b>	<b>210</b>	<b>25</b>	<b>98</b>	<b>123</b>	<b>986</b>	<b>402</b>	<b>1'388</b>	<b>1'388</b>
<i>dati mancanti</i>	1'969	946	2'915	198	69	267	162	34	196	643	162	805	203	719	936	3'493	2'160	5'667	5'667
<b>Debiti*</b>																			
nessun debito	71.6	85.6	75.6	38.8	54.2	41.7	40.9	60.0	43.5	84.3	87.8	84.9	88.0	88.1	88.3	70.7	83.8	74.8	1'842
fino a 5000 fr.	3.9	4.7	4.1	7.8	8.3	7.9	18.3	6.7	16.7	5.0	5.1	5.0	2.0	2.2	2.1	5.5	4.2	5.1	125
da 5001 a 10 000 fr.	5.7	2.5	4.7	14.6	12.5	14.2	12.9	0.0	11.1	5.0	4.1	4.8	0.0	3.2	2.5	6.5	3.4	5.5	136
da 10 001 a 25 000 fr.	6.8	2.5	5.6	13.6	16.7	14.2	15.1	13.3	14.8	3.8	1.0	3.3	2.0	2.7	2.5	7.1	3.4	5.9	146
da 25 001 a 50 000 fr.	5.5	2.8	4.7	10.7	0.0	8.7	3.2	13.3	4.6	0.7	1.0	0.8	2.0	2.7	2.5	4.4	2.9	3.9	97
da 50 001 a 100 000 fr.	2.6	1.1	2.2	7.8	8.3	7.9	5.4	6.7	5.6	0.5	0.0	0.4	4.0	0.0	0.8	2.8	1.2	2.3	56
più di 100 000 fr.	4.0	0.8	3.1	6.8	0.0	5.5	4.3	0.0	3.7	0.7	1.0	0.8	2.0	1.1	1.3	3.1	1.1	2.5	61
<b>N**</b>	<b>883</b>	<b>360</b>	<b>1'243</b>	<b>103</b>	<b>24</b>	<b>127</b>	<b>93</b>	<b>15</b>	<b>108</b>	<b>420</b>	<b>98</b>	<b>518</b>	<b>50</b>	<b>185</b>	<b>240</b>	<b>1'701</b>	<b>757</b>	<b>2'463</b>	<b>2'463</b>
<i>dati mancanti</i>	1'671	792	2'463	185	61	246	116	31	147	390	107	497	178	632	819	2'778	1'805	4'592	4'592

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

## T8 Incarcerazione o detenzione preventiva prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2012)

	Pazienti: problema principale												Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Incarcerazione o detenzione preventiva*</b>																
nessuna	89.8	98.7	92.4	58.3	69.6	60.5	75.0	76.9	75.4	85.4	97.5	87.4	86.2	96.4	88.8	1'446
in prigione	5.2	1.0	4.0	20.8	8.7	18.5	8.3	7.7	8.2	6.5	2.5	5.9	6.6	1.7	5.3	87
in detenzione preventiva	3.0	0.3	2.2	11.5	17.4	12.6	12.5	15.4	13.1	6.5	0.0	5.4	4.7	1.7	3.9	64
in prigione e in detenzione preventiva	2.1	0.0	1.5	9.4	4.3	8.4	4.2	0.0	3.3	1.5	0.0	1.3	2.5	0.2	1.9	31
<b>N**</b>	<b>771</b>	<b>315</b>	<b>1'086</b>	<b>96</b>	<b>23</b>	<b>119</b>	<b>48</b>	<b>13</b>	<b>61</b>	<b>199</b>	<b>40</b>	<b>239</b>	<b>1'211</b>	<b>417</b>	<b>1'628</b>	<b>1'628</b>
<i>dati mancanti</i>	1'783	837	2'620	192	62	254	161	33	194	611	165	776	3'040	1'328	4'368	4'368
<b>Durata totale di detenzione***</b>																
fino a 1 mese	31.6	66.7	33.3	21.9	20.0	21.6	14.3	0.0	11.1	44.0	0.0	42.3	32.0	27.3	31.6	43
> 1 a 2 mesi	1.8	0.0	1.7	6.3	20.0	8.1	14.3	50.0	22.2	4.0	0.0	3.8	4.8	18.2	5.9	8
> 2 a 6 mesi	40.4	0.0	38.3	37.5	40.0	37.8	14.3	50.0	22.2	28.0	0.0	26.9	34.4	27.3	33.8	46
> 6 a 12 mesi	10.5	0.0	10.0	9.4	20.0	10.8	28.6	0.0	22.2	12.0	100.0	15.4	11.2	18.2	11.8	16
più di un anno	15.8	33.3	16.7	25.0	0.0	21.6	28.6	0.0	22.2	12.0	0.0	11.5	17.6	9.1	16.9	23
<b>N**</b>	<b>57</b>	<b>3</b>	<b>60</b>	<b>32</b>	<b>5</b>	<b>37</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>125</b>	<b>11</b>	<b>136</b>	<b>136</b>
<i>dati mancanti</i>	22	1	23	8	2	10	5	1	6	4	0	4	42	4	46	46

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti che hanno vissuto un'esperienza di detenzione. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile



## T9 Istanza d'invio principale e secondaria dei pazienti (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2012)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			N
	Alcol			Oppiacei			Coacaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Istanza d'invio principale*</b>																			
propria iniziativa	33.5	41.1	35.9	44.5	51.8	46.2	51.5	44.2	50.2	21.2	21.6	21.3	69.8	74.3	72.4	35.8	51.7	41.5	2'692
coniuge/partner	4.8	2.7	4.1	2.5	0.0	1.9	4.1	0.0	3.3	1.4	0.5	1.3	3.5	2.1	2.3	3.9	2.1	3.2	209
famiglia	3.2	5.5	3.9	3.9	7.1	4.6	7.7	7.0	7.5	9.9	8.8	9.6	8.9	5.7	6.3	5.6	6.1	5.7	373
amici/collegghi/conoscenti	1.6	3.1	2.0	2.8	4.7	3.3	2.0	7.0	2.9	1.2	2.6	1.5	3.5	4.6	4.3	1.8	3.7	2.4	159
istituto ambulatoriale specializ.	1.5	2.2	1.7	3.6	7.1	4.4	3.1	0.0	2.5	0.4	2.1	0.7	2.5	2.5	2.5	1.5	2.4	1.9	121
istituto residenziale specializ.	4.8	5.5	5.0	6.0	2.4	5.2	3.1	9.3	4.2	0.8	0.0	0.6	0.0	0.6	0.4	3.5	3.0	3.4	218
studio medico	8.3	9.0	8.5	9.3	3.5	7.9	3.1	11.6	4.6	2.9	4.6	3.2	4.0	2.6	2.9	6.6	6.4	6.5	423
ospedale/clinica	11.1	13.1	11.7	4.6	8.2	5.5	4.6	2.3	4.2	2.6	2.1	2.5	1.5	0.8	1.0	7.6	7.3	7.5	487
servizi sociali	6.8	5.8	6.5	7.5	12.9	8.7	1.5	7.0	2.5	3.4	4.1	3.6	1.0	2.8	2.3	5.5	4.8	5.2	340
prov. penale/amministrativo	16.9	6.6	13.7	11.0	2.4	9.0	16.3	7.0	14.6	45.1	39.7	44.0	1.5	0.4	1.9	20.1	6.9	15.5	1'007
datore di lavoro	4.8	1.9	3.9	1.4	0.0	1.1	0.0	4.7	0.8	2.1	1.5	2.0	1.0	0.3	0.4	3.4	1.4	2.7	175
insegnante	0.2	1.1	0.4	0.4	0.0	0.3	0.5	0.0	0.4	4.1	4.6	4.2	0.0	0.6	0.4	1.3	1.2	1.2	80
altra	2.5	2.5	2.5	2.5	0.0	1.9	2.6	0.0	2.1	4.9	7.7	5.5	3.0	2.9	2.9	3.3	3.0	3.2	207
<b>N**</b>	<b>2'349</b>	<b>1'045</b>	<b>3'394</b>	<b>281</b>	<b>85</b>	<b>366</b>	<b>196</b>	<b>43</b>	<b>239</b>	<b>760</b>	<b>194</b>	<b>954</b>	<b>202</b>	<b>724</b>	<b>938</b>	<b>4'144</b>	<b>2'335</b>	<b>6'491</b>	<b>6'491</b>
<i>dati mancanti</i>	205	107	312	7	0	7	13	3	16	50	11	61	26	93	121	335	227	564	564
<b>Istanza d'invio secondaria***</b>																			
propria iniziativa	31.6	21.3	28.8	27.2	11.1	23.8	19.5	50.0	25.5	17.8	11.9	16.6	3.9	10.8	9.3	26.9	17.3	23.8	669
coniuge/partner	8.8	8.5	8.7	6.6	5.6	6.4	7.3	0.0	5.9	3.0	1.5	2.7	15.8	6.1	8.2	8.4	6.8	7.9	221
famiglia	3.6	5.6	4.1	5.1	2.8	4.7	3.7	0.0	2.9	6.8	6.0	6.6	5.3	4.3	4.5	4.5	5.1	4.7	132
amici/collegghi/conoscenti	1.8	2.9	2.1	2.9	2.8	2.9	2.4	0.0	2.0	1.1	4.5	1.8	5.3	3.2	3.7	1.9	3.1	2.3	65
istituto ambulatoriale specializ.	1.3	0.9	1.2	1.5	2.8	1.7	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	2.6	1.4	1.7	1.1	1.0	1.1	30
istituto residenziale specializ.	2.7	2.7	2.7	2.9	2.8	2.9	1.2	0.0	1.0	0.8	0.0	0.6	1.3	0.0	0.3	2.2	1.5	2.0	55
studio medico	4.4	5.8	4.8	8.8	16.7	10.5	6.1	5.0	5.9	2.3	1.5	2.1	2.6	1.8	2.0	4.6	5.2	4.8	135
ospedale/clinica	4.3	2.9	3.9	1.5	0.0	1.2	4.9	0.0	3.9	1.1	3.0	1.5	0.0	2.2	1.7	3.4	2.4	3.1	87
servizi sociali	1.8	1.6	1.8	2.9	5.6	3.5	6.1	0.0	4.9	0.4	3.0	0.9	1.3	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8	51
prov. penale/amministrativo	4.4	2.5	3.9	2.2	5.6	2.9	8.5	0.0	6.9	5.3	3.0	4.8	1.3	0.0	0.3	4.2	1.8	3.4	95
datore di lavoro	2.2	1.6	2.0	0.7	2.8	1.2	1.2	0.0	1.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.4	0.3	1.6	1.1	1.5	41
insegnante	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	3.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.4	10
altra	1.3	0.9	1.2	0.0	2.8	0.6	1.2	0.0	1.0	1.9	1.5	1.8	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	39
nessuna	41.0	47.2	42.7	46.3	50.0	47.1	43.9	45.0	44.1	59.8	67.2	61.3	60.5	68.6	66.9	45.1	55.2	48.4	1359.0
<b>N**</b>	<b>1'195</b>	<b>445</b>	<b>1'640</b>	<b>136</b>	<b>36</b>	<b>172</b>	<b>82</b>	<b>20</b>	<b>102</b>	<b>264</b>	<b>67</b>	<b>331</b>	<b>76</b>	<b>277</b>	<b>353</b>	<b>1'902</b>	<b>908</b>	<b>2'810</b>	<b>2'810</b>
<i>dati mancanti</i>	1'359	707	2'066	152	49	201	127	26	153	546	138	684	152	540	706	2'577	1'654	4'245	4'245

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

\*\*\* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili)

## T10 Tipo di aiuto atteso dai pazienti (in rapporto al problema principale) e dai parenti o conoscenti all'entrata e base legale dell'intervento (2012)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Tipo di aiuto atteso*</b>																			
problemi di dipendenza	84.0	90.5	85.8	90.7	95.1	91.6	88.8	82.6	87.6	75.3	77.9	75.8	70.7	65.4	66.7	81.6	82.4	81.8	2'538
problemi somatici	3.0	3.0	3.0	4.3	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	1.6	5.2	2.3	1.2	0.7	0.8	2.4	2.3	2.4	74
problemi psichici	14.9	25.0	17.8	15.5	17.1	15.8	8.2	30.4	12.4	10.3	15.6	11.3	11.0	19.1	17.2	13.5	21.9	16.2	502
problemi relazionali	14.2	16.0	14.7	5.0	9.8	5.9	9.2	21.7	11.6	6.6	15.6	8.3	28.0	41.9	38.7	12.3	22.7	15.6	485
problemi familiari	9.0	10.7	9.5	5.6	7.3	5.9	11.2	17.4	12.4	9.4	19.5	11.3	32.9	38.6	37.3	9.9	18.7	12.7	394
problemi finanziari	6.2	3.6	5.5	18.0	9.8	16.3	11.2	21.7	13.2	5.0	5.2	5.0	4.9	7.7	7.1	7.4	5.9	6.9	215
problemi professionali o di formazione	11.5	10.3	11.1	14.3	17.1	14.9	14.3	17.4	14.9	11.3	15.6	12.1	6.1	5.1	5.4	11.7	9.7	11.1	343
problemi di alloggio	3.7	3.4	3.6	8.7	2.4	7.4	6.1	4.3	5.8	3.8	2.6	3.5	6.1	6.3	6.2	4.2	3.9	4.1	128
problemi di violenza	1.3	1.0	1.2	0.6	2.4	1.0	1.0	4.3	1.7	1.3	0.0	1.0	1.2	4.0	3.4	1.1	1.8	1.3	41
problemi giuridici	7.5	3.8	6.5	6.2	2.4	5.4	15.3	8.7	14.0	11.3	6.5	10.3	2.4	5.1	4.5	7.9	4.2	6.7	208
altro-i	2.3	1.4	2.0	1.2	0.0	1.0	5.1	0.0	4.1	2.8	2.6	2.8	0.0	2.6	2.0	3.0	1.8	2.6	81
nessuna richiesta	9.7	4.8	8.3	1.9	2.4	2.0	3.1	0.0	2.5	18.4	13.0	17.4	3.7	1.8	2.3	10.3	4.2	8.4	259
<b>N**</b>	<b>1'272</b>	<b>505</b>	<b>1'777</b>	<b>161</b>	<b>41</b>	<b>202</b>	<b>98</b>	<b>23</b>	<b>121</b>	<b>320</b>	<b>77</b>	<b>397</b>	<b>82</b>	<b>272</b>	<b>354</b>	<b>2'106</b>	<b>995</b>	<b>3'101</b>	<b>3'101</b>
<i>dati mancanti</i>	<i>1'282</i>	<i>647</i>	<i>1'929</i>	<i>127</i>	<i>44</i>	<i>171</i>	<i>111</i>	<i>23</i>	<i>134</i>	<i>490</i>	<i>128</i>	<i>618</i>	<i>146</i>	<i>545</i>	<i>705</i>	<i>2'373</i>	<i>1'567</i>	<i>3'954</i>	<i>3'954</i>
<b>Base legale dell'intervento*</b>																			
Sospensione della procedura, rinuncia a infliggere una pena o un avvertimento (art. 19a cifra 2 Lstup)	0.7	0.0	0.5	0.7	0.0	0.6	2.3	4.8	2.8	12.9	18.8	14.1	0.0	0.0	0.0	2.7	1.6	2.3	63
abbandono del perseguimento penale nel caso di un trattamento sotto sorveglianza medica (art. 19a cifra 3 Lstup)	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	4
misure concernenti delinquenti mentalmente anormali (art. 43 CPS)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
trattamento delle persone dipendenti dall'alcol o dalle droghe (art. 44 CPS)	2.2	0.9	1.9	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	1.9	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	1.6	0.5	1.2	33
irresponsabilità (art. 10 CPS)	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1
responsabilità limitata (art. 11 CPS)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
esecuzione di misure per tossicodipend. in un'istituzione di educazione al lavoro (art. 2a ord. 3 rel. al CPS SR 311.03)	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	4.3	3.8	0.0	0.0	0.0	0.8	0.3	0.7	18
altra	12.0	6.4	10.5	8.9	8.8	8.9	18.6	4.8	15.9	21.8	10.1	19.4	0.0	0.4	0.3	12.8	5.2	10.4	282
nessuna misura (trattamento volontario)	84.8	92.6	87.0	90.4	91.2	90.5	74.4	90.5	77.6	61.3	66.7	62.4	100.0	99.6	99.7	82.0	92.3	85.3	2'311
<b>N**</b>	<b>1'131</b>	<b>435</b>	<b>1'566</b>	<b>135</b>	<b>34</b>	<b>169</b>	<b>86</b>	<b>21</b>	<b>107</b>	<b>271</b>	<b>69</b>	<b>340</b>	<b>72</b>	<b>237</b>	<b>309</b>	<b>1'849</b>	<b>860</b>	<b>2'709</b>	<b>2'709</b>
<i>dati mancanti</i>	<i>1'423</i>	<i>717</i>	<i>2'140</i>	<i>153</i>	<i>51</i>	<i>204</i>	<i>123</i>	<i>25</i>	<i>148</i>	<i>539</i>	<i>136</i>	<i>675</i>	<i>156</i>	<i>580</i>	<i>750</i>	<i>2'630</i>	<i>1'702</i>	<i>4'346</i>	<i>4'346</i>

\* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

## T11 Trattamenti/accompagnamenti dei pazienti prima dell'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2012)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			N
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Interventi precedenti*</b>																			
no	45.9	41.9	44.7	20.3	20.3	20.3	46.4	41.0	45.4	77.3	76.1	77.0	67.1	66.9	67.0	52.8	53.5	53.1	3'068
si	54.1	58.1	55.3	79.7	79.7	79.7	53.6	59.0	54.6	22.7	23.9	23.0	32.9	33.1	33.0	47.2	46.5	46.9	2'712
<b>N**</b>	<b>2'113</b>	<b>930</b>	<b>3'043</b>	<b>227</b>	<b>74</b>	<b>301</b>	<b>179</b>	<b>39</b>	<b>218</b>	<b>687</b>	<b>180</b>	<b>867</b>	<b>173</b>	<b>611</b>	<b>789</b>	<b>3'720</b>	<b>2'055</b>	<b>5'780</b>	<b>5'780</b>
<i>dati mancanti</i>	441	222	663	61	11	72	30	7	37	123	25	148	55	206	270	759	507	1'275	1'275
<b>Tipo di intervento***</b>																			
trattamento con prescriz. di eroina	1.7	1.3	1.5	7.1	12.0	8.4	0.0	5.6	1.2	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	2.0	1.8	1.9	41
terapia sostitut. (metadone, subutex)	4.0	4.8	4.3	67.9	70.0	68.4	16.7	38.9	21.4	5.7	3.1	5.2	5.7	2.8	3.5	11.6	9.6	10.9	236
altro tratt. medicam. delle dipendenze	9.2	10.7	9.7	7.9	10.0	8.4	4.5	11.1	6.0	0.8	6.3	1.9	0.0	1.9	1.4	7.9	8.6	8.1	176
consulenza ambulatoriale	71.8	73.7	72.4	58.6	58.0	58.4	75.8	77.8	76.2	77.9	90.6	80.5	77.1	83.3	81.3	72.1	75.3	73.2	1'581
terapia residenziale	49.5	53.4	50.7	47.1	50.0	47.9	45.5	44.4	45.2	30.3	15.6	27.3	14.3	9.3	10.4	45.7	43.2	44.8	969
cura di disintossicazione	44.9	49.0	46.2	40.7	54.0	44.2	34.8	33.3	34.5	18.9	15.6	18.2	5.7	10.2	9.0	40.0	38.7	39.5	854
gruppo di aiuto reciproco/ autosost.	5.3	7.9	6.1	2.9	4.0	3.2	1.5	0.0	1.2	3.3	3.1	3.2	0.0	7.4	5.6	4.4	6.6	5.2	112
altro-i	2.2	3.3	2.5	0.0	2.0	0.5	4.5	5.6	4.8	4.1	3.1	3.9	11.4	7.4	9.0	2.4	3.9	3.0	64
<b>N**</b>	<b>964</b>	<b>457</b>	<b>1'421</b>	<b>140</b>	<b>50</b>	<b>190</b>	<b>66</b>	<b>18</b>	<b>84</b>	<b>122</b>	<b>32</b>	<b>154</b>	<b>35</b>	<b>108</b>	<b>144</b>	<b>1'419</b>	<b>741</b>	<b>2'161</b>	<b>2'161</b>
<i>dati mancanti</i>	179	83	262	41	9	50	30	5	35	34	11	45	22	94	116	336	215	551	551

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti che sono già stati presi in carico in precedenza. Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

## T12 Trattamento sostitutivo e altri interventi all'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2012)

	Pazienti: problema principale												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Sostituzione o prescrizione di eroina*</b>																
no	98.3	97.8	98.2	46.5	40.6	45.0	93.3	82.4	91.1	99.5	100.0	99.6	94.9	94.7	94.9	4'018
sì	1.7	2.2	1.8	53.5	59.4	55.0	6.7	17.6	8.9	0.5	0.0	0.4	5.1	5.3	5.1	217
<b>N**</b>	<b>1'797</b>	<b>769</b>	<b>2'566</b>	<b>187</b>	<b>64</b>	<b>251</b>	<b>135</b>	<b>34</b>	<b>169</b>	<b>610</b>	<b>169</b>	<b>779</b>	<b>3'003</b>	<b>1'232</b>	<b>4'235</b>	<b>4'235</b>
<i>dati mancanti</i>	757	383	1'140	101	21	122	74	12	86	200	36	236	1'248	513	1'761	1'761
<b>Tipo di sostituzione***</b>																
eroina	3.4	0.0	2.2	2.0	7.9	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	4.7	3.3	7
metadone	79.3	50.0	68.9	81.8	81.6	81.8	85.7	66.7	76.9	100.0	0.0	100.0	81.0	73.4	78.7	166
altri oppiacei	10.3	31.3	17.8	15.2	10.5	13.9	14.3	16.7	15.4	0.0	0.0	0.0	14.3	15.6	14.7	31
altre sostanze	6.9	18.8	11.1	1.0	0.0	0.7	0.0	16.7	7.7	0.0	0.0	0.0	2.0	6.3	3.3	7
<b>N**</b>	<b>29</b>	<b>16</b>	<b>45</b>	<b>99</b>	<b>38</b>	<b>137</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>147</b>	<b>64</b>	<b>211</b>	<b>211</b>
<i>dati mancanti</i>	1	1	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1	5	1	6	6
<b>Altro intervento parallelo*</b>																
no	91.2	87.8	90.2	85.6	88.9	86.3	90.7	85.7	89.7	95.7	97.2	96.0	91.7	89.7	91.2	2'237
sì	8.8	12.2	9.8	14.4	11.1	13.7	9.3	14.3	10.3	4.3	2.8	4.0	8.3	10.3	8.8	216
<b>N**</b>	<b>1'146</b>	<b>449</b>	<b>1'595</b>	<b>139</b>	<b>36</b>	<b>175</b>	<b>86</b>	<b>21</b>	<b>107</b>	<b>280</b>	<b>72</b>	<b>352</b>	<b>1'811</b>	<b>642</b>	<b>2'453</b>	<b>2'453</b>
<i>dati mancanti</i>	1'408	703	2'111	149	49	198	123	25	148	530	133	663	2'440	1'103	3'543	3'543
<b>Tipo di intervento parallelo****</b>																
trattamento o consulenza ambulatoriale	44.4	51.0	46.7	75.0	75.0	75.0	42.9	0.0	30.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	104
terapia residenziale	10.1	3.9	8.0	5.0	0.0	4.2	57.1	0.0	40.0	8.3	0.0	7.1	11.6	3.2	9.1	19
gruppo di aiuto reciproco o di autosostegno	8.1	13.7	10.0	5.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	11.3	7.7	16
altro-i	42.4	41.2	42.0	20.0	25.0	20.8	14.3	100.0	40.0	41.7	50.0	42.9	37.0	43.5	38.9	81
<b>N**</b>	<b>99</b>	<b>51</b>	<b>150</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>146</b>	<b>62</b>	<b>208</b>	<b>208</b>
<i>dati mancanti</i>	2	4	6	0	0	0	1	0	1	0	0	0	4	4	8	8

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti che seguono un programma di sostituzione. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti presi in carico parallelamente. Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

## T13a Entrata in seguito a una cura di disintossicazione, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2012)

	Pazienti: problema principale												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Entrata in seguito a una cura di disintossicazione*</b>																
no	77.3	75.4	76.8	82.1	88.9	83.4	83.3	84.0	83.5	96.8	98.4	97.1	82.1	79.8	81.4	2'045
disintossicazione nella stessa istituzione	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.9	0.4	0.0	0.3	0.5	0.4	0.5	12
disintossicazione in un'altra istituzione	22.0	24.0	22.6	17.9	11.1	16.6	15.6	16.0	15.7	2.8	1.6	2.6	17.4	19.8	18.1	454
<b>N**</b>	<b>1'161</b>	<b>495</b>	<b>1'656</b>	<b>151</b>	<b>36</b>	<b>187</b>	<b>90</b>	<b>25</b>	<b>115</b>	<b>283</b>	<b>63</b>	<b>346</b>	<b>1'824</b>	<b>687</b>	<b>2'511</b>	<b>2'511</b>
<i>dati mancanti</i>	1'393	657	2'050	137	49	186	119	21	140	527	142	669	2'427	1'058	3'485	3'485

## T13b Frequenza delle cure di disintossicazione senza aiuto professionale prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2012)

Freq. disintossicazioni senza accompagnamento*	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
mai	64.7	56.8	62.4	21.9	33.3	24.4	53.5	0.0	41.8	71.6	65.7	70.6	63.0	54.9	60.9	743
una volta	7.8	10.9	8.7	14.1	5.6	12.2	7.0	41.7	14.5	13.6	20.0	14.7	9.2	12.6	10.1	123
due o tre volte	8.2	11.4	9.1	12.5	16.7	13.4	18.6	8.3	16.4	3.6	11.4	4.9	8.0	11.7	8.9	109
più di tre volte	19.3	21.0	19.8	51.6	44.4	50.0	20.9	50.0	27.3	11.2	2.9	9.8	19.8	20.8	20.1	245
<b>N**</b>	<b>564</b>	<b>229</b>	<b>793</b>	<b>64</b>	<b>18</b>	<b>82</b>	<b>43</b>	<b>12</b>	<b>55</b>	<b>169</b>	<b>35</b>	<b>204</b>	<b>903</b>	<b>317</b>	<b>1'220</b>	<b>1'220</b>
<i>dati mancanti</i>	1'990	923	2'913	224	67	291	166	34	200	641	170	811	3'348	1'428	4'776	4'776

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

**T14 Problema principale all'entrata (solamente pazienti) (2012)**

Tutti i pazienti									
Problema principale	Uomini	Donne	Totale	N		Uomini	Donne	Totale	N
	%	%	%			%	%	%	
alcol	60.1	66.0	61.8	3'706	alcol	60.1	66.0	61.8	3'706
cocktail (eroina e cocaina)	0.3	0.1	0.2	13	cocktail	0.3	0.1	0.2	13
eroina	5.4	4.1	5.0	299	oppiacei	6.5	4.8	6.0	360
metadone	0.8	0.5	0.7	41					
altri oppiacei	0.4	0.2	0.3	20	cocaina e derivati	4.9	2.6	4.3	255
cocaina	4.9	2.5	4.2	252					
crack, freebase	0.0	0.1	0.1	3	stimolanti	1.1	0.9	1.0	61
amfetamine	0.6	0.5	0.5	32					
MDMA e affini (ecstasy)	0.5	0.3	0.5	28	medicamenti	0.6	1.8	1.0	59
altri stimolanti (per es., khat)	0.0	0.1	0.0	1					
barbiturici	0.0	0.0	0.0	0	allucinogeni	0.2	0.1	0.1	8
benzodiazepine	0.6	1.4	0.8	49					
altri sonniferi e tranquillanti	0.0	0.5	0.2	10	canapa	19.1	11.7	16.9	1'015
LSD	0.2	0.1	0.1	8					
altri allucinogeni	0.0	0.0	0.0	0	tabacco	1.8	3.4	2.3	137
canapa	19.1	11.7	16.9	1'015					
tabacco	1.8	3.4	2.3	137	altra/e sostanza/e	1.0	1.1	1.1	64
sostanze volatili (per es., solventi)	0.0	0.1	0.0	1					
altra/e sostanza/e	1.0	1.1	1.1	63	problemi assimilabili a una dipendenza	4.4	7.4	5.3	318
gioco patologico	1.8	1.2	1.6	98					
disturbi alimentari	0.2	4.9	1.5	92	altri problemi assimilabili a una dipendenza	2.4	1.4	2.1	128
altri problemi assimilabili a una dipendenza	2.4	1.4	2.1	128					
<b>N**</b>	<b>4'251</b>	<b>1'745</b>	<b>5'996</b>	<b>5'996</b>		<b>4'251</b>	<b>1'745</b>	<b>5'996</b>	<b>5'996</b>
<i>dati mancanti</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

**T15.1a Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata (2012), uomini**

Pazienti: principale sostanza problematica										
Uomini	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Coacaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
<b>Frequenza di consumo 30 ultimi giorni (%)*</b>										
mai	31.9	71.4	30.9	29.8	42.9	23.5	0.0	26.3	4.4	100.0
un giorno alla settimana o meno	7.4	0.0	8.5	27.4	25.0	5.9	100.0	20.6	1.5	0.0
2 a 3 giorni alla settimana	12.0	14.3	13.3	21.8	17.9	5.9	0.0	15.8	2.9	0.0
4 a 6 giorni alla settimana	10.7	14.3	6.1	9.7	10.7	5.9	0.0	7.5	4.4	0.0
una volta al giorno	7.0	0.0	17.6	3.2	0.0	11.8	0.0	6.2	2.9	0.0
più volte al giorno	31.1	0.0	23.6	8.1	3.6	47.1	0.0	23.6	83.8	0.0
<b>N**</b>	<b>1'689</b>	<b>7</b>	<b>165</b>	<b>124</b>	<b>28</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>601</b>	<b>68</b>	<b>1</b>
<i>dati mancanti</i>	865	4	112	85	18	10	3	209	10	43
<b>Frequenza di consumo 6 ultimi mesi (%)*</b>										
mai	7.9	33.3	15.3	16.5	13.3	6.7	0.0	7.6	4.2	7.7
un giorno alla settimana o meno	7.2	0.0	10.2	27.6	40.0	13.3	80.0	28.8	1.4	0.0
2 a 3 giorni alla settimana	16.5	16.7	12.1	28.3	23.3	0.0	0.0	18.5	2.8	0.0
4 a 6 giorni alla settimana	13.9	16.7	7.6	15.0	13.3	6.7	0.0	9.7	2.8	0.0
una volta al giorno	9.3	0.0	21.0	3.1	3.3	0.0	0.0	6.4	2.8	15.4
più volte al giorno	45.2	33.3	33.8	9.4	6.7	73.3	20.0	29.0	85.9	76.9
<b>N**</b>	<b>1'700</b>	<b>6</b>	<b>157</b>	<b>127</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>579</b>	<b>71</b>	<b>13</b>
<i>dati mancanti</i>	854	5	120	82	16	12	2	231	7	31

**T15.1b Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata (2012), uomini**

Uomini	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
<b>Frequenza di manifestazione 30 ultimi giorni (%)*</b>			
mai	52.3	16.7	8.6
1 giorno alla settimana o meno	11.4	16.7	5.7
2 a 3 giorni alla settimana	9.1	0.0	5.7
4 a 6 giorni alla settimana	11.4	33.3	2.9
una volta al giorno	9.1	16.7	12.9
più volte al giorno	6.8	16.7	64.3
<b>N**</b>	<b>44</b>	<b>6</b>	<b>70</b>
<i>dati mancanti</i>	33	1	34
<b>Frequenza di manifestazione 6 ultimi mesi (%)*</b>			
mai	19.4	0.0	1.5
1 giorno alla settimana o meno	22.2	20.0	6.1
2 a 3 giorni alla settimana	11.1	20.0	9.1
4 a 6 giorni alla settimana	22.2	20.0	1.5
una volta al giorno	11.1	20.0	15.2
più volte al giorno	13.9	20.0	66.7
<b>N**</b>	<b>36</b>	<b>5</b>	<b>66</b>
<i>dati mancanti</i>	41	2	38

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

## T15.2a Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata (2012), donne

Pazienti: principale sostanza problematica										
Donne	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Coacaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
<b>Frequenza di consumo 30 ultimi giorni (%)*</b>										
mai	23.2	0.0	25.4	26.5	33.3	33.3	0.0	19.3	1.9	100.0
un giorno alla settimana o meno	10.0	0.0	10.2	17.6	22.2	5.6	100.0	27.3	1.9	0.0
2 a 3 giorni alla settimana	13.6	0.0	11.9	26.5	0.0	0.0	0.0	18.0	1.9	0.0
4 a 6 giorni alla settimana	11.5	0.0	10.2	11.8	11.1	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0
una volta al giorno	9.4	0.0	16.9	8.8	11.1	11.1	0.0	5.6	5.6	0.0
più volte al giorno	32.3	0.0	25.4	8.8	22.2	50.0	0.0	18.6	88.9	0.0
<b>N**</b>	<b>733</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>34</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>161</b>	<b>54</b>	<b>1</b>
<i>dati mancanti</i>	419	2	24	12	6	14	0	44	5	19
<b>Frequenza di consumo 6 ultimi mesi (%)*</b>										
mai	7.1	0.0	16.1	2.9	11.1	0.0	0.0	2.6	1.8	28.6
un giorno alla settimana o meno	7.8	0.0	8.9	20.6	33.3	0.0	100.0	28.8	0.0	14.3
2 a 3 giorni alla settimana	17.7	0.0	14.3	17.6	11.1	10.5	0.0	21.2	1.8	14.3
4 a 6 giorni alla settimana	12.8	0.0	7.1	23.5	11.1	0.0	0.0	10.9	1.8	0.0
una volta al giorno	11.7	0.0	25.0	14.7	11.1	10.5	0.0	5.8	5.3	0.0
più volte al giorno	42.9	0.0	28.6	20.6	22.2	78.9	0.0	30.8	89.5	42.9
<b>N**</b>	<b>728</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>34</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>156</b>	<b>57</b>	<b>7</b>
<i>dati mancanti</i>	424	2	27	12	6	13	0	49	2	13

## T15.2b Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata (2012), donne

Pazienti: problema principale			
Donne	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
<b>Frequenza di manifestazione 30 ultimi giorni (%)*</b>			
mai	38.5	3.3	15.4
1 giorno alla settimana o meno	30.8	6.6	30.8
2 a 3 giorni alla settimana	7.7	21.3	15.4
4 a 6 giorni alla settimana	15.4	6.6	0.0
una volta al giorno	0.0	6.6	15.4
più volte al giorno	7.7	55.7	23.1
<b>N**</b>	<b>13</b>	<b>61</b>	<b>13</b>
<i>dati mancanti</i>	8	24	11
<b>Frequenza di manifestazione 6 ultimi mesi (%)*</b>			
mai	9.1	0.0	8.3
1 giorno alla settimana o meno	45.5	7.3	25.0
2 a 3 giorni alla settimana	18.2	16.4	25.0
4 a 6 giorni alla settimana	18.2	12.7	0.0
una volta al giorno	0.0	7.3	16.7
più volte al giorno	9.1	56.4	25.0
<b>N**</b>	<b>11</b>	<b>55</b>	<b>12</b>
<i>dati mancanti</i>	10	30	12

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)



## T15.3a Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata (2012), uomini e donne

Pazienti: principale sostanza problematica										
Uomini e donne	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Coacaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
<b>Frequenza di consumo 30 ultimi giorni (%)*</b>										
mai	29.2	71.4	29.5	29.1	40.5	28.6	0.0	24.8	3.3	100.0
un giorno alla settimana o meno	8.2	0.0	8.9	25.3	24.3	5.7	100.0	22.0	1.6	0.0
2 a 3 giorni alla settimana	12.5	14.3	12.9	22.8	13.5	2.9	0.0	16.3	2.5	0.0
4 a 6 giorni alla settimana	10.9	14.3	7.1	10.1	10.8	2.9	0.0	8.3	2.5	0.0
una volta al giorno	7.7	0.0	17.4	4.4	2.7	11.4	0.0	6.0	4.1	0.0
più volte al giorno	31.5	0.0	24.1	8.2	8.1	48.6	0.0	22.6	86.1	0.0
<b>N**</b>	<b>2'422</b>	<b>7</b>	<b>224</b>	<b>158</b>	<b>37</b>	<b>35</b>	<b>5</b>	<b>762</b>	<b>122</b>	<b>2</b>
<i>dati mancanti</i>	1'284	6	136	97	24	24	3	253	15	62
<b>Frequenza di consumo 6 ultimi mesi (%)*</b>										
mai	7.7	33.3	15.5	13.7	12.8	2.9	0.0	6.5	3.1	15.0
un giorno alla settimana o meno	7.4	0.0	9.9	26.1	38.5	5.9	83.3	28.8	0.8	5.0
2 a 3 giorni alla settimana	16.8	16.7	12.7	26.1	20.5	5.9	0.0	19.0	2.3	5.0
4 a 6 giorni alla settimana	13.6	16.7	7.5	16.8	12.8	2.9	0.0	9.9	2.3	0.0
una volta al giorno	10.0	0.0	22.1	5.6	5.1	5.9	0.0	6.3	3.9	10.0
più volte al giorno	44.5	33.3	32.4	11.8	10.3	76.5	16.7	29.4	87.5	65.0
<b>N**</b>	<b>2'428</b>	<b>6</b>	<b>213</b>	<b>161</b>	<b>39</b>	<b>34</b>	<b>6</b>	<b>735</b>	<b>128</b>	<b>20</b>
<i>dati mancanti</i>	1'278	7	147	94	22	25	2	280	9	44

## T15.3b Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata (2012), uomini e donne

Pazienti: problema principale			
Uomini e donne	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
<b>Frequenza di manifestazione 30 ultimi giorni (%)*</b>			
mai	49.1	4.5	9.6
1 giorno alla settimana o meno	15.8	7.5	9.6
2 a 3 giorni alla settimana	8.8	19.4	7.2
4 a 6 giorni alla settimana	12.3	9.0	2.4
una volta al giorno	7.0	7.5	13.3
più volte al giorno	7.0	52.2	57.8
<b>N**</b>	<b>57</b>	<b>67</b>	<b>83</b>
<i>dati mancanti</i>	41	25	45
<b>Frequenza di manifestazione 6 ultimi mesi (%)*</b>			
mai	17.0	0.0	2.6
1 giorno alla settimana o meno	27.7	8.3	9.0
2 a 3 giorni alla settimana	12.8	16.7	11.5
4 a 6 giorni alla settimana	21.3	13.3	1.3
una volta al giorno	8.5	8.3	15.4
più volte al giorno	12.8	53.3	60.3
<b>N**</b>	<b>47</b>	<b>60</b>	<b>78</b>
<i>dati mancanti</i>	51	32	50

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

## T16.1a Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2012), uomini

Pazienti: principale sostanza problematica										
Uomini	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Coacaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
<b>Età all'epoca del primo consumo</b>										
media	16.1	20.5	21.7	21.2	20.1	35.5	14.8	14.8	15.8	26.2
deviazione standard	3.6	5.0	5.8	5.3	6.1	13.7	2.6	2.2	3.5	16.5
1° quartile	14.0	17.0	18.0	18.0	17.0	21.0	13.0	14.0	13.0	17.0
mediana	16.0	20.5	20.0	20.0	18.0	37.0	15.5	15.0	15.0	18.0
3° quartile	17.0	24.0	25.0	24.0	23.0	49.5	16.5	16.0	18.0	25.0
<b>N*</b>	<b>1'035</b>	<b>2</b>	<b>144</b>	<b>101</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>582</b>	<b>45</b>	<b>5</b>
<i>dati mancanti</i>	1'519	9	133	108	28	19	3	228	33	39
<b>Età all'inizio del consumo regolare</b>										
media	22.8	21.0	23.3	23.1	21.6	32.3	15.0	15.9	16.9	23.0
deviazione standard	8.3	4.2	6.1	6.0	7.8	12.9	2.8	2.8	4.9	5.6
1° quartile	18.0	18.0	19.0	19.0	17.5	22.0	13.0	15.0	14.0	19.0
mediana	20.0	21.0	21.5	21.0	18.0	24.0	16.0	15.0	16.0	24.0
3° quartile	25.0	24.0	26.5	25.0	24.0	49.0	17.0	16.0	20.0	26.0
<b>N*</b>	<b>1'083</b>	<b>2</b>	<b>136</b>	<b>93</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>482</b>	<b>42</b>	<b>5</b>
<i>dati mancanti</i>	1'471	9	141	116	30	20	3	328	36	39
<b>Età all'inizio del consumo problematico</b>										
media	32.8	21.7	24.3	24.4	21.5	32.0	16.7	16.7	19.1	33.3
deviazione standard	12.2	3.2	6.8	6.3	7.2	14.2	1.5	3.4	8.2	19.1
1° quartile	23.0	18.0	19.0	20.0	17.5	22.0	15.0	15.0	14.0	19.0
mediana	30.0	23.0	23.0	23.0	19.0	26.0	17.0	16.0	17.0	26.0
3° quartile	40.0	24.0	28.0	29.0	21.5	38.0	18.0	17.0	20.0	55.0
<b>N*</b>	<b>922</b>	<b>3</b>	<b>92</b>	<b>82</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>454</b>	<b>45</b>	<b>3</b>
<i>dati mancanti</i>	1'632	8	185	127	30	18	4	356	33	41
<b>Periodo di latenza (in anni)**</b>										
media	25.9	.	9.5	8.3	3.4	6.8	0.6	5.2	9.5	18.7
deviazione standard	13.2	.	9.4	6.1	4.7	4.6	0.1	6.7	10.2	14.2
1° quartile	15.5	.	2.2	4.3	0.8	3.6	0.6	1.4	1.5	8.7
mediana	25.6	.	7.0	6.9	1.1	6.8	0.6	2.8	6.1	18.7
3° quartile	35.2	.	14.0	11.7	4.5	10.1	0.7	5.8	12.0	28.8
<b>N*</b>	<b>464</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>53</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>440</b>	<b>33</b>	<b>2</b>
<i>dati mancanti</i>	506	4	15	30	13	2	2	91	12	19

\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

\*\* Lasso di tempo tra il primo consumo della sostanza problematica e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

## T16.1b Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2012), donne

Pazienti: principale sostanza problematica										
Donne	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Coacaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
<b>Età all'epoca del primo consumo</b>										
media	17.7	.	20.6	20.7	16.6	32.7	16.0	14.8	17.0	29.3
deviazione standard	5.3	.	6.3	5.7	1.5	11.3		1.9	3.4	25.7
1° quartile	15.0	.	17.0	17.0	15.5	24.0	16.0	14.0	15.0	14.0
mediana	16.0	.	20.0	19.0	17.0	30.0	16.0	15.0	16.0	15.0
3° quartile	20.0	.	23.0	24.0	18.0	44.0	16.0	16.0	19.0	59.0
<b>N*</b>	<b>411</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>26</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>158</b>	<b>37</b>	<b>3</b>
<i>dati mancanti</i>	741	2	39	20	7	22	0	47	22	17
<b>Età all'inizio del consumo regolare</b>										
media	27.3	.	22.7	22.1	17.1	38.3	16.0	16.2	18.4	16.5
deviazione standard	10.9	.	6.7	6.1	1.4	14.5		3.6	4.8	2.1
1° quartile	20.0	.	18.0	19.0	17.0	25.0	16.0	14.0	16.0	15.0
mediana	24.0	.	21.0	20.0	17.0	30.0	16.0	15.0	17.5	16.5
3° quartile	35.0	.	25.0	24.5	18.0	50.0	16.0	16.0	20.0	18.0
<b>N*</b>	<b>424</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>131</b>	<b>36</b>	<b>2</b>
<i>dati mancanti</i>	728	2	41	22	6	21	0	74	23	18
<b>Età all'inizio del consumo problematico</b>										
media	35.3	.	22.9	24.1	17.2	41.2	.	16.5	21.7	59.0
deviazione standard	12.8	.	6.3	7.2	1.4	14.4	.	3.0	10.5	
1° quartile	25.0	.	18.0	20.0	17.0	30.0	.	15.0	16.0	59.0
mediana	35.0	.	23.0	22.5	17.5	37.5	.	16.0	20.0	59.0
3° quartile	44.0	.	26.0	27.0	18.0	50.0	.	17.0	22.0	59.0
<b>N*</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>33</b>	<b>1</b>
<i>dati mancanti</i>	742	2	49	26	5	22	1	80	26	19
<b>Periodo di latenza (in anni)**</b>										
media	24.6	.	6.5	7.7	2.3	10.1	2.4	4.9	21.9	15.1
deviazione standard	12.6	.	7.3	6.3	1.5	4.1		5.6	16.1	17.4
1° quartile	15.9	.	1.4	3.3	1.1	7.1	2.4	1.4	4.8	1.5
mediana	25.0	.	5.3	4.4	1.9	9.3	2.4	2.6	23.3	9.2
3° quartile	33.6	.	7.6	10.7	3.1	13.2	2.4	5.9	35.6	34.7
<b>N*</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>117</b>	<b>26</b>	<b>3</b>
<i>dati mancanti</i>	230	0	5	2	3	5	0	20	10	7

\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

\*\* Lasso di tempo tra il primo consumo della sostanza problematica e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

## T16.1c Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2012), uomini e donne

Pazienti: principale sostanza problematica										
Uomini e donne	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Coacaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
<b>Età all'epoca del primo consumo</b>										
media	16.6	20.5	21.4	21.1	19.0	33.9	15.0	14.8	16.3	27.4
deviazione standard	4.2	5.0	5.9	5.4	5.4	12.1	2.4	2.1	3.5	18.6
1° quartile	15.0	17.0	18.0	17.0	16.0	22.0	15.0	14.0	14.0	15.5
mediana	16.0	20.5	20.0	20.0	17.5	33.0	16.0	15.0	16.0	17.5
3° quartile	18.0	24.0	24.0	24.0	19.0	48.0	16.0	16.0	19.0	40.0
<b>N*</b>	<b>1'446</b>	<b>2</b>	<b>188</b>	<b>127</b>	<b>26</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>740</b>	<b>82</b>	<b>8</b>
<i>dati mancanti</i>	2'260	11	172	128	35	41	3	275	55	56
<b>Età all'inizio del consumo regolare</b>										
media	24.1	21.0	23.1	22.9	20.0	35.9	15.2	16.0	17.6	21.1
deviazione standard	9.3	4.2	6.2	6.0	6.6	13.9	2.5	3.0	4.9	5.6
1° quartile	18.0	18.0	19.0	19.0	17.0	24.0	15.0	15.0	14.0	16.0
mediana	20.0	21.0	21.0	21.0	18.0	30.0	16.0	15.0	17.0	19.0
3° quartile	29.0	24.0	26.0	25.0	19.0	49.0	17.0	16.0	20.0	26.0
<b>N*</b>	<b>1'507</b>	<b>2</b>	<b>178</b>	<b>117</b>	<b>25</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>613</b>	<b>78</b>	<b>7</b>
<i>dati mancanti</i>	2'199	11	182	138	36	41	3	402	59	57
<b>Età all'inizio del consumo problematico</b>										
media	33.5	21.7	23.9	24.3	19.9	36.8	16.7	16.6	20.2	39.8
deviazione standard	12.4	3.2	6.7	6.5	6.0	14.7	1.5	3.3	9.3	20.2
1° quartile	23.0	18.0	19.0	20.0	17.0	25.0	15.0	15.0	15.0	22.5
mediana	32.0	23.0	23.0	23.0	18.0	32.0	17.0	16.0	18.0	40.5
3° quartile	40.0	24.0	27.0	27.0	19.0	50.0	18.0	17.0	20.0	57.0
<b>N*</b>	<b>1'332</b>	<b>3</b>	<b>126</b>	<b>102</b>	<b>26</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>579</b>	<b>78</b>	<b>4</b>
<i>dati mancanti</i>	2'374	10	234	153	35	40	5	436	59	60
<b>Periodo di latenza (in anni)**</b>										
media	25.6	.	8.7	8.2	3.0	9.0	1.2	5.1	15.0	16.6
deviazione standard	13.0	.	8.8	6.1	3.8	4.2	1.0	6.5	14.4	14.3
1° quartile	15.6	.	2.2	3.4	0.8	6.2	0.6	1.4	1.7	8.7
mediana	25.5	.	6.1	6.5	1.5	9.0	0.7	2.7	11.0	9.2
3° quartile	34.6	.	9.1	11.7	4.1	10.7	2.4	5.9	24.8	28.8
<b>N*</b>	<b>624</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>67</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>557</b>	<b>59</b>	<b>5</b>
<i>dati mancanti</i>	736	4	20	32	16	7	2	111	22	26

\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

\*\* Lasso di tempo tra il primo consumo della sostanza problematica e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

## T16.2a Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2012), uomini

Pazienti: problema principale			
<i>Uomini</i>	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
<b>Età all'epoca della prima manifestazione</b>			
media	28.5	22.8	16.7
deviazione standard	14.0	14.2	8.0
1° quartile	18.5	10.5	13.0
mediana	23.0	23.0	15.0
3° quartile	37.5	35.0	17.0
<b>N*</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>37</b>
<i>dati mancanti</i>	53	3	67
<b>Età all'inizio della manifestazione regolare</b>			
media	31.2	22.4	19.2
deviazione standard	13.2	12.2	8.1
1° quartile	21.0	13.0	14.0
mediana	29.0	20.0	16.0
3° quartile	40.0	34.0	21.0
<b>N*</b>	<b>27</b>	<b>5</b>	<b>47</b>
<i>dati mancanti</i>	50	2	57
<b>Età all'inizio della manifestazione problematica</b>			
media	34.0	23.3	21.4
deviazione standard	14.3	10.5	9.9
1° quartile	24.0	13.0	15.0
mediana	30.0	23.0	17.0
3° quartile	44.0	34.0	24.0
<b>N*</b>	<b>29</b>	<b>3</b>	<b>50</b>
<i>dati mancanti</i>	48	4	54
<b>Periodo di latenza (in anni)**</b>			
media	7.7	11.7	9.2
deviazione standard	4.8	3.4	8.6
1° quartile	4.8	9.0	2.8
mediana	6.3	12.6	5.5
3° quartile	11.2	14.3	13.2
<b>N*</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>37</b>
<i>dati mancanti</i>	53	3	67

\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

\*\* Lasso di tempo tra la prima manifestazione del comportamento problematico e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

## T16.2b Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2012), donne

Pazienti: problema principale			
Donne	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
<b>Età all'epoca della prima manifestazione</b>			
media	40.2	15.5	18.6
deviazione standard	13.1	4.7	10.9
1° quartile	30.0	13.0	13.0
mediana	43.0	16.0	15.0
3° quartile	50.0	18.0	15.0
<b>N*</b>	<b>9</b>	<b>43</b>	<b>5</b>
<i>dati mancanti</i>	12	42	19
<b>Età all'inizio della manifestazione regolare</b>			
media	45.9	16.3	21.7
deviazione standard	11.7	4.4	9.1
1° quartile	43.0	14.0	15.0
mediana	48.0	17.0	20.0
3° quartile	55.0	19.0	30.0
<b>N*</b>	<b>10</b>	<b>43</b>	<b>7</b>
<i>dati mancanti</i>	11	42	17
<b>Età all'inizio della manifestazione problematica</b>			
media	47.7	17.9	25.1
deviazione standard	12.3	5.5	11.9
1° quartile	36.0	15.0	15.5
mediana	49.0	17.0	19.0
3° quartile	56.0	19.0	39.0
<b>N*</b>	<b>11</b>	<b>46</b>	<b>8</b>
<i>dati mancanti</i>	10	39	16
<b>Periodo di latenza (in anni)**</b>			
media	11.4	10.4	5.1
deviazione standard	7.7	11.5	5.5
1° quartile	4.8	2.4	1.3
mediana	9.4	5.6	2.5
3° quartile	17.2	15.6	6.7
<b>N*</b>	<b>9</b>	<b>43</b>	<b>5</b>
<i>dati mancanti</i>	12	42	19

\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

\*\* Lasso di tempo tra la prima manifestazione del comportamento problematico e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

### T16.2c Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2012), uomini e donne

Pazienti: problema principale			
<i>Uomini e donne</i>	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
<b>Età all'epoca della prima manifestazione</b>			
media	31.7	16.1	17.0
deviazione standard	14.5	6.1	8.3
1° quartile	19.0	12.0	13.0
mediana	28.0	16.0	15.0
3° quartile	43.0	19.0	17.0
<b>N*</b>	<b>33</b>	<b>47</b>	<b>42</b>
<i>dati mancanti</i>	65	45	86
<b>Età all'inizio della manifestazione regolare</b>			
media	35.2	17.0	19.5
deviazione standard	14.3	5.8	8.2
1° quartile	23.0	13.5	14.0
mediana	31.0	17.0	16.0
3° quartile	48.0	19.5	21.0
<b>N*</b>	<b>37</b>	<b>48</b>	<b>54</b>
<i>dati mancanti</i>	61	44	74
<b>Età all'inizio della manifestazione problematica</b>			
media	37.8	18.2	21.9
deviazione standard	15.0	5.9	10.2
1° quartile	25.5	15.0	15.0
mediana	33.0	17.0	17.5
3° quartile	51.5	20.0	25.0
<b>N*</b>	<b>40</b>	<b>49</b>	<b>58</b>
<i>dati mancanti</i>	58	43	70
<b>Periodo di latenza (in anni)**</b>			
media	8.7	10.5	8.7
deviazione standard	5.8	11.0	8.3
1° quartile	4.8	2.6	2.5
mediana	6.6	7.1	5.4
3° quartile	13.0	15.6	13.2
<b>N*</b>	<b>33</b>	<b>47</b>	<b>42</b>
<i>dati mancanti</i>	65	45	86

\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

\*\* Lasso di tempo tra la prima manifestazione del comportamento problematico e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

## T17 Modo di amministrazione della principale sostanza problematica nel corso dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata (2012)

Pazienti: principale sostanza problematica															
Modo di amministrazione*	Eroina			Cocaina			Amfetamine			Canapa			Benzodiazepine		
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
iniettato	21.6	27.3	23.1	5.2	7.1	5.6	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
fumato/inalato	49.5	45.5	48.5	17.7	14.3	16.9	8.3	14.3	10.5	98.1	97.8	98.1	12.5	0.0	5.9
ingerito /bevuto	2.1	0.0	1.5	2.1	3.6	2.4	33.3	42.9	36.8	1.1	1.4	1.2	62.5	88.9	76.5
sniffato	26.8	27.3	26.9	75.0	75.0	75.0	58.3	42.9	52.6	0.4	0.7	0.4	25.0	0.0	11.8
altro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	5.9
<b>N**</b>	<b>97</b>	<b>33</b>	<b>130</b>	<b>96</b>	<b>28</b>	<b>124</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>529</b>	<b>139</b>	<b>668</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>
<i>dati mancanti</i>	<i>131</i>	<i>38</i>	<i>169</i>	<i>112</i>	<i>16</i>	<i>128</i>	<i>12</i>	<i>1</i>	<i>13</i>	<i>281</i>	<i>66</i>	<i>347</i>	<i>17</i>	<i>15</i>	<i>32</i>

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto



**T18 Prevalenza a vita delle iniezioni, nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata, scambio di materiale d'iniezione nel corso degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata e età all'epoca della prima iniezione, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2012)**

	Pazienti: pricipale sostanza problematica												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Iniezioni nel corso della vita*</b>																
sì	5.0	4.8	4.9	61.7	58.5	60.9	12.7	31.0	16.1	5.8	4.3	5.5	9.3	7.7	8.9	338
no	95.0	95.2	95.1	38.3	41.5	39.1	87.3	69.0	83.9	94.2	95.7	94.5	90.7	92.3	91.1	3'481
<b>N**</b>	<b>1'592</b>	<b>684</b>	<b>2'276</b>	<b>180</b>	<b>53</b>	<b>233</b>	<b>126</b>	<b>29</b>	<b>155</b>	<b>603</b>	<b>164</b>	<b>767</b>	<b>2'722</b>	<b>1'097</b>	<b>3'819</b>	<b>3'819</b>
<i>dati mancanti</i>	962	468	1'430	108	32	140	83	17	100	207	41	248	1'529	648	2'177	2'177
<b>Iniezioni nel corso dei 6 ultimi mesi*</b>																
sì	0.3	0.3	0.3	27.0	25.5	26.6	7.9	7.1	7.8	4.5	3.1	4.2	3.2	2.0	2.8	108
no	99.7	99.7	99.7	73.0	74.5	73.4	92.1	92.9	92.2	95.5	96.9	95.8	96.8	98.0	97.2	3'685
<b>N**</b>	<b>1'598</b>	<b>687</b>	<b>2'285</b>	<b>152</b>	<b>47</b>	<b>199</b>	<b>126</b>	<b>28</b>	<b>154</b>	<b>604</b>	<b>163</b>	<b>767</b>	<b>2'700</b>	<b>1'093</b>	<b>3'793</b>	<b>3'793</b>
<i>dati mancanti</i>	956	465	1'421	136	38	174	83	18	101	206	42	248	1'551	652	2'203	2'203
<b>Iniezioni nel corso dei 30 ultimi giorni*</b>																
sì	0.2	0.1	0.2	15.3	24.6	17.9	6.3	8.0	6.6	0.0	0.6	0.1	1.3	1.6	1.4	57
no	99.8	99.9	99.8	84.7	75.4	82.1	93.7	92.0	93.4	100.0	99.4	99.9	98.7	98.4	98.6	3'971
<b>N**</b>	<b>1'710</b>	<b>740</b>	<b>2'450</b>	<b>150</b>	<b>57</b>	<b>207</b>	<b>126</b>	<b>25</b>	<b>151</b>	<b>611</b>	<b>165</b>	<b>776</b>	<b>2'852</b>	<b>1'176</b>	<b>4'028</b>	<b>4'028</b>
<i>dati mancanti</i>	844	412	1'256	138	28	166	83	21	104	199	40	239	1'399	569	1'968	1'968
<b>Scambio di materiale d'iniezione nel corso dei 6 ultimi mesi***</b>																
sì	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	3.4	0.0	100.0	20.0	3.7	0.0	3.2	3.5	8.3	4.3	3
no	100.0	0.0	100.0	95.5	100.0	96.6	100.0	0.0	80.0	96.3	100.0	96.8	96.5	91.7	95.7	66
<b>N**</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>29</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>27</b>	<b>4</b>	<b>31</b>	<b>57</b>	<b>12</b>	<b>69</b>	<b>69</b>
<i>dati mancanti</i>	1	2	3	13	3	16	4	1	5	0	1	1	19	7	26	26
<b>Età all'epoca della prima iniezione****</b>																
fino a 14 anni	5.0	16.7	7.7	0.0	18.8	3.8	0.0	14.3	7.7	0.0	0.0	0.0	1.7	16.2	5.2	8
da 15 a 16 anni	17.5	8.3	15.4	8.1	12.5	9.0	16.7	28.6	23.1	20.0	0.0	16.7	12.0	16.2	13.0	20
da 17 a 18 anni	15.0	33.3	19.2	24.2	25.0	24.4	16.7	0.0	7.7	0.0	100.0	16.7	19.7	24.3	20.8	32
da 19 a 20 anni	25.0	16.7	23.1	12.9	18.8	14.1	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	33.3	19.7	13.5	18.2	28
da 21 a 25 anni	30.0	8.3	25.0	32.3	25.0	30.8	33.3	42.9	38.5	20.0	0.0	16.7	29.9	21.6	27.9	43
da 26 a 30 anni	2.5	16.7	5.8	14.5	0.0	11.5	33.3	14.3	23.1	0.0	0.0	0.0	10.3	8.1	9.7	15
da 31 a 39 anni	2.5	0.0	1.9	6.5	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	16.7	5.1	0.0	3.9	6
dai 40 anni in su	2.5	0.0	1.9	1.6	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.3	2
<b>N**</b>	<b>40</b>	<b>12</b>	<b>52</b>	<b>62</b>	<b>16</b>	<b>78</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>117</b>	<b>37</b>	<b>154</b>	<b>154</b>
<i>dati mancanti</i>	39	21	60	49	15	64	10	2	12	30	6	36	136	48	184	184

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti che si sono iniettati una sostanza illegale nel corso dei 6 ultimi mesi. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti che si sono iniettati una sostanza illegale nel corso della loro vita. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

## T19.1a Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2012), uomini

## Uomini

	Pazienti: principale sostanza problematica									
	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Altri problemi*</b>										
alcol	-	28.6	26.7	39.3	21.1	36.8	16.7	24.2	24.6	44.8
cocktail (eroina e cocaina)	0.4	-	1.5	1.3	0.0	5.3	16.7	0.0	0.0	0.0
eroina	1.9	14.3	6.3	8.7	0.0	42.1	33.3	1.3	1.6	3.4
metadone	1.4	0.0	19.4	4.0	0.0	10.5	0.0	0.2	0.0	0.0
altri oppiacei	0.1	0.0	2.4	0.7	0.0	0.0	0.0	1.0	1.6	0.0
cocaina	5.1	14.3	28.2	0.0	23.7	21.1	50.0	6.5	1.6	13.8
crack, freebase	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.6	0.0
amfetamine	1.1	0.0	5.3	6.0	15.8	5.3	16.7	3.6	1.6	3.4
MDMA e affini (ecstasy)	1.2	0.0	4.4	10.0	18.4	0.0	33.3	3.7	0.0	3.4
altri stimolanti	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
barbiturici	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazepine	2.2	14.3	11.7	4.0	2.6	0.0	16.7	0.5	1.6	0.0
altri sonniferi e tranquillanti	0.6	0.0	2.4	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	3.4
LSD	0.7	0.0	1.5	4.7	5.3	5.3	0.0	1.8	0.0	0.0
altri allucinogeni	0.2	0.0	0.0	2.7	0.0	10.5	16.7	0.8	0.0	0.0
sostanze volatili (per es., solventi)	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
canapa	12.3	0.0	28.2	32.7	39.5	26.3	50.0	-	14.8	31.0
tabacco	30.4	14.3	28.6	34.7	28.9	10.5	16.7	39.3	-	6.9
altra/e sostanza/e	0.3	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	-
gioco patologico	0.2	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.3	0.0	3.4
disturbi alimentari	0.2	0.0	0.5	0.7	0.0	5.3	0.0	0.2	1.6	3.4
altri problemi assimilabili a una dipendenza	0.8	0.0	1.0	0.7	0.0	0.0	0.0	1.5	6.6	0.0
nessun altro problema di dipendenza	57.4	28.6	26.2	25.3	23.7	31.6	16.7	43.1	59.0	34.5
<b>N**</b>	<b>1'650</b>	<b>7</b>	<b>206</b>	<b>150</b>	<b>38</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>615</b>	<b>61</b>	<b>29</b>
<i>dati mancanti</i>	<i>904</i>	<i>4</i>	<i>71</i>	<i>59</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>1</i>	<i>195</i>	<i>17</i>	<i>15</i>

\* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

## T19.1b Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2012), donne

## Donne

	Pazienti: principale sostanza problematica									
	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Altri problemi*</b>										
alcol	-	0.0	18.8	31.3	45.5	28.6	0.0	26.5	17.9	46.2
cocktail (eroina e cocaina)	0.4	-	3.1	3.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
eroina	1.7	0.0	6.3	12.5	0.0	0.0	0.0	0.6	2.6	0.0
metadone	1.3	0.0	12.5	9.4	0.0	14.3	0.0	0.6	0.0	0.0
altri oppiacei	0.6	0.0	1.6	0.0	0.0	4.8	0.0	0.6	0.0	0.0
cocaina	2.9	0.0	21.9	0.0	45.5	0.0	0.0	6.6	0.0	0.0
crack, freebase	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amfetamine	0.7	0.0	1.6	12.5	9.1	0.0	0.0	6.0	0.0	7.7
MDMA e affini (ecstasy)	1.3	0.0	3.1	15.6	36.4	0.0	100.0	7.8	0.0	7.7
altri stimolanti	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
barbiturici	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazepine	3.3	0.0	15.6	6.3	9.1	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
altri sonniferi e tranquillanti	1.9	0.0	6.3	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.3	0.0	1.6	3.1	9.1	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0
altri allucinogeni	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	100.0	0.6	0.0	0.0
sostanze volatili (per es., solventi)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
canapa	5.1	100.0	20.3	28.1	45.5	9.5	100.0	-	10.3	0.0
tabacco	28.2	0.0	25.0	25.0	45.5	0.0	0.0	42.8	-	7.7
altra/e sostanza/e	0.4	0.0	0.0	0.0	9.1	9.5	0.0	0.6	0.0	-
gioco patologico	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7
disturbi alimentari	2.2	0.0	3.1	9.4	9.1	9.5	0.0	0.0	2.6	0.0
altri problemi assimilabili a una dipendenza	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0
nessun altro problema di dipendenza	61.0	0.0	35.9	28.1	18.2	42.9	0.0	43.4	69.2	38.5
<b>N**</b>	<b>687</b>	<b>1</b>	<b>64</b>	<b>32</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>166</b>	<b>39</b>	<b>13</b>
<i>dati mancanti</i>	<i>465</i>	<i>1</i>	<i>19</i>	<i>14</i>	<i>4</i>	<i>11</i>	<i>0</i>	<i>39</i>	<i>20</i>	<i>7</i>

\* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

## T19.1c Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2012), uomini e donne

## Uomini e donne

	Pazienti: principale sostanza problematica									
	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Altri problemi*</b>										
alcol	-	25.0	24.8	37.9	26.5	32.5	14.3	24.7	22.0	45.2
cocktail (eroina e cocaina)	0.4	-	1.9	1.6	0.0	2.5	14.3	0.1	0.0	0.0
eroina	1.8	12.5	6.3	9.3	0.0	20.0	28.6	1.2	2.0	2.4
metadone	1.4	0.0	17.8	4.9	0.0	12.5	0.0	0.3	0.0	0.0
altri oppiacei	0.3	0.0	2.2	0.5	0.0	2.5	0.0	0.9	1.0	0.0
cocaina	4.5	12.5	26.7	0.0	28.6	10.0	42.9	6.5	1.0	9.5
crack, freebase	0.0	0.0	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	0.0
amfetamine	1.0	0.0	4.4	7.1	14.3	2.5	14.3	4.1	1.0	4.8
MDMA e affini (ecstasy)	1.2	0.0	4.1	11.0	22.4	0.0	42.9	4.6	0.0	4.8
altri stimolanti	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
barbiturici	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazepine	2.6	12.5	12.6	4.4	4.1	0.0	14.3	0.5	1.0	0.0
altri sonniferi e tranquillanti	1.0	0.0	3.3	0.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.4
LSD	0.6	0.0	1.5	4.4	6.1	2.5	0.0	1.8	0.0	0.0
altri allucinogeni	0.2	0.0	0.0	2.2	2.0	5.0	28.6	0.8	0.0	0.0
sostanze volatili (per es., solventi)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
canapa	10.2	12.5	26.3	31.9	40.8	17.5	57.1	-	13.0	21.4
tabacco	29.8	12.5	27.8	33.0	32.7	5.0	14.3	40.1	-	7.1
altra/e sostanza/e	0.3	0.0	0.7	0.0	2.0	5.0	0.0	0.6	0.0	-
gioco patologico	0.2	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.3	0.0	4.8
disturbi alimentari	0.8	0.0	1.1	2.2	2.0	7.5	0.0	0.1	2.0	2.4
altri problemi assimilabili a una dipendenza	0.9	0.0	0.7	0.5	0.0	0.0	0.0	1.4	4.0	0.0
nessun altro problema di dipendenza	58.5	25.0	28.5	25.8	22.4	37.5	14.3	43.1	63.0	35.7
<b>N**</b>	<b>2'337</b>	<b>8</b>	<b>270</b>	<b>182</b>	<b>49</b>	<b>40</b>	<b>7</b>	<b>781</b>	<b>100</b>	<b>42</b>
<i>dati mancanti</i>	1'369	5	90	73	12	19	1	234	37	22

\* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

## T19.2a Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2012), uomini

## Uomini

Pazienti: problema principale			
	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
	%	%	%
<b>Altri problemi*</b>			
alcol	6.4	0.0	4.9
cocktail (eroina e cocaina)	0.0	0.0	0.0
eroina	0.0	0.0	0.0
metadone	0.0	0.0	0.0
altri oppiacei	0.0	0.0	0.0
cocaina	0.0	0.0	0.0
crack, freebase	0.0	0.0	0.0
amfetamine	0.0	0.0	0.0
MDMA e affini (ecstasy)	0.0	0.0	0.0
altri stimolanti	0.0	0.0	0.0
barbiturici	0.0	0.0	0.0
benzodiazepine	0.0	0.0	0.0
altri sonniferi e tranquillanti	0.0	0.0	1.6
LSD	0.0	0.0	0.0
altri allucinogeni	0.0	0.0	0.0
sostanze volatili (per es., solventi)	0.0	0.0	0.0
canapa	4.3	0.0	8.2
tabacco	21.3	0.0	11.5
altra/e sostanza/e	2.1	0.0	0.0
gioco patologico	-	0.0	1.6
disturbi alimentari	0.0	-	1.6
altri problemi assimilabili a una dipendenza	0.0	0.0	-
nessun altro problema di dipendenza	72.3	100.0	78.7
<b>N**</b>	<b>47</b>	<b>6</b>	<b>61</b>
<i>dati mancanti</i>	30	1	43

\* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

## T19.2b Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2012), donne

Donne

Pazienti: problema principale			
	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
	%	%	%
<b>Altri problemi*</b>			
alcol	10.0	7.5	0.0
cocktail (eroina e cocaina)	0.0	0.0	0.0
eroina	0.0	1.9	0.0
metadone	0.0	0.0	0.0
altri oppiacei	0.0	0.0	0.0
cocaina	0.0	3.8	0.0
crack, freebase	0.0	0.0	0.0
amfetamine	0.0	0.0	0.0
MDMA e affini (ecstasy)	0.0	0.0	0.0
altri stimolanti	0.0	0.0	0.0
barbiturici	0.0	0.0	0.0
benzodiazepine	0.0	1.9	0.0
altri sonniferi e tranquillanti	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0
altri allucinogeni	0.0	0.0	0.0
sostanze volatili (per es., solventi)	0.0	0.0	0.0
canapa	0.0	1.9	0.0
tabacco	10.0	9.4	6.7
altra/e sostanza/e	0.0	0.0	13.3
gioco patologico	-	0.0	0.0
disturbi alimentari	0.0	-	6.7
altri problemi assimilabili a una dipendenza	0.0	1.9	-
nessun altro problema di dipendenza	80.0	83.0	80.0
<b>N**</b>	<b>10</b>	<b>53</b>	<b>15</b>
<i>dati mancanti</i>	11	32	9

\* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

### T19.2c Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2012), uomini e donne

#### Uomini e donne

Pazienti: problema principale			
	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
	%	%	%
<b>Altri problemi*</b>			
alcol	7.0	6.8	3.9
cocktail (eroina e cocaina)	0.0	0.0	0.0
eroina	0.0	1.7	0.0
metadone	0.0	0.0	0.0
altri oppiacei	0.0	0.0	0.0
cocaina	0.0	3.4	0.0
crack, freebase	0.0	0.0	0.0
amfetamine	0.0	0.0	0.0
MDMA e affini (ecstasy)	0.0	0.0	0.0
altri stimolanti	0.0	0.0	0.0
barbiturici	0.0	0.0	0.0
benzodiazepine	0.0	1.7	0.0
altri sonniferi e tranquillanti	0.0	0.0	1.3
LSD	0.0	0.0	0.0
altri allucinogeni	0.0	0.0	0.0
sostanze volatili (per es., solventi)	0.0	0.0	0.0
canapa	3.5	1.7	6.6
tabacco	19.3	8.5	10.5
altra/e sostanza/e	1.8	0.0	2.6
gioco patologico	-	0.0	1.3
disturbi alimentari	0.0	-	2.6
altri problemi assimilabili a una dipendenza	0.0	1.7	-
nessun altro problema di dipendenza	73.7	84.7	78.9
<b>N**</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	<b>76</b>
<i>dati mancanti</i>	41	33	52

\* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

**T20 Frequenza del consumo di alcol, numero di "bicchieri standard" al giorno e frequenza di forti consumi di alcol prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti ) (2012)**

	Pazienti: problema principale												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Frequenza del consumo di alcol*</b>																
mai	12.1	11.0	11.8	14.4	22.0	16.1	11.5	8.0	10.9	13.3	16.5	14.0	13.2	14.0	13.5	491
1 volta al mese o meno	3.6	4.8	3.9	14.4	31.7	18.3	7.7	12.0	8.5	22.9	26.8	23.7	8.9	9.7	9.1	332
2 a 4 volte al mese	5.0	7.0	5.6	24.5	24.4	24.4	21.2	24.0	21.7	42.4	43.3	42.5	15.5	15.0	15.4	561
2 a 3 volte alla settimana	17.4	15.9	17.0	18.0	14.6	17.2	36.5	28.0	34.9	16.5	9.4	15.1	17.8	14.7	16.9	618
4 volte alla settimana o più	61.9	61.4	61.7	28.8	7.3	23.9	23.1	28.0	24.0	4.9	3.9	4.7	44.5	46.6	45.1	1'646
<b>N**</b>	<b>1'706</b>	<b>730</b>	<b>2'436</b>	<b>139</b>	<b>41</b>	<b>180</b>	<b>104</b>	<b>25</b>	<b>129</b>	<b>510</b>	<b>127</b>	<b>637</b>	<b>2'627</b>	<b>1'021</b>	<b>3'648</b>	<b>3'648</b>
<i>dati mancanti</i>	848	422	1'270	149	44	193	105	21	126	300	78	378	1'624	724	2'348	2'348
<b>Numero di "bicchieri standard" al giorno***</b>																
1 o 2	7.1	7.7	7.3	42.7	55.6	45.4	37.8	31.8	36.5	51.7	57.1	52.7	20.4	20.3	20.4	615
3 o 4	17.6	18.4	17.8	29.1	29.6	29.2	26.8	40.9	29.8	32.9	32.7	32.9	22.1	21.6	22.0	663
5 o 6	23.0	25.6	23.7	12.6	11.1	12.3	19.5	4.5	16.3	10.7	7.1	10.0	19.6	21.0	20.0	603
7 o 9	20.2	24.3	21.4	7.8	3.7	6.9	7.3	4.5	6.7	3.6	3.1	3.5	15.1	18.6	16.1	485
10 o più	32.2	24.1	29.8	7.8	0.0	6.2	8.5	18.2	10.6	1.2	0.0	1.0	22.7	18.5	21.6	650
<b>N**</b>	<b>1'468</b>	<b>614</b>	<b>2'082</b>	<b>103</b>	<b>27</b>	<b>130</b>	<b>82</b>	<b>22</b>	<b>104</b>	<b>422</b>	<b>98</b>	<b>520</b>	<b>2'188</b>	<b>828</b>	<b>3'016</b>	<b>3'016</b>
<i>dati mancanti</i>	1'086	538	1'624	185	58	243	127	24	151	388	107	495	2'063	917	2'980	2'980
<b>Frequenza di forti consumi di alcol***</b>																
mai	12.9	15.1	13.5	42.3	61.8	46.9	26.5	45.8	30.8	48.8	50.9	49.2	24.1	27.6	25.1	821
meno di una volta al mese	10.2	10.6	10.3	21.6	11.8	19.3	27.7	20.8	26.2	29.8	33.6	30.6	15.7	14.1	15.2	499
1 volta al mese	11.3	8.7	10.5	10.8	8.8	10.3	18.1	4.2	15.0	13.4	8.2	12.3	11.9	8.2	10.8	355
1 volta alla settimana	24.6	25.8	25.0	15.3	14.7	15.2	21.7	8.3	18.7	6.5	7.3	6.6	20.0	20.7	20.2	660
quasi ogni giorno	41.0	39.9	40.7	9.9	2.9	8.3	6.0	20.8	9.3	1.6	0.0	1.3	28.4	29.4	28.7	940
<b>N**</b>	<b>1'579</b>	<b>644</b>	<b>2'223</b>	<b>111</b>	<b>34</b>	<b>145</b>	<b>83</b>	<b>24</b>	<b>107</b>	<b>449</b>	<b>110</b>	<b>559</b>	<b>2'370</b>	<b>905</b>	<b>3'275</b>	<b>3'275</b>
<i>dati mancanti</i>	975	508	1'483	177	51	228	126	22	148	361	95	456	1'881	840	2'721	2'721

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti che hanno indicato un consumo d'alcol. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile



## T21 Frequenza del consumo di tabacco e numero di sigarette al giorno nel corso dei 30 ultimi giorni prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2012)

	Pazienti: problema principale												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Frequenza del consumo di tabacco*</b>																
mai	29.7	33.6	30.8	3.8	4.9	4.1	14.4	4.2	12.3	18.5	10.7	16.9	25.0	27.7	25.8	693
1 giorno alla settimana o meno	1.2	0.2	0.9	0.0	0.0	0.0	2.2	4.2	2.6	3.6	3.3	3.5	1.8	0.9	1.5	41
2 a 3 giorni alla settimana	0.3	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.9	4.2	2.5	3.9	1.3	1.2	1.3	34
4 a 6 giorni alla settimana	0.8	0.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	1.7	2.4	1.2	0.7	1.0	28
1 volta al giorno	1.2	0.4	1.0	1.9	2.4	2.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7	1.7	1.2	0.9	1.2	31
più volte al giorno	66.8	64.9	66.2	94.3	92.7	93.9	83.3	87.5	84.2	69.4	80.2	71.6	69.5	68.7	69.3	1'864
<b>N**</b>	<b>1'087</b>	<b>453</b>	<b>1'540</b>	<b>106</b>	<b>41</b>	<b>147</b>	<b>90</b>	<b>24</b>	<b>114</b>	<b>471</b>	<b>121</b>	<b>592</b>	<b>1'925</b>	<b>766</b>	<b>2'691</b>	<b>2'691</b>
<i>dati mancanti</i>	1'467	699	2'166	182	44	226	119	22	141	339	84	423	2'326	979	3'305	3'305
<b>Numero di sigarette al giorno***</b>																
0 a 10	16.8	19.2	17.5	9.6	18.9	12.5	23.9	38.9	27.0	53.9	45.5	52.0	27.7	25.4	27.1	479
11 a 20	41.5	50.2	43.9	44.6	48.6	45.8	45.1	44.4	44.9	35.0	42.4	36.6	40.2	48.2	42.4	749
21 a 30	30.9	24.7	29.2	32.5	18.9	28.3	19.7	11.1	18.0	9.5	11.1	9.8	23.7	20.5	22.8	403
31 o più	10.8	5.9	9.4	13.3	13.5	13.3	11.3	5.6	10.1	1.7	1.0	1.6	8.4	5.9	7.7	137
<b>N**</b>	<b>667</b>	<b>255</b>	<b>922</b>	<b>83</b>	<b>37</b>	<b>120</b>	<b>71</b>	<b>18</b>	<b>89</b>	<b>349</b>	<b>99</b>	<b>448</b>	<b>1'280</b>	<b>488</b>	<b>1'768</b>	<b>1'768</b>
<i>dati mancanti</i>	97	46	143	19	2	21	6	5	11	35	9	44	164	66	230	230

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti che hanno indicato un consumo di tabacco. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

## T22a Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2012), uomini

Pazienti: principale sostanza problematica										
	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Obiettivo di consumo*</b>										
astinenza definitiva	31.8	100.0	75.0	80.8	66.7	58.3	50.0	48.3	46.2	46.7
astinenza limitata nel tempo	25.4	0.0	4.0	6.4	16.7	0.0	0.0	9.0	7.7	0.0
consumo controllato	30.0	0.0	6.5	5.1	8.3	8.3	0.0	20.9	30.8	33.3
non è prevista nessuna limitazione	1.3	0.0	0.8	1.3	0.0	8.3	0.0	5.6	0.0	0.0
nessuna decisione finora	11.4	0.0	12.9	6.4	8.3	25.0	50.0	15.8	15.4	20.0
altro	0.2	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
<b>N*</b>	<b>1'025</b>	<b>2</b>	<b>124</b>	<b>78</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>234</b>	<b>13</b>	<b>15</b>
<i>dati mancanti</i>	1'529	9	153	131	34	15	5	576	65	29

## T22b Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2012), donne

<b>Obiettivo di consumo*</b>										
astinenza definitiva	34.2	0.0	75.0	70.0	20.0	66.7	100.0	50.0	50.0	66.7
astinenza limitata nel tempo	20.8	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0
consumo controllato	31.9	0.0	3.1	5.0	20.0	22.2	0.0	23.3	0.0	16.7
non è prevista nessuna limitazione	0.7	0.0	9.4	0.0	0.0	11.1	0.0	1.7	0.0	0.0
nessuna decisione finora	11.6	0.0	9.4	20.0	60.0	0.0	0.0	16.7	50.0	16.7
altro	0.7	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>N*</b>	<b>404</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>60</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
<i>dati mancanti</i>	748	2	51	26	10	23	0	145	57	14

## T22c Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2012), uomini e donne

<b>Obiettivo di consumo*</b>										
astinenza definitiva	32.5	100.0	75.0	78.6	52.9	61.9	66.7	48.6	46.7	52.4
astinenza limitata nel tempo	24.1	0.0	3.2	6.1	11.8	0.0	0.0	8.8	6.7	0.0
consumo controllato	30.5	0.0	5.8	5.1	11.8	14.3	0.0	21.4	26.7	28.6
non è prevista nessuna limitazione	1.1	0.0	2.6	1.0	0.0	9.5	0.0	4.8	0.0	0.0
nessuna decisione finora	11.5	0.0	12.2	9.2	23.5	14.3	33.3	16.0	20.0	19.0
altro	0.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
<b>N*</b>	<b>1'429</b>	<b>2</b>	<b>156</b>	<b>98</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>294</b>	<b>15</b>	<b>21</b>
<i>dati mancanti</i>	2'277	11	204	157	44	38	5	721	122	43

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

## T23a Problemi psichici nel corso della vita (2012), uomini

## Uomini

	Pazienti: problema principale									
	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Problemi psichici*</b>										
depressione grave	33.2	100.0	44.2	25.0	11.1	55.6	50.0	22.1	10.0	71.4
stati ansiosi/tensione nervosa grave	26.8	100.0	37.9	17.9	44.4	77.8	50.0	20.5	0.0	50.0
diff. di compr./memoria/concentrazion.	13.0	0.0	23.2	8.9	33.3	33.3	25.0	18.9	20.0	21.4
allucinazioni	2.6	0.0	8.4	7.1	11.1	0.0	25.0	4.2	10.0	7.1
diff. a controllare comp. violenti	13.9	100.0	17.9	19.6	11.1	0.0	0.0	17.9	0.0	50.0
problemi psichici curati con medicine	12.6	0.0	9.5	12.5	0.0	66.7	0.0	6.3	0.0	0.0
pensieri suicidi seri	14.6	100.0	18.9	14.3	33.3	22.2	25.0	13.2	0.0	28.6
tentativi di suicidio	5.5	0.0	9.5	7.1	11.1	0.0	0.0	6.8	0.0	21.4
altro/i problema/i psichico/i	3.5	0.0	2.1	5.4	0.0	0.0	0.0	4.2	10.0	0.0
nessuno	39.2	0.0	27.4	42.9	44.4	11.1	25.0	55.8	60.0	14.3
<b>N**</b>	<b>779</b>	<b>1</b>	<b>95</b>	<b>56</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>190</b>	<b>10</b>	<b>14</b>
<i>dati mancanti</i>	<i>1'775</i>	<i>10</i>	<i>182</i>	<i>153</i>	<i>37</i>	<i>18</i>	<i>3</i>	<i>620</i>	<i>68</i>	<i>30</i>

\* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

## T23b Problemi psichici nel corso della vita (2012), donne

Donne

	Pazienti: problema principale									
	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Problemi psichici*</b>										
depressione grave	44.3	0.0	36.0	41.2	0.0	77.8	0.0	32.7	0.0	57.1
stati ansiosi/tensione nervosa grave	42.7	0.0	48.0	41.2	0.0	66.7	0.0	30.8	0.0	42.9
diff. di compr./memoria/concentrazion.	15.3	0.0	8.0	17.6	0.0	44.4	0.0	17.3	0.0	42.9
allucinazioni	2.2	0.0	0.0	5.9	0.0	11.1	0.0	5.8	0.0	14.3
diff. a controllare comp. violenti	7.6	0.0	8.0	17.6	0.0	11.1	0.0	23.1	0.0	14.3
problemi psichici curati con medicine	24.5	0.0	20.0	23.5	100.0	22.2	0.0	17.3	0.0	0.0
pensieri suicidi seri	20.7	0.0	32.0	17.6	50.0	66.7	0.0	26.9	0.0	57.1
tentativi di suicidio	13.1	0.0	12.0	11.8	0.0	66.7	0.0	13.5	0.0	28.6
altro/i problema/i psichico/i	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0
nessuno	22.3	0.0	24.0	23.5	0.0	0.0	100.0	40.4	100.0	28.6
<b>N**</b>	<b>314</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>52</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
<i>dati mancanti</i>	838	2	58	29	13	23	0	153	58	13

\* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

## T23c Problemi psichici nel corso della vita (2012), uomini e donne

## Uomini e donne

	Pazienti: problema principale									
	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Problemi psichici*</b>										
depressione grave	36.4	100.0	42.5	28.8	9.1	66.7	40.0	24.4	9.1	66.7
stati ansiosi/tensione nervosa grave	31.4	100.0	40.0	23.3	36.4	72.2	40.0	22.7	0.0	47.6
diff. di compr./memoria/concentrazion.	13.6	0.0	20.0	11.0	27.3	38.9	20.0	18.6	18.2	28.6
allucinazioni	2.5	0.0	6.7	6.8	9.1	5.6	20.0	4.5	9.1	9.5
diff. a controllare comp. violenti	12.1	100.0	15.8	19.2	9.1	5.6	0.0	19.0	0.0	38.1
problemi psichici curati con medicine	16.0	0.0	11.7	15.1	18.2	44.4	0.0	8.7	0.0	0.0
pensieri suicidi seri	16.4	100.0	21.7	15.1	36.4	44.4	20.0	16.1	0.0	38.1
tentativi di suicidio	7.7	0.0	10.0	8.2	9.1	33.3	0.0	8.3	0.0	23.8
altro/i problema/i psichico/i	3.9	0.0	1.7	4.1	0.0	0.0	0.0	3.7	9.1	0.0
nessuno	34.3	0.0	26.7	38.4	36.4	5.6	40.0	52.5	63.6	19.0
<b>N**</b>	<b>1'093</b>	<b>1</b>	<b>120</b>	<b>73</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>242</b>	<b>11</b>	<b>21</b>
<i>dati mancanti</i>	<i>2'613</i>	<i>12</i>	<i>240</i>	<i>182</i>	<i>50</i>	<i>41</i>	<i>3</i>	<i>773</i>	<i>126</i>	<i>43</i>

\* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

## T24 Parenti/conoscenti: legame tra l'utente e la persona sintomatica (2012)

Parenti o conoscenti				
	Uomini	Donne	Totale	
	%	%	%	N
<b>L'utente è... *</b>				
madre/padre	37.1	31.2	32.6	338
figlio/figlia	17.2	13.6	14.2	147
sorella/fratello	6.8	4.6	5.0	52
partner	29.9	45.1	41.2	427
altro parente	1.4	2.0	1.8	19
collega/amico/a	3.6	1.6	2.0	21
datore di lavoro/docente	0.9	0.2	0.4	4
tutore/curatore	0.0	0.0	0.0	0
altro	3.2	1.6	2.7	28
<b>N**</b>	<b>221</b>	<b>801</b>	<b>1'036</b>	<b>1'036</b>
<i>dati mancanti</i>	7	16	23	23

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

## T25 Parenti/conoscenti: problema principale e altri problemi della persona sintomatica (2012)

Parenti o conoscenti					
Totale			Totale		
	%	N		%	N
<b>Problema principale della persona sintomatica*</b>			<b>Altri problemi della persona sintomatica***</b>		
alcol	63.6	663	alcol	32.5	130
cocktail (eroina e cocaina)	0.4	4	cocktail (eroina e cocaina)	0.5	2
eroina	2.7	28	eroina	2.8	11
metadone	0.7	7	metadone	3.8	15
altri oppiacei	0.1	1	altri oppiacei	1.3	5
cocaina	5.5	57	cocaina	8.8	35
crack, freebase	0.0	0	crack, freebase	0.3	1
amfetamine	0.4	4	amfetamine	2.0	8
MDMA e affini (ecstasy)	1.0	10	MDMA e affini (ecstasy)	2.8	11
altri stimolanti	0.1	1	altri stimolanti	0.5	2
barbiturici	1.6	17	barbiturici	0.3	1
benzodiazepine	0.4	4	benzodiazepine	2.8	11
altri sonniferi e tranquillanti	0.1	1	altri sonniferi e tranquillanti	2.5	10
LSD	0.0	0	LSD	2.0	8
altri allucinogeni	0.4	4	altri allucinogeni	0.3	1
sostanze volatili (per es., solventi)	0.0	0	sostanze volatili (per es., solventi)	0.0	0
canapa	12.8	133	canapa	18.0	72
tabacco	0.8	8	tabacco	21.5	86
altra/e sostanza/e	0.5	5	altra/e sostanza/e	0.5	2
gioco patologico	3.1	32	gioco patologico	4.5	18
disturbi alimentari	1.5	16	disturbi alimentari	0.8	3
altri problemi assimilabili a una dipendenza	4.5	47	altri problemi assimilabili a una dipendenza	5.0	20
			nessun altro problema di dipendenza	22.5	90
<b>N**</b>		<b>1'042</b>	<b>N**</b>		<b>400</b>
<i>dati mancanti</i>		<i>17</i>	<i>dati mancanti</i>		<i>659</i>

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

\*\*\* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

**T26 Parenti/conoscenti: Problemi della persona di contatto legati ai problemi della persona sintomatica (2012)**

Parenti o conoscenti				
	Uomini	Donne	Totale	N
	%	%	%	
<b>propri problemi*</b>				
propri problemi di consumo	12.0	10.8	11.0	40
propri comportamenti di dipendenza	0.0	1.0	0.8	3
propri problemi somatici	0.0	6.6	5.2	19
propri problemi psichici	14.7	35.2	30.9	112
problemi con il/la partner	34.7	40.8	39.5	143
problemi di famiglia	53.3	54.0	53.9	195
problemi finanziari	9.3	14.3	13.3	48
propri problemi prof./di formazione	2.7	4.5	4.1	15
problemi di alloggio	9.3	8.7	8.8	32
problemi di violenza (vittima)	2.7	8.4	7.2	26
problemi per controllare la violenza	2.7	0.7	1.1	4
problemi giuridici	4.0	4.2	4.1	15
altro/i	1.3	3.1	2.8	10
nessuno	18.7	13.2	14.4	52
<b>N**</b>	<b>75</b>	<b>287</b>	<b>362</b>	<b>362</b>
<i>dati mancanti</i>	<i>153</i>	<i>530</i>	<i>697</i>	<i>697</i>

\* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)



T27 Sesso e età dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale<sup>1</sup>) e dei parenti o conoscenti (2012)

	Pazienti: problema principale <sup>1</sup>												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Sesso*</b>																			
maschile	69.9			73.4			83.3			80.7			21.1			64.1		4'425	
femminile	30.1			26.6			16.7			19.3			78.8			35.9		2'478	
Sesso non noto	0.0			0.0			0.0			0.0			0.1			0.0		1	
<b>N**</b>	<b>2'560</b>	<b>1'100</b>	<b>3'660</b>	<b>325</b>	<b>118</b>	<b>443</b>	<b>249</b>	<b>50</b>	<b>299</b>	<b>718</b>	<b>172</b>	<b>890</b>	<b>214</b>	<b>798</b>	<b>1'013</b>	<b>4'425</b>	<b>2'478</b>	<b>6'904</b>	<b>6'904</b>
<b>Età (in anni)*</b>																			
fino a 14 anni	0.2	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.3	2.9	1.7	2.7	4.7	0.6	1.5	1.2	0.8	1.0	72
15-19	1.9	1.0	1.7	0.3	0.8	0.5	2.4	8.0	3.3	55.8	55.8	55.8	4.2	2.7	3.0	11.6	7.1	10.0	685
20-24	3.6	2.0	3.1	5.9	16.9	8.8	16.1	26.0	17.7	15.3	18.6	16.0	4.7	3.8	4.0	7.3	5.9	6.8	464
25-29	8.1	4.2	7.0	17.3	18.6	17.6	21.3	32.0	23.1	11.3	9.3	10.9	4.7	6.8	6.4	10.3	7.5	9.3	638
30-34	10.0	6.6	9.0	19.4	17.8	19.0	23.3	8.0	20.7	6.3	5.2	6.1	9.3	8.2	8.4	11.1	8.0	10.0	686
35-39	9.6	8.7	9.3	24.4	15.3	21.9	15.7	8.0	14.4	3.8	3.5	3.7	7.9	11.4	10.6	10.2	9.6	9.9	683
40-44	14.8	13.9	14.5	16.4	16.1	16.3	11.2	4.0	10.0	2.0	2.9	2.1	7.9	14.8	13.3	11.8	13.0	12.2	839
45-49	14.8	18.1	15.8	9.0	10.2	9.3	6.8	4.0	6.4	1.7	1.2	1.6	15.4	16.3	16.1	11.0	14.5	12.3	841
50-54	12.8	17.0	14.0	4.6	2.5	4.1	1.6	4.0	2.0	0.6	1.7	0.8	13.1	15.5	15.0	9.1	13.4	10.7	733
55-59	10.7	11.1	10.8	2.5	0.8	2.0	1.6	4.0	2.0	0.1	0.0	0.1	11.7	8.2	8.9	7.4	8.5	7.8	536
60-64	6.0	8.7	6.8	0.3	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	6.1	4.4	4.8	3.9	5.5	4.5	308
65-69	4.5	4.7	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	5.6	2.9	3.5	3.1	3.3	3.1	215
70-74	1.8	2.1	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	2.9	2.6	1.2	2.0	1.5	101
75 e più	1.1	1.3	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	1.5	1.9	0.8	1.1	0.9	64
<b>N**</b>	<b>2'547</b>	<b>1'083</b>	<b>3'630</b>	<b>324</b>	<b>118</b>	<b>442</b>	<b>249</b>	<b>50</b>	<b>299</b>	<b>717</b>	<b>172</b>	<b>889</b>	<b>214</b>	<b>792</b>	<b>1'006</b>	<b>4'410</b>	<b>2'455</b>	<b>6'865</b>	<b>6'865</b>
<i>dati mancanti</i>	13	17	30	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	6	7	15	23	39	39
<b>Età</b>																			
media	45.4	48.2	46.3	37.0	34.6	36.4	33.1	29.7	32.6	22.4	22.4	22.4	45.2	45.0	45.0	39.4	43.1	40.8	
deviazione standard	13.0	12.3	12.9	8.3	9.3	8.6	8.5	10.4	8.9	8.0	8.4	8.1	16.1	13.2	13.8	14.9	14.5	14.9	
1° quartile	35.6	40.8	37.1	30.4	27.7	29.8	26.6	22.2	25.8	17.2	16.7	17.1	34.6	36.1	35.7	27.6	32.4	29.0	
mediana	45.6	48.4	46.5	36.6	32.7	36.3	32.1	27.1	31.0	18.7	18.4	18.6	46.6	45.6	45.8	39.3	44.4	41.4	
3° quartile	54.6	56.1	55.1	42.2	42.0	42.1	38.9	33.5	38.6	25.4	24.7	25.2	57.0	52.5	53.4	50.4	53.0	51.6	
<b>N**</b>	<b>2'547</b>	<b>1'083</b>	<b>3'630</b>	<b>324</b>	<b>118</b>	<b>442</b>	<b>249</b>	<b>50</b>	<b>299</b>	<b>717</b>	<b>172</b>	<b>889</b>	<b>214</b>	<b>792</b>	<b>1'006</b>	<b>4'410</b>	<b>2'455</b>	<b>6'865</b>	
<i>dati mancanti</i>	13	17	30	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	6	7	15	23	39	

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T28 Stato civile e grado di urbanizzazione del domicilio dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale<sup>1</sup>) e dei parenti o conoscenti (2012)

	Pazienti: problema principale <sup>1</sup>												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Stato civile*</b>																			
celibe/nubile	40.9	29.0	37.4	71.9	72.0	71.9	73.8	87.2	75.9	92.7	92.4	92.6	31.9	23.6	25.4	54.5	37.8	48.4	2'928
sposato	31.9	27.5	30.6	11.9	14.0	12.4	13.8	7.7	12.9	4.2	3.2	4.0	51.9	52.7	52.5	25.5	32.4	28.0	1'693
separato-a (giuridicamente)	5.4	7.2	5.9	3.3	2.0	3.0	4.3	5.1	4.4	1.1	0.6	1.0	3.2	4.6	4.3	4.1	5.1	4.5	269
divorziato-a	19.5	30.5	22.8	12.2	8.0	11.1	6.2	0.0	5.2	1.8	3.2	2.1	9.2	16.2	14.7	14.1	20.6	16.4	994
vedovo-a	1.8	5.3	2.8	0.0	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.3	2.7	2.4	2.5	1.2	3.6	2.1	126
unione registrata	0.4	0.5	0.5	0.7	3.0	1.4	1.9	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.1	0.4	0.6	0.6	0.5	0.6	34
<b>N**</b>	<b>2'254</b>	<b>960</b>	<b>3'214</b>	<b>270</b>	<b>100</b>	<b>370</b>	<b>210</b>	<b>39</b>	<b>249</b>	<b>613</b>	<b>158</b>	<b>771</b>	<b>185</b>	<b>711</b>	<b>897</b>	<b>3'854</b>	<b>2'189</b>	<b>6'044</b>	<b>6'044</b>
<i>dati mancanti</i>	306	140	446	55	18	73	39	11	50	105	14	119	29	87	116	571	289	860	860
<b>Grado di urbanizzazione*</b>																			
grandi centri urbani	7.8	8.4	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	9.4	9.1	9.2	5.1	6.7	5.7	355
periferia dei grandi centri	12.9	15.0	13.5	2.6	3.1	2.8	4.2	13.2	5.6	2.9	6.3	3.6	16.3	14.2	14.6	9.7	12.5	10.7	670
città di media importanza	13.7	12.8	13.4	10.6	22.4	13.8	21.0	13.2	19.8	28.0	22.2	26.8	15.3	15.9	15.8	16.5	16.2	16.3	1'020
piccole città	34.8	32.2	34.0	59.6	48.0	56.5	50.9	57.9	52.0	35.0	39.9	36.0	36.1	33.1	33.8	38.2	34.6	36.9	2'303
campagna	30.8	31.7	31.0	27.2	26.5	27.0	23.8	15.8	22.6	33.9	31.6	33.4	22.8	27.7	26.6	30.5	30.0	30.3	1'893
<b>N**</b>	<b>2'349</b>	<b>995</b>	<b>3'344</b>	<b>265</b>	<b>98</b>	<b>363</b>	<b>214</b>	<b>38</b>	<b>252</b>	<b>611</b>	<b>158</b>	<b>769</b>	<b>202</b>	<b>747</b>	<b>950</b>	<b>3'980</b>	<b>2'260</b>	<b>6'241</b>	<b>6'241</b>
<i>dati mancanti</i>	211	105	316	60	20	80	35	12	47	107	14	121	12	51	63	445	218	663	663

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T29 Tipo di nucleo familiare, situazione di domicilio e tipo di relazione di coppia dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale<sup>1</sup>) e dei parenti o conoscenti (2012)

	Pazienti: problema principale <sup>1</sup>												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			N
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Tipo di nucleo familiare*</b>																			
da solo-a	39.3	38.0	39.0	47.4	28.8	41.8	33.1	26.9	32.1	14.6	12.8	14.2	16.7	12.1	12.9	33.1	26.4	30.7	1'336
con i genitori/un genitore	5.9	2.2	4.8	9.7	7.6	9.1	12.5	34.6	16.0	68.6	59.4	66.6	14.0	5.6	7.3	19.3	10.7	16.2	706
con figlio-a-i	2.2	11.5	5.0	3.2	13.6	6.4	1.5	7.7	2.5	0.4	1.5	0.7	7.0	14.5	13.1	2.0	11.0	5.3	232
con un-a partner (senza figli)	26.2	29.3	27.1	12.3	24.2	15.9	19.9	3.8	17.3	4.4	9.0	5.4	28.1	26.2	26.5	20.6	25.3	22.3	971
con un-a partner e figlio-a-i	18.2	14.1	17.0	9.7	15.2	11.4	19.1	0.0	16.0	2.5	5.3	3.1	31.6	40.5	38.8	15.8	21.3	17.8	775
con altri parenti-familiari	1.1	0.7	1.0	2.6	0.0	1.8	0.7	0.0	0.6	1.9	0.8	1.6	1.8	0.4	0.6	1.4	0.6	1.1	49
con amici (comunità abitativa)	2.3	1.2	2.0	3.2	6.1	4.1	5.1	7.7	5.6	1.9	2.3	2.0	0.9	0.6	0.6	2.5	1.7	2.2	95
altro	4.7	2.9	4.2	11.7	4.5	9.5	8.1	19.2	9.9	5.6	9.0	6.4	0.0	0.2	0.2	5.2	3.0	4.4	192
<b>N**</b>	<b>1'645</b>	<b>686</b>	<b>2'331</b>	<b>154</b>	<b>66</b>	<b>220</b>	<b>136</b>	<b>26</b>	<b>162</b>	<b>478</b>	<b>133</b>	<b>611</b>	<b>114</b>	<b>504</b>	<b>619</b>	<b>2'761</b>	<b>1'594</b>	<b>4'356</b>	<b>4'356</b>
<i>dati mancanti</i>	915	414	1'329	171	52	223	113	24	137	240	39	279	100	294	394	1'664	884	2'548	2'548
<b>Situazione di domicilio*</b>																			
domicilio fisso	93.1	95.4	93.8	79.7	79.2	79.5	90.0	88.2	89.7	93.0	86.4	91.7	96.5	97.9	97.6	92.5	94.6	93.3	4'499
senza domicilio fisso	4.9	3.1	4.4	12.1	19.4	14.2	6.9	8.8	7.2	4.6	10.7	5.8	3.5	2.1	2.4	5.2	4.2	4.8	233
istituzione	1.9	1.5	1.8	8.2	1.4	6.3	3.1	2.9	3.1	2.4	2.9	2.5	0.0	0.0	0.0	2.3	1.1	1.9	92
<b>N**</b>	<b>1'804</b>	<b>744</b>	<b>2'548</b>	<b>182</b>	<b>72</b>	<b>254</b>	<b>160</b>	<b>34</b>	<b>194</b>	<b>544</b>	<b>140</b>	<b>684</b>	<b>142</b>	<b>571</b>	<b>714</b>	<b>3'073</b>	<b>1'750</b>	<b>4'824</b>	<b>4'824</b>
<i>dati mancanti</i>	756	356	1'112	143	46	189	89	16	105	174	32	206	72	227	299	1'352	728	2'080	2'080
<b>Tipo di relazione di coppia*</b>																			
senza partner, sola-a	31.8	33.7	32.4	40.6	31.1	37.1	31.5	43.8	33.1	71.7	40.2	64.4	16.0	16.9	16.9	37.9	29.7	34.8	1'235
relazione-i saltuaria-e	4.0	4.6	4.2	4.7	8.2	6.0	5.6	18.8	7.3	5.6	13.4	7.4	2.1	0.5	0.8	4.2	4.3	4.2	150
relazione fissa, vivendo separat.	10.4	11.4	10.7	10.4	16.4	12.6	18.5	12.5	17.7	12.1	25.8	15.3	8.5	7.3	7.5	10.8	11.3	11.0	389
relazione fissa, vivendo insieme	53.8	50.3	52.8	44.3	44.3	44.3	44.4	25.0	41.9	10.6	20.6	12.9	73.4	75.3	74.8	47.1	54.7	50.0	1'774
<b>N**</b>	<b>1'380</b>	<b>612</b>	<b>1'992</b>	<b>106</b>	<b>61</b>	<b>167</b>	<b>108</b>	<b>16</b>	<b>124</b>	<b>322</b>	<b>97</b>	<b>419</b>	<b>94</b>	<b>437</b>	<b>532</b>	<b>2'182</b>	<b>1'365</b>	<b>3'548</b>	<b>3'548</b>
<i>dati mancanti</i>	1'180	488	1'668	219	57	276	141	34	175	396	75	471	120	361	481	2'243	1'113	3'356	3'356

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

**T30 Più alta formazione portata a termine, fonte di reddito principale e attività principale dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale<sup>1</sup>) e dei parenti o conoscenti (2012)**

	Pazienti: problema principale <sup>1</sup>												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Più alta formazione portata a termine**</b>																			
nessuna form. terminata	5.9	8.6	6.6	9.7	4.8	8.3	6.4	15.4	7.8	19.2	17.3	18.8	9.1	5.2	6.0	9.8	8.2	9.2	371
scuola dell'obbligo	12.1	11.1	11.8	32.9	45.2	36.4	20.7	42.3	24.1	54.1	58.6	55.1	10.0	11.9	11.7	22.1	19.4	21.2	849
scolarità complementare	2.4	5.1	3.2	3.9	8.1	5.1	3.6	0.0	3.0	4.8	5.3	4.9	1.8	4.8	4.1	2.9	5.2	3.7	149
apprendistato/ scuola profes.	59.9	54.6	58.4	45.8	38.7	43.8	58.6	34.6	54.8	18.8	17.3	18.5	44.5	50.1	48.9	49.1	47.3	48.5	1'945
liceo/diploma	4.2	3.6	4.0	1.9	1.6	1.8	2.9	3.8	3.0	1.0	0.8	1.0	7.3	6.4	6.6	3.9	4.9	4.2	170
magistrale, scuola pedagogic.	0.7	1.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	3.6	3.6	3.6	0.6	1.8	1.0	42
form. profession. superiore	6.3	6.1	6.3	3.2	1.6	2.8	6.4	3.8	6.0	1.7	0.0	1.3	8.2	8.6	8.5	5.3	5.9	5.5	219
scuola profession. superiore	1.1	1.2	1.1	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.9	0.2	0.4	0.8	0.6	0.7	30
alta scuola specializzata	2.6	2.6	2.6	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.1	3.2	1.8	2.2	1.9	77
università, politecnico	4.9	5.5	5.1	1.9	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.2	10.9	6.2	7.1	3.7	4.5	4.0	160
<b>N**</b>	<b>1'517</b>	<b>604</b>	<b>2'121</b>	<b>155</b>	<b>62</b>	<b>217</b>	<b>140</b>	<b>26</b>	<b>166</b>	<b>479</b>	<b>133</b>	<b>612</b>	<b>110</b>	<b>421</b>	<b>532</b>	<b>2'627</b>	<b>1'384</b>	<b>4'012</b>	<b>4'012</b>
<i>dati mancanti</i>	<i>1'043</i>	<i>496</i>	<i>1'539</i>	<i>170</i>	<i>56</i>	<i>226</i>	<i>109</i>	<i>24</i>	<i>133</i>	<i>239</i>	<i>39</i>	<i>278</i>	<i>104</i>	<i>377</i>	<i>481</i>	<i>1'798</i>	<i>1'094</i>	<i>2'892</i>	<i>2'892</i>
<b>Fonte di reddito principale*</b>																			
reddito da lavoro	60.6	43.3	55.5	36.9	29.5	34.7	65.0	35.9	59.8	29.7	21.4	28.0	72.2	60.6	62.9	54.0	46.5	51.3	2'671
risparmi	1.1	0.6	0.9	0.0	1.3	0.4	0.6	2.6	0.9	0.5	0.7	0.6	0.0	0.2	0.1	0.8	0.5	0.7	37
rendita (AVS/AI, ecc.)	15.7	21.5	17.4	16.0	14.1	15.5	9.4	10.3	9.6	4.1	9.0	5.1	13.3	11.0	11.5	12.7	16.3	14.0	730
assistenza/previdenza sociale	12.8	14.0	13.2	31.0	42.3	34.3	12.2	23.1	14.2	9.5	12.4	10.1	1.9	2.5	2.3	12.6	10.8	11.9	621
assicurazione disoccupazione	5.8	4.2	5.3	8.0	1.3	6.0	5.6	2.6	5.0	1.6	2.8	1.8	0.6	1.3	1.2	4.8	2.9	4.1	215
sostegno del/della partner	0.9	13.1	4.5	0.5	5.1	1.9	0.6	2.6	0.9	0.5	1.4	0.7	0.6	18.8	15.0	0.8	12.9	5.2	272
sosteg. genitori/familiari/amici	2.3	2.4	2.4	4.8	5.1	4.9	3.9	20.5	6.8	54.1	51.7	53.6	10.1	5.3	6.4	13.3	9.5	11.9	621
spacciando/tagliando	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	4
altre entrate illegali	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	3
prostituzione	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
altra-e	0.7	0.9	0.8	0.5	1.3	0.8	2.2	2.6	2.3	0.0	0.7	0.1	0.6	0.3	0.4	0.7	0.6	0.7	34
<b>N**</b>	<b>1'933</b>	<b>819</b>	<b>2'752</b>	<b>187</b>	<b>78</b>	<b>265</b>	<b>180</b>	<b>39</b>	<b>219</b>	<b>579</b>	<b>145</b>	<b>724</b>	<b>158</b>	<b>607</b>	<b>766</b>	<b>3'322</b>	<b>1'885</b>	<b>5'208</b>	<b>5'208</b>
<i>dati mancanti</i>	<i>627</i>	<i>281</i>	<i>908</i>	<i>138</i>	<i>40</i>	<i>178</i>	<i>69</i>	<i>11</i>	<i>80</i>	<i>139</i>	<i>27</i>	<i>166</i>	<i>56</i>	<i>191</i>	<i>247</i>	<i>1'103</i>	<i>593</i>	<i>1'696</i>	<i>1'696</i>
<b>Attività principale (nel corso dei 30 ultimi giorni)*</b>																			
att. a tempo pieno (70% o più)	56.8	31.4	49.5	34.0	25.7	31.4	60.1	20.8	54.5	22.5	14.1	20.6	65.9	38.5	44.3	49.2	31.8	43.0	1'869
attività a tempo parziale	5.5	20.1	9.7	7.2	7.1	7.2	3.5	8.3	4.2	1.9	5.9	2.8	2.3	31.5	25.2	4.7	20.8	10.4	453
varie attività occas.	1.4	1.5	1.4	1.3	0.0	0.9	2.8	4.2	3.0	1.3	0.7	1.1	0.0	0.6	0.5	1.2	1.1	1.2	52.0
in formazione	2.6	1.6	2.3	3.3	1.4	2.7	3.5	25.0	6.6	59.2	56.3	58.6	13.2	5.7	7.5	14.6	10.3	13.1	568
inattivo sul mercat. del lavor.	19.1	30.2	22.3	24.8	34.3	27.8	12.6	20.8	13.8	5.3	8.1	5.9	14.0	19.6	18.3	16.2	24.3	19.1	830
disoccup., ricerc. di un lavoro	8.1	7.8	8.0	18.3	18.6	18.4	11.2	8.3	10.8	5.5	6.7	5.7	1.6	3.4	3.0	7.8	6.3	7.3	317
disoccupato, lav. fut. garant.	0.4	0.3	0.3	1.3	1.4	1.3	0.7	0.0	0.6	0.4	0.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.4	17
altra	6.2	7.0	6.4	9.8	11.4	10.3	5.6	12.5	6.6	4.0	7.4	4.7	3.1	0.6	1.2	5.9	5.0	5.6	243
<b>N**</b>	<b>1'654</b>	<b>668</b>	<b>2'322</b>	<b>153</b>	<b>70</b>	<b>223</b>	<b>143</b>	<b>24</b>	<b>167</b>	<b>476</b>	<b>135</b>	<b>611</b>	<b>129</b>	<b>470</b>	<b>600</b>	<b>2'802</b>	<b>1'546</b>	<b>4'349</b>	<b>4'349</b>
<i>dati mancanti</i>	<i>906</i>	<i>432</i>	<i>1'338</i>	<i>172</i>	<i>48</i>	<i>220</i>	<i>106</i>	<i>26</i>	<i>132</i>	<i>242</i>	<i>37</i>	<i>279</i>	<i>85</i>	<i>328</i>	<i>413</i>	<i>1'623</i>	<i>932</i>	<i>2'555</i>	<i>2'555</i>

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T31 Statuto professionale e reddito mensile netto dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale<sup>1</sup>) e dei parenti o conoscenti (2012)

	Pazienti: problema principale <sup>1</sup>												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Statuto professionale*</b>																			
senza attività professionale	27.8	37.8	30.9	46.2	63.6	51.7	19.8	58.3	24.1	15.8	23.9	17.2	10.6	25.4	22.3	25.9	35.5	29.1	626
apprendista, praticante	1.5	0.5	1.2	0.0	3.6	1.2	4.2	16.7	5.6	28.8	28.3	28.7	2.1	1.7	1.8	6.4	3.9	5.6	120
manovale, operaio-a ausiliar.	4.5	7.8	5.5	4.3	7.3	5.2	7.3	0.0	6.5	5.9	2.2	5.2	0.0	5.8	4.5	4.6	6.5	5.3	113
operaio-a con formaz. pratica	4.8	7.6	5.6	14.5	9.1	12.8	4.2	0.0	3.7	1.4	0.0	1.1	0.0	5.8	4.5	4.8	6.9	5.5	119
oper. con form. certif. (AFC)	17.5	9.6	15.1	20.5	5.5	15.7	27.1	8.3	25.0	12.6	6.5	11.6	4.3	6.4	5.9	17.0	8.7	14.2	306
caposquadra	4.1	0.3	2.9	2.6	0.0	1.7	3.1	0.0	2.8	0.9	0.0	0.7	4.3	1.7	2.3	3.4	0.6	2.4	52
impiegato-a non qualificato-a	15.0	21.1	16.9	3.4	7.3	4.7	13.5	8.3	13.0	5.4	10.9	6.3	10.6	27.2	23.6	12.1	20.1	14.8	318
impieg. qualif., quadro medio	9.4	7.0	8.7	1.7	1.8	1.7	7.3	0.0	6.5	1.4	0.0	1.1	29.8	9.2	13.6	7.8	6.1	7.2	156
imp. funz. dirett., quadr. sup.	4.2	2.1	3.5	0.9	0.0	0.6	4.2	8.3	4.6	0.5	0.0	0.4	8.5	2.3	3.6	3.4	1.8	2.9	62
indipendente	8.6	4.7	7.4	3.4	0.0	2.3	6.3	0.0	5.6	0.5	2.2	0.7	14.9	6.9	8.6	6.8	4.3	5.9	128
scolaro-a, studente	1.3	0.3	1.0	0.9	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	25.7	26.1	25.7	14.9	6.4	8.2	6.2	4.6	5.6	121
altro statuto	1.4	1.3	1.4	1.7	1.8	1.7	3.1	0.0	2.8	1.4	0.0	1.1	0.0	1.2	0.9	1.6	1.1	1.4	31
<b>N**</b>	<b>862</b>	<b>384</b>	<b>1'246</b>	<b>117</b>	<b>55</b>	<b>172</b>	<b>96</b>	<b>12</b>	<b>108</b>	<b>222</b>	<b>46</b>	<b>268</b>	<b>47</b>	<b>173</b>	<b>220</b>	<b>1'430</b>	<b>722</b>	<b>2'152</b>	<b>2'152</b>
<i>dati mancanti</i>	1'698	716	2'414	208	63	271	153	38	191	496	126	622	167	625	793	2'995	1'756	4'752	4'752
<b>Reddito mensile netto*</b>																			
nessun reddito	24.4	36.0	27.3	38.9	37.5	38.5	16.7	25.0	18.0	50.0	50.0	50.0	16.7	15.9	16.0	30.2	34.7	31.5	346
fino a 1000 fr.	3.2	4.3	3.5	11.1	8.3	10.4	7.1	12.5	8.0	25.0	25.0	25.0	25.0	13.0	14.8	8.7	9.1	8.8	97
da 1001 a 2000 fr.	4.3	9.9	5.7	13.9	12.5	13.5	11.9	12.5	12.0	10.3	13.9	11.0	0.0	11.6	9.9	6.5	11.3	7.9	87
da 2001 a 3000 fr.	12.2	17.4	13.5	5.6	25.0	10.4	9.5	0.0	8.0	0.7	5.6	1.7	0.0	7.2	6.2	8.9	13.4	10.2	112
da 3001 a 4000 fr.	12.8	13.0	12.9	9.7	0.0	7.3	19.0	12.5	18.0	6.6	0.0	5.2	0.0	18.8	16.0	11.7	11.9	11.7	129
da 4001 a 5000 fr.	16.7	6.8	14.1	15.3	12.5	14.6	19.0	37.5	22.0	4.4	2.8	4.1	8.3	10.1	9.9	14.1	7.8	12.3	135
da 5001 a 6000 fr.	12.6	8.7	11.6	2.8	4.2	3.1	7.1	0.0	6.0	1.5	2.8	1.7	25.0	13.0	14.8	9.5	7.8	9.0	99
da 6001 a 8000 fr.	10.7	1.2	8.3	2.8	0.0	2.1	4.8	0.0	4.0	1.5	0.0	1.2	16.7	7.2	8.6	7.8	2.2	6.2	68
da 8001 a 10 000 fr.	1.9	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	8.3	1.4	2.5	1.5	1.3	1.5	16
da 10 001 a 15 000 fr.	1.3	0.6	1.1	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.3	0.8	9
più di 15 000 fr.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.2	0.0	0.3	0.1	1
<b>N**</b>	<b>468</b>	<b>161</b>	<b>629</b>	<b>72</b>	<b>24</b>	<b>96</b>	<b>42</b>	<b>8</b>	<b>50</b>	<b>136</b>	<b>36</b>	<b>172</b>	<b>12</b>	<b>69</b>	<b>81</b>	<b>779</b>	<b>320</b>	<b>1'099</b>	<b>1'099</b>
<i>dati mancanti</i>	2'092	939	3'031	253	94	347	207	42	249	582	136	718	202	729	932	3'646	2'158	5'805	5'805

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T32a Ragione principale della fine del trattamento/accompagnamento dei pazienti (in rapporto al problema principale<sup>1</sup>) e dei parenti o conoscenti (2012)

Ragione principale*	Pazienti: problema principale <sup>1</sup>												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
conclus. pianific. senza passag.	52.6	52.2	52.5	26.9	23.7	26.0	39.8	38.0	39.5	60.4	63.2	61.0	69.2	69.8	69.7	52.1	57.7	54.1	3'708
conclus. pianific. con passag.	5.5	6.5	5.8	10.6	15.3	11.9	6.9	14.0	8.1	4.5	3.5	4.3	4.2	3.8	3.8	5.9	6.2	6.0	409
cambio di domicilio	2.0	1.8	2.0	8.1	7.6	8.0	3.3	4.0	3.4	2.1	2.9	2.3	0.0	1.1	0.9	2.4	2.0	2.3	156
ospedalizzazione	0.6	0.6	0.6	0.9	0.8	0.9	0.8	2.0	1.0	0.3	0.6	0.3	0.5	0.0	0.1	0.5	0.4	0.5	34
incarcerazione	0.2	0.0	0.1	1.9	0.0	1.4	0.8	0.0	0.7	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	13
perdita di contatto	26.1	24.9	25.8	38.1	37.3	37.9	37.0	30.0	35.8	23.3	24.0	23.4	16.4	16.8	16.7	26.8	22.4	25.2	1'729
conclusione esplicita	9.0	9.9	9.3	7.5	10.2	8.2	9.8	12.0	10.1	6.6	4.1	6.1	6.1	5.6	5.7	8.3	7.9	8.2	561
decesso	2.1	1.7	1.9	2.5	4.2	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.1	0.3	1.4	1.0	1.3	87
altre cause	1.9	2.4	2.1	3.4	0.8	2.7	1.6	0.0	1.4	2.7	1.8	2.5	2.8	2.8	2.8	2.2	2.4	2.3	155
<b>N**</b>	<b>2'532</b>	<b>1'090</b>	<b>3'622</b>	<b>320</b>	<b>118</b>	<b>438</b>	<b>246</b>	<b>50</b>	<b>296</b>	<b>713</b>	<b>171</b>	<b>884</b>	<b>214</b>	<b>798</b>	<b>1'013</b>	<b>4'384</b>	<b>2'467</b>	<b>6'852</b>	<b>6'852</b>
dati mancanti	28	10	38	5	0	5	3	0	3	5	1	6	0	0	0	41	11	52	52

T32b Destinazione dei trasferimenti dei pazienti (in rapporto al problema principale<sup>1</sup>) e dei parenti o conoscenti (2012)

Destinazione dei trasferimenti***	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
terapia residenziale	36.8	37.2	37.0	36.8	35.7	36.4	60.0	25.0	50.0	31.3	50.0	33.3	0.0	7.7	5.9	34.8	30.7	33.2	75
consulenza ambulatoriale	39.5	53.5	44.5	36.8	57.1	45.5	40.0	50.0	42.9	50.0	0.0	44.4	100.0	61.5	70.6	44.2	56.8	49.1	111
appartamento protetto	1.3	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.9	2
altra istituzione specializzata	22.4	9.3	17.6	26.3	7.1	18.2	0.0	25.0	7.1	12.5	50.0	16.7	0.0	30.8	23.5	19.6	12.5	16.8	38
<b>N**</b>	<b>76</b>	<b>43</b>	<b>119</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>33</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>138</b>	<b>88</b>	<b>226</b>	<b>226</b>
dati mancanti	62	28	90	15	4	19	7	3	10	16	4	20	5	17	22	119	64	183	183

T32c Causa di decesso dei pazienti (in rapporto al problema principale<sup>1</sup>) e dei parenti o conoscenti (2012)

Cause di decesso****	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
suicidio	13.3	7.7	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	6.3	9.8	5
infortunio	10.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	11.4	0.0	7.8	4
malattia	63.3	84.6	69.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	75.0	60.8	31
overdose o intossicazione acuta	6.7	7.7	7.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	18.8	17.6	9
altre cause di decesso	6.7	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	3.9	2.0
<b>N**</b>	<b>30</b>	<b>13</b>	<b>43</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>35</b>	<b>16</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
dati mancanti	22	5	27	4	3	7	0	0	0	0	0	0	1	1	2	27	9	36	36

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti trasferiti. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti deceduti durante l'intervento. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T33 Durata dell'intervento sui pazienti (in rapporto al problema principale<sup>1</sup>) e sui parenti o conoscenti (2012)

	Pazienti: problema principale <sup>1</sup>												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
<b>Durata della presa in carico* (%)</b>																			
1 settimana o meno	4.4	4.7	4.4	2.2	2.5	2.3	1.6	4.0	2.0	4.6	2.9	4.3	13.1	9.9	10.6	4.6	6.0	5.1	350
> 1 settimana a 1 mese	3.9	2.8	3.6	2.2	2.5	2.3	2.0	2.0	2.0	7.2	5.8	7.0	7.0	5.7	5.9	4.6	3.9	4.4	301
> 1 a 2 mesi	4.5	5.0	4.7	1.8	0.8	1.6	2.4	4.0	2.7	6.3	7.6	6.5	5.1	5.9	5.7	4.7	5.3	4.9	339
> 2 a 3 mesi	4.4	4.4	4.4	2.5	1.7	2.3	3.2	0.0	2.7	6.3	4.7	6.0	4.2	7.2	6.6	4.6	5.2	4.8	332
> 3 a 6 mesi	12.6	12.0	12.4	10.2	8.5	9.7	10.1	8.0	9.8	13.4	13.5	13.4	19.2	16.3	16.9	12.8	13.9	13.2	909
> 6 mesi a 1 anno	25.9	25.6	25.8	19.4	22.9	20.3	34.8	24.0	33.0	31.1	41.5	33.1	28.5	30.9	30.4	27.5	29.0	28.0	1'927
> 1 a 2 anni	20.9	22.7	21.4	22.5	23.7	22.8	22.3	38.0	24.9	21.6	14.0	20.1	15.4	15.3	15.3	20.8	19.9	20.4	1'407
> 2 a 3 anni	10.5	8.3	9.9	13.8	14.4	14.0	11.3	14.0	11.8	6.4	4.7	6.1	3.7	4.5	4.4	9.4	6.9	8.5	585
> 3 a 5 anni	9.1	8.5	8.9	16.6	12.7	15.6	9.7	2.0	8.4	2.8	4.7	3.1	3.3	2.9	3.0	7.9	6.1	7.2	498
> 5 a 10 anni	2.7	3.7	3.0	7.7	8.5	7.9	1.6	2.0	1.7	0.4	0.6	0.4	0.5	0.6	0.6	2.4	2.5	2.4	167
più di 10 anni	1.1	2.3	1.5	1.2	1.7	1.4	0.8	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.6	0.8	1.4	1.0	68
<b>N**</b>	<b>2'550</b>	<b>1'094</b>	<b>3'644</b>	<b>325</b>	<b>118</b>	<b>443</b>	<b>247</b>	<b>50</b>	<b>297</b>	<b>718</b>	<b>171</b>	<b>889</b>	<b>214</b>	<b>796</b>	<b>1'011</b>	<b>4'413</b>	<b>2'469</b>	<b>6'883</b>	<b>6'883</b>
<i>dati mancanti</i>	10	6	16	0	0	0	2	0	2	0	1	1	0	2	2	12	9	21	21
<b>Durata (in settimane)</b>																			
media	77.4	86.2	80.1	111.4	111.0	111.2	74.3	84.2	75.9	44.6	43.7	44.4	38.3	45.5	44.0	69.7	67.8	69.0	
deviazione standard	103.6	126.5	111.0	108.9	126.4	113.7	78.8	95.5	81.7	44.6	49.2	45.5	47.7	78.9	73.5	91.6	104.7	96.5	
1° quartile	19.7	21.1	20.0	31.7	34.9	33.3	28.9	34.7	29.1	12.6	14.0	13.0	7.9	10.1	9.9	18.3	16.1	17.7	
mediana	44.6	46.4	44.9	71.1	70.9	71.1	47.1	67.9	49.9	32.4	31.1	32.1	24.9	26.3	26.0	40.9	36.0	39.0	
3° quartile	98.9	98.0	98.4	157.6	148.0	155.2	90.7	92.9	91.7	59.7	49.0	57.9	50.4	50.2	50.4	86.9	76.0	83.1	
<b>N**</b>	<b>2'550</b>	<b>1'094</b>	<b>3'644</b>	<b>325</b>	<b>118</b>	<b>443</b>	<b>247</b>	<b>50</b>	<b>297</b>	<b>718</b>	<b>171</b>	<b>889</b>	<b>214</b>	<b>796</b>	<b>1'011</b>	<b>4'413</b>	<b>2'469</b>	<b>6'883</b>	
<i>dati mancanti</i>	10	6	16	0	0	0	2	0	2	0	1	1	0	2	2	12	9	21	

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T34 Trattamento sostitutivo durante e immediatamente dopo l'intervento, in rapporto al problema principale<sup>1</sup> (solamente pazienti) (2012)

	Pazienti: problema principale <sup>1</sup>												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Sostituzione nel corso dell'intervento*</b>																
no	98.8	98.1	98.6	43.3	36.3	41.4	90.6	94.6	91.2	99.3	98.7	99.2	94.5	94.0	94.4	4'153
si	1.2	1.9	1.4	56.7	63.8	58.6	9.4	5.4	8.8	0.7	1.3	0.8	5.5	6.0	5.6	248
<b>N**</b>	<b>1'912</b>	<b>778</b>	<b>2'690</b>	<b>217</b>	<b>80</b>	<b>297</b>	<b>180</b>	<b>37</b>	<b>217</b>	<b>592</b>	<b>150</b>	<b>742</b>	<b>3'168</b>	<b>1'233</b>	<b>4'401</b>	<b>4'401</b>
<i>dati mancanti</i>	648	322	970	108	38	146	69	13	82	126	22	148	1'043	447	1'490	1'490
<b>Tipo di sostituzione***</b>																
eroina	0.0	7.7	3.1	1.1	2.2	1.5	7.1	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	1.5	3.1	2.0	4
metadone	57.9	61.5	59.4	86.8	95.6	89.7	64.3	100.0	66.7	100.0	100.0	100.0	80.9	87.7	83.2	162
altri oppiacei	0.0	0.0	0.0	7.7	2.2	5.9	28.6	0.0	26.7	0.0	0.0	0.0	8.4	1.5	6.1	12
altre sostanze	42.1	30.8	37.5	4.4	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	7.7	8.7	17
<b>N**</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>32</b>	<b>91</b>	<b>45</b>	<b>136</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>130</b>	<b>65</b>	<b>195</b>	<b>195</b>
<i>dati mancanti</i>	4	2	6	32	6	38	3	1	4	2	0	2	44	9	53	53
<b>Sostituzione dopo l'intervento*</b>																
no	99.4	99.3	99.4	76.0	60.0	71.6	94.7	96.2	95.0	99.4	98.5	99.2	98.0	97.2	97.7	3'763
si	0.6	0.7	0.6	24.0	40.0	28.4	5.3	3.8	5.0	0.6	1.5	0.8	2.0	2.8	2.3	87
<b>N**</b>	<b>1'754</b>	<b>707</b>	<b>2'461</b>	<b>146</b>	<b>55</b>	<b>201</b>	<b>133</b>	<b>26</b>	<b>159</b>	<b>484</b>	<b>134</b>	<b>618</b>	<b>2'760</b>	<b>1'090</b>	<b>3'850</b>	<b>3'850</b>
<i>dati mancanti</i>	806	393	1'199	179	63	242	116	24	140	234	38	272	1'451	590	2'041	2'041
<b>Tipo di sostituzione***</b>																
prescrizione di eroina	0.0	20.0	6.7	2.9	9.1	5.3	14.3	0.0	12.5	66.7	0.0	40.0	7.1	9.7	8.0	7
trattamento sostitutivo	100.0	80.0	93.3	97.1	90.9	94.7	85.7	100.0	87.5	33.3	100.0	60.0	92.9	90.3	92.0	80
<b>N**</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>35</b>	<b>22</b>	<b>57</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>56</b>	<b>31</b>	<b>87</b>	<b>87</b>
<i>dati mancanti</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti ai quali è stata prescritta una sostituzione durante l'intervento. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile



T35 Postassistenza prevista e preparata, in rapporto al problema principale<sup>1</sup> (solamente pazienti) (2012)

	Pazienti: problema principale <sup>1</sup>												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Postassistenza prevista e preparata*</b>																
no	88.4	84.3	87.3	79.1	80.4	79.5	89.0	66.7	85.3	87.1	94.4	88.5	87.5	84.2	86.7	1'922
sì	11.6	15.7	12.7	20.9	19.6	20.5	11.0	33.3	14.7	12.9	5.6	11.5	12.5	15.8	13.3	296
<b>N**</b>	<b>1'068</b>	<b>394</b>	<b>1'462</b>	<b>139</b>	<b>46</b>	<b>185</b>	<b>91</b>	<b>18</b>	<b>109</b>	<b>241</b>	<b>54</b>	<b>295</b>	<b>1'653</b>	<b>565</b>	<b>2'218</b>	<b>2'218</b>
<i>dati mancanti</i>	1'492	706	2'198	186	72	258	158	32	190	477	118	595	2'558	1'115	3'673	3'673
<b>Tipo di postassistenza prevista***</b>																
appartamento protetto dell'istituzione	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
servizio di postassistenza dell'istituzione	1.7	3.4	2.2	0.0	16.7	3.2	25.0	0.0	14.3	3.4	0.0	3.2	2.6	4.9	3.3	9
appartamento protetto esterno	3.4	1.7	2.8	0.0	16.7	3.2	0.0	0.0	0.0	10.3	0.0	9.7	3.6	2.4	3.3	9
servizio di postassistenza esterno	8.4	13.6	10.1	16.0	0.0	12.9	0.0	16.7	7.1	3.4	0.0	3.2	8.2	11.0	9.1	25
centro di consulenza per problemi inerenti all'alcol	24.4	27.1	25.3	8.0	0.0	6.5	12.5	0.0	7.1	10.3	0.0	9.7	18.6	20.7	19.2	53
centro di consulenza per problemi inerenti alle droghe	7.6	5.1	6.7	20.0	50.0	25.8	25.0	33.3	28.6	13.8	0.0	12.9	10.3	12.2	10.9	30
altri centri di consulenza	21.8	11.9	18.5	20.0	16.7	19.4	12.5	16.7	14.3	24.1	50.0	25.8	21.6	14.6	19.6	54
gruppo di aiuto reciproco e di autosostegno	4.2	15.3	7.9	4.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	6.5	4.1	11.0	6.2	17
gruppo di precedenti utenti del centro/ dell'istituzione	0.0	1.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.4	1
altro-i	32.8	28.8	31.5	36.0	0.0	29.0	25.0	33.3	28.6	37.9	50.0	38.7	36.1	29.3	34.1	94
<b>N**</b>	<b>119</b>	<b>59</b>	<b>178</b>	<b>25</b>	<b>6</b>	<b>31</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>2</b>	<b>31</b>	<b>194</b>	<b>82</b>	<b>276</b>	<b>276</b>
<i>dati mancanti</i>	5	3	8	4	3	7	2	0	2	2	1	3	13	7	20	20

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti per i quali una postassistenza è prevista. Le categorie non sono esclusive (molte risposte possibili)

T36 Problemi di dipendenza all'uscita, in rapporto al problema principale<sup>1</sup> (solamente pazienti) (2012)

Problemi di dipendenza*	Pazienti: problema principale <sup>1</sup>												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
alcol	48.5	55.5	50.5	20.1	15.5	18.8	19.5	26.1	20.6	11.6	10.9	11.5	35.2	38.4	36.2	1'253
cocktail (eroina e cocaina)	0.1	0.0	0.1	1.5	5.2	2.6	0.8	0.0	0.7	0.2	0.0	0.2	0.2	0.3	0.3	9
eroina	0.4	0.9	0.5	36.6	50.0	40.6	3.4	4.3	3.5	0.9	0.8	0.9	2.6	3.7	2.9	102
metadone	0.5	0.6	0.5	17.9	22.4	19.3	0.8	4.3	1.4	0.5	0.0	0.4	1.5	1.9	1.6	55
altri oppiacei	0.1	0.5	0.2	1.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.2	7
cocaina	1.2	0.9	1.1	6.7	10.3	7.8	46.6	56.5	48.2	0.9	3.4	1.4	3.6	3.0	3.4	118
crack, freebase	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.7	0.2	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	3
amfetamine	0.3	0.3	0.3	0.7	0.0	0.5	0.8	4.3	1.4	0.5	0.8	0.5	0.7	0.6	0.6	22
MDMA e affini (ecstasy)	0.2	0.2	0.2	0.7	0.0	0.5	3.4	4.3	3.5	0.2	0.8	0.4	0.5	0.3	0.5	16
altri stimolanti	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	2
barbiturici	0.0	0.2	0.0	0.0	1.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	4
benzodiazepine	0.7	2.7	1.3	11.2	10.3	10.9	5.1	4.3	5.0	0.0	0.0	0.0	1.6	3.0	2.0	69
altri sonniferi e tranquillanti	0.3	0.3	0.3	1.5	0.0	1.0	0.8	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	0.4	14
LSD	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.8	0.5	0.2	0.1	0.1	5
altri allucinogeni	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	2
sostanze volatili (per es., solventi)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
canapa	3.7	1.7	3.1	9.0	15.5	10.9	11.9	13.0	12.1	56.0	57.1	56.3	13.9	9.5	12.6	436
tabacco	11.5	10.9	11.3	15.7	20.7	17.2	12.7	26.1	14.9	15.0	17.6	15.6	13.9	16.0	14.5	503
altra/e sostanza/e	0.6	0.3	0.5	0.7	0.0	0.5	0.8	0.0	0.7	0.2	2.5	0.7	0.7	0.7	0.7	25
gioco patologico	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.9	0.7	0.8	29
disturbi alimentari	0.0	1.3	0.4	0.0	3.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.4	0.1	5.5	1.7	58
altri problemi assimilabili a una dipendenza	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	1.2	0.9	1.1	38
nessuno	46.1	39.1	44.1	38.1	27.6	34.9	38.1	21.7	35.5	35.5	32.8	34.9	42.7	35.5	40.6	1'406
<b>N**</b>	<b>1'552</b>	<b>632</b>	<b>2'184</b>	<b>134</b>	<b>58</b>	<b>192</b>	<b>118</b>	<b>23</b>	<b>141</b>	<b>439</b>	<b>119</b>	<b>558</b>	<b>2'460</b>	<b>1'004</b>	<b>3'464</b>	<b>3'464</b>
<i>dati mancanti</i>	<i>1'008</i>	<i>468</i>	<i>1'476</i>	<i>191</i>	<i>60</i>	<i>251</i>	<i>131</i>	<i>27</i>	<i>158</i>	<i>279</i>	<i>53</i>	<i>332</i>	<i>1'751</i>	<i>676</i>	<i>2'427</i>	<i>2'427</i>

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T37 Frequenza delle ricadute, sostanza o comportamento implicato e durata delle ricadute nel corso dell'intervento, in rapporto al problema principale<sup>1</sup> (solamente pazienti) (2012)

	Pazienti: problema principale <sup>1</sup>												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Frequenza delle ricadute*</b>																
nessuna	66.1	47.7	60.8	41.8	42.9	42.1	61.7	44.4	59.4	73.9	54.5	70.3	65.2	47.9	60.5	861
1 volta	9.1	13.2	10.3	19.4	0.0	13.7	10.0	11.1	10.1	7.0	24.2	10.3	9.4	13.7	10.5	150
2 volte	4.9	8.4	5.9	7.5	3.6	6.3	3.3	0.0	2.9	4.9	3.0	4.6	5.1	7.7	5.8	83
3 o 4 volte	8.3	14.3	10.0	11.9	14.3	12.6	8.3	11.1	8.7	5.6	15.2	7.4	7.9	13.7	9.5	135
5 volte o più	11.5	16.4	12.9	19.4	39.3	25.3	16.7	33.3	18.8	8.5	3.0	7.4	12.5	17.0	13.7	195
<b>N**</b>	<b>711</b>	<b>287</b>	<b>998</b>	<b>67</b>	<b>28</b>	<b>95</b>	<b>60</b>	<b>9</b>	<b>69</b>	<b>142</b>	<b>33</b>	<b>175</b>	<b>1'036</b>	<b>388</b>	<b>1'424</b>	<b>1'424</b>
<i>dati mancanti</i>	1'849	813	2'662	258	90	348	189	41	230	576	139	715	3'175	1'292	4'467	4'467
<b>Sostanza/comportamento comparabile a una dipendenza al momento delle ricadute***</b>																
alcol	94.6	97.9	95.9	25.0	40.0	29.4	38.1	33.3	37.5	8.3	0.0	6.5	70.1	79.8	73.5	378
cocktail (eroina e cocaina)	0.9	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	4.2	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	0.6	3
oppiacei	3.6	1.4	2.8	75.0	86.7	78.4	19.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	13.0	9.3	11.7	60
cocaina e derivati	3.2	1.4	2.5	22.2	33.3	25.5	85.7	66.7	83.3	11.1	10.0	10.9	11.5	6.0	9.5	49
stimolanti	1.8	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	4.2	5.6	0.0	4.3	2.7	0.0	1.8	9
medicamenti	2.3	3.5	2.8	30.6	33.3	31.4	23.8	0.0	20.8	2.8	0.0	2.2	7.9	6.0	7.2	37
allucinogeni	0.0	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	2.2	0.3	0.5	0.4	2
canapa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
tabacco	5.4	0.7	3.6	11.1	20.0	13.7	33.3	33.3	33.3	88.9	100.0	91.3	17.5	8.7	14.4	74
sostanze volatili	2.7	1.4	2.2	5.6	6.7	5.9	4.8	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	3.0	2.7	2.9	15
altra/e sostanza/e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.4	2
gioco patologico	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.5	1.4	7
disturbi alimentari	0.0	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	1.0	5
altri problemi assimilabili a una dipendenza	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.5	0.8	4
<b>N**</b>	<b>221</b>	<b>141</b>	<b>362</b>	<b>36</b>	<b>15</b>	<b>51</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>36</b>	<b>10</b>	<b>46</b>	<b>331</b>	<b>183</b>	<b>514</b>	<b>514</b>
<i>dati mancanti</i>	20	9	29	3	1	4	2	2	4	1	5	6	30	19	49	49
<b>Durata delle ricadute****</b>																
1 a 2 giorni	24.5	46.0	33.1	9.1	20.0	12.5	50.0	0.0	50.0	50.0	75.0	54.5	29.3	48.8	36.4	80
3 a 6 giorni	37.2	31.7	35.0	36.4	20.0	31.3	25.0	0.0	25.0	27.8	25.0	27.3	35.0	27.5	32.3	71
7 a 10 giorni	13.8	6.3	10.8	9.1	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	5.0	8.6	19
>10 giorni a 2 settimane	8.5	1.6	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	4.5	6.4	1.3	4.5	10
> 2 a 4 settimane	7.4	6.3	7.0	18.2	20.0	18.8	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	4.5	7.1	6.3	6.8	15
>4 a 6 settimane	3.2	1.6	2.5	18.2	20.0	18.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	2.5	3.2	7
>6 a 8 settimane	0.0	1.6	0.6	0.0	20.0	6.3	8.3	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.7	2.5	1.4	3
> 2 mesi	5.3	4.8	5.1	9.1	0.0	6.3	16.7	0.0	16.7	11.1	0.0	9.1	7.1	6.3	6.8	15
<b>N**</b>	<b>94</b>	<b>63</b>	<b>157</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>140</b>	<b>80</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
<i>dati mancanti</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti che hanno indicato una o più ricadute. Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

\*\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti che hanno indicato una o più ricadute. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

## T38 Frequenza del consumo di tabacco e numero di sigarette al giorno nel corso dei 30 giorni precedenti l'uscita, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2012)

	Pazienti: problema principale <sup>1</sup>												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Frequenza del consumo di tabacco*</b>																
mai	29.0	40.9	32.4	6.3	3.7	5.5	11.1	0.0	9.2	12.9	11.4	12.6	24.3	34.0	26.9	337
1 giorno alla settimana o meno	0.7	0.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.6	0.6	0.3	0.5	6
2 a 3 giorni alla settimana	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	1.5	2.4	0.0	1.9	0.9	0.3	0.7	9
4 a 6 giorni alla settimana	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	5.7	3.8	1.1	0.6	1.0	12
una volta al giorno	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	2.9	3.1	1.0	0.3	0.8	10
più volte al giorno	67.9	58.7	65.3	93.8	96.3	94.5	88.9	90.9	89.2	77.4	80.0	78.0	72.2	64.5	70.1	877
<b>N**</b>	<b>611</b>	<b>242</b>	<b>853</b>	<b>64</b>	<b>27</b>	<b>91</b>	<b>54</b>	<b>11</b>	<b>65</b>	<b>124</b>	<b>35</b>	<b>159</b>	<b>907</b>	<b>344</b>	<b>1'251</b>	<b>1'251</b>
<i>dati mancanti</i>	1'949	858	2'807	261	91	352	195	39	234	594	137	731	3'304	1'336	4'640	4'640
<b>Numero di sigarette al giorno***</b>																
0 a 10 sigarette al giorno	20.7	24.0	21.6	6.7	13.6	9.6	28.9	33.3	29.5	52.8	47.1	51.7	26.6	26.6	26.6	156
11 a 20 sigarette al giorno	47.3	44.8	46.6	40.0	59.1	48.1	44.7	33.3	43.2	34.7	35.3	34.8	44.3	46.1	44.8	263
21 a 30 sigarette al giorno	22.5	28.1	24.0	40.0	27.3	34.6	18.4	33.3	20.5	12.5	11.8	12.4	21.5	24.0	22.1	130
31 sigarette al giorno o più	9.5	3.1	7.8	13.3	0.0	7.7	7.9	0.0	6.8	0.0	5.9	1.1	7.6	3.2	6.5	38
<b>N**</b>	<b>275</b>	<b>96</b>	<b>371</b>	<b>30</b>	<b>22</b>	<b>52</b>	<b>38</b>	<b>6</b>	<b>44</b>	<b>72</b>	<b>17</b>	<b>89</b>	<b>433</b>	<b>154</b>	<b>587</b>	<b>587</b>
<i>dati mancanti</i>	159	47	206	30	4	34	10	5	15	36	14	50	254	73	327	327

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti che hanno indicato un consumo di tabacco. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T39 Obiettivo di consumo all'uscita e pronostico, in rapporto alla principale sostanza problematica<sup>1</sup> (solamente pazienti) (2012)

	Pazienti: sostanza problematica <sup>1</sup>												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Obiettivo di consumo*</b>																
astinenza definitiva	34.2	41.3	36.2	80.0	67.6	76.7	74.7	80.0	75.5	47.3	37.2	45.6	42.4	44.5	42.9	801
astinenza limitata nel tempo	17.8	11.5	16.0	4.2	2.9	3.9	8.9	6.7	8.5	8.2	7.0	8.0	14.4	9.8	13.2	246
consumo controllato	34.5	37.2	35.3	5.3	14.7	7.8	8.9	0.0	7.4	24.6	39.5	27.2	29.4	33.2	30.4	567
nessuna limitazione nel consumo prevista	2.6	1.4	2.3	2.1	0.0	1.6	1.3	6.7	2.1	9.7	2.3	8.4	3.5	1.8	3.1	57
nessuna decisione per il momento	8.9	8.0	8.7	6.3	14.7	8.5	6.3	6.7	6.4	10.1	14.0	10.8	8.9	9.2	8.9	167
altro	1.9	0.6	1.5	2.1	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.4	1.5	28
<b>N**</b>	<b>906</b>	<b>349</b>	<b>1'255</b>	<b>95</b>	<b>34</b>	<b>129</b>	<b>79</b>	<b>15</b>	<b>94</b>	<b>207</b>	<b>43</b>	<b>250</b>	<b>1'378</b>	<b>488</b>	<b>1'866</b>	<b>1'866</b>
<i>dati mancanti</i>	1'654	751	2'405	230	84	314	170	35	205	511	129	640	2'833	1'192	4'025	4'025
<b>Pronostico*</b>																
pronostico molto positivo	18.8	14.4	17.6	10.7	2.9	8.7	26.0	25.0	25.8	25.1	21.7	24.5	18.9	15.0	17.9	341
pronostico positivo	47.7	48.8	48.0	46.6	54.3	48.6	41.6	16.7	38.2	48.2	56.5	49.8	47.4	50.1	48.1	915
pronostico piuttosto sfavorevole	23.6	22.2	23.2	32.0	20.0	29.0	22.1	41.7	24.7	18.8	19.6	19.0	24.0	21.8	23.4	446
pronostico negativo	9.9	14.7	11.2	10.7	22.9	13.8	10.4	16.7	11.2	7.9	2.2	6.8	9.7	13.0	10.6	201
<b>N**</b>	<b>937</b>	<b>361</b>	<b>1'298</b>	<b>103</b>	<b>35</b>	<b>138</b>	<b>77</b>	<b>12</b>	<b>89</b>	<b>191</b>	<b>46</b>	<b>237</b>	<b>1'404</b>	<b>499</b>	<b>1'903</b>	<b>1'903</b>
<i>dati mancanti</i>	1'623	739	2'362	222	83	305	172	38	210	527	126	653	2'807	1'181	3'988	3'988

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

## ALLEGATI

## A1 Dati di base delle istituzioni non partecipanti: Sesso e età all'entrata, in funzione del problema principale (2012)

	Pazienti: problema principale												Tutti gli interventi***			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Sesso*</b>																
uomini			63.2			68.4			81.8			77.0			73.0	498
donne			36.8			31.6			18.2			23.0			27.0	184
Sesso non noto			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	0
<b>N**</b>	<b>36</b>	<b>21</b>	<b>57</b>	<b>147</b>	<b>68</b>	<b>215</b>	<b>99</b>	<b>22</b>	<b>121</b>	<b>47</b>	<b>14</b>	<b>61</b>	<b>498</b>	<b>184</b>	<b>682</b>	<b>682</b>
<b>Età (in anni)*</b>																
fino a 14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
15-19	2.8	9.5	5.3	0.0	0.0	0.0	2.0	4.5	2.5	34.0	21.4	31.1	4.8	4.4	4.7	32
20-24	11.1	4.8	8.8	4.8	14.9	7.9	8.1	13.6	9.1	29.8	21.4	27.9	10.6	14.2	11.6	79
25-29	5.6	9.5	7.0	17.7	9.0	15.0	15.2	0.0	12.4	14.9	14.3	14.8	13.7	13.7	13.7	93
30-34	16.7	4.8	12.3	15.0	16.4	15.4	18.2	27.3	19.8	12.8	21.4	14.8	16.7	16.9	16.7	114
35-39	8.3	9.5	8.8	17.0	14.9	16.4	21.2	22.7	21.5	8.5	7.1	8.2	19.1	15.3	18.1	123
40-44	27.8	9.5	21.1	15.6	11.9	14.5	21.2	13.6	19.8	0.0	0.0	0.0	16.3	9.3	14.4	98
45-49	13.9	9.5	12.3	11.6	6.0	9.8	9.1	13.6	9.9	0.0	0.0	0.0	9.6	8.7	9.4	64
50-54	5.6	28.6	14.0	12.2	13.4	12.6	3.0	4.5	3.3	0.0	7.1	1.6	6.2	9.8	7.2	49
55-59	5.6	9.5	7.0	3.4	6.0	4.2	1.0	0.0	0.8	0.0	7.1	1.6	1.8	4.4	2.5	17
60-64	2.8	0.0	1.8	2.0	3.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.1	0.9	6
65-69	0.0	4.8	1.8	0.7	3.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.6	0.6	4
70-74	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.5	1.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.3	2
75 e più	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
<b>N**</b>	<b>36</b>	<b>21</b>	<b>57</b>	<b>147</b>	<b>67</b>	<b>214</b>	<b>99</b>	<b>22</b>	<b>121</b>	<b>47</b>	<b>14</b>	<b>61</b>	<b>498</b>	<b>183</b>	<b>681</b>	<b>681</b>
<i>dati mancanti</i>	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>Età</b>																
media	39.0	42.4	40.3	38.9	39.9	39.2	36.4	35.5	36.2	23.3	29.2	24.7	35.7	36.6	35.9	
deviazione standard	10.8	14.1	12.1	10.3	12.8	11.1	8.8	9.9	9.0	6.9	11.7	8.5	10.1	12.1	10.7	
1° quartile	31.5	34.0	33.0	31.0	30.0	30.0	29.2	31.0	30.0	18.0	20.0	18.0	28.7	27.0	28.0	
mediana	40.5	48.0	41.0	38.4	37.0	38.0	36.4	37.0	36.9	21.0	26.5	22.0	35.2	35.0	35.0	
3° quartile	47.0	52.1	49.0	46.3	50.0	47.0	42.89	42.0	42.9	28.0	33.0	30.0	42.0	46.0	43.0	
<b>N**</b>	<b>36</b>	<b>21</b>	<b>57</b>	<b>147</b>	<b>67</b>	<b>214</b>	<b>99</b>	<b>22</b>	<b>121</b>	<b>47</b>	<b>14</b>	<b>61</b>	<b>498</b>	<b>183</b>	<b>681</b>	
<i>dati mancanti</i>	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

## A2 Dati di base delle istituzioni non partecipanti: Problema principale all'entrata (pazienti) (2012)

Tutti i pazienti				
	Uomini	Donne	Totale	N
	%	%	%	
<b>Problema principale*</b>				
alcol	7.2	11.4	8.4	57
oppiacei	29.5	37.0	31.5	215
cocaina	19.9	12.0	17.7	121
stimolanti	7.0	2.7	5.9	40
sonniferi e tranquillanti	1.6	2.2	1.8	12
allucinogeni	0.4	2.2	0.9	6
sostanze volatili	0.0	0.0	0.0	0
canapa	9.4	7.6	8.9	61
tabacco	3.2	1.6	2.8	19
altra/e sostanza/e	1.0	1.6	1.2	8
uso multiplo**	20.7	21.7	21.0	143
altri problemi assimilabili a una dipendenza	0.0	0.0	0.0	0
<b>N***</b>	<b>498</b>	<b>184</b>	<b>682</b>	<b>682</b>
<i>dati mancanti</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Diverse istituzioni non definiscono il problema principale per act-info seguendo le direttive e indicano ad esempio "uso multiplo". Pertanto, la distribuzione risultante non è direttamente comparabile con quella delle istituzioni partecipanti

\*\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto