

Intervento ambulatoriale nelle problematiche di dipendenza

Risultati dell'indagine presso gli utenti 2009

Raccolta di tabelle statistiche

Luca Notari, Etienne Maffli, Mariana Astudillo

Ringraziamenti

Ringraziamo vivamente sia i collaboratori e le collaboratrici che i pazienti delle istituzioni che hanno partecipato e che hanno gentilmente accettato di riempire i questionari del monitoraggio act-info. Ringraziamo ugualmente i collaboratori e le collaboratrici dei servizi di consultazione che hanno effettuato i lavori di logistica e di registrazione dei dati. I nostri migliori ringraziamenti vanno anche all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) che finanzia e coordina l'insieme della rete act-info. Grazie anche a Edith Bacher e Christiane Gmel per la grafica e l'impaginazione di questo rapporto come pure a Marina Delgrande Jordan per la sua preziosa collaborazione nell'elaborazione delle procedure d'analisi.

Complementi d'informazione: Etienne Maffli, tel. 021 321 29 54, fax 021 321 29 40,
e-mail emaffli@addiction-info.ch

Realizzazione: Luca Notari, Etienne Maffli & Mariana Astudillo,
Dipendenze Info Svizzera

Diffusione: Libreria Dipendenze Info Svizzera, casella postale 870, 1001
Losanna,
tel. 021 321 29 35, fax 021 321 29 40,
e-mail librairie@addiction-info.ch

Prezzo: Fr. 10.–

Lingua del testo originale : tedesco

Grafica/impaginazione: Dipendenze Info Svizzera

Copyright: © Dipendenze Info Svizzera, Losanna 2010

Citazione raccomandata: Notari, L., Maffli, E. & Astudillo, M. (2010). Intervento ambulatoriale nelle problematiche di dipendenza. Risultati dell'indagine presso gli utenti 2009 – Raccolta di tabelle statistiche. Losanna: Dipendenze Info Svizzera.

Indice

act-info –addiction care and therapy information

act-info nel settore ambulatoriale dell’aiuto psicosociale nel campo delle dipendenze

ENTRATA

- T1 Sesso e età dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2009)
- T2 Stato civile e nazionalità dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2009)
- T3 Grado di urbanizzazione del domicilio, tipo di nucleo familiare e situazione di domicilio dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2009)
- T4 Tipo di relazione di coppia, numero di figli, e numero di figli che vivono nel nucleo familiare all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2009)
- T5 Più alta formazione portata a termine e statuto professionale dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2009)
- T6 Fonte di reddito principale e attività dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2009)
- T7 Reddito mensile netto e debiti dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2009)
- T8 Incarcerazione o detenzione preventiva prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2009)
- T9 Istanza d'invio principale e secondaria dei pazienti (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2009)
- T10 Tipo di aiuto atteso dai pazienti (in rapporto al problema principale) e dai parenti o conoscenti all'entrata e base legale dell'intervento (2009)
- T11 Trattamenti/accompagnamenti dei pazienti prima dell'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2009)
- T12 Trattamento sostitutivo e altri interventi all'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2009)
- T13a Entrata in seguito a una cura di disintossicazione, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2009)
- T13b Frequenza delle cure di disintossicazione senza aiuto professionale prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2009)
- T14 Problema principale all'entrata (solamente pazienti) (2009)
- T15.1a Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata (2009), uomini

- T15.1b Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata (2009), uomini
- T15.2a Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata (2009), donne
- T15.2b Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata (2009), donne
- T15.3a Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata (2009), uomini e donne
- T15.3b Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata (2009), uomini e donne
- T16.1a Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2009), uomini
- T16.1b Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2009), donne
- T16.1c Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2009), uomini e donne
- T16.2a Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2009), uomini
- T16.2b Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2009), donne
- T16.2c Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2009), uomini e donne
- T17 Modo di amministrazione della principale sostanza problematica nel corso dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata (2009)
- T18 Prevalenza a vita delle iniezioni, nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata, scambio di materiale d'iniezione nel corso degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata e età all'epoca della prima iniezione, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2009)
- T19.1a Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2009), uomini
- T19.1b Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2009), donne
- T19.1c Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2009), uomini e donne
- T19.2a Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2009), uomini
- T19.2b Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2009), donne

- T19.2c Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2009), uomini e donne
- T20 Frequenza del consumo di alcol, numero di "bicchieri standard" al giorno e frequenza di forti consumi di alcol prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2009)
- T21 Frequenza del consumo di tabacco e numero di sigarette al giorno nel corso dei 30 ultimi giorni prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2009)
- T22a Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2009), uomini
- T22b Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2009), donne
- T22c Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2009), uomini e donne
- T23a Problemi psichici nel corso della vita (2009), uomini
- T23b Problemi psichici nel corso della vita (2009), donne
- T23c Problemi psichici nel corso della vita (2009), uomini e donne
- T24 Parenti/conoscenti: legame tra l'utente e la persona sintomatica (2009)
- T25 Parenti/conoscenti: problema principale e altri problemi della persona sintomatica (2009)
- T26 Parenti/conoscenti: Problemi della persona di contatto legati ai problemi della persona sintomatica (2009)

USCITA

- T27 Sesso e età dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2009)
- T28 Stato civile e grado di urbanizzazione del domicilio dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2009)
- T29 Tipo di nucleo familiare, situazione di domicilio e tipo di relazione di coppia dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2009)
- T30 Più alta formazione portata a termine, fonte di reddito principale e attività principale dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2009)
- T31 Statuto professionale e reddito mensile netto dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2009)
- T32a Ragione principale della fine del trattamento/accompagnamento dei pazienti (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2009)
- T32b Destinazione dei trasferimenti dei pazienti (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2009)
- T32c Causa di decesso dei pazienti (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2009)

- T33 Durata dell'intervento sui pazienti (in rapporto al problema principale) e sui parenti o conoscenti (2009)
- T34 Trattamento sostitutivo durante e immediatamente dopo l'intervento, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2009)
- T35 Postassistenza prevista e preparata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2009)
- T36 Problemi di dipendenza all'uscita, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2009)
- T37 Frequenza delle ricadute, sostanza o comportamento implicato e durata delle ricadute nel corso dell'intervento, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2009)
- T38 Frequenza del consumo di tabacco e numero di sigarette al giorno nel corso dei 30 giorni precedenti l'uscita, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2009)
- T39 Obiettivo di consumo all'uscita e pronostico, in rapporto alla principale sostanza problematica (solamente pazienti) (2009)

act-info - addiction care and therapy information

La Rete di monitoraggio degli interventi e dei trattamenti delle dipendenze in Svizzera (*act-info*) raccoglie nel suo seno i cinque sistemi statistici che erano realizzati in materia di intervento e di trattamento della dipendenza in Svizzera. Tali sistemi sono:

- SAMBAD (Statistica del settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale in materia di dipendenza)
- Residalc (Statistica dei trattamenti residenziali della dipendenza all'alcol in Svizzera)
- FOS (Statistica della Lega per la valutazione dei trattamenti residenziali della tossicomania)
- HegeBe (Statistica dei trattamenti con prescrizione di eroina)
- Metadone (Statistica nazionale dei trattamenti con prescrizione di metadone)

Dal 2004 queste cinque statistiche dispongono di strumenti armonizzati e ottimizzati. I dati comuni sono integrati in una banca dati centralizzata che permette di procedere ad analisi concernenti l'insieme dei settori. L'adozione degli standard europei (Treatment Demande Indicator) permette di garantire anche la comparabilità dei dati al livello internazionale.

act-info è finanziato e coordinato dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e l'analisi e la raccolta dei dati nei differenti campi dell'intervento è affidata all'Istituto di medicina sociale e preventiva dell'Università di Berna (ISPM), a Dipendenze Info Svizzera di Losanna e all'Istituto di ricerca sulla salute pubblica e sulle dipendenze affiliato all'Università di Zurigo (ISGF).

act-info nel settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale in materia di dipendenza (SAMBAD)

Gli strumenti di monitoraggio *act-info* sono stati introdotti a partire dal 2004 nel settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale in materia di dipendenza e sostituiscono i vecchi questionari in vigore dal 1994. La realizzazione di *act-info* in questo settore è affidata a Dipendenze Info Svizzera.

La statistica *act-info* SAMBAD dà una visione dell'utenza e delle attività di aiuto ambulatoriale in materia di dipendenza in Svizzera. I dati sono raccolti all'inizio e alla fine dell'intervento. Le informazioni rilevate al momento dell'entrata permettono di valutare in particolare le caratteristiche socio-demografiche degli utenti, la eventuale presenza di trattamenti precedenti, le modalità di consumo e la presenza di problemi psicosociali precedenti l'intervento. Le informazioni finali rilevate al termine dell'intervento evidenziano in particolare le caratteristiche socio-demografiche dell'utenza in quel preciso momento, le misure prese dalle persone curanti durante la presa in carico e le circostanze della fine di quest'ultima.

Nel 2009, 80 tra le 216 istituzioni registrate nel settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale in materia di dipendenza hanno partecipato al monitoraggio *act-info*. Queste istituzioni sono sia servizi deputati alla consultazione specialistica dei problemi inerenti all'alcol e/o alle droghe illegali, sia servizi polivalenti offrenti ugualmente un'aiuto per i problemi di dipendenza.

Qualche spiegazione riguardo alle tabelle

La presente statistica descrittiva dei dati dell'indagine act-info presso gli utenti del settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale in materia di dipendenza si basa su due tipi di tabelle:

- quando la domanda contiene delle categorie di risposte predefinite o ricodificate in parti distinte (per esempio « stato civile » o « età »), la tabella indica le percentuali delle differenti categorie di risposte
- quando la domanda non contiene delle categorie predefinite, ma richiede un valore numerico (per esempio « età all'inizio del consumo problematico »), la tabella presenta dei parametri di posizione (media, mediana) e dei parametri di dispersione (deviazione standard, 1° quartile, 3° quartile)

La maggior parte delle tabelle presenta i risultati in maniera distinta per i sottogruppi di pazienti che hanno menzionato l'**alcol**, un **oppiaceo** (eroina in particolare), la **cocaina** (e derivati) o la **canapa** come problema principale al momento dell'entrata. I **parenti o conoscenti** che consultano per i problemi di un terzo sono ugualmente oggetto di analisi separate per gli aspetti socio-demografici. Invece, gli utenti (poco numerosi) che hanno menzionato altre sostanze come problema principale (per esempio un stimolante o le sostanze volatili) o un problema di dipendenza non inerente a una sostanza (per esempio gioco patologico), non sono differenziati nei risultati (eccetto nei temi direttamente inerenti ai modi di consumo o alle forme di comportamenti additivi non inerenti alle sostanze). Queste persone sono tuttavia incluse nelle analisi relative all'insieme degli interventi che figurano nei blocchi a destra delle tabelle rispettive. Tutte le analisi sono effettuate separatamente per gli uomini, per le donne e per i sessi riuniti (nel caso in cui ci fossero persone il cui sesso non è conosciuto, queste saranno comprese nella colonna « Totale »).

Solo le risposte valide sono considerate nelle analisi. Cioè, le risposte « non noto » e le informazioni mancanti (missings) sono escluse dalle analisi. Il numero di risposte valide **N** rappresenta il numero esatto di casi sui quali sono calcolati le percentuali o altri parametri; esso viene indicato per ogni gruppo o sottogruppo. In basso alla tabella viene anche indicato il numero corrispondente di dati mancanti. La presenza di numerosi dati mancanti costringe a interpretare i risultati con particolare prudenza.

Le note in basso alla tabella danno informazioni sulle eventuali particolarità dei gruppi di riferimento e sul tipo di domanda. Quando sono possibili più risposte a una stessa domanda (per esempio nelle tabelle del tema T19, « altri problemi di dipendenza ») le percentuali ottenute non si possono addizionare.

T1 Sesso e età dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2009)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Sesso*																			
uomini			70.7			75.8			82.1			83.0			21.4			65.7	4'878
donne			29.3			24.2			17.9			17.0			78.6			34.3	2'549
sex non noto			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	0
N**	2'710	1'123	3'833	542	173	715	253	55	308	832	171	1'003	213	783	996	4'878	2'549	7'427	7'427
Età (in anni)*																			
fino a 14	0.1	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	7.0	7.0	7.0	1.9	0.8	1.0	1.7	1.1	1.5	112
15-19	2.7	3.1	2.8	4.3	9.2	5.5	5.5	21.8	8.4	60.3	60.8	60.4	7.1	2.3	3.3	13.8	8.7	12.0	893
20-24	5.2	3.0	4.6	12.6	23.1	15.1	20.9	25.5	21.8	13.5	12.3	13.3	3.8	4.4	4.2	8.5	6.9	8.0	591
25-29	8.4	4.7	7.3	19.8	19.1	19.6	25.3	20.0	24.4	9.1	9.9	9.3	4.2	7.7	7.0	10.7	7.9	9.7	722
30-34	9.4	7.9	9.0	17.2	15.0	16.7	17.8	16.4	17.5	4.9	4.7	4.9	5.7	8.6	8.0	9.9	8.8	9.5	703
35-39	11.2	7.9	10.2	21.4	11.6	19.0	13.4	3.6	11.7	2.2	1.8	2.1	10.8	10.7	10.7	11.0	8.7	10.2	758
40-44	14.3	16.6	15.0	15.5	12.1	14.7	9.1	10.9	9.4	2.4	2.3	2.4	8.0	17.2	15.3	11.7	15.0	12.8	951
45-49	15.6	16.9	16.0	5.7	6.4	5.9	4.0	0.0	3.2	0.2	0.6	0.3	15.1	17.5	17.0	10.7	14.0	11.8	877
50-54	13.0	15.3	13.7	2.6	2.9	2.7	2.8	1.8	2.6	0.1	0.6	0.2	16.5	12.7	13.5	8.7	11.6	9.7	720
55-59	8.9	10.1	9.3	0.7	0.6	0.7	0.8	0.0	0.6	0.2	0.0	0.2	9.9	6.3	7.1	5.8	7.0	6.2	460
60-64	6.3	8.5	6.9	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	5.4	5.3	4.0	5.6	4.6	339
65-69	2.9	3.7	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.5	3.4	1.8	2.9	2.2	163
70-74	1.6	1.3	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	1.9	2.5	1.1	1.2	1.2	87
75 e più	0.4	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	1.0	1.7	0.4	0.7	0.5	37
N**	2'705	1'121	3'826	541	173	714	253	55	308	832	171	1'003	212	778	990	4'871	2'542	7'413	7'413
<i>dati mancanti</i>	5	2	7	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	5	6	7	7	14	14
Età																			
media	44.0	46.3	44.6	33.9	31.7	33.4	31.2	27.5	30.6	20.6	20.5	20.6	46.3	44.3	44.7	37.7	41.5	39.0	
deviazione standard	12.9	12.5	12.8	8.6	9.4	8.8	8.7	8.4	8.7	6.7	7.1	6.8	16.2	13.0	13.8	14.7	14.4	14.7	
1° quartile	34.6	39.4	35.6	27.5	24.1	26.5	24.7	20.9	24.2	16.5	16.3	16.4	36.3	36.2	36.2	25.4	30.3	27.0	
mediana	44.6	46.8	45.3	33.7	29.4	32.7	29.5	25.9	29.0	17.7	17.3	17.7	47.8	44.5	45.1	37.6	42.9	39.6	
3° quartile	52.9	54.6	53.5	39.9	39.4	39.8	36.85	31.6	36.1	23.0	23.7	23.0	55.5	52.0	52.8	48.5	51.4	49.8	
N**	2'705	1'121	3'826	541	173	714	253	55	308	832	171	1'003	212	778	990	4'871	2'542	7'413	
<i>dati mancanti</i>	5	2	7	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	5	6	7	7	14	

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T2 Stato civile e nazionalità dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2009)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Stato civile*																			
celibe/nubile	41.5	29.8	38.1	72.3	69.3	71.5	75.2	71.7	74.6	95.0	92.0	94.5	27.4	23.1	24.0	56.2	38.2	50.1	3'564
sposato-a	30.6	32.2	31.1	12.9	12.0	12.7	10.2	13.2	10.7	3.1	3.1	3.1	59.2	53.2	54.5	23.9	33.2	27.1	1'928
separato-a	6.1	7.0	6.3	3.3	5.4	3.8	2.8	1.9	2.7	0.6	0.6	0.6	3.5	4.5	4.2	4.3	5.3	4.7	332
divorziato-a	20.2	25.1	21.6	10.2	9.0	9.9	11.0	11.3	11.0	1.1	3.1	1.5	9.0	15.2	13.9	14.3	18.7	15.8	1'124
vedovo-a	1.3	5.4	2.5	0.6	2.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.7	2.2	0.9	3.7	1.8	130
unione registrata	0.3	0.4	0.3	0.8	1.8	1.0	0.8	1.9	1.0	0.1	1.2	0.3	0.5	1.3	1.2	0.4	0.9	0.5	39
N**	2'604	1'083	3'687	519	166	685	246	53	299	799	163	962	201	741	942	4'682	2'435	7'117	7'117
<i>dati mancanti</i>	106	40	146	23	7	30	7	2	9	33	8	41	12	42	54	196	114	310	310
Nazionalità*																			
CH	80.1	87.5	82.3	67.2	86.3	71.9	68.7	76.9	70.2	86.1	92.0	87.1	83.6	86.7	86.1	79.0	87.0	81.8	5'687
EU	11.6	10.0	11.2	18.8	10.6	16.8	17.2	19.2	17.5	7.8	4.9	7.3	8.2	9.9	9.6	11.9	9.7	11.1	774
altra	8.2	2.6	6.6	14.0	3.1	11.3	14.2	3.8	12.3	6.1	3.1	5.6	8.2	3.3	4.4	9.1	3.3	7.1	495
N**	2'578	1'053	3'631	500	161	661	233	52	285	769	162	931	195	724	919	4'574	2'382	6'956	6'956
<i>dati mancanti</i>	132	70	202	42	12	54	20	3	23	63	9	72	18	59	77	304	167	471	471

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T3 Grado di urbanizzazione del domicilio, tipo di nucleo familiare e situazione di domicilio dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2009)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Grado di urbanizzazione*																			
grandi centri urbani	7.4	8.8	7.8	3.0	1.8	2.7	1.2	3.8	1.7	0.5	0.6	0.5	7.9	8.2	8.1	4.9	6.6	5.5	395
periferia dei grandi centri	13.9	16.7	14.7	5.9	4.8	5.6	13.6	7.5	12.5	7.1	4.1	6.6	12.4	14.2	13.8	11.3	12.8	11.8	850
città di media importanza	15.7	16.2	15.9	18.3	22.2	19.2	25.1	20.8	24.3	24.2	27.8	24.8	18.8	16.6	17.1	18.4	18.7	18.5	1'328
piccole città	34.2	32.5	33.7	46.9	43.1	46.0	34.2	39.6	35.1	37.5	40.2	37.9	34.2	29.9	30.8	36.8	33.9	35.8	2'574
campagne	28.8	25.9	28.0	25.9	28.1	26.4	25.9	28.3	26.4	30.7	27.2	30.1	26.7	31.2	30.2	28.5	28.0	28.3	2'036
N**	2'622	1'075	3'697	525	167	692	243	53	296	817	169	986	202	747	949	4'731	2'452	7'183	7'183
<i>dati mancanti</i>	88	48	136	17	6	23	10	2	12	15	2	17	11	36	47	147	97	244	244
Tipo di nucleo familiare (30 ultimi giorni)*																			
da solo-a	38.3	35.3	37.4	33.1	25.0	31.1	32.1	25.0	30.7	10.3	9.7	10.2	12.5	13.3	13.2	30.4	25.7	28.8	1'705
con i genitori/un genitore	8.6	5.1	7.6	18.5	18.8	18.6	22.0	16.7	21.0	69.7	59.0	68.0	9.0	5.1	5.9	23.0	12.1	19.4	1'146
con figlio-a-i (senza partner)	2.3	10.1	4.5	0.2	4.9	1.4	1.0	6.3	1.9	0.1	4.9	0.9	4.2	16.0	13.6	1.5	10.8	4.6	274
con un-a partner (senza figli)	23.1	27.0	24.2	16.2	26.4	18.8	16.7	25.0	18.3	5.7	4.9	5.5	27.8	26.1	26.5	18.7	24.4	20.6	1'219
con un-a partner e figlio-a-i	18.4	15.5	17.6	9.0	13.2	10.1	11.0	2.1	9.3	2.2	0.0	1.8	38.2	37.2	37.4	14.6	19.6	16.3	963
con altri parenti/familiari	1.4	0.6	1.2	1.9	1.4	1.7	3.8	4.2	3.9	0.9	2.1	1.1	0.0	1.2	1.0	1.5	1.2	1.4	82
con amici (comunità abitativa)	2.6	1.6	2.4	4.2	5.6	4.5	5.7	4.2	5.4	3.5	3.5	3.5	2.8	0.5	1.0	3.1	1.8	2.7	159
altro	5.3	4.8	5.1	16.9	4.9	13.9	7.7	16.7	9.3	7.6	16.0	8.9	5.6	0.5	1.5	7.2	4.5	6.3	372
N**	2'152	863	3'015	432	144	576	209	48	257	740	144	884	144	570	714	3'948	1'972	5'920	5'920
<i>dati mancanti</i>	558	260	818	110	29	139	44	7	51	92	27	119	69	213	282	930	577	1'507	1'507
Situazione di domicilio (30 ultimi giorni)*																			
domicilio fisso	94.0	93.6	93.9	75.3	85.3	77.8	85.5	84.6	85.3	93.3	91.4	92.9	96.6	97.0	96.9	91.6	93.8	92.3	5'115
senza domicilio fisso	4.0	4.8	4.2	17.1	14.0	16.3	11.2	10.3	11.0	4.6	4.3	4.6	3.4	3.0	3.1	5.9	5.0	5.6	310
istituzione	2.0	1.6	1.9	7.6	0.8	5.9	3.4	5.1	3.7	2.1	4.3	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	1.2	2.1	116
N**	2'056	795	2'851	381	129	510	179	39	218	667	139	806	147	561	708	3'682	1'859	5'541	5'541
<i>dati mancanti</i>	654	328	982	161	44	205	74	16	90	165	32	197	66	222	288	1196	690	1886	1'886

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T4 Tipo di relazione di coppia, numero di figli, di figli vivendo nel nucleo familiare dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2009)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Tipo di relazione di coppia*																			
senza partner, sola-a	33.9	35.2	34.2	45.6	22.7	39.5	37.4	27.6	35.9	63.2	47.4	60.5	13.4	14.1	13.9	38.9	28.6	35.4	1'573
relazione-i saltuaria-e	3.8	4.8	4.1	9.5	4.5	8.2	7.4	13.8	8.3	10.1	13.7	10.7	4.7	1.3	2.0	5.7	4.6	5.3	236
relazione fissa, vivendo separato-a	13.7	12.6	13.4	12.5	20.9	14.7	21.5	27.6	22.4	15.1	29.5	17.6	10.2	10.4	10.4	14.1	14.5	14.3	634
relazione fissa, vivendo insieme	48.6	47.5	48.3	32.5	51.8	37.6	33.7	31.0	33.3	11.6	9.5	11.2	71.7	74.2	73.7	41.3	52.3	45.1	2'003
N**	1'677	668	2'345	305	110	415	163	29	192	457	95	552	127	462	589	2'928	1'518	4'446	4'446
<i>dati mancanti</i>	1'033	455	1'488	237	63	300	90	26	116	375	76	451	86	321	407	1'950	1'031	2'981	2'981
Numero di figli*																			
nessuno	42.8	37.5	41.2	63.9	55.4	61.6	65.0	71.4	66.0	94.7	91.9	94.2	32.1	22.7	24.7	55.9	41.2	50.7	2'849
1 figlio	18.0	18.4	18.1	24.6	25.9	25.0	18.1	11.4	17.0	3.0	5.9	3.5	15.7	19.3	18.5	15.7	17.4	16.3	917
2 figli	26.1	30.7	27.5	9.2	15.1	10.7	11.3	14.3	11.8	1.8	2.2	1.8	32.7	39.6	38.1	18.9	28.4	22.3	1'250
3 figli o più	13.1	13.4	13.2	2.4	3.6	2.7	5.6	2.9	5.2	0.5	0.0	0.4	19.5	18.4	18.6	9.5	13.0	10.7	601
N**	2'057	887	2'944	382	139	521	177	35	212	628	136	764	159	581	740	3'646	1'971	5'617	5'617
<i>dati mancanti</i>	653	236	889	160	34	194	76	20	96	204	35	239	54	202	256	1'232	578	1'810	1'810
Numero dei figli vivendo nel nucleo familiare*																			
nessuno	74.1	67.5	72.1	81.7	70.4	78.7	78.4	75.9	78.0	61.9	57.7	61.1	57.6	40.1	43.7	72.1	59.9	67.8	3'350
1 figlio	10.7	15.2	12.0	10.3	16.8	12.0	9.2	6.9	8.8	9.9	13.1	10.5	17.3	22.5	21.4	10.7	16.5	12.8	630
2 figli	11.2	12.5	11.6	6.3	12.0	7.8	9.2	17.2	10.4	19.1	19.2	19.1	18.0	29.2	26.8	12.3	17.5	14.1	696
3 figli o più	4.0	4.7	4.2	1.7	0.8	1.5	3.3	0.0	2.7	9.0	10.0	9.2	7.2	8.2	8.0	4.9	6.1	5.3	263
N**	1'762	742	2'504	350	125	475	153	29	182	575	130	705	139	524	663	3'204	1'735	4'939	4'939
<i>dati mancanti</i>	948	381	1'329	192	48	240	100	26	126	257	41	298	74	259	333	1'674	814	2'488	2'488

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T5 Più alta formazione portata a termine e statuto professionale dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2009)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Più alta formazione portata a termine*																			
nessuna formazione terminata	4.7	6.1	5.1	9.0	4.3	7.9	8.7	8.3	8.6	21.5	21.7	21.5	4.2	6.3	5.9	9.1	8.0	8.7	490
scuola dell'obbligo	13.3	18.4	14.7	30.8	40.0	32.9	21.6	29.2	23.0	50.6	48.1	50.2	16.9	13.3	14.1	23.4	21.3	22.7	1'277
scolarità complementare	3.9	6.5	4.7	3.1	6.4	3.8	1.9	4.2	2.3	3.5	10.1	4.5	1.7	4.4	3.8	3.5	6.1	4.3	243
apprendistato/ scuola profes.	59.5	51.1	57.1	48.0	44.3	47.2	52.4	52.1	52.3	20.2	18.6	20.0	41.5	51.9	49.7	48.9	47.5	48.4	2'720
liceo/diploma	3.8	3.8	3.8	3.5	3.6	3.5	4.3	4.2	4.3	2.7	1.6	2.5	5.9	5.7	5.7	3.8	4.4	4.0	225
magistrale, scuola pedagogica	0.8	1.8	1.1	0.9	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	2.5	2.8	2.8	0.7	1.9	1.1	59
form. profession. superiore	6.3	6.3	6.3	2.4	1.4	2.2	4.3	0.0	3.5	1.1	0.0	1.0	12.7	8.1	9.0	4.9	5.7	5.2	290
scuola profession. superiore	1.6	1.1	1.5	0.2	0.0	0.2	2.4	2.1	2.3	0.1	0.0	0.1	0.0	1.1	0.9	1.2	1.0	1.1	64
alta scuola specializzata	1.5	1.1	1.4	0.4	0.0	0.3	1.4	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	3.4	1.8	2.1	1.1	1.1	1.1	64
università, politecnico	4.6	3.8	4.4	1.7	0.0	1.3	2.9	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	11.0	4.6	5.9	3.4	3.0	3.3	184
N**	2'103	820	2'923	458	140	598	208	48	256	707	129	836	118	457	575	3'832	1'784	5'616	5'616
<i>dati mancanti</i>	607	303	910	84	33	117	45	7	52	125	42	167	95	326	421	1'046	765	1'811	1'811
Statuto professionale*																			
senza attività professionale	34.3	44.5	37.2	52.3	67.5	56.0	31.8	52.4	35.1	18.0	30.2	20.0	28.3	28.6	28.6	33.8	40.9	36.1	962
apprendista, praticante	2.6	1.2	2.2	4.6	5.2	4.7	3.6	0.0	3.1	28.4	25.6	27.9	8.7	1.3	2.5	6.4	3.3	5.4	143
manovale, operaio-a ausiliare	2.8	5.4	3.5	5.9	2.6	5.1	1.8	0.0	1.5	5.0	0.0	4.2	2.2	1.3	1.4	3.4	3.6	3.5	92
operaio-a con formaz. pratica	7.0	5.2	6.5	7.5	2.6	6.3	11.8	0.0	9.9	1.4	4.7	1.9	0.0	3.4	2.9	6.7	4.2	5.9	157
oper. con formaz. certif. (AFC)	13.9	9.1	12.5	13.0	9.1	12.0	16.4	9.5	15.3	13.1	0.0	10.9	2.2	8.1	7.1	13.5	8.7	11.9	318
caposquadra	2.2	0.2	1.7	1.3	0.0	0.9	2.7	0.0	2.3	1.4	0.0	1.1	2.2	0.9	1.1	2.0	0.3	1.5	39
impiegato-a non qualificato-a	13.9	18.7	15.2	6.7	10.4	7.6	9.1	28.6	12.2	5.9	9.3	6.4	10.9	33.8	30.0	11.6	22.3	15.1	402
impieg. qualif., quadro medio	8.9	6.8	8.3	2.9	0.0	2.2	10.0	0.0	8.4	2.3	4.7	2.6	15.2	12.0	12.5	7.4	7.1	7.3	194
imp. funz. dirett., quadr. sup.	2.7	2.1	2.5	1.3	0.0	0.9	1.8	9.5	3.1	0.9	0.0	0.8	10.9	1.3	2.9	2.3	1.6	2.1	56
indipendente	9.7	5.2	8.4	1.7	1.3	1.6	7.3	0.0	6.1	0.9	0.0	0.8	17.4	7.7	9.3	7.3	4.9	6.5	173
scolaro-a, studente	1.0	1.2	1.1	0.8	1.3	0.9	2.7	0.0	2.3	22.5	23.3	22.6	2.2	1.3	1.4	4.6	2.6	3.9	105
altro statuto	1.1	0.5	0.9	2.1	0.0	1.6	0.9	0.0	0.8	0.5	2.3	0.8	0.0	0.4	0.4	1.1	0.5	0.9	23
N**	1'083	427	1'510	239	77	316	110	21	131	222	43	265	46	234	280	1'804	860	2'664	2'664
<i>dati mancanti</i>	1'627	696	2'323	303	96	399	143	34	177	610	128	738	167	549	716	3'074	1'689	4'763	4'763

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T6 Fonte di reddito principale e attività dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2009)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Fonte di reddito principale (nel corso dei 30 ultimi giorni)*																			
reddito da lavoro	55.3	38.8	50.7	27.8	26.7	27.5	58.3	44.0	55.9	24.4	22.1	24.0	63.3	58.5	59.5	46.9	43.3	45.7	3'044
risparmi	1.5	1.3	1.4	1.6	1.8	1.7	1.3	4.0	1.7	1.2	0.0	1.0	1.2	1.0	1.0	1.4	1.1	1.3	86
rendita (AVS/AI, ecc.)	14.3	20.6	16.1	12.4	13.9	12.8	7.1	4.0	6.6	3.1	5.5	3.5	19.9	13.1	14.5	11.8	16.0	13.2	877
assistenza/previdenza sociale	14.9	12.3	14.2	37.1	38.2	37.4	12.5	24.0	14.5	8.1	13.5	9.0	5.4	2.1	2.8	15.1	11.2	13.8	921
assicurazione disoccupazione	8.3	6.6	7.8	9.3	5.5	8.4	9.2	8.0	9.0	3.7	3.1	3.6	3.0	1.3	1.7	7.1	4.4	6.2	413
sostegno del/della partner	1.2	15.6	5.3	1.0	3.0	1.5	2.1	0.0	1.7	0.2	1.2	0.4	0.6	19.7	15.6	1.0	13.6	5.2	345
sosteg. genitori/familiari/amici	2.9	2.8	2.9	6.7	9.7	7.4	7.5	14.0	8.6	58.0	54.0	57.3	4.8	3.7	3.9	14.8	9.0	12.9	857
spacciando/tagliando	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.2	0.4	0.0	0.3	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	11
altre entrate illegali	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2
prostituzione	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
altra-e	1.5	1.9	1.6	2.4	1.2	2.1	0.8	2.0	1.0	0.9	0.6	0.8	1.8	0.6	0.9	1.5	1.4	1.5	99
N**	2'454	964	3'418	493	165	658	240	50	290	803	163	966	166	620	786	4'459	2'197	6'656	6'656
<i>dati mancanti</i>	256	159	415	49	8	57	13	5	18	29	8	37	47	163	210	419	352	771	771
Attività principale (nel corso dei 30 ultimi giorni)*																			
att. a tempo pieno (70% o più)	50.1	24.2	42.8	22.4	14.7	20.5	50.4	36.5	48.0	17.1	11.0	16.1	58.7	37.4	41.9	41.0	27.5	36.6	2'374
attività a tempo parziale	3.9	18.6	8.0	4.8	10.4	6.1	4.5	5.8	4.7	2.3	6.1	2.9	3.3	28.3	23.0	3.7	18.2	8.4	544
varie attività occas.	1.1	1.1	1.1	1.4	0.6	1.2	2.0	1.9	2.0	0.8	0.6	0.7	0.7	1.8	1.6	1.0	1.3	1.1	73
in formazione	3.5	3.0	3.3	2.4	6.1	3.3	3.7	9.6	4.7	56.8	58.3	57.1	6.0	4.9	5.1	14.2	9.8	12.8	828
inattivo sul mercat. del lavoro	17.8	35.3	22.8	22.0	33.1	24.7	13.5	13.5	13.5	4.5	9.2	5.3	20.7	24.3	23.5	15.5	28.8	19.8	1'285
disoccup., ricerc. di un lavoro	15.7	11.9	14.6	27.2	17.8	24.9	15.6	23.1	16.9	9.1	6.7	8.7	3.3	2.4	2.6	14.9	8.9	13.0	841
disoccup., lav. futuro garantito	0.5	0.2	0.4	1.0	0.6	0.9	0.8	0.0	0.7	0.4	1.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.2	0.4	28
altra	7.5	5.7	7.0	18.8	16.6	18.3	9.4	9.6	9.5	9.0	6.7	8.6	7.3	0.9	2.3	9.1	5.2	7.8	507
N**	2'384	934	3'318	504	163	667	244	52	296	799	163	962	150	551	701	4'389	2'091	6'480	6'480
<i>dati mancanti</i>	326	189	515	38	10	48	9	3	12	33	8	41	63	232	295	489	458	947	947

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T7 Reddito mensile netto e debiti dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2009)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi				N
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale		
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							%	
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Reddito mensile netto (6 ultimi mesi)*																				
nessun reddito	24.5	34.5	27.1	29.9	30.2	30.0	28.1	45.5	30.7	37.3	58.3	40.1	23.5	21.4	21.7	27.1	32.3	28.7	461	
fino a 1000 fr.	5.7	5.1	5.5	15.2	17.0	15.7	7.8	9.1	8.0	30.4	29.2	30.2	11.8	10.7	10.8	10.8	9.2	10.3	166	
da 1001 a 2000 fr.	7.5	9.8	8.1	15.2	24.5	17.5	6.3	9.1	6.7	8.2	4.2	7.7	11.8	7.8	8.3	8.3	11.1	9.1	147	
da 2001 a 3000 fr.	13.5	17.0	14.4	18.3	17.0	18.0	12.5	18.2	13.3	2.5	0.0	2.2	5.9	13.6	12.5	12.0	15.6	13.1	210	
da 3001 a 4000 fr.	12.4	13.6	12.7	9.8	9.4	9.7	18.8	9.1	17.3	9.5	4.2	8.8	5.9	18.4	16.7	12.3	13.9	12.7	205	
da 4001 a 5000 fr.	15.3	10.2	13.9	6.1	0.0	4.6	18.8	9.1	17.3	9.5	4.2	8.8	17.6	14.6	15.0	13.6	9.4	12.4	199	
da 5001 a 6000 fr.	12.5	4.7	10.5	3.7	0.0	2.8	3.1	0.0	2.7	0.6	0.0	0.5	11.8	9.7	10.0	9.1	4.7	7.8	126	
da 6001 a 8000 fr.	5.2	3.8	4.8	1.2	0.0	0.9	3.1	0.0	2.7	0.6	0.0	0.5	0.0	2.9	2.5	3.9	2.6	3.5	56	
da 8001 a 10 000 fr.	1.8	0.0	1.3	0.6	0.0	0.5	1.6	0.0	1.3	1.3	0.0	1.1	11.8	1.0	2.5	1.9	0.2	1.4	23	
da 10 001 a 15 000 fr.	1.5	0.9	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.4	0.8	13	
più di 15 000 fr.	0.2	0.4	0.2	0.0	1.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.2	3	
N**	654	235	889	164	53	217	64	11	75	158	24	182	17	103	120	1'142	467	1'609	1'609	
<i>dati mancanti</i>	2'056	888	2'944	378	120	498	189	44	233	674	147	821	196	680	876	3'736	2'082	5'818	5'818	
Debiti*																				
nessun debito	65.6	80.1	69.6	26.0	38.9	29.0	41.1	50.0	42.3	84.0	88.2	84.7	85.5	92.3	90.6	64.1	78.9	68.4	2'011	
fino a 5000 fr.	4.6	4.5	4.6	14.0	19.4	15.3	16.3	22.7	17.2	5.3	5.4	5.3	3.2	2.6	2.7	6.5	5.7	6.3	185	
da 5001 a 10 000 fr.	8.7	5.0	7.7	12.3	18.1	13.7	9.9	13.6	10.4	2.8	1.1	2.6	3.2	1.5	2.0	7.5	5.5	6.9	203	
da 10 001 a 25 000 fr.	8.5	3.7	7.2	20.4	12.5	18.6	17.0	9.1	16.0	3.2	3.2	3.2	3.2	1.0	1.6	9.2	4.2	7.7	227	
da 25 001 a 50 000 fr.	5.5	3.1	4.8	15.3	8.3	13.7	4.3	4.5	4.3	2.6	1.1	2.4	3.2	2.6	2.7	6.1	3.3	5.3	155	
da 50 001 a 100 000 fr.	3.0	1.8	2.7	8.9	2.8	7.5	6.4	0.0	5.5	1.0	0.0	0.9	1.6	0.0	0.4	3.5	1.3	2.9	84	
più di 100 000 fr.	4.1	1.8	3.5	3.0	0.0	2.3	5.0	0.0	4.3	1.0	1.1	1.0	0.0	0.0	0.0	3.1	1.1	2.5	73	
N**	1'000	382	1'382	235	72	307	141	22	163	495	93	588	62	194	256	2'083	855	2'938	2'938	
<i>dati mancanti</i>	1'710	741	2'451	307	101	408	112	33	145	337	78	415	151	589	740	2'795	1'694	4'489	4'489	

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T8 Incarcerazione o detenzione preventiva prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2009)

	Pazienti: problema principale												Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Incarcerazione o detenzione preventiva*																
nessuna	87.1	96.8	90.0	41.8	73.1	48.9	64.0	70.0	64.7	91.0	92.6	91.2	80.4	93.6	83.9	1'559
in prigione	7.1	2.2	5.6	24.3	13.5	21.8	14.7	10.0	14.1	3.4	3.7	3.4	9.2	3.4	7.6	142
in detenzione preventiva	3.6	1.1	2.8	11.3	7.7	10.5	10.7	10.0	10.6	3.4	3.7	3.4	5.1	2.0	4.3	80
in prigione e in detenzione preventiva	2.2	0.0	1.5	22.6	5.8	18.8	10.7	10.0	10.6	2.3	0.0	2.0	5.3	1.0	4.1	77
N**	863	372	1'235	177	52	229	75	10	85	177	27	204	1'360	498	1'858	1'858
<i>dati mancanti</i>	1'847	751	2'598	365	121	486	178	45	223	655	144	799	3'305	1'268	4'573	4'573
Durata totale di detenzione***																
fino a 1 mese	26.3	25.0	26.1	20.0	27.3	20.9	38.9	66.7	42.9	50.0	100.0	53.3	26.7	37.5	27.9	61
> 1 a 2 mesi	8.8	12.5	9.1	13.3	18.2	14.0	0.0	33.3	4.8	7.1	0.0	6.7	10.8	16.7	11.4	25
> 2 a 6 mesi	32.5	37.5	33.0	28.0	27.3	27.9	11.1	0.0	9.5	7.1	0.0	6.7	27.2	25.0	26.9	59
> 6 a 12 mesi	17.5	0.0	15.9	12.0	18.2	12.8	11.1	0.0	9.5	21.4	0.0	20.0	14.4	8.3	13.7	29
più di un anno	15.0	25.0	15.9	26.7	9.1	24.4	38.9	0.0	33.3	14.3	0.0	13.3	21.0	12.5	20.1	44
N**	80	8	88	75	11	86	18	3	21	13	1	14	194	24	218	218
<i>dati mancanti</i>	31	4	35	28	3	31	9	0	9	3	1	4	73	8	81	81

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che hanno vissuto un'esperienza di detenzione. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T9 Istanza d'invio principale e secondaria dei pazienti (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2009)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Coacaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Istanza d'invio principale*																			
propria iniziativa	31.3	37.8	33.2	43.9	57.7	47.3	40.2	36.0	39.4	19.4	17.3	19.0	66.3	74.3	72.6	32.9	49.3	38.5	2'602
coniuge/partner	5.8	3.1	5.1	3.8	2.6	3.5	3.6	2.0	3.3	0.8	0.6	0.7	1.1	2.7	2.4	4.3	2.7	3.8	255
famiglia	3.4	3.9	3.6	4.0	5.8	4.4	8.0	6.0	7.7	10.1	8.3	9.8	6.8	4.1	4.7	5.5	4.8	5.3	357
amici/colleghi/conoscenti	1.4	3.1	1.9	2.1	2.6	2.2	3.6	10.0	4.7	0.9	3.0	1.3	2.1	4.7	4.1	1.5	4.0	2.4	162
istituto ambulatoriale specializ.	1.5	1.8	1.6	4.6	5.8	4.9	2.7	4.0	2.9	0.4	0.6	0.4	1.6	1.3	1.3	1.7	2.0	1.8	122
istituto residenziale specializ.	5.1	6.1	5.4	5.0	5.1	5.0	2.2	4.0	2.6	0.9	1.8	1.1	1.1	0.4	0.6	3.8	3.6	3.7	250
studio medico	7.7	10.3	8.4	7.9	8.3	8.0	8.5	4.0	7.7	2.5	3.0	2.6	4.7	3.6	3.8	6.6	7.2	6.8	462
ospedale/clinica	11.6	15.3	12.7	3.8	3.8	3.8	2.2	8.0	3.3	1.3	3.0	1.6	3.2	0.9	1.3	7.7	8.1	7.8	529
servizi sociali	6.7	5.3	6.3	8.6	5.1	7.7	4.0	8.0	4.7	4.0	5.4	4.3	3.2	2.7	2.8	5.9	4.6	5.4	368
prov. penale/amministrativo	17.5	6.1	14.3	9.8	1.3	7.7	21.0	12.0	19.3	52.1	41.7	50.2	4.7	1.0	1.8	21.6	6.4	16.4	1'108
datore di lavoro	3.8	2.9	3.5	1.7	0.6	1.4	0.9	0.0	0.7	1.6	1.2	1.5	3.2	0.4	1.0	3.1	1.9	2.7	180
insegnante	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	4.2	3.0	0.5	0.9	0.8	1.0	1.3	1.1	77
altra	3.6	3.9	3.7	4.8	1.3	3.9	3.1	6.0	3.6	3.4	10.1	4.6	1.6	3.1	2.8	4.3	4.1	4.2	286
N**	2'473	991	3'464	478	156	634	224	50	274	770	168	938	190	703	893	4'452	2'306	6'758	6'758
<i>dati mancanti</i>	237	132	369	64	17	81	29	5	34	62	3	65	23	80	103	426	243	669	669
Istanza d'invio secondaria***																			
propria iniziativa	27.7	23.0	26.5	26.6	22.9	25.8	34.7	42.9	36.3	17.8	22.9	18.5	11.5	15.6	14.9	25.8	21.5	24.4	827
coniuge/partner	8.9	5.5	8.0	4.9	8.3	5.8	9.3	0.0	7.5	2.4	2.1	2.4	18.0	3.8	6.1	7.7	4.9	6.8	230
famiglia	4.3	6.1	4.8	4.3	8.3	5.3	9.3	7.1	8.9	16.4	12.5	15.8	4.9	4.8	4.8	6.0	6.2	6.1	206
amici/colleghi/conoscenti	1.6	1.6	1.6	2.3	1.0	2.0	2.5	0.0	2.1	1.7	4.2	2.1	4.9	4.5	4.5	1.9	2.5	2.1	71
istituto ambulatoriale specializ.	0.6	1.6	0.8	4.6	3.1	4.3	2.5	3.6	2.7	0.0	0.0	0.0	4.9	2.9	3.2	1.2	2.0	1.4	49
istituto residenziale specializ.	1.8	2.0	1.9	3.9	2.1	3.5	1.7	0.0	1.4	1.0	0.0	0.9	3.3	0.3	0.8	2.0	1.2	1.8	60
studio medico	7.1	6.1	6.9	9.5	10.4	9.8	4.2	3.6	4.1	2.1	4.2	2.4	4.9	1.6	2.1	6.5	5.1	6.0	204
ospedale/clinica	6.0	10.6	7.2	3.0	4.2	3.3	4.2	7.1	4.8	3.5	4.2	3.6	4.9	0.0	0.8	5.0	6.2	5.3	181
servizi sociali	2.1	2.6	2.2	3.9	3.1	3.8	0.8	14.3	3.4	1.4	2.1	1.5	1.6	1.6	1.6	2.2	2.5	2.3	79
prov. penale/amministrativo	3.9	2.0	3.4	8.6	1.0	6.8	5.1	7.1	5.5	6.3	0.0	5.4	0.0	0.3	0.3	4.6	1.5	3.6	123
datore di lavoro	1.9	2.2	2.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.0	0.7	1.4	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.6	1.3	1.5	51
insegnante	0.5	1.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.9	0.0	0.6	0.5	0.5	0.7	0.6	19
altra	1.7	1.6	1.7	2.3	1.0	2.0	1.7	0.0	1.4	3.5	0.0	3.0	0.0	1.0	0.8	1.9	1.2	1.7	58
nessuna	42.1	43.1	42.4	37.2	42.7	38.5	33.1	25.0	31.5	47.4	52.1	48.1	41.0	65.3	61.3	42.5	50.0	44.8	1'519
N**	1'414	508	1'922	304	96	400	118	28	146	287	48	335	61	314	375	2'320	1'067	3'387	3'387
<i>dati mancanti</i>	1'296	615	1'911	238	77	315	135	27	162	545	123	668	152	469	621	2'558	1'482	4'040	4'040

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili)

T10 Tipo di aiuto atteso dai pazienti (in rapporto al problema principale) e dai parenti o conoscenti all'entrata e base legale dell'intervento (2009)

Tipo di aiuto atteso*	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
problemi di dipendenza	80.8	87.1	82.5	90.3	93.8	91.2	78.6	76.0	78.2	69.5	81.5	71.5	46.7	51.6	50.6	78.1	76.4	77.5	2'648
problemi somatici	3.6	3.7	3.6	7.3	4.1	6.5	3.4	0.0	2.8	0.8	1.9	0.9	2.7	0.9	1.3	3.6	2.8	3.3	113
problemi psichici	16.4	24.1	18.5	18.0	17.5	17.9	11.1	12.0	11.3	7.6	14.8	8.9	14.7	14.6	14.6	14.7	19.9	16.4	560
problemi relazionali	12.8	19.0	14.5	12.1	12.4	12.2	16.2	16.0	16.2	4.6	7.4	5.1	33.3	45.3	43.1	12.4	24.8	16.4	561
problemi familiari	9.4	17.3	11.6	11.1	16.5	12.4	12.8	8.0	12.0	9.9	11.1	10.1	45.3	46.3	46.1	10.8	24.9	15.4	527
problemi finanziari	8.1	7.7	8.0	19.7	27.8	21.8	8.5	0.0	7.0	6.1	5.6	6.0	4.0	3.7	3.8	9.4	8.1	9.0	307
problemi professionali o di formazione	13.2	11.4	12.7	19.0	18.6	18.9	10.3	8.0	9.9	11.1	9.3	10.8	5.3	4.0	4.3	12.8	9.5	11.7	401
problemi di alloggio	4.0	3.5	3.9	7.6	16.5	9.8	5.1	8.0	5.6	1.9	3.7	2.2	6.7	3.4	4.0	4.3	4.9	4.5	154
problemi di violenza	1.4	2.0	1.6	3.1	1.0	2.6	1.7	0.0	1.4	0.4	5.6	1.3	2.7	5.0	4.5	1.5	2.8	1.9	66
problemi giuridici	10.2	4.2	8.6	7.3	7.2	7.3	15.4	16.0	15.5	14.1	9.3	13.3	9.3	4.0	5.0	10.1	5.0	8.4	288
altro-i	2.5	2.0	2.3	1.0	1.0	1.0	2.6	4.0	2.8	4.2	1.9	3.8	1.3	0.6	0.8	3.9	2.4	3.4	116
nessuna richiesta	12.2	6.3	10.6	5.5	0.0	4.1	7.7	8.0	7.7	18.3	5.6	16.1	2.7	2.2	2.3	11.4	4.6	9.2	313
N**	1'415	543	1'958	289	97	386	117	25	142	262	54	316	75	322	397	2'298	1'118	3'416	3'416
<i>dati mancanti</i>	1'267	575	1'842	248	74	322	136	30	166	561	115	676	133	390	523	2'531	1'349	3'880	3'880
Base legale dell'intervento*																			
Sospensione della procedura, rinuncia a infliggere una pena o un avvertimento (art. 19a cifra 2 Lstup)	0.3	0.2	0.3	0.8	0.0	0.6	3.0	0.0	2.5	6.6	2.3	5.9	0.0	0.0	0.0	1.2	0.2	0.9	26
abbandono del perseguimento penale nel caso di un trattamento sotto sorveglianza medica (art. 19a cifra 3 Lstup)	0.2	0.0	0.1	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	4
misure concernenti delinquenti mentalmente anormali (art. 43 CPS)	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
trattamento delle persone dipendenti dall'alcol o dalle droghe (art. 44 CPS)	2.9	1.5	2.6	2.0	0.0	1.5	2.0	0.0	1.7	1.7	2.3	1.8	0.0	0.4	0.3	2.4	1.0	2.0	59
irresponsabilità (art. 10 CPS)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
responsabilità limitata (art. 11 CPS)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
esecuzione di misure per tossicodipend. in un'istituzione di educazione al lavoro (art. 2a ord. 3 rel. al CPS SR 311.03)	0.5	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.8	7.4	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	1.2	0.1	0.8	25
altra	10.8	4.3	9.1	5.7	2.5	4.9	10.1	5.0	9.2	22.7	11.4	20.9	1.6	0.0	0.3	11.4	3.5	8.9	267
nessuna misura (trattamento volontario)	85.4	93.7	87.6	91.0	97.5	92.6	83.8	95.0	85.7	61.1	84.1	64.8	98.4	99.6	99.4	83.7	95.2	87.3	2'616
N**	1'301	460	1'761	245	81	326	99	20	119	229	44	273	64	266	330	2'060	936	2'996	2'996
<i>dati mancanti</i>	1'409	663	2'072	297	92	389	154	35	189	603	127	730	149	517	666	2'818	1'613	4'431	4'431

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T11 Trattamenti/accompagnamenti dei pazienti prima dell'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2009)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Interventi precedenti*																			
no	46.2	38.1	43.9	15.5	20.0	16.6	47.6	60.9	50.0	79.9	75.7	79.2	70.3	66.2	67.0	51.7	50.8	51.4	3'139
si	53.8	61.9	56.1	84.5	80.0	83.4	52.4	39.1	50.0	20.1	24.3	20.8	29.7	33.8	33.0	48.3	49.2	48.6	2'969
N**	2'256	910	3'166	444	140	584	208	46	254	730	144	874	158	597	755	4'063	2'045	6'108	6'108
<i>dati mancanti</i>	454	213	667	98	33	131	45	9	54	102	27	129	55	186	241	815	504	1'319	1'319
Tipo di intervento***																			
trattamento con prescriz. di eroina	1.2	1.7	1.4	4.9	5.6	5.1	2.6	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	5.3	0.9	2.0	2.0	2.1	2.0	48
terapia sostitut. (metadone, subutex)	4.8	4.8	4.8	76.3	72.2	75.3	15.8	27.3	17.2	3.0	5.0	3.3	7.9	1.8	3.3	18.2	12.4	16.3	388
altro tratt. medicam. delle dipendenze	12.2	10.5	11.7	7.1	6.7	7.0	5.3	0.0	4.6	1.0	0.0	0.8	0.0	2.6	2.0	9.9	7.8	9.2	219
consulenza ambulatoriale	64.9	66.5	65.4	59.7	57.8	59.2	77.6	72.7	77.0	84.2	75.0	82.6	73.7	84.2	81.6	66.1	69.4	67.2	1'598
terapia residenziale	51.2	56.4	52.9	48.4	43.3	47.2	48.7	54.5	49.4	18.8	15.0	18.2	23.7	17.5	19.1	47.4	46.2	47.0	1'118
cura di disintossicazione	43.2	49.3	45.1	59.4	62.2	60.1	35.5	36.4	35.6	12.9	10.0	12.4	5.3	7.0	6.6	42.7	41.2	42.2	1'004
gruppo di aiuto reciproco/ autosost.	4.7	6.1	5.1	3.5	3.3	3.5	1.3	0.0	1.1	2.0	0.0	1.7	0.0	3.5	2.6	4.1	5.1	4.5	106
altro-i	2.4	1.9	2.2	1.1	3.3	1.6	1.3	9.1	2.3	3.0	5.0	3.3	0.0	6.1	4.6	2.1	3.5	2.6	61
N**	1'046	477	1'523	283	90	373	76	11	87	101	20	121	38	114	152	1'599	780	2'379	2'379
<i>dati mancanti</i>	168	86	254	92	22	114	33	7	40	46	15	61	9	88	97	363	227	590	590

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che sono già stati presi in carico in precedenza. Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

T12 Trattamento sostitutivo e altri interventi all'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2009)

	Pazienti: problema principale												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Sostituzione o prescrizione di eroina*																
no	97.8	96.6	97.5	56.4	52.8	55.5	95.0	97.4	95.4	99.7	99.3	99.6	93.5	92.7	93.3	4'287
si	2.2	3.4	2.5	43.6	47.2	44.5	5.0	2.6	4.6	0.3	0.7	0.4	6.5	7.3	6.7	309
N**	1'917	758	2'675	367	125	492	180	38	218	658	137	795	3'359	1'237	4'596	4'596
<i>dati mancanti</i>	793	365	1'158	175	48	223	73	17	90	174	34	208	1'306	529	1'835	1'835
Tipo di sostituzione***																
eroina	2.6	3.8	3.1	0.6	5.2	1.9	11.1	0.0	10.0	0.0	-	0.0	1.4	4.5	2.3	7
metadone	76.9	73.1	75.4	90.5	87.9	89.8	66.7	100.0	70.0	50.0	-	50.0	86.9	84.1	86.1	260
altri oppiacei	12.8	3.8	9.2	8.2	5.2	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	8.4	4.5	7.3	22
altre sostanze	7.7	19.2	12.3	0.6	1.7	0.9	22.2	0.0	20.0	50.0	-	50.0	3.3	6.8	4.3	13
N**	39	26	65	158	58	216	9	1	10	2	0	2	214	88	302	302
<i>dati mancanti</i>	3	0	3	2	1	3	0	0	0	0	1	1	5	2	7	7
Altro intervento parallelo*																
no	89.9	86.8	89.1	79.3	83.1	80.2	84.2	90.5	85.2	92.4	95.7	93.0	89.0	87.6	88.6	2'379
si	10.1	13.2	10.9	20.7	16.9	19.8	15.8	9.5	14.8	7.6	4.3	7.0	11.0	12.4	11.4	306
N**	1'282	476	1'758	251	83	334	101	21	122	238	46	284	1'992	693	2'685	2'685
<i>dati mancanti</i>	1'428	647	2'075	291	90	381	152	34	186	594	125	719	2'673	1'073	3'746	3'746
Tipo di intervento parallelo****																
trattamento o consulenza ambulatoriale	67.8	53.3	63.0	65.4	85.7	69.7	53.3	50.0	52.9	83.3	0.0	75.0	66.8	56.6	63.9	188
terapia residenziale	9.9	16.7	12.2	15.4	7.1	13.6	20.0	0.0	17.6	0.0	0.0	0.0	10.9	14.5	11.9	35
gruppo di aiuto reciproco o di autosostegno	3.3	6.7	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.8	3.1	9
altro-i	23.1	26.7	24.3	21.2	7.1	18.2	26.7	50.0	29.4	16.7	100.0	25.0	22.7	26.5	23.8	70
N**	121	60	181	52	14	66	15	2	17	18	2	20	211	83	294	294
<i>dati mancanti</i>	8	3	11	0	0	0	1	0	1	0	0	0	9	3	12	12

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che seguono un programma di sostituzione. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

**** I risultati si basano solamente sui clienti presi in carico parallelamente. Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

T13a Entrata in seguito a una cura di disintossicazione, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2009)

	Pazienti: problema principale												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Entrata in seguito a una cura di disintossicazione*																
no	78.6	73.6	77.2	87.3	87.5	87.4	90.8	85.0	89.8	93.8	93.0	93.7	83.2	78.4	82.0	2'098
disintossicazione nella stessa istituzione	0.7	1.6	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.5	1.2	0.7	17
disintossicazione in un'altra istituzione	20.8	24.8	21.9	12.7	12.5	12.6	9.2	10.0	9.3	6.2	7.0	6.3	16.4	20.3	17.4	445
N**	1'223	447	1'670	245	80	325	98	20	118	225	43	268	1'906	654	2'560	2'560
<i>dati mancanti</i>	1'487	676	2'163	297	93	390	155	35	190	607	128	735	2'759	1'112	3'871	3'871

T13b Frequenza delle cure di disintossicazione senza aiuto professionale prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2009)

Freq. disintossicazioni senza accompagnamento*																
mai	60.9	60.7	60.8	21.2	22.6	21.6	56.5	30.0	52.8	73.9	75.0	74.1	58.4	56.5	57.9	801
una volta	8.0	9.4	8.4	14.4	22.6	16.8	19.4	30.0	20.8	11.6	20.0	12.7	9.7	11.8	10.3	142
due o tre volte	10.4	10.2	10.3	20.5	26.4	22.2	4.8	10.0	5.6	6.5	5.0	6.3	10.6	11.5	10.8	150
più di tre volte	20.7	19.7	20.4	43.9	28.3	39.5	19.4	30.0	20.8	8.0	0.0	7.0	21.3	20.2	21.0	291
N**	637	244	881	132	53	185	62	10	72	138	20	158	1'028	356	1'384	1'384
<i>dati mancanti</i>	2'073	879	2'952	410	120	530	191	45	236	694	151	845	3'637	1'410	5'047	5'047

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T14 Problema principale all'entrata (solamente pazienti) (2009)

Tutti i pazienti									
Problema principale	Uomini	Donne	Totale	N		Uomini	Donne	Totale	N
	%	%	%			%	%	%	
alcol	58.1	63.6	59.6	3'833	alcol	58.1	63.6	59.6	3'833
cocktail (eroina e cocaina)	0.3	0.2	0.2	16	cocktail	0	0	0	16
eroina	10.1	8.1	9.5	612	oppiacei	11.4	9.6	10.9	699
metadone	1.0	1.2	1.0	67					
altri oppiacei	0.3	0.3	0.3	20					
cocaina	5.4	3.1	4.8	308	cocaina e derivati	5.4	3.1	4.8	308
crack, freebase	0.0	0.0	0.0	0					
amfetamine	0.3	0.7	0.4	28	stimolanti	0.5	1.0	0.6	40
MDMA e affini (ecstasy)	0.1	0.2	0.1	8					
altri stimolanti (per es., khat)	0.1	0.1	0.1	4					
barbiturici	0.0	0.1	0.0	2	medicamenti	0.7	1.8	1.0	64
benzodiazepine	0.6	1.3	0.8	49					
altri sonniferi e tranquillanti	0.1	0.5	0.2	13					
LSD	0.0	0.0	0.0	1	allucinogeni	0.0	0.0	0.0	2
altri allucinogeni	0.0	0.0	0.0	1					
canapa	17.8	9.7	15.6	1'003	canapa	17.8	9.7	15.6	1'003
tabacco	2.0	4.8	2.7	176	tabacco	2.0	4.8	2.7	176
sostanze volatili (per es., solventi)	0.0	0.2	0.1	5	altra/e sostanza/e	0.4	0.8	0.5	33
altra/e sostanza/e	0.4	0.6	0.4	28					
gioco patologico	2.3	1.3	2.0	128	problemi assimilabili a una dipendenza	3.5	5.4	4.0	257
disturbi alimentari	0.1	3.2	1.0	62					
altri problemi assimilabili a una dipendenza	1.1	1.0	1.0	67					
N**	4'665	1'766	6'431	6'431		4'665	1'766	6'431	6'431
<i>dati mancanti</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T15.1a Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata (2009), uomini

Pazienti: principale sostanza problematica										
Uomini	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Coacaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
Frequenza di consumo 30 ultimi giorni (%)*										
mai	28.0	20.0	25.5	41.0	27.3	31.6	0.0	27.9	3.5	40.0
un giorno alla settimana o meno	7.5	20.0	9.3	24.0	27.3	0.0	50.0	20.4	1.2	20.0
2 a 3 giorni alla settimana	13.5	20.0	11.7	20.5	27.3	5.3	50.0	17.0	4.7	40.0
4 a 6 giorni alla settimana	10.7	10.0	8.5	5.0	9.1	0.0	0.0	7.7	3.5	0.0
una volta al giorno	11.0	20.0	24.1	5.0	0.0	36.8	0.0	9.9	4.7	0.0
più volte al giorno	29.4	10.0	21.0	4.5	9.1	26.3	0.0	17.0	82.6	0.0
N**	1'856	10	377	200	11	19	2	705	86	5
<i>dati mancanti</i>	854	2	153	53	11	13	0	127	6	14
Frequenza di consumo 6 ultimi mesi (%)*										
mai	8.3	10.0	14.8	23.0	27.3	10.0	0.0	7.7	2.3	8.3
un giorno alla settimana o meno	7.5	20.0	8.8	28.1	18.2	5.0	50.0	25.7	1.2	8.3
2 a 3 giorni alla settimana	16.7	20.0	12.9	23.0	27.3	10.0	50.0	21.2	5.8	33.3
4 a 6 giorni alla settimana	13.8	10.0	8.5	8.7	18.2	0.0	0.0	8.9	3.5	0.0
una volta al giorno	12.6	20.0	29.1	7.1	0.0	40.0	0.0	12.1	5.8	0.0
più volte al giorno	41.0	20.0	25.8	10.2	9.1	35.0	0.0	24.4	81.4	50.0
N**	1'863	10	364	196	11	20	2	685	86	12
<i>dati mancanti</i>	847	2	166	57	11	12	0	147	6	7

T15.1b Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata (2009), uomini

Uomini	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
Frequenza di manifestazione 30 ultimi giorni (%)*			
mai	54.3	0.0	12.8
1 giorno alla settimana o meno	15.7	0.0	5.1
2 a 3 giorni alla settimana	8.6	33.3	15.4
4 a 6 giorni alla settimana	10.0	0.0	15.4
una volta al giorno	2.9	0.0	12.8
più volte al giorno	8.6	66.7	38.5
N**	70	3	39
<i>dati mancanti</i>	35	3	11
Frequenza di manifestazione 6 ultimi mesi (%)*			
mai	27.3	0.0	2.6
1 giorno alla settimana o meno	36.4	0.0	5.3
2 a 3 giorni alla settimana	14.5	0.0	13.2
4 a 6 giorni alla settimana	12.7	33.3	13.2
una volta al giorno	1.8	0.0	10.5
più volte al giorno	7.3	66.7	55.3
N**	55	3	38
<i>dati mancanti</i>	50	3	12

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T15.2a Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata (2009), donne

Pazienti: principale sostanza problematica										
Donne	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Coacaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
Frequenza di consumo 30 ultimi giorni (%)*										
mai	25.4	0.0	20.0	40.5	33.3	22.7	-	29.0	2.6	0.0
un giorno alla settimana o meno	8.9	33.3	15.4	19.0	13.3	0.0	-	19.6	1.3	0.0
2 a 3 giorni alla settimana	12.5	33.3	6.9	11.9	40.0	13.6	-	14.5	2.6	25.0
4 a 6 giorni alla settimana	13.6	33.3	6.9	9.5	6.7	0.0	-	8.0	1.3	0.0
una volta al giorno	10.9	0.0	27.7	11.9	6.7	18.2	-	10.9	3.9	25.0
più volte al giorno	28.7	0.0	23.1	7.1	0.0	45.5	-	18.1	88.3	50.0
N**	743	3	130	42	15	22	0	138	77	4
<i>dati mancanti</i>	380	1	39	13	3	10	0	33	7	10
Frequenza di consumo 6 ultimi mesi (%)*										
mai	7.5	0.0	9.6	20.5	12.5	0.0	-	6.5	2.6	12.5
un giorno alla settimana o meno	7.0	0.0	14.4	18.2	12.5	0.0	-	30.2	0.0	12.5
2 a 3 giorni alla settimana	16.7	33.3	9.6	20.5	50.0	0.0	-	13.7	3.9	12.5
4 a 6 giorni alla settimana	15.1	33.3	5.6	15.9	6.3	0.0	-	7.2	1.3	0.0
una volta al giorno	12.4	0.0	31.2	9.1	12.5	30.4	-	9.4	3.9	12.5
più volte al giorno	41.3	33.3	29.6	15.9	6.3	69.6	-	33.1	88.3	50.0
N**	724	3	125	44	16	23	0	139	77	8
<i>dati mancanti</i>	399	1	44	11	2	9	0	32	7	6

T15.2b Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata (2009), donne

Pazienti: problema principale			
Donne	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
Frequenza di manifestazione 30 ultimi giorni (%)*			
mai	56.3	2.8	0.0
1 giorno alla settimana o meno	18.8	5.6	16.7
2 a 3 giorni alla settimana	6.3	22.2	50.0
4 a 6 giorni alla settimana	12.5	2.8	0.0
una volta al giorno	0.0	13.9	0.0
più volte al giorno	6.3	52.8	33.3
N**	16	36	6
<i>dati mancanti</i>	7	20	11
Frequenza di manifestazione 6 ultimi mesi (%)*			
mai	44.4	2.9	0.0
1 giorno alla settimana o meno	44.4	5.7	16.7
2 a 3 giorni alla settimana	11.1	22.9	50.0
4 a 6 giorni alla settimana	0.0	5.7	0.0
una volta al giorno	0.0	5.7	0.0
più volte al giorno	0.0	57.1	33.3
N**	9	35	6
<i>dati mancanti</i>	14	21	11

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T15.3a Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata (2009), uomini e donne

Pazienti: principale sostanza problematica										
Uomini e donne	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Coacaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
Frequenza di consumo 30 ultimi giorni (%)*										
mai	27.2	15.4	24.1	40.9	30.8	26.8	0.0	28.1	3.1	22.2
un giorno alla settimana o meno	7.9	23.1	10.8	23.1	19.2	0.0	50.0	20.3	1.2	11.1
2 a 3 giorni alla settimana	13.2	23.1	10.5	19.0	34.6	9.8	50.0	16.6	3.7	33.3
4 a 6 giorni alla settimana	11.5	15.4	8.1	5.8	7.7	0.0	0.0	7.7	2.5	0.0
una volta al giorno	11.0	15.4	25.0	6.2	3.8	26.8	0.0	10.1	4.3	11.1
più volte al giorno	29.2	7.7	21.5	5.0	3.8	36.6	0.0	17.2	85.3	22.2
N**	2'599	13	507	242	26	41	2	843	163	9
<i>dati mancanti</i>	1'234	3	192	66	14	23	0	160	13	24
Frequenza di consumo 6 ultimi mesi (%)*										
mai	8.1	7.7	13.5	22.5	18.5	4.7	0.0	7.5	2.5	10.0
un giorno alla settimana o meno	7.3	15.4	10.2	26.3	14.8	2.3	50.0	26.5	0.6	10.0
2 a 3 giorni alla settimana	16.7	23.1	12.1	22.5	40.7	4.7	50.0	19.9	4.9	25.0
4 a 6 giorni alla settimana	14.2	15.4	7.8	10.0	11.1	0.0	0.0	8.6	2.5	0.0
una volta al giorno	12.6	15.4	29.7	7.5	7.4	34.9	0.0	11.7	4.9	5.0
più volte al giorno	41.1	23.1	26.8	11.3	7.4	53.5	0.0	25.8	84.7	50.0
N**	2'587	13	489	240	27	43	2	824	163	20
<i>dati mancanti</i>	1'246	3	210	68	13	21	0	179	13	13

T15.3b Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata (2009), uomini e donne

Pazienti: problema principale			
Uomini e donne	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
Frequenza di manifestazione 30 ultimi giorni (%)*			
mai	54.7	2.6	11.1
1 giorno alla settimana o meno	16.3	5.1	6.7
2 a 3 giorni alla settimana	8.1	23.1	20.0
4 a 6 giorni alla settimana	10.5	2.6	13.3
una volta al giorno	2.3	12.8	11.1
più volte al giorno	8.1	53.8	37.8
N**	86	39	45
<i>dati mancanti</i>	42	23	22
Frequenza di manifestazione 6 ultimi mesi (%)*			
mai	29.7	2.6	2.3
1 giorno alla settimana o meno	37.5	5.3	6.8
2 a 3 giorni alla settimana	14.1	21.1	18.2
4 a 6 giorni alla settimana	10.9	7.9	11.4
una volta al giorno	1.6	5.3	9.1
più volte al giorno	6.3	57.9	52.3
N**	64	38	44
<i>dati mancanti</i>	64	24	23

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T16.1a Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2009), uomini

Pazienti: principale sostanza problematica										
Uomini	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Coacaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
Età all'epoca del primo consumo										
media	16.1	21.6	21.0	22.4	20.1	33.1	20.0	14.9	14.2	20.2
deviazione standard	3.7	7.0	5.5	6.7	3.6	12.6	1.4	2.5	2.4	8.4
1° quartile	14.0	16.0	17.0	18.0	17.0	25.0	19.0	14.0	13.0	15.0
mediana	16.0	22.0	20.0	20.0	19.0	28.0	20.0	15.0	14.0	17.0
3° quartile	18.0	24.0	23.0	25.0	22.0	38.0	21.0	16.0	16.0	25.0
N*	1'102	9	323	179	7	15	2	642	43	6
<i>dati mancanti</i>	1'608	3	207	74	15	17	0	190	49	13
Età all'inizio del consumo regolare										
media	21.9	23.4	22.5	24.0	21.8	34.9	22.0	16.0	16.2	19.7
deviazione standard	7.2	6.2	5.8	6.7	4.9	12.8	-	2.9	5.1	5.0
1° quartile	18.0	19.0	18.0	19.0	17.0	27.0	22.0	15.0	14.0	15.0
mediana	20.0	23.0	21.0	22.0	22.0	33.0	22.0	16.0	15.0	19.0
3° quartile	25.0	26.5	25.0	27.0	25.0	38.0	22.0	16.0	18.0	25.0
N*	1'055	8	275	141	5	13	1	504	38	3
<i>dati mancanti</i>	1'655	4	255	112	17	19	1	328	54	16
Età all'inizio del consumo problematico										
media	31.4	26.4	23.7	25.1	27.0	34.9	22.0	16.7	17.5	22.8
deviazione standard	11.7	4.6	6.7	6.7	5.9	11.6	-	3.7	6.8	11.2
1° quartile	22.0	23.0	19.0	20.0	25.0	28.0	22.0	15.0	14.0	14.0
mediana	30.0	24.0	22.0	24.0	28.0	33.0	22.0	16.0	16.0	21.0
3° quartile	40.0	28.0	27.0	28.5	31.0	34.0	22.0	17.0	18.0	31.5
N*	1'045	7	263	156	6	9	1	487	41	4
<i>dati mancanti</i>	1'665	5	267	97	16	23	1	345	51	15
Periodo di latenza (in anni)**										
media	24.3	1.6	6.6	6.4	9.1	9.0	8.4	4.7	8.2	4.5
deviazione standard	13.0	-	7.2	5.1	6.2	5.0	4.9	5.8	9.7	3.8
1° quartile	14.4	1.6	1.4	2.8	4.8	4.2	5.0	1.3	2.2	1.2
mediana	24.2	1.6	4.1	5.5	10.7	8.7	8.4	2.5	3.0	4.4
3° quartile	33.7	1.6	8.5	7.9	13.3	14.2	11.8	5.3	11.9	7.8
N*	508	1	48	85	4	3	2	498	31	4
<i>dati mancanti</i>	534	1	19	14	4	3	0	85	30	8

* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

** Lasso di tempo tra il primo consumo della sostanza problematica e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

T16.1b Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2009), donne

Pazienti: principale sostanza problematica										
Donne	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Coacaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
Età all'epoca del primo consumo										
media	17.4	16.0	19.4	20.5	18.7	30.1	-	14.7	15.1	28.9
deviazione standard	5.2	1.7	6.2	6.8	4.6	10.8	-	2.2	2.8	18.2
1° quartile	15.0	15.0	15.0	17.0	15.0	22.0	-	13.0	14.0	17.0
mediana	16.0	15.0	18.0	19.0	18.0	31.5	-	15.0	15.0	19.0
3° quartile	19.0	18.0	21.0	22.0	20.5	38.0	-	16.0	17.0	41.0
N*	419	3	109	41	12	14	0	127	40	7
<i>dati mancanti</i>	704	1	60	14	6	18	0	44	44	7
Età all'inizio del consumo regolare										
media	27.2	18.7	20.7	22.0	19.0	36.5	-	15.4	17.2	36.3
deviazione standard	11.2	2.3	6.5	8.0	4.0	7.8	-	2.4	3.4	18.4
1° quartile	18.0	16.0	16.0	17.0	16.0	29.0	-	14.0	15.0	19.0
mediana	25.0	20.0	19.0	19.0	18.0	38.0	-	15.0	17.0	33.5
3° quartile	35.0	20.0	22.0	23.0	20.0	44.0	-	16.0	20.0	48.0
N*	420	3	91	33	14	11	0	99	39	6
<i>dati mancanti</i>	703	1	78	22	4	21	0	72	45	8
Età all'inizio del consumo problematico										
media	35.1	18.7	21.2	22.8	20.9	33.4	-	16.5	19.3	33.7
deviazione standard	12.2	2.3	6.7	8.4	6.4	9.2	-	3.2	7.3	27.2
1° quartile	25.0	16.0	17.0	17.0	16.5	27.0	-	15.0	16.0	17.0
mediana	35.0	20.0	19.0	19.0	19.0	32.5	-	16.0	17.5	19.0
3° quartile	43.0	20.0	23.0	25.0	23.5	39.0	-	17.0	20.0	65.0
N*	450	3	90	35	16	10	0	95	36	3
<i>dati mancanti</i>	673	1	79	20	2	22	0	76	48	11
Periodo di latenza (in anni)**										
media	26.0	-	5.7	7.5	4.5	28.1	-	3.9	15.5	3.8
deviazione standard	13.2	-	6.6	7.9	3.8	-	-	4.3	14.5	2.8
1° quartile	15.0	-	1.6	1.9	1.8	28.1	-	1.3	1.5	2.1
mediana	27.4	-	2.4	3.5	3.5	28.1	-	2.6	15.5	3.4
3° quartile	36.1	-	6.8	9.3	6.4	28.1	-	4.4	27.4	5.5
N*	164	0	24	23	9	1	0	93	31	4
<i>dati mancanti</i>	183	0	4	5	2	4	0	16	19	3

* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

** Lasso di tempo tra il primo consumo della sostanza problematica e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

T16.1c Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2009), uomini e donne

Pazienti: principale sostanza problematica										
Uomini e donne	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Coacaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
Età all'epoca del primo consumo										
media	16.5	20.2	20.6	22.0	19.2	31.7	20.0	14.9	14.6	24.8
deviazione standard	4.2	6.5	5.7	6.7	4.2	11.6	1.4	2.4	2.6	14.7
1° quartile	14.0	15.0	17.0	18.0	17.0	25.0	19.0	14.0	13.0	17.0
mediana	16.0	19.0	19.0	20.0	18.0	30.0	20.0	15.0	14.0	17.0
3° quartile	18.0	23.0	23.0	24.0	21.0	38.0	21.0	16.0	16.0	26.0
N*	1'521	12	432	220	19	29	2	769	83	13
<i>dati mancanti</i>	2'312	4	267	88	21	35	0	234	93	20
Età all'inizio del consumo regolare										
media	23.4	22.1	22.1	23.6	19.7	35.6	22.0	15.9	16.7	30.8
deviazione standard	8.9	5.8	6.1	7.0	4.3	10.6	-	2.8	4.3	16.9
1° quartile	18.0	18.0	18.0	18.0	17.0	27.0	22.0	14.0	14.0	19.0
mediana	20.0	20.0	21.0	22.0	18.0	34.0	22.0	16.0	16.0	25.0
3° quartile	26.0	25.0	25.0	27.0	22.0	42.5	22.0	16.0	18.0	41.0
N*	1'475	11	366	174	19	24	1	603	77	9
<i>dati mancanti</i>	2'358	5	333	134	21	40	1	400	99	24
Età all'inizio del consumo problematico										
media	32.6	24.1	23.1	24.7	22.6	34.1	22.0	16.7	18.4	27.4
deviazione standard	11.9	5.4	6.7	7.1	6.7	10.2	-	3.6	7.1	18.5
1° quartile	23.0	20.0	18.0	19.0	17.0	27.0	22.0	15.0	15.0	16.0
mediana	30.0	23.5	21.0	23.0	20.5	33.0	22.0	16.0	16.0	19.0
3° quartile	40.0	27.0	26.0	28.0	27.0	38.0	22.0	17.0	20.0	37.0
N*	1'495	10	353	191	22	19	1	582	77	7
<i>dati mancanti</i>	2'338	6	346	117	18	45	1	421	99	26
Periodo di latenza (in anni)**										
media	24.7	1.6	6.3	6.7	5.9	13.8	8.4	4.6	11.9	4.1
deviazione standard	13.0	-	7.0	5.8	4.9	10.4	4.9	5.6	12.8	3.1
1° quartile	14.5	1.6	1.5	2.5	1.8	6.5	5.0	1.3	2.1	1.2
mediana	24.8	1.6	3.9	5.3	4.2	11.4	8.4	2.5	4.9	3.4
3° quartile	33.9	1.6	7.9	8.0	9.8	21.1	11.8	5.1	19.7	7.5
N*	672	1	72	108	13	4	2	591	62	8
<i>dati mancanti</i>	717	1	23	19	6	7	0	101	49	11

* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

** Lasso di tempo tra il primo consumo della sostanza problematica e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

T16.2a Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2009), uomini

Pazienti: problema principale			
Uomini	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
Età all'epoca della prima manifestazione			
media	28.3	18.0	19.0
deviazione standard	9.2	0.0	11.3
1° quartile	20.0	18.0	13.0
mediana	28.0	18.0	16.0
3° quartile	35.0	18.0	18.0
N*	34	2	25
<i>dati mancanti</i>	71	4	25
Età all'inizio della manifestazione regolare			
media	31.8	22.0	20.1
deviazione standard	13.4	6.9	11.3
1° quartile	20.0	18.0	14.0
mediana	30.5	18.0	17.5
3° quartile	36.0	30.0	22.0
N*	30	3	26
<i>dati mancanti</i>	75	3	24
Età all'inizio della manifestazione problematica			
media	34.9	22.0	21.4
deviazione standard	11.9	6.9	11.3
1° quartile	28.0	18.0	14.0
mediana	32.0	18.0	18.0
3° quartile	39.0	30.0	24.0
N*	41	3	27
<i>dati mancanti</i>	64	3	23
Periodo di latenza (in anni)**			
media	13.4	1.5	8.0
deviazione standard	13.8	1.2	7.1
1° quartile	4.0	0.6	2.3
mediana	5.7	1.5	5.5
3° quartile	18.1	2.4	11.4
N*	34	2	25
<i>dati mancanti</i>	71	4	25

* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

** Lasso di tempo tra la prima manifestazione del comportamento problematico e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

T16.2b Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2009), donne

Pazienti: problema principale			
<i>Donne</i>	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
Età all'epoca della prima manifestazione			
media	22.8	16.9	19.0
deviazione standard	5.3	4.5	-
1° quartile	18.0	14.0	19.0
mediana	22.0	17.0	19.0
3° quartile	25.0	20.0	19.0
N*	6	28	1
<i>dati mancanti</i>	17	28	16
Età all'inizio della manifestazione regolare			
media	30.2	18.4	21.3
deviazione standard	13.9	4.1	3.2
1° quartile	19.0	15.0	19.0
mediana	26.0	18.0	20.0
3° quartile	36.0	21.0	25.0
N*	6	27	3
<i>dati mancanti</i>	17	29	14
Età all'inizio della manifestazione problematica			
media	34.1	19.6	22.0
deviazione standard	12.5	4.9	2.6
1° quartile	22.0	16.0	20.0
mediana	36.0	18.0	21.0
3° quartile	42.0	22.0	25.0
N*	9	26	3
<i>dati mancanti</i>	14	30	14
Periodo di latenza (in anni)**			
media	10.1	9.3	5.6
deviazione standard	8.8	9.1	-
1° quartile	4.6	3.0	5.6
mediana	5.5	4.6	5.6
3° quartile	19.5	15.6	5.6
N*	6	28	1
<i>dati mancanti</i>	17	28	16

* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

** Lasso di tempo tra la prima manifestazione del comportamento problematico e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

T16.2c Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2009), uomini e donne

Pazienti: problema principale			
<i>Uomini e donne</i>	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
Età all'epoca della prima manifestazione			
media	27.5	17.0	19.0
deviazione standard	8.9	4.3	11.0
1° quartile	20.0	14.0	13.0
mediana	25.5	17.5	16.0
3° quartile	32.5	20.0	19.0
N*	40	30	26
<i>dati mancanti</i>	88	32	41
Età all'inizio della manifestazione regolare			
media	31.5	18.7	20.2
deviazione standard	13.3	4.4	10.7
1° quartile	20.0	15.0	14.0
mediana	30.0	18.0	18.0
3° quartile	36.0	21.0	22.0
N*	36	30	29
<i>dati mancanti</i>	92	32	38
Età all'inizio della manifestazione problematica			
media	34.7	19.9	21.5
deviazione standard	11.9	5.0	10.8
1° quartile	26.0	16.0	15.0
mediana	32.0	18.0	18.0
3° quartile	41.0	22.0	24.0
N*	50	29	30
<i>dati mancanti</i>	78	33	37
Periodo di latenza (in anni)**			
media	12.9	8.8	7.9
deviazione standard	13.1	9.0	7.0
1° quartile	4.0	2.7	2.3
mediana	5.6	4.3	5.5
3° quartile	18.8	15.3	11.4
N*	40	30	26
<i>dati mancanti</i>	88	32	41

* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

** Lasso di tempo tra la prima manifestazione del comportamento problematico e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

T17 Modo di amministrazione della principale sostanza problematica nel corso dei 6 ultimi mesi prima dell'entrata (2009)

Pazienti: principale sostanza problematica															
Modo di amministrazione*	Eroina			Cocaina			Amfetamine			Canapa			Benzodiazepine		
	Uomini %	Donne %	Totale %	Uomini %	Donne %	Totale %	Uomini %	Donne %	Totale %	Uomini %	Donne %	Totale %	Uomini %	Donne %	Totale %
iniettato	31.9	26.8	30.5	9.0	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0
fumato/inalato	44.9	45.1	45.0	16.5	6.7	14.7	50.0	50.0	50.0	98.3	97.5	98.2	0.0	0.0	0.0
ingerito /bevuto	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.6	50.0	30.0	35.7	0.8	1.7	1.0	100.0	100.0	100.0
sniffato	23.1	28.0	24.5	73.7	93.3	77.3	0.0	20.0	14.3	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
altro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
N**	216	82	298	133	30	163	4	10	14	603	120	723	10	9	19
<i>dati mancanti</i>	<i>253</i>	<i>61</i>	<i>314</i>	<i>120</i>	<i>25</i>	<i>145</i>	<i>11</i>	<i>3</i>	<i>14</i>	<i>229</i>	<i>51</i>	<i>280</i>	<i>16</i>	<i>14</i>	<i>30</i>

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T18 Prevalenza a vita delle iniezioni, nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata, scambio di materiale d'iniezione nel corso degli ultimi 6 mesi prima dell'entrata e età all'epoca della prima iniezione, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2009)

	Pazienti: pricipale sostanza problematica												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Iniezioni nel corso della vita*																
sì	6.2	6.9	6.4	64.4	66.4	64.9	16.1	12.1	15.5	2.0	4.3	2.4	12.5	12.3	12.4	518
no	93.8	93.1	93.6	35.6	33.6	35.1	83.9	87.9	84.5	98.0	95.7	97.6	87.5	87.7	87.6	3'646
N**	1'639	700	2'339	348	119	467	174	33	207	664	138	802	3'024	1'140	4'164	4'164
<i>dati mancanti</i>	<i>1'071</i>	<i>423</i>	<i>1'494</i>	<i>194</i>	<i>54</i>	<i>248</i>	<i>79</i>	<i>22</i>	<i>101</i>	<i>168</i>	<i>33</i>	<i>201</i>	<i>1'641</i>	<i>626</i>	<i>2'267</i>	<i>2'267</i>
Iniezioni nel corso dei 6 ultimi mesi*																
sì	1.4	1.3	1.4	40.8	43.8	41.6	9.8	0.0	8.3	1.2	2.2	1.4	6.2	5.5	6.0	250
no	98.6	98.7	98.6	59.2	56.3	58.4	90.2	100.0	91.7	98.8	97.8	98.6	93.8	94.5	94.0	3'903
N**	1'650	700	2'350	333	112	445	173	33	206	665	138	803	3'019	1'134	4'153	4'153
<i>dati mancanti</i>	<i>1'060</i>	<i>423</i>	<i>1'483</i>	<i>209</i>	<i>61</i>	<i>270</i>	<i>80</i>	<i>22</i>	<i>102</i>	<i>167</i>	<i>33</i>	<i>200</i>	<i>1'646</i>	<i>632</i>	<i>2'278</i>	<i>2'278</i>
Iniezioni nel corso dei 30 ultimi giorni*																
sì	0.3	0.5	0.4	34.8	33.9	34.6	7.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	3.9	3.4	3.7	164
no	99.7	99.5	99.6	65.2	66.1	65.4	93.0	100.0	94.1	100.0	100.0	100.0	96.1	96.6	96.3	4'213
N**	1'805	750	2'555	296	109	405	171	32	203	664	139	803	3'167	1'210	4'377	4'377
<i>dati mancanti</i>	<i>905</i>	<i>373</i>	<i>1'278</i>	<i>246</i>	<i>64</i>	<i>310</i>	<i>82</i>	<i>23</i>	<i>105</i>	<i>168</i>	<i>32</i>	<i>200</i>	<i>1'498</i>	<i>556</i>	<i>2'054</i>	<i>2'054</i>
Scambio di materiale d'iniezione nel corso dei 6 ultimi mesi***																
sì	0.0	0.0	0.0	13.1	15.4	13.8	27.3	-	27.3	0.0	0.0	0.0	12.9	12.5	12.8	15
no	100.0	100.0	100.0	86.9	84.6	86.2	72.7	-	72.7	100.0	100.0	100.0	87.1	87.5	87.2	102
N**	7	2	9	61	26	87	11	0	11	4	3	7	85	32	117	117
<i>dati mancanti</i>	<i>12</i>	<i>5</i>	<i>17</i>	<i>56</i>	<i>21</i>	<i>77</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>4</i>	<i>77</i>	<i>26</i>	<i>103</i>	<i>103</i>
Età all'epoca della prima iniezione****																
fino a 14 anni	4.7	0.0	3.5	3.6	13.0	5.9	0.0	33.3	5.0	0.0	0.0	0.0	3.3	10.3	5.0	14
da 15 a 16 anni	11.6	14.3	12.3	7.2	21.7	10.8	17.6	0.0	15.0	14.3	0.0	11.1	8.9	19.1	11.4	32
da 17 a 18 anni	23.3	42.9	28.1	17.3	19.6	17.8	23.5	33.3	25.0	28.6	0.0	22.2	19.2	25.0	20.6	58
da 19 a 20 anni	18.6	21.4	19.3	19.4	21.7	20.0	11.8	33.3	15.0	0.0	50.0	11.1	17.8	23.5	19.2	54
da 21 a 25 anni	30.2	14.3	26.3	36.0	13.0	30.3	17.6	0.0	15.0	57.1	50.0	55.6	34.3	13.2	29.2	82
da 26 a 30 anni	7.0	7.1	7.0	11.5	8.7	10.8	17.6	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	10.8	7.4	10.0	28
da 31 a 39 anni	2.3	0.0	1.8	3.6	2.2	3.2	11.8	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	3.8	1.5	3.2	9
dai 40 anni in su	2.3	0.0	1.8	1.4	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.4	4
N**	43	14	57	139	46	185	17	3	20	7	2	9	213	68	281	281
<i>dati mancanti</i>	<i>58</i>	<i>34</i>	<i>92</i>	<i>85</i>	<i>33</i>	<i>118</i>	<i>11</i>	<i>1</i>	<i>12</i>	<i>6</i>	<i>4</i>	<i>10</i>	<i>165</i>	<i>72</i>	<i>237</i>	<i>237</i>

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che si sono iniettati una sostanza illegale nel corso dei 6 ultimi mesi. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

**** I risultati si basano solamente sui clienti che si sono iniettati una sostanza illegale nel corso della loro vita. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T19.1a Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2009), uomini

Uomini

	Pazienti: principale sostanza problematica									
	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Altri problemi*										
alcol	-	22.2	30.4	44.8	40.0	23.8	0.0	26.6	13.5	30.8
cocktail (eroina e cocaina)	0.4	-	4.2	2.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
eroina	2.3	11.1	4.5	12.8	10.0	23.8	0.0	2.2	0.0	0.0
metadone	1.4	11.1	20.9	7.6	0.0	23.8	0.0	0.4	0.0	0.0
altri oppiacei	0.7	0.0	2.6	0.6	10.0	4.8	0.0	0.6	0.0	0.0
cocaina	6.4	22.2	30.2	0.0	30.0	23.8	0.0	9.9	1.9	0.0
crack, freebase	0.2	0.0	1.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amfetamine	1.0	0.0	3.2	9.3	0.0	4.8	100.0	2.4	0.0	0.0
MDMA e affini (ecstasy)	0.9	0.0	2.9	11.0	0.0	4.8	100.0	3.2	0.0	0.0
altri stimolanti	0.1	0.0	0.3	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
barbiturici	0.1	0.0	1.9	1.2	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazepine	2.4	44.4	18.5	5.2	0.0	0.0	0.0	0.7	1.9	0.0
altri sonniferi e tranquillanti	0.7	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
LSD	0.5	0.0	2.6	5.8	10.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0
altri allucinogeni	0.5	0.0	1.9	4.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
sostanze volatili (per es., solventi)	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
canapa	11.2	11.1	36.0	38.4	30.0	9.5	0.0	-	9.6	7.7
tabacco	30.6	33.3	34.4	32.6	30.0	23.8	0.0	32.2	-	7.7
altra/e sostanza/e	0.5	0.0	0.3	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
gioco patologico	0.3	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
disturbi alimentari	0.1	0.0	0.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
altri problemi assimilabili a una dipendenza	0.4	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0
nessun altro problema di dipendenza	58.2	22.2	22.8	23.8	40.0	23.8	0.0	45.4	78.8	61.5
N**	1'687	9	378	172	10	21	1	537	52	13
<i>dati mancanti</i>	1'023	3	152	81	12	11	1	295	40	6

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T19.1b Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2009), donne

Donne

	Pazienti: principale sostanza problematica									
	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Altri problemi*										
alcol	-	50.0	24.6	47.5	42.9	39.1	-	26.9	4.3	50.0
cocktail (eroina e cocaina)	0.2	-	5.1	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
eroina	2.1	0.0	9.3	10.0	0.0	4.3	-	3.8	0.0	0.0
metadone	2.3	0.0	17.8	5.0	0.0	4.3	-	0.0	0.0	0.0
altri oppiacei	0.2	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
cocaina	4.2	0.0	32.2	0.0	21.4	13.0	-	15.4	0.0	20.0
crack, freebase	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	-	0.0	0.0	10.0
amfetamine	0.3	0.0	5.1	25.0	14.3	0.0	-	5.8	0.0	10.0
MDMA e affini (ecstasy)	0.3	0.0	5.1	30.0	21.4	0.0	-	6.7	0.0	20.0
altri stimolanti	0.2	0.0	0.0	0.0	21.4	4.3	-	0.0	0.0	0.0
barbiturici	0.6	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	10.0
benzodiazepine	8.4	50.0	26.3	7.5	0.0	8.7	-	0.0	0.0	20.0
altri sonniferi e tranquillanti	2.1	0.0	0.8	0.0	0.0	4.3	-	0.0	0.0	10.0
LSD	0.0	0.0	1.7	5.0	7.1	0.0	-	1.0	0.0	10.0
altri allucinogeni	0.0	0.0	0.8	7.5	0.0	0.0	-	1.9	0.0	0.0
sostanze volatili (per es., solventi)	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	-	1.0	0.0	0.0
canapa	5.7	0.0	34.7	42.5	50.0	4.3	-	-	8.5	20.0
tabacco	31.4	0.0	32.2	32.5	21.4	21.7	-	30.8	-	20.0
altra/e sostanza/e	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
gioco patologico	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	-	1.0	0.0	0.0
disturbi alimentari	1.8	0.0	1.7	5.0	0.0	0.0	-	0.0	2.1	0.0
altri problemi assimilabili a una dipendenza	0.3	0.0	0.8	0.0	0.0	4.3	-	0.0	0.0	0.0
nessun altro problema di dipendenza	54.1	0.0	20.3	25.0	21.4	34.8	-	42.3	85.1	30.0
N**	663	2	118	40	14	23	0	104	47	10
<i>dati mancanti</i>	<i>460</i>	<i>2</i>	<i>51</i>	<i>15</i>	<i>4</i>	<i>9</i>	<i>0</i>	<i>67</i>	<i>37</i>	<i>4</i>

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T19.1c Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2009), uomini e donne

Uomini e donne

	Pazienti: principale sostanza problematica									
	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Altri problemi*										
alcol	-	27.3	29.0	45.3	41.7	31.8	0.0	26.7	9.1	39.1
cocktail (eroina e cocaina)	0.3	-	4.4	1.9	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
eroina	2.2	9.1	5.6	12.3	4.2	13.6	0.0	2.5	0.0	0.0
metadone	1.7	9.1	20.2	7.1	0.0	13.6	0.0	0.3	0.0	0.0
altri oppiacei	0.5	0.0	2.6	0.5	4.2	2.3	0.0	0.5	0.0	0.0
cocaina	5.8	18.2	30.6	0.0	25.0	18.2	0.0	10.8	1.0	8.7
crack, freebase	0.1	0.0	0.8	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3
amfetamine	0.8	0.0	3.6	12.3	8.3	2.3	100.0	3.0	0.0	4.3
MDMA e affini (ecstasy)	0.7	0.0	3.4	14.6	12.5	2.3	100.0	3.7	0.0	8.7
altri stimolanti	0.1	0.0	0.2	1.4	12.5	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0
barbiturici	0.3	0.0	1.8	0.9	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	4.3
benzodiazepine	4.1	45.5	20.4	5.7	0.0	4.5	0.0	0.6	1.0	8.7
altri sonniferi e tranquillanti	1.1	0.0	1.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.3	0.0	4.3
LSD	0.3	0.0	2.4	5.7	8.3	0.0	0.0	2.3	0.0	4.3
altri allucinogeni	0.3	0.0	1.6	4.7	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0
sostanze volatili (per es., solventi)	0.2	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
canapa	9.7	9.1	35.7	39.2	41.7	6.8	0.0	-	9.1	13.0
tabacco	30.8	27.3	33.9	32.5	25.0	22.7	0.0	32.0	-	13.0
altra/e sostanza/e	0.6	0.0	0.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
gioco patologico	0.3	0.0	0.0	0.5	0.0	2.3	0.0	0.2	0.0	0.0
disturbi alimentari	0.6	0.0	0.8	1.4	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	0.0
altri problemi assimilabili a una dipendenza	0.4	0.0	0.2	0.9	0.0	2.3	0.0	0.8	0.0	0.0
nessun altro problema di dipendenza	57.0	18.2	22.2	24.1	29.2	29.5	0.0	44.9	81.8	47.8
N**	2'350	11	496	212	24	44	1	641	99	23
<i>dati mancanti</i>	<i>1'483</i>	<i>5</i>	<i>203</i>	<i>96</i>	<i>16</i>	<i>20</i>	<i>1</i>	<i>362</i>	<i>77</i>	<i>10</i>

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T19.2a Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2009), uomini

Uomini

Pazienti: problema principale			
	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
	%	%	%
Altri problemi*			
alcol	7.8	0.0	0.0
cocktail (eroina e cocaina)	0.0	0.0	0.0
eroina	0.0	0.0	0.0
metadone	0.0	0.0	0.0
altri oppiacei	0.0	0.0	0.0
cocaina	0.0	0.0	2.9
crack, freebase	0.0	0.0	0.0
amfetamine	0.0	0.0	0.0
MDMA e affini (ecstasy)	0.0	0.0	0.0
altri stimolanti	0.0	0.0	0.0
barbiturici	0.0	0.0	0.0
benzodiazepine	0.0	0.0	0.0
altri sonniferi e tranquillanti	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0
altri allucinogeni	0.0	0.0	0.0
sostanze volatili (per es., solventi)	0.0	0.0	0.0
canapa	3.1	0.0	11.8
tabacco	10.9	0.0	8.8
altra/e sostanza/e	1.6	0.0	0.0
gioco patologico	-	0.0	2.9
disturbi alimentari	1.6	-	2.9
altri problemi assimilabili a una dipendenza	0.0	25.0	0.0
nessun altro problema di dipendenza	78.1	75.0	79.4
N**	64	4	34
<i>dati mancanti</i>	41	2	16

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T19.2b Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2009), donne

Donne

Pazienti: problema principale			
	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
	%	%	%
Altri problemi*			
alcol	16.7	15.2	12.5
cocktail (eroina e cocaina)	0.0	0.0	0.0
eroina	0.0	3.0	0.0
metadone	0.0	0.0	0.0
altri oppiacei	0.0	0.0	0.0
cocaina	0.0	3.0	0.0
crack, freebase	0.0	0.0	0.0
amfetamine	0.0	0.0	0.0
MDMA e affini (ecstasy)	0.0	0.0	0.0
altri stimolanti	0.0	0.0	0.0
barbiturici	0.0	0.0	0.0
benzodiazepine	0.0	0.0	0.0
altri sonniferi e tranquillanti	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0
altri allucinogeni	0.0	0.0	0.0
sostanze volatili (per es., solventi)	0.0	0.0	0.0
canapa	8.3	3.0	0.0
tabacco	8.3	6.1	0.0
altra/e sostanza/e	8.3	0.0	0.0
gioco patologico	-	0.0	12.5
disturbi alimentari	0.0	-	12.5
altri problemi assimilabili a una dipendenza	0.0	3.0	0.0
nessun altro problema di dipendenza	66.7	72.7	62.5
N**	12	33	8
<i>dati mancanti</i>	11	23	9

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T19.2c Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2009), uomini e donne

Uomini e donne

Pazienti: problema principale			
	Gioco patologico	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
	%	%	%
Altri problemi*			
alcol	9.2	13.5	2.4
cocktail (eroina e cocaina)	0.0	0.0	0.0
eroina	0.0	2.7	0.0
metadone	0.0	0.0	0.0
altri oppiacei	0.0	0.0	0.0
cocaina	0.0	2.7	2.4
crack, freebase	0.0	0.0	0.0
amfetamine	0.0	0.0	0.0
MDMA e affini (ecstasy)	0.0	0.0	0.0
altri stimolanti	0.0	0.0	0.0
barbiturici	0.0	0.0	0.0
benzodiazepine	0.0	0.0	0.0
altri sonniferi e tranquillanti	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0
altri allucinogeni	0.0	0.0	0.0
sostanze volatili (per es., solventi)	0.0	0.0	0.0
canapa	3.9	2.7	9.5
tabacco	10.5	5.4	7.1
altra/e sostanza/e	2.6	0.0	0.0
gioco patologico	-	0.0	4.8
disturbi alimentari	1.3	-	4.8
altri problemi assimilabili a una dipendenza	0.0	5.4	0.0
nessun altro problema di dipendenza	76.3	73.0	76.2
N**	76	37	42
<i>dati mancanti</i>	52	25	25

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T20 Frequenza del consumo di alcol, numero di "bicchieri standard" al giorno e frequenza di forti consumi di alcol prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2009)

	Pazienti: problema principale												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Frequenza del consumo di alcol*																
mai	12.4	10.7	11.9	17.6	19.8	18.1	10.3	14.3	10.9	14.7	13.6	14.5	13.9	14.0	13.9	520
1 volta al mese o meno	3.6	4.3	3.8	13.7	23.5	16.0	13.5	21.4	14.8	25.4	32.0	26.5	10.1	10.5	10.2	380
2 a 4 volte al mese	5.9	6.3	6.0	21.4	25.9	22.4	25.2	17.9	24.0	38.2	36.9	38.0	15.3	12.2	14.5	542
2 a 3 volte alla settimana	18.0	17.7	17.9	17.6	9.9	15.7	26.5	35.7	27.9	15.8	9.7	14.8	17.8	16.8	17.5	655
4 volte alla settimana o più	60.2	61.0	60.4	29.8	21.0	27.7	24.5	10.7	22.4	6.0	7.8	6.3	42.9	46.5	43.9	1'638
N**	1'704	672	2'376	262	81	343	155	28	183	532	103	635	2'763	972	3'735	3'735
<i>dati mancanti</i>	1'006	451	1'457	280	92	372	98	27	125	300	68	368	1'902	794	2'696	2'696
Numero di "bicchieri standard" al giorno***																
1 o 2	7.6	6.2	7.2	46.2	50.8	47.2	41.0	26.3	39.0	57.1	53.8	56.6	23.5	18.2	22.1	658
3 o 4	17.9	16.7	17.6	30.8	22.0	28.7	39.3	36.8	39.0	30.5	29.5	30.3	22.8	19.2	21.9	651
5 o 6	20.9	25.8	22.3	9.2	20.3	11.8	7.4	21.1	9.2	8.1	10.3	8.5	16.4	23.1	18.1	540
7 o 9	19.3	23.2	20.4	4.6	5.1	4.7	8.2	5.3	7.8	2.5	3.8	2.8	13.8	18.2	14.9	444
10 o più	34.3	28.1	32.6	9.2	1.7	7.5	4.1	10.5	5.0	1.8	2.6	1.9	23.5	21.4	23.0	684
N**	1'418	569	1'987	195	59	254	122	19	141	394	78	472	2'201	776	2'977	2'977
<i>dati mancanti</i>	1'292	554	1'846	347	114	461	131	36	167	438	93	531	2'464	990	3'454	3'454
Frequenza di forti consumi di alcol***																
mai	15.3	14.8	15.2	42.7	53.1	45.1	34.6	31.8	34.2	51.8	61.8	53.4	27.5	27.6	27.6	902
meno di una volta al mese	9.0	12.0	9.8	23.0	17.2	21.7	28.5	22.7	27.6	28.9	28.1	28.8	15.0	14.5	14.9	488
1 volta al mese	10.4	9.5	10.1	11.3	7.8	10.5	18.5	13.6	17.8	10.4	1.1	8.9	10.8	8.2	10.1	332
1 volta alla settimana	23.7	22.0	23.2	11.3	9.4	10.8	13.1	31.8	15.8	8.0	6.7	7.8	18.5	18.7	18.6	608
quasi ogni giorno	41.7	41.7	41.7	11.7	12.5	11.9	5.4	0.0	4.6	0.9	2.2	1.1	28.1	30.9	28.8	943
N**	1'539	600	2'139	213	64	277	130	22	152	450	89	539	2'419	854	3'273	3'273
<i>dati mancanti</i>	1'171	523	1'694	329	109	438	123	33	156	382	82	464	2'246	912	3'158	3'158

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che hanno indicato un consumo d'alcol. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T21 Frequenza del consumo di tabacco e numero di sigarette al giorno nel corso dei 30 ultimi giorni prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2009)

	Pazienti: problema principale												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Frequenza del consumo di tabacco*																
mai	29.4	34.1	30.7	5.0	1.3	4.1	9.0	10.0	9.2	21.0	25.0	21.7	23.2	26.4	24.0	672
1 giorno alla settimana o meno	0.9	1.0	0.9	0.5	0.0	0.3	1.6	0.0	1.4	4.8	2.9	4.4	1.8	1.1	1.6	45
2 a 3 giorni alla settimana	0.3	1.0	0.5	0.5	0.0	0.3	0.8	0.0	0.7	5.4	3.8	5.1	1.7	1.3	1.6	44
4 a 6 giorni alla settimana	0.7	0.7	0.7	0.0	1.3	0.3	0.8	0.0	0.7	3.0	1.0	2.6	1.2	0.8	1.1	31
1 volta al giorno	1.0	1.2	1.1	0.9	1.3	1.0	0.8	0.0	0.7	4.0	1.9	3.6	1.8	1.1	1.6	44
più volte al giorno	67.8	62.1	66.1	93.2	96.1	93.9	86.9	90.0	87.3	61.9	65.4	62.5	70.4	69.3	70.1	1'960
N**	1'049	419	1'468	219	76	295	122	20	142	504	104	608	2'047	749	2'796	2'796
<i>dati mancanti</i>	1'661	704	2'365	323	97	420	131	35	166	328	67	395	2'618	1'017	3'635	3'635
Numero di sigarette al giorno***																
0 a 10	14.0	16.0	14.6	11.1	7.8	10.3	21.4	29.4	22.6	50.6	45.1	49.6	24.4	21.0	23.5	443
11 a 20	39.8	47.5	41.9	54.0	43.8	51.4	57.1	58.8	57.4	39.9	43.7	40.5	43.0	46.1	43.8	826
21 a 30	28.9	26.9	28.3	24.3	34.4	26.9	19.4	5.9	17.4	8.4	7.0	8.2	21.8	23.5	22.2	419
31 o più	17.3	9.7	15.2	10.6	14.1	11.5	2.0	5.9	2.6	1.1	4.2	1.6	10.8	9.5	10.5	197
N**	648	238	886	189	64	253	98	17	115	356	71	427	1'399	486	1'885	1'885
<i>dati mancanti</i>	93	38	131	19	11	30	13	1	14	42	7	49	174	65	239	239

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che hanno indicato un consumo di tabacco. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T22a Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2009), uomini

Pazienti: principale sostanza problematica										
	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Obiettivo di consumo*										
astinenza definitiva	34.2	100.0	78.1	79.8	40.0	57.1	100.0	49.2	33.3	88.9
astinenza limitata nel tempo	22.3	0.0	3.1	6.1	20.0	7.1	0.0	9.1	11.1	0.0
consumo controllato	26.7	0.0	8.3	3.0	0.0	28.6	0.0	23.4	0.0	11.1
non è prevista nessuna limitazione	2.8	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	22.2	0.0
nessuna decisione finora	13.6	0.0	7.5	10.1	40.0	7.1	0.0	11.7	22.2	0.0
altro	0.4	0.0	1.8	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	11.1	0.0
N*	1'157	5	228	99	5	14	1	197	9	9
<i>dati mancanti</i>	1'553	7	302	154	17	18	1	635	83	10

T22b Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2009), donne

Obiettivo di consumo*										
astinenza definitiva	39.9	0.0	81.8	76.5	60.0	73.7	-	53.8	50.0	42.9
astinenza limitata nel tempo	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	12.8	0.0	0.0
consumo controllato	28.3	0.0	7.8	5.9	20.0	5.3	-	17.9	0.0	14.3
non è prevista nessuna limitazione	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	50.0	14.3
nessuna decisione finora	13.8	100.0	10.4	17.6	20.0	15.8	-	15.4	0.0	28.6
altro	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	-	0.0	0.0	0.0
N*	414	1	77	17	5	19	0	39	4	7
<i>dati mancanti</i>	709	3	92	38	13	13	0	132	80	7

T22c Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2009), uomini e donne

Obiettivo di consumo*										
astinenza definitiva	35.7	83.3	79.0	79.3	50.0	66.7	100.0	50.0	38.5	68.8
astinenza limitata nel tempo	20.7	0.0	2.3	5.2	10.0	3.0	0.0	9.7	7.7	0.0
consumo controllato	27.1	0.0	8.2	3.4	10.0	15.2	0.0	22.5	0.0	12.5
non è prevista nessuna limitazione	2.4	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	30.8	6.3
nessuna decisione finora	13.6	16.7	8.2	11.2	30.0	12.1	0.0	12.3	15.4	12.5
altro	0.4	0.0	1.3	0.9	0.0	3.0	0.0	1.7	7.7	0.0
N*	1'571	6	305	116	10	33	1	236	13	16
<i>dati mancanti</i>	2'262	10	394	192	30	31	1	767	163	17

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T23a Problemi psichici nel corso della vita (2009), uomini

Uomini

	Pazienti: problema principale									
	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problemi psichici*										
depressione grave	32.0	20.0	36.6	33.8	33.3	53.3	-	14.5	0.0	44.4
stati ansiosi/tensione nervosa grave	27.6	20.0	29.0	31.2	33.3	60.0	-	15.6	0.0	55.6
diff. di compr./memoria/concentrazion.	14.1	0.0	21.5	14.3	33.3	33.3	-	16.8	0.0	22.2
allucinazioni	2.4	20.0	5.9	2.6	33.3	6.7	-	4.5	0.0	0.0
diff. a controllare comp. violenti	13.4	20.0	19.4	15.6	0.0	13.3	-	12.3	37.5	66.7
problemi psichici curati con medicine	13.5	40.0	13.4	14.3	0.0	33.3	-	5.0	0.0	0.0
pensieri suicidi seri	13.9	0.0	19.9	15.6	33.3	46.7	-	10.6	0.0	22.2
tentativi di suicidio	6.6	0.0	12.9	9.1	0.0	33.3	-	5.0	0.0	22.2
altro/i problema/i psichico/i	2.1	0.0	3.2	2.6	0.0	6.7	-	1.7	0.0	0.0
nessuno	39.5	20.0	34.9	44.2	33.3	6.7	-	59.2	62.5	22.2
N**	957	5	186	77	3	15	0	179	8	9
<i>dati mancanti</i>	<i>1'753</i>	<i>7</i>	<i>344</i>	<i>176</i>	<i>19</i>	<i>17</i>	<i>2</i>	<i>653</i>	<i>84</i>	<i>10</i>

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T23b Problemi psichici nel corso della vita (2009), donne

Donne

	Pazienti: problema principale									
	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problemi psichici*										
depressione grave	47.0	100.0	38.6	43.8	0.0	71.4	-	45.9	25.0	66.7
stati ansiosi/tensione nervosa grave	39.7	100.0	40.0	43.8	0.0	92.9	-	27.0	25.0	66.7
diff. di compr./memoria/concentrazion.	14.6	0.0	10.0	31.3	20.0	35.7	-	21.6	25.0	33.3
allucinazioni	3.0	0.0	2.9	18.8	0.0	7.1	-	13.5	0.0	0.0
diff. a controllare comp. violenti	8.9	0.0	11.4	6.3	20.0	21.4	-	16.2	0.0	0.0
problemi psichici curati con medicine	21.4	0.0	28.6	31.3	20.0	28.6	-	13.5	25.0	0.0
pensieri suicidi seri	19.7	0.0	17.1	6.3	20.0	57.1	-	27.0	25.0	50.0
tentativi di suicidio	10.3	0.0	14.3	0.0	20.0	28.6	-	21.6	25.0	16.7
altro/i problema/i psichico/i	3.2	0.0	4.3	6.3	0.0	0.0	-	5.4	0.0	0.0
nessuno	23.0	0.0	34.3	37.5	60.0	0.0	-	35.1	50.0	33.3
N**	370	1	70	16	5	14	0	37	4	6
<i>dati mancanti</i>	753	3	99	39	13	18	0	134	80	8

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T23c Problemi psichici nel corso della vita (2009), uomini e donne

Uomini e donne

	Pazienti: problema principale									
	Alcol	Cocktail	Oppiacei	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problemi psichici*										
depressione grave	36.2	33.3	37.1	35.5	12.5	62.1	-	19.9	8.3	53.3
stati ansiosi/tensione nervosa grave	31.0	33.3	32.0	33.3	12.5	75.9	-	17.6	8.3	60.0
diff. di compr./memoria/concentrazion.	14.2	0.0	18.4	17.2	25.0	34.5	-	17.6	8.3	26.7
allucinazioni	2.6	16.7	5.1	5.4	12.5	6.9	-	6.0	0.0	0.0
diff. a controllare comp. violenti	12.1	16.7	17.2	14.0	12.5	17.2	-	13.0	25.0	40.0
problemi psichici curati con medicine	15.7	33.3	17.6	17.2	12.5	31.0	-	6.5	8.3	0.0
pensieri suicidi seri	15.5	0.0	19.1	14.0	25.0	51.7	-	13.4	8.3	33.3
tentativi di suicidio	7.6	0.0	13.3	7.5	12.5	31.0	-	7.9	8.3	20.0
altro/i problema/i psichico/i	2.4	0.0	3.5	3.2	0.0	3.4	-	2.3	0.0	0.0
nessuno	34.9	16.7	34.8	43.0	50.0	3.4	-	55.1	58.3	26.7
N**	1'327	6	256	93	8	29	0	216	12	15
<i>dati mancanti</i>	<i>2'506</i>	<i>10</i>	<i>443</i>	<i>215</i>	<i>32</i>	<i>35</i>	<i>2</i>	<i>787</i>	<i>164</i>	<i>18</i>

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T24 Parenti/conoscenti: legame tra l'utente e la persona sintomatica (2009)

Parenti o conoscenti				
	Uomini	Donne	Totale	
	%	%	%	N
L'utente è... *				
madre/padre	26.5	27.0	26.9	255
figlio/figlia	10.8	14.2	13.5	128
sorella/fratello	5.4	4.8	5.0	47
partner	39.7	46.7	45.2	429
altro parente	1.0	2.6	2.2	21
collega/amico/a	2.0	2.1	2.1	20
datore di lavoro/docente	2.9	0.5	1.1	10
tutore/curatore	0.0	0.0	0.0	0
altro	11.8	2.0	4.1	39
N**	204	745	949	949
<i>dati mancanti</i>	9	38	47	47

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T25 Parenti/conoscenti: problema principale e altri problemi della persona sintomatica (2009)

Parenti o conoscenti					
	Totale			Totale	
	%	N		%	N
Problema principale della persona sintomatica*			Altri problemi della persona sintomatica***		
alcol	69.2	660	alcol	25.6	91
cocktail (eroina e cocaina)	0.8	8	cocktail (eroina e cocaina)	1.4	5
eroina	4.8	46	eroina	3.4	12
metadone	0.2	2	metadone	3.4	12
altri oppiacei	0.2	2	altri oppiacei	1.1	4
cocaina	2.8	27	cocaina	8.4	30
crack, freebase	0.1	1	crack, freebase	0.3	1
amfetamine	0.5	5	amfetamine	1.4	5
MDMA e affini (ecstasy)	0.0	0	MDMA e affini (ecstasy)	1.1	4
altri stimolanti	0.0	0	altri stimolanti	0.0	0
barbiturici	1.5	14	barbiturici	0.3	1
benzodiazepine	0.5	5	benzodiazepine	5.6	20
altri sonniferi e tranquillanti	0.1	1	altri sonniferi e tranquillanti	1.4	5
LSD	0.0	0	LSD	0.0	0
altri allucinogeni	0.7	7	altri allucinogeni	0.0	0
sostanze volatili (per es., solventi)	0.0	0	sostanze volatili (per es., solventi)	0.8	3
canapa	10.7	102	canapa	20.2	72
tabacco	0.6	6	tabacco	22.8	81
altra/e sostanza/e	0.5	5	altra/e sostanza/e	0.0	0
gioco patologico	1.6	15	gioco patologico	0.8	3
disturbi alimentari	1.5	14	disturbi alimentari	1.4	5
altri problemi assimilabili a una dipendenza	3.6	34	altri problemi assimilabili a una dipendenza	3.7	13
			nessun altro problema di dipendenza	31.5	112
N**	954	954	N**	356	356
<i>dati mancanti</i>	<i>42</i>	<i>42</i>	<i>dati mancanti</i>	<i>639</i>	<i>639</i>

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

*** Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

T26 Parenti/conoscenti: Problemi della persona di contatto legati ai problemi della persona sintomatica (2009)

Parenti o conoscenti				
	Uomini	Donne	Totale	
	%	%	%	N
propri problemi*				
propri problemi di consumo	3.5	9.7	8.7	32
propri comportamenti di dipendenza	3.5	0.6	1.1	4
propri problemi somatici	7.0	5.8	6.0	22
propri problemi psichici	21.1	33.9	31.9	117
problemi con il/la partner	35.1	46.5	44.7	164
problemi di famiglia	45.6	54.8	53.4	196
problemi finanziari	12.3	11.9	12.0	44
propri problemi prof./di formazione	1.8	3.5	3.3	12
problemi di alloggio	8.8	4.2	4.9	18
problemi di violenza (vittima)	8.8	10.0	9.8	36
problemi per controllare la violenza	1.8	1.3	1.4	5
problemi giuridici	0.0	2.9	2.5	9
altro/i	0.0	0.6	0.5	2
nessuno	24.6	15.5	16.9	62
N**	57	310	367	367
<i>dati mancanti</i>	<i>156</i>	<i>473</i>	<i>629</i>	<i>629</i>

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T27 Sesso e età dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale¹) e dei parenti o conoscenti (2009)

	Pazienti: problema principale ¹												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Sesso*																			
maschile			69.6			72.9			76.2			83.2			22.0			64.6	4'226
femminile			30.4			27.1			23.8			16.8			78.0			35.4	2'314
sex non noto			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	0
N**	2'307	1'007	3'314	488	181	669	243	76	319	717	145	862	203	718	921	4'226	2'314	6'540	6'540
Età (in anni)*																			
fino a 14 anni	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	3.4	4.2	1.0	0.7	0.8	0.9	0.7	0.8	54
15-19	1.9	2.7	2.1	2.7	4.4	3.1	3.3	18.4	6.9	60.8	57.2	60.2	9.0	3.1	4.4	13.2	7.6	11.2	731
20-24	4.4	3.3	4.1	12.7	16.6	13.8	16.5	19.7	17.2	14.9	20.7	15.9	3.5	4.3	4.1	8.3	7.2	7.9	516
25-29	6.3	5.8	6.2	18.0	21.5	19.0	23.5	23.7	23.5	8.9	8.3	8.8	3.0	6.4	5.7	9.5	8.6	9.2	598
30-34	8.8	6.4	8.1	16.6	18.2	17.0	20.6	18.4	20.1	5.3	4.1	5.1	2.5	9.2	7.8	9.5	8.5	9.2	600
35-39	12.7	7.8	11.2	20.7	15.5	19.3	17.7	6.6	15.0	2.0	2.8	2.1	9.0	10.8	10.4	11.9	9.4	11.0	719
40-44	15.2	16.5	15.6	16.2	15.5	16.0	8.2	7.9	8.2	2.1	2.1	2.1	8.0	15.7	14.0	12.2	14.4	13.0	847
45-49	14.8	17.6	15.6	8.8	6.6	8.2	7.0	1.3	5.6	1.3	1.4	1.3	18.4	17.1	17.4	11.3	14.5	12.4	810
50-54	12.9	16.4	14.0	3.5	1.1	2.8	1.6	2.6	1.9	0.1	0.0	0.1	14.9	10.8	11.7	8.6	11.2	9.5	620
55-59	10.3	10.2	10.3	0.4	0.6	0.4	1.6	0.0	1.3	0.3	0.0	0.2	10.0	10.2	10.2	6.5	8.3	7.1	465
60-64	6.5	7.0	6.6	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	4.9	5.7	4.2	4.7	4.4	288
65-69	3.3	3.7	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	6.0	3.1	3.7	2.2	2.6	2.4	154
70-74	1.9	1.5	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.1	2.3	1.2	1.3	1.2	79
75 e più	0.9	1.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	1.7	2.1	0.6	1.0	0.8	49
N**	2'303	1'006	3'309	488	181	669	243	76	319	717	145	862	201	715	916	4'220	2'310	6'530	6'530
<i>dati mancanti</i>	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	6	4	10	10
Età																			
media	45.2	46.4	45.6	34.9	32.9	34.4	32.6	28.9	31.7	21.1	21.1	21.1	47.4	44.8	45.4	38.7	41.8	39.8	
deviazione standard	12.7	12.6	12.6	8.8	8.6	8.8	8.6	9.5	8.9	7.0	6.9	7.0	16.1	13.4	14.0	14.7	14.3	14.6	
1° quartile	36.7	39.1	37.3	28.2	26.0	27.6	25.6	21.8	25.0	16.9	16.7	16.9	39.0	35.8	36.5	26.5	30.7	27.8	
mediana	45.4	47.4	45.9	35.0	32.1	34.3	31.2	26.5	30.6	18.2	18.0	18.2	48.7	44.9	46.0	38.7	42.8	40.3	
3° quartile	54.2	54.2	54.2	41.2	39.9	40.7	37.8	34.3	37.1	23.2	23.4	23.2	57.2	54.0	54.5	49.3	51.5	50.1	
N**	2'303	1'006	3'309	488	181	669	243	76	319	717	145	862	201	715	916	4'220	2'310	6'530	
<i>dati mancanti</i>	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	6	4	10	

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T28 Stato civile e grado di urbanizzazione del domicilio dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale¹) e dei parenti o conoscenti (2009)

	Pazienti: problema principale ¹												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Stato civile*																			
celibe/nubile	41.0	32.5	38.4	76.9	76.1	76.7	72.9	69.8	72.2	95.2	92.4	94.6	18.9	23.9	22.8	54.9	39.6	49.3	2'821
sposato	31.7	30.7	31.4	10.7	8.2	10.1	12.5	9.4	11.8	2.9	4.5	3.2	62.2	53.9	55.7	25.1	33.4	28.1	1'608
separato-a (giuridicamente)	5.8	6.8	6.1	3.9	3.7	3.8	2.1	3.8	2.4	0.9	0.0	0.7	3.9	3.7	3.7	4.4	4.7	4.5	260
divorziato-a	19.8	25.6	21.6	7.4	9.0	7.8	10.9	15.1	11.8	1.0	2.3	1.3	12.2	14.7	14.2	14.2	18.5	15.7	900
vedovo-a	1.5	4.1	2.3	0.3	1.5	0.6	0.0	1.9	0.4	0.0	0.0	0.0	2.2	2.7	2.6	1.0	2.9	1.7	97
unione registrata	0.2	0.3	0.3	0.8	1.5	1.0	1.6	0.0	1.2	0.0	0.8	0.1	0.6	1.2	1.1	0.4	0.8	0.5	31
N**	2'095	906	3'001	363	134	497	192	53	245	578	132	710	180	675	855	3'646	2'071	5'717	5'717
<i>dati mancanti</i>	212	101	313	125	47	172	51	23	74	139	13	152	23	43	66	580	243	823	823
Grado di urbanizzazione*																			
grandi centri urbani	9.3	9.7	9.4	1.5	0.7	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	9.7	8.9	5.8	7.6	6.4	382
periferia dei grandi centri	14.9	17.0	15.6	4.1	2.2	3.6	7.5	7.1	7.5	3.5	1.5	3.1	16.7	13.9	14.5	11.1	12.7	11.6	692
città di media importanza	13.3	14.3	13.6	22.9	23.9	23.2	29.1	30.4	29.4	26.8	23.7	26.2	19.9	19.0	19.2	18.5	18.2	18.4	1'095
piccole città	33.8	32.6	33.5	49.9	39.9	47.3	39.2	39.3	39.2	37.7	36.3	37.4	27.4	29.8	29.3	36.5	33.7	35.5	2'110
campagna	28.6	26.4	27.9	21.6	33.3	24.7	24.1	23.2	23.9	32.1	38.5	33.2	30.1	27.6	28.1	28.1	27.9	28.0	1'666
N**	2'157	946	3'103	393	138	531	199	56	255	608	135	743	186	699	885	3'790	2'155	5'945	5'945
<i>dati mancanti</i>	150	61	211	95	43	138	44	20	64	109	10	119	17	19	36	436	159	595	595

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T29 Tipo di nucleo familiare, situazione di domicilio e tipo di relazione di coppia dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale¹) e dei parenti o conoscenti (2009)

	Pazienti: problema principale ¹												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Tipo di nucleo familiare*																			
da solo-a	39.0	36.8	38.3	43.5	34.5	41.1	48.8	25.0	43.6	10.7	16.1	11.7	14.0	15.3	15.0	32.8	27.7	31.0	1'274
con i genitori/un genitore	7.2	4.0	6.2	16.7	11.5	15.3	12.6	19.4	14.1	72.2	55.4	69.0	6.1	4.2	4.6	21.3	10.2	17.3	713
con figlio-a-i	1.5	13.2	5.0	1.2	3.4	1.8	1.6	5.6	2.5	0.6	1.8	0.8	8.8	17.6	15.9	1.6	12.6	5.5	227
con un-a partner (senza figli)	23.9	24.6	24.1	13.4	29.9	17.7	11.8	16.7	12.9	2.3	7.1	3.2	29.8	24.8	25.8	18.6	22.9	20.2	829
con un-a partner e figlio-a-i	19.9	14.6	18.3	11.0	9.2	10.5	15.0	8.3	13.5	2.9	0.9	2.5	38.6	34.4	35.2	16.3	18.8	17.2	707
con altri parenti-familiari	1.0	0.5	0.8	0.8	0.0	0.6	0.8	5.6	1.8	1.9	1.8	1.8	0.0	1.5	1.2	1.1	1.1	1.1	46
con amici (comunità abitativa)	2.5	2.9	2.6	3.7	2.3	3.3	3.9	0.0	3.1	2.5	3.6	2.7	1.8	1.1	1.2	2.6	2.3	2.5	103
altro	5.1	3.6	4.6	9.8	9.2	9.6	5.5	19.4	8.6	7.0	13.4	8.2	0.9	1.1	1.0	5.6	4.4	5.2	213
N**	1'503	631	2'134	246	87	333	127	36	163	485	112	597	114	471	585	2'650	1'462	4'112	4'112
<i>dati mancanti</i>	804	376	1'180	242	94	336	116	40	156	232	33	265	89	247	336	1'576	852	2'428	2'428
Situazione di domicilio*																			
domicilio fisso	92.6	92.8	92.6	77.4	78.1	77.6	86.4	75.0	83.8	90.9	89.9	90.8	98.4	97.0	97.3	90.9	92.5	91.4	4'061
senza domicilio fisso	5.3	5.3	5.3	19.2	19.0	19.1	10.4	15.9	11.6	5.7	7.3	6.0	0.8	3.0	2.6	6.8	6.1	6.5	290
istituzione	2.1	1.9	2.0	3.4	2.9	3.3	3.2	9.1	4.5	3.3	2.8	3.2	0.8	0.0	0.2	2.4	1.5	2.0	91
N**	1'612	683	2'295	292	105	397	154	44	198	508	109	617	127	495	622	2'878	1'564	4'442	4'442
<i>dati mancanti</i>	695	324	1'019	196	76	272	89	32	121	209	36	245	76	223	299	1'348	750	2'098	2'098
Tipo di relazione di coppia*																			
senza partner, sola-a	29.9	35.0	31.4	48.7	35.1	44.9	40.4	26.1	37.6	68.2	52.2	64.9	14.7	21.2	19.8	36.3	31.4	34.5	1'095
relazione-i saltuaria-e	5.0	5.4	5.1	4.2	9.5	5.7	7.4	8.7	7.7	8.6	13.0	9.5	2.9	1.0	1.4	5.3	4.6	5.0	160
relazione fissa, vivendo separat.	11.7	13.0	12.1	12.2	10.8	11.8	13.8	30.4	17.1	12.4	18.8	13.7	5.9	9.8	9.0	11.6	13.1	12.2	387
relazione fissa, vivendo insieme	53.4	46.6	51.4	34.9	44.6	37.6	38.3	34.8	37.6	10.9	15.9	11.9	76.5	68.0	69.7	46.7	50.9	48.3	1'531
N**	1'228	517	1'745	189	74	263	94	23	117	267	69	336	102	397	499	2'001	1'172	3'173	3'173
<i>dati mancanti</i>	1'079	490	1'569	299	107	406	149	53	202	450	76	526	101	321	422	2'225	1'142	3'367	3'367

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T30 Più alta formazione portata a termine, fonte di reddito principale e attività principale dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale¹) e dei parenti o conoscenti (2009)

	Pazienti: problema principale ¹												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Più alta formazione portata a termine**																			
nessuna form. terminata	5.2	8.5	6.2	10.8	14.7	11.8	8.7	5.6	8.1	22.3	21.3	22.1	8.2	6.5	6.8	9.9	9.8	9.9	389
scuola dell'obbligo	12.5	16.0	13.5	31.5	38.9	33.4	15.4	50.0	22.2	52.1	46.3	51.1	8.2	13.5	12.4	22.8	20.6	22.1	866
scolarità complementare	3.3	3.3	3.3	1.8	4.2	2.4	4.7	5.6	4.9	3.3	5.6	3.7	4.1	3.0	3.2	3.3	3.7	3.4	134
apprendistato/ scuola profes.	59.5	53.7	57.8	49.5	36.8	46.3	54.4	30.6	49.7	19.3	20.4	19.5	49.0	56.6	55.0	48.9	48.6	48.8	1'916
liceo/diploma	2.9	5.4	3.6	3.2	2.1	2.9	5.4	5.6	5.4	2.0	1.9	1.9	6.1	5.1	5.3	3.3	5.1	3.9	154
magistrale, scuola pedagogic.	1.1	1.6	1.2	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.3	3.1	3.8	3.6	0.8	2.1	1.2	48
form. profession. superiore	6.9	5.6	6.6	1.1	1.1	1.1	7.4	2.8	6.5	0.4	1.9	0.6	13.3	4.3	6.2	5.3	4.7	5.1	199
scuola profession. superiore	1.7	0.7	1.4	0.4	1.1	0.5	2.0	0.0	1.6	0.4	0.9	0.5	2.0	0.3	0.6	1.3	0.5	1.1	42
alta scuola specializzata	3.0	1.2	2.5	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	2.0	2.4	2.3	1.8	1.5	1.7	66
università, politecnico	3.8	4.0	3.8	1.1	1.1	1.1	1.3	0.0	1.1	0.2	0.0	0.2	4.1	4.6	4.5	2.7	3.3	2.9	113
N**	1'439	574	2'013	279	95	374	149	36	185	512	108	620	98	371	469	2'637	1'290	3'927	3'927
<i>dati mancanti</i>	868	433	1'301	209	86	295	94	40	134	205	37	242	105	347	452	1'589	1'024	2'613	2'613
Fonte di reddito principale*																			
reddito da lavoro	54.9	42.7	51.3	30.5	26.3	29.4	70.7	33.3	62.0	22.4	23.1	22.5	67.6	57.8	59.9	48.0	45.1	47.0	2'229
risparmi	1.3	0.3	1.0	1.0	0.0	0.7	1.9	0.0	1.5	0.2	0.9	0.3	0.0	0.6	0.5	1.0	0.4	0.8	39
rendita (AVS/AI, ecc.)	17.7	17.9	17.8	14.6	20.2	16.1	7.6	14.6	9.3	2.9	2.6	2.9	20.4	12.3	14.1	14.0	14.9	14.3	678
assistenz./previdenza sociale	14.1	13.7	14.0	38.1	36.8	37.8	11.5	27.1	15.1	6.2	15.4	7.9	3.5	2.1	2.4	14.1	11.4	13.2	624
assicurazione disoccupazione	7.1	5.9	6.7	7.6	7.0	7.5	3.8	6.3	4.4	3.1	2.6	3.0	2.8	0.8	1.2	6.0	4.0	5.3	250
sostegno del/della partner	0.9	14.0	4.8	1.3	0.9	1.2	0.6	4.2	1.5	0.4	0.9	0.5	0.7	21.4	16.9	0.9	13.6	5.4	255
sosteg. genitori/familiari/amici	2.3	3.2	2.5	2.2	2.6	2.3	2.5	12.5	4.9	63.5	51.3	61.3	3.5	3.9	3.8	14.1	8.1	12.0	570
spacciando/tagliando	0.1	0.0	0.0	1.3	2.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	9
altre entrate illegali	0.1	0.0	0.1	0.3	0.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	4
prostituzione	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
altra-e	1.5	2.3	1.8	3.2	2.6	3.0	1.3	2.1	1.5	1.1	3.4	1.5	1.4	1.2	1.2	1.6	2.2	1.8	86
N**	1'708	728	2'436	315	114	429	157	48	205	545	117	662	142	519	661	3'068	1'676	4'744	4'744
<i>dati mancanti</i>	599	279	878	173	67	240	86	28	114	172	28	200	61	199	260	1'158	638	1'796	1'796
Attività principale (nel corso dei 30 ultimi giorni)*																			
att. a tempo pieno (70% o più)	52.0	29.1	45.2	28.4	14.9	24.9	63.2	23.3	55.8	17.8	14.9	17.3	61.0	42.3	46.4	44.2	32.1	40.0	1'638
attività a tempo parziale	5.0	18.1	8.9	4.4	8.0	5.3	8.3	6.7	8.0	2.8	4.4	3.1	4.2	27.0	22.1	4.6	18.0	9.3	380
varie attività occas.	1.2	1.4	1.3	2.4	2.3	2.4	0.8	3.3	1.2	0.6	2.6	1.0	0.8	1.2	1.1	1.1	1.5	1.2	51
in formazione	2.2	3.0	2.5	2.4	3.4	2.7	4.5	13.3	6.1	63.0	56.1	61.7	4.2	4.7	4.6	14.9	9.6	13.0	534
inattivo sul mercat. del lavor.	22.2	30.8	24.8	20.4	31.0	23.1	10.5	23.3	12.9	4.0	7.9	4.8	20.3	20.5	20.4	17.3	24.4	19.8	810
disoccup., ricerc. di un lavoro	11.3	11.6	11.4	20.4	19.5	20.2	7.5	16.7	9.2	6.3	5.3	6.1	4.2	1.6	2.2	10.5	8.3	9.7	398
disoccupato, lav. fut. garant.	0.3	0.3	0.3	1.6	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	14
altra	5.8	5.6	5.7	20.0	20.7	20.2	5.3	13.3	6.7	5.5	8.8	6.1	5.1	2.6	3.1	6.9	5.8	6.5	267
N**	1'486	623	2'109	250	87	337	133	30	163	494	114	608	118	430	548	2'667	1'425	4'092	4'092
<i>dati mancanti</i>	821	384	1'205	238	94	332	110	46	156	223	31	254	85	288	373	1'559	889	2'448	2'448

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T31 Statuto professionale e reddito mensile netto dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale¹) e dei parenti o conoscenti (2009)

	Pazienti: problema principale ¹												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			N
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Statuto professionale*																			
senza attività professionale	34.3	45.4	37.5	53.2	73.3	57.8	19.4	46.2	24.0	15.3	25.0	16.8	19.6	23.4	22.7	33.0	38.5	34.9	622
apprendista, praticante	1.4	0.7	1.2	4.5	4.4	4.5	1.6	0.0	1.3	35.1	25.0	33.5	4.3	1.5	2.0	6.1	2.8	4.9	88
manovale, operaio-a ausiliar.	3.7	4.1	3.8	7.1	2.2	6.0	6.5	7.7	6.7	3.8	8.3	4.5	0.0	2.4	2.0	4.0	3.7	3.9	70
operaio-a con formaz. pratica	4.4	5.4	4.7	8.4	4.4	7.5	8.1	7.7	8.0	1.5	4.2	1.9	0.0	3.9	3.2	5.4	4.9	5.2	93
oper. con form. certif. (AFC)	10.3	3.7	8.4	15.6	4.4	13.1	17.7	0.0	14.7	8.4	4.2	7.7	6.5	11.2	10.4	10.9	6.1	9.3	165
caposquadra	3.8	0.3	2.8	0.6	0.0	0.5	4.8	0.0	4.0	0.8	0.0	0.6	2.2	0.0	0.4	2.9	0.2	2.0	35
impiegato-a non qualificato-a	17.3	27.8	20.4	7.1	8.9	7.5	16.1	15.4	16.0	5.3	4.2	5.2	8.7	27.3	23.9	14.2	24.9	17.9	319
impieg. qualif., quadro medio	10.2	4.4	8.5	2.6	2.2	2.5	11.3	7.7	10.7	0.0	4.2	0.6	8.7	12.7	12.0	7.7	7.1	7.5	134
imp. funz. dirett., quadr. sup.	3.5	1.0	2.8	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	2.7	0.8	0.0	0.6	8.7	3.4	4.4	2.7	1.6	2.4	42
indipendente	9.4	5.4	8.3	0.6	0.0	0.5	9.7	7.7	9.3	2.3	0.0	1.9	34.8	8.8	13.5	8.2	5.8	7.4	132
scolaro-a, studente	0.7	1.4	0.9	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.3	26.0	25.0	25.8	6.5	2.4	3.2	4.1	2.9	3.7	66
altro statuto	1.0	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	1.3	0.8	0.0	0.6	0.0	2.9	2.4	0.7	1.5	1.0	17
N**	709	295	1'004	154	45	199	62	13	75	131	24	155	46	205	251	1'165	618	1'783	1'783
<i>dati mancanti</i>	<i>1'598</i>	<i>712</i>	<i>2'310</i>	<i>334</i>	<i>136</i>	<i>470</i>	<i>181</i>	<i>63</i>	<i>244</i>	<i>586</i>	<i>121</i>	<i>707</i>	<i>157</i>	<i>513</i>	<i>670</i>	<i>3'061</i>	<i>1'696</i>	<i>4'757</i>	<i>4'757</i>
Reddito mensile netto*																			
nessun reddito	26.0	38.9	29.4	19.4	14.8	18.4	18.4	25.0	19.6	42.6	41.2	42.4	17.6	11.7	12.8	26.4	29.6	27.3	308
fino a 1000 fr.	3.7	6.9	4.6	19.4	22.2	20.0	10.5	25.0	13.0	33.3	35.3	33.6	11.8	7.8	8.5	10.8	9.8	10.5	118
da 1001 a 2000 fr.	6.0	9.7	7.0	17.3	14.8	16.8	13.2	12.5	13.0	7.4	11.8	8.0	0.0	9.1	7.4	7.4	10.7	8.3	94
da 2001 a 3000 fr.	15.4	22.3	17.2	22.4	33.3	24.8	13.2	25.0	15.2	2.8	0.0	2.4	0.0	9.1	7.4	13.8	18.6	15.2	171
da 3001 a 4000 fr.	13.5	8.6	12.2	12.2	7.4	11.2	13.2	0.0	10.9	5.6	0.0	4.8	5.9	22.1	19.1	12.9	12.2	12.7	143
da 4001 a 5000 fr.	12.5	7.4	11.1	6.1	7.4	6.4	21.1	12.5	19.6	8.3	11.8	8.8	23.5	18.2	19.1	12.1	10.1	11.5	130
da 5001 a 6000 fr.	13.1	2.9	10.4	3.1	0.0	2.4	7.9	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	5.9	15.6	13.8	9.4	5.8	8.3	94
da 6001 a 8000 fr.	7.1	3.4	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.5	6.5	9.6	5.0	3.4	4.5	51
da 8001 a 10 000 fr.	1.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.7	8
da 10 001 a 15 000 fr.	1.5	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	1.1	1.0	0.0	0.7	8
più di 15 000 fr.	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	1.1	0.3	0.0	0.2	2
N**	481	175	656	98	27	125	38	8	46	108	17	125	17	77	94	799	328	1'127	1'127
<i>dati mancanti</i>	<i>1'826</i>	<i>832</i>	<i>2'658</i>	<i>390</i>	<i>154</i>	<i>544</i>	<i>205</i>	<i>68</i>	<i>273</i>	<i>609</i>	<i>128</i>	<i>737</i>	<i>186</i>	<i>641</i>	<i>827</i>	<i>3'427</i>	<i>1'986</i>	<i>5'413</i>	<i>5'413</i>

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T32a Ragione principale della fine del trattamento/accompagnamento dei pazienti (in rapporto al problema principale¹) e dei parenti o conoscenti (2009)

Ragione principale*	Pazienti: problema principale ¹												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
conclus. pianific. senza passag.	45.1	46.8	45.6	23.7	23.8	23.7	35.6	23.7	32.7	63.2	58.3	62.4	59.9	68.0	66.2	46.3	52.5	48.5	3'144
conclus. pianific. con passag.	9.0	8.6	8.9	17.0	13.3	16.0	12.6	13.2	12.7	5.5	7.6	5.8	5.4	3.5	3.9	9.4	7.2	8.6	559
cambio di domicilio	2.9	3.0	2.9	5.4	6.6	5.7	2.1	6.6	3.2	1.4	2.8	1.6	0.5	0.6	0.5	2.6	2.6	2.6	170
ospedalizzazione	0.8	1.0	0.9	1.0	1.7	1.2	0.4	2.6	1.0	0.1	0.7	0.2	0.0	0.1	0.1	0.6	0.8	0.7	46
incarcerazione	0.3	0.1	0.3	2.3	0.6	1.8	0.8	0.0	0.6	1.0	0.0	0.8	0.5	0.0	0.1	0.7	0.1	0.5	32
perdita di contatto	26.3	25.1	25.9	32.4	36.5	33.5	31.8	39.5	33.7	16.8	21.5	17.6	22.8	20.0	20.6	25.3	24.4	25.0	1'619
conclusione esplicita	11.5	11.0	11.4	12.9	11.0	12.4	13.8	9.2	12.7	9.7	6.9	9.2	8.9	5.2	6.0	11.1	8.5	10.2	658
decesso	1.9	2.2	2.0	3.7	4.4	3.9	1.3	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.4	1.5	98
altre cause	2.1	2.1	2.1	1.7	2.2	1.8	1.7	3.9	2.2	2.4	2.1	2.3	2.0	2.7	2.5	2.3	2.5	2.4	155
N**	2'287	989	3'276	482	181	663	239	76	315	714	144	858	202	716	918	4'190	2'291	6'481	6'481
<i>dati mancanti</i>	20	18	38	6	0	6	4	0	4	3	1	4	1	2	3	36	23	59	59

T32b Destinazione dei trasferimenti dei pazienti (in rapporto al problema principale¹) e dei parenti o conoscenti (2009)

Destinazione dei trasferimenti***	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
terapia residenziale	26.8	30.8	27.8	34.5	28.6	33.3	57.1	12.5	40.9	31.6	20.0	29.2	14.3	11.1	12.5	31.4	24.1	29.4	88
consulenza ambulatoriale	50.0	53.8	51.0	34.5	28.6	33.3	35.7	50.0	40.9	52.6	40.0	50.0	71.4	55.6	62.5	46.8	50.6	47.8	143
appartamento protetto	5.4	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	4.5	5.3	20.0	8.3	0.0	0.0	0.0	3.2	2.5	3.0	9
altra istituzione specializzata	17.9	15.4	17.2	30.9	42.9	33.3	7.1	25.0	13.6	10.5	20.0	12.5	14.3	33.3	25.0	18.6	22.8	19.7	59
N**	112	39	151	55	14	69	14	8	22	19	5	24	7	9	16	220	79	299	299
<i>dati mancanti</i>	94	46	140	27	10	37	16	2	18	20	6	26	4	16	20	174	86	260	260

T32c Causa di decesso dei pazienti (in rapporto al problema principale¹) e dei parenti o conoscenti (2009)

Cause di decesso****	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
suicidio	12.5	0.0	8.6	33.3	0.0	21.4	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	17.1	0.0	11.3	6
infortunio	8.3	9.1	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	5.7	5.6	5.7	3
malattia	70.8	72.7	71.4	11.1	40.0	21.4	50.0	0.0	33.3	-	-	-	-	-	-	54.3	61.1	56.6	30
overdose o intossicazione acuta	8.3	18.2	11.4	55.6	40.0	50.0	0.0	100.0	33.3	-	-	-	-	-	-	20.0	27.8	22.6	12
altre cause di decesso	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	7.1	50.0	0.0	33.3	-	-	-	-	-	-	2.9	5.6	3.8	2
N**	24	11	35	9	5	14	2	1	3	0	0	0	0	0	0	35	18	53	53
<i>dati mancanti</i>	20	11	31	9	3	12	1	0	1	0	0	0	0	0	0	31	14	45	45

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti trasferiti. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

**** I risultati si basano solamente sui clienti deceduti durante l'intervento. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T33 Durata dell'intervento sui pazienti (in rapporto al problema principale¹) e sui parenti o conoscenti (2009)

	Pazienti: problema principale ¹												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
Durata della presa in carico* (%)																			
1 settimana o meno	4.6	4.6	4.6	1.2	0.6	1.0	0.8	0.0	0.6	4.5	1.4	3.9	7.4	6.8	7.0	4.5	5.2	4.7	308
> 1 settimana a 1 mese	3.7	2.3	3.2	3.7	1.7	3.1	1.2	1.3	1.3	11.0	14.5	11.6	4.9	2.2	2.8	4.9	3.0	4.2	274
> 1 a 2 mesi	3.8	4.1	3.9	5.1	1.7	4.2	0.4	5.3	1.6	9.6	9.7	9.6	5.4	4.0	4.3	5.0	4.2	4.7	307
> 2 a 3 mesi	3.3	4.8	3.7	2.7	3.4	2.8	4.5	0.0	3.4	4.3	7.6	4.9	4.9	4.7	4.8	3.6	4.7	4.0	260
> 3 a 6 mesi	11.7	13.7	12.3	8.8	6.1	8.1	7.4	9.2	7.8	14.2	11.7	13.8	16.3	16.3	16.3	12.0	13.8	12.6	824
> 6 mesi a 1 anno	29.2	27.4	28.6	29.7	29.6	29.7	32.9	36.8	33.9	31.5	35.9	32.3	27.6	37.7	35.4	30.2	32.2	30.9	2'015
> 1 a 2 anni	25.2	25.4	25.2	21.1	26.3	22.5	29.2	26.3	28.5	18.4	13.1	17.5	22.7	18.7	19.6	23.0	21.9	22.6	1'475
> 2 a 3 anni	8.7	8.7	8.7	10.0	7.3	9.3	11.9	14.5	12.5	3.9	2.8	3.7	7.4	5.4	5.9	7.9	7.0	7.6	496
> 3 a 5 anni	6.9	5.6	6.5	12.9	14.0	13.2	8.6	5.3	7.8	2.1	1.4	2.0	3.0	2.5	2.6	6.4	4.9	5.9	384
> 5 a 10 anni	2.4	3.2	2.6	3.9	7.8	4.9	2.9	1.3	2.5	0.4	2.1	0.7	0.5	1.4	1.2	2.1	2.7	2.3	151
più di 10 anni	0.6	0.3	0.5	0.8	1.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	0.3	0.4	24
N**	2'294	1'001	3'295	488	179	667	243	76	319	717	145	862	203	717	920	4'213	2'305	6'518	6'518
<i>dati mancanti</i>	13	6	19	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	9	22	22
Durata (in settimane)																			
media	68.6	66.2	67.9	85.5	110.0	92.0	76.8	70.5	75.3	38.3	40.0	38.6	47.0	47.8	47.6	63.2	60.8	62.3	
deviazione standard	84.4	76.0	82.0	94.3	142.5	109.8	69.6	71.8	70.1	40.7	58.8	44.2	46.1	59.0	56.4	77.2	78.2	77.6	
1° quartile	22.3	20.0	21.6	27.6	33.6	29.4	31.6	31.4	31.6	8.0	7.3	8.0	13.0	18.1	16.4	19.1	19.4	19.1	
mediana	46.0	42.9	44.9	50.5	61.3	53.4	57.0	49.4	54.4	29.4	26.9	29.0	32.6	32.6	32.6	40.9	37.3	39.9	
3° quartile	85.3	85.1	85.3	114.2	136.7	118.7	98.0	88.4	96.7	52.0	46.3	51.0	65.7	56.1	58.1	78.0	72.7	76.4	
N**	2'294	1'001	3'295	488	179	667	243	76	319	717	145	862	203	717	920	4'213	2'305	6'518	
<i>dati mancanti</i>	13	6	19	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	9	22	

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T34 Trattamento sostitutivo durante e immediatamente dopo l'intervento, in rapporto al problema principale¹ (solamente pazienti) (2009)

	Pazienti: problema principale ¹												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Sostituzione nel corso dell'intervento*																
no	97.4	97.5	97.4	35.8	30.3	34.3	88.1	86.3	87.7	99.3	97.4	99.0	89.8	89.4	89.6	3'730
sì	2.6	2.5	2.6	64.2	69.7	65.7	11.9	13.7	12.3	0.7	2.6	1.0	10.2	10.6	10.4	431
N**	1'721	709	2'430	355	132	487	177	51	228	556	115	671	3'015	1'146	4'161	4'161
<i>dati mancanti</i>	584	298	882	133	47	180	65	24	89	157	28	185	1'001	446	1'447	1'447
Tipo di sostituzione***																
eroina	2.4	11.8	5.2	2.5	1.4	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	3.0	2.4	8
metadone	63.4	47.1	58.6	90.7	93.1	91.5	94.4	100.0	95.8	100.0	66.7	83.3	86.7	85.0	86.2	287
altri oppiacei	2.4	5.9	3.4	4.9	4.2	4.7	5.6	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	4.3	4.0	4.2	14
altre sostanze	31.7	35.3	32.8	1.9	1.4	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	16.7	6.9	8.0	7.2	24
N**	41	17	58	162	72	234	18	6	24	3	3	6	233	100	333	333
<i>dati mancanti</i>	4	1	5	66	20	86	3	1	4	1	0	1	76	22	98	98
Sostituzione dopo l'intervento*																
no	99.0	98.3	98.8	64.0	66.3	64.7	96.4	86.1	94.3	100.0	100.0	100.0	95.7	95.3	95.6	3'464
sì	1.0	1.7	1.2	36.0	33.7	35.3	3.6	13.9	5.7	0.0	0.0	0.0	4.3	4.7	4.4	161
N**	1'548	645	2'193	239	92	331	138	36	174	495	113	608	2'605	1'020	3'625	3'625
<i>dati mancanti</i>	757	362	1'119	249	87	336	104	39	143	218	30	248	1'411	572	1'983	1'983
Tipo di sostituzione***																
prescrizione di eroina	12.5	36.4	22.2	3.5	6.5	4.3	0.0	40.0	20.0	-	-	-	4.4	16.7	8.1	13
trattamento sostitutivo	87.5	63.6	77.8	96.5	93.5	95.7	100.0	60.0	80.0	-	-	-	95.6	83.3	91.9	148
N**	16	11	27	86	31	117	5	5	10	0	0	0	113	48	161	161
<i>dati mancanti</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti ai quali è stata prescritta una sostituzione durante l'intervento. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T35 Postassistenza prevista e preparata, in rapporto al problema principale¹ (solamente pazienti) (2009)

	Pazienti: problema principale ¹												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Postassistenza prevista e preparata*																
no	87.2	79.5	85.0	76.3	72.7	75.4	84.9	58.8	80.6	85.2	86.1	85.4	85.5	79.4	83.9	1'806
si	12.8	20.5	15.0	23.7	27.3	24.6	15.1	41.2	19.4	14.8	13.9	14.6	14.5	20.6	16.1	346
N**	1'028	395	1'423	190	66	256	86	17	103	183	36	219	1'590	562	2'152	2'152
<i>dati mancanti</i>	1'277	612	1'889	298	113	411	156	58	214	530	107	637	2'426	1'030	3'456	3'456
Tipo di postassistenza prevista***																
appartamento protetto dell'istituzione	0.8	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	0.6	2
servizio di postassistenza dell'istituzione	8.9	1.4	6.2	0.0	5.6	1.7	0.0	20.0	5.6	0.0	0.0	0.0	5.1	2.9	4.4	14
appartamento protetto esterno	5.6	1.4	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	20.0	6.9	3.7	2.0	3.2	10
servizio di postassistenza esterno	7.3	13.0	9.3	24.4	16.7	22.0	46.2	20.0	38.9	8.3	0.0	6.9	13.1	12.7	13.0	41
centro di consulenza per problemi inerenti all'alcol	23.4	15.9	20.7	12.2	0.0	8.5	0.0	20.0	5.6	4.2	0.0	3.4	16.4	11.8	14.9	47
centro di consulenza per problemi inerenti alle droghe	6.5	4.3	5.7	29.3	16.7	25.4	23.1	0.0	16.7	8.3	20.0	10.3	13.1	6.9	11.1	35
altri centri di consulenza	16.9	23.2	19.2	14.6	22.2	16.9	38.5	0.0	27.8	20.8	0.0	17.2	18.2	21.6	19.3	61
gruppo di aiuto reciproco e di autosostegno	5.6	2.9	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	2.0	2.8	9
gruppo di precedenti utenti del centro/ dell'istituzione	0.0	2.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.6	2
altro-i	33.9	43.5	37.3	31.7	38.9	33.9	15.4	20.0	16.7	54.2	60.0	55.2	35.5	43.1	38.0	120
N**	124	69	193	41	18	59	13	5	18	24	5	29	214	102	316	316
<i>dati mancanti</i>	8	12	20	4	0	4	0	2	2	3	0	3	16	14	30	30

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti per i quali una postassistenza è prevista. Le categorie non sono esclusive (molte risposte possibili)

T36 Problemi di dipendenza all'uscita, in rapporto al problema principale¹ (solamente pazienti) (2009)

Problemi di dipendenza*	Pazienti: problema principale ¹												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
alcol	54.9	61.1	56.8	20.6	23.5	21.3	21.2	34.4	24.0	8.6	15.7	9.9	37.1	44.1	39.1	1'272
cocktail (eroina e cocaina)	0.1	0.0	0.1	3.6	1.2	3.0	1.7	6.3	2.7	0.2	0.0	0.2	0.6	0.3	0.6	18
eroina	0.8	0.5	0.7	60.3	56.8	59.5	5.9	18.8	8.7	0.9	1.0	0.9	7.5	6.1	7.1	230
metadone	0.7	0.9	0.8	18.6	34.6	22.6	4.2	15.6	6.7	0.0	0.0	0.0	2.8	4.1	3.2	103
altri oppiacei	0.0	0.3	0.1	2.0	2.5	2.1	0.8	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.3	10
cocaina	1.9	1.2	1.7	10.1	22.2	13.1	48.3	62.5	51.3	1.1	5.9	2.0	4.9	5.7	5.1	167
crack, freebase	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	3.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	2
amfetamine	0.1	0.2	0.2	0.8	0.0	0.6	2.5	9.4	4.0	0.2	1.0	0.4	0.5	0.8	0.6	18
MDMA e affini (ecstasy)	0.0	0.5	0.2	0.8	0.0	0.6	2.5	9.4	4.0	0.2	1.0	0.4	0.3	1.0	0.5	15
altri stimolanti	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	4
barbiturici	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	2
benzodiazepine	1.7	2.3	1.9	16.2	14.8	15.9	4.2	12.5	6.0	0.2	0.0	0.2	3.3	3.6	3.3	109
altri sonniferi e tranquillanti	0.1	0.9	0.4	1.2	1.2	1.2	0.8	0.0	0.7	0.2	0.0	0.2	0.3	0.7	0.4	14
LSD	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	0.4	0.1	0.1	0.1	3
altri allucinogeni	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.6	0.0	3.1	0.7	0.2	1.0	0.4	0.1	0.2	0.2	5
sostanze volatili (per es., solventi)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0	0.5	0.1	0.1	0.1	3
canapa	3.2	3.1	3.2	14.2	17.3	14.9	10.2	25.0	13.3	51.2	47.1	50.5	14.1	10.1	13.0	423
tabacco	13.5	11.8	13.0	18.6	12.3	17.1	9.3	21.9	12.0	12.6	16.7	13.3	14.0	15.0	14.3	465
altra/e sostanza/e	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0	0.5	0.3	0.5	0.4	13
gioco patologico	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	1.4	1.3	1.4	45
disturbi alimentari	0.0	0.3	0.1	0.4	2.5	0.9	0.0	6.3	1.3	0.0	1.0	0.2	0.2	4.3	1.4	45
altri problemi assimilabili a una dipendenza	0.1	0.3	0.2	0.4	1.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.8	0.6	20
nessuno	39.7	35.5	38.4	19.0	18.5	18.9	38.1	15.6	33.3	41.3	47.1	42.3	38.0	33.3	36.7	1'194
N**	1'344	574	1'918	247	81	328	118	32	150	453	102	555	2'335	920	3'255	3'255
<i>dati mancanti</i>	<i>961</i>	<i>433</i>	<i>1'394</i>	<i>241</i>	<i>98</i>	<i>339</i>	<i>124</i>	<i>43</i>	<i>167</i>	<i>260</i>	<i>41</i>	<i>301</i>	<i>1'681</i>	<i>672</i>	<i>2'353</i>	<i>2'353</i>

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T37 Frequenza delle ricadute, sostanza o comportamento implicato e durata delle ricadute nel corso dell'intervento, in rapporto al problema principale¹ (solamente pazienti) (2009)

	Pazienti: problema principale ¹												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Frequenza delle ricadute*																
nessuna	61.2	47.5	57.5	33.7	31.6	33.1	49.2	46.7	48.6	76.3	55.6	73.0	59.2	46.0	55.8	754
1 volta	9.8	13.1	10.7	7.6	13.2	9.2	10.2	0.0	8.1	5.4	22.2	8.1	9.4	13.4	10.4	141
2 volte	5.3	8.1	6.0	14.1	10.5	13.1	10.2	0.0	8.1	4.3	11.1	5.4	6.0	8.0	6.5	88
3 o 4 volte	12.4	15.4	13.2	15.2	13.2	14.6	8.5	13.3	9.5	6.5	5.6	6.3	12.1	14.8	12.8	173
5 volte o più	11.3	15.8	12.5	29.3	31.6	30.0	22.0	40.0	25.7	7.5	5.6	7.2	13.3	17.9	14.5	196
N**	701	259	960	92	38	130	59	15	74	93	18	111	1'000	352	1'352	1'352
<i>dati mancanti</i>	1'604	748	2'352	396	141	537	183	60	243	620	125	745	3'016	1'240	4'256	4'256
Sostanza/comportamento comparabile a una dipendenza al momento delle ricadute***																
alcol	95.8	98.5	96.7	27.1	24.0	26.2	28.6	62.5	36.1	20.0	0.0	14.3	72.1	77.3	73.7	424
cocktail (eroina e cocaina)	0.0	2.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	2.8	5.0	0.0	3.6	0.3	2.2	0.9	5
oppiacei	5.0	2.3	4.1	84.7	92.0	86.9	32.1	37.5	33.3	5.0	0.0	3.6	19.0	16.2	18.1	104
cocaina e derivati	4.6	1.5	3.6	23.7	40.0	28.6	89.3	75.0	86.1	5.0	12.5	7.1	13.8	10.8	12.9	74
stimolanti	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	2.8	5.0	0.0	3.6	0.5	0.5	0.5	3
medicamenti	1.9	2.3	2.0	22.0	16.0	20.2	17.9	37.5	22.2	5.0	0.0	3.6	6.7	6.5	6.6	38
allucinogeni	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	2
canapa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	1
tabacco	5.0	2.3	4.1	22.0	8.0	17.9	21.4	37.5	25.0	80.0	87.5	82.1	12.8	8.1	11.3	65
sostanze volatili	1.1	0.8	1.0	0.0	4.0	1.2	0.0	12.5	2.8	5.0	0.0	3.6	1.8	2.2	1.9	11
altra/e sostanza/e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
gioco patologico	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.5	1.7	10
disturbi alimentari	0.4	0.8	0.5	0.0	4.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.8	1.4	8
altri problemi assimilabili a una dipendenza	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.5	0.7	4
N**	262	132	394	59	25	84	28	8	36	20	8	28	390	185	575	575
<i>dati mancanti</i>	10	4	14	2	1	3	2	0	2	2	0	2	18	5	23	23
Durata delle ricadute****																
1 a 2 giorni	24.8	22.6	24.1	40.0	50.0	42.3	45.5	0.0	38.5	25.0	100.0	50.0	29.1	33.8	30.6	70
3 a 6 giorni	31.9	24.5	29.5	10.0	16.7	11.5	0.0	50.0	7.7	12.5	0.0	8.3	25.9	21.1	24.5	56
7 a 10 giorni	10.6	15.1	12.0	10.0	0.0	7.7	27.3	0.0	23.1	12.5	0.0	8.3	11.4	11.3	11.4	26
>10 giorni a 2 settimane	2.7	7.5	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	5.6	3.1	7
> 2 a 4 settimane	10.6	17.0	12.7	5.0	16.7	7.7	0.0	0.0	0.0	37.5	0.0	25.0	10.1	14.1	11.4	26
>4 a 6 settimane	13.3	5.7	10.8	10.0	0.0	7.7	9.1	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	11.4	4.2	9.2	21
>6 a 8 settimane	2.7	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.3	3
> 2 mesi	3.5	7.5	4.8	25.0	16.7	23.1	18.2	50.0	23.1	12.5	0.0	8.3	8.2	9.9	8.7	20
N**	113	53	166	20	6	26	11	2	13	8	4	12	158	71	229	229
<i>dati mancanti</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che hanno indicato una o più ricadute. Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

**** I risultati si basano solamente sui clienti che hanno indicato una o più ricadute. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T38 Frequenza del consumo di tabacco e numero di sigarette al giorno nel corso dei 30 giorni precedenti l'uscita, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2009)

	Pazienti: problema principale ¹												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Frequenza del consumo di tabacco*																
mai	26.0	36.2	28.9	1.6	0.0	1.3	25.0	27.3	25.5	14.0	9.1	13.0	21.7	31.7	24.5	297
1 giorno alla settimana o meno	0.5	0.9	0.6	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	7
2 a 3 giorni alla settimana	1.0	0.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	2.8	1.1	0.6	1.0	12
4 a 6 giorni alla settimana	1.0	0.4	0.8	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.6	0.7	9
una volta al giorno	0.3	0.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.3	4
più volte al giorno	71.1	60.9	68.2	97.5	100.0	98.1	72.5	72.7	72.5	82.6	90.9	84.3	75.5	65.9	72.9	884
N**	589	235	824	122	38	160	40	11	51	86	22	108	879	334	1'213	1'213
<i>dati mancanti</i>	<i>1'716</i>	<i>772</i>	<i>2'488</i>	<i>366</i>	<i>141</i>	<i>507</i>	<i>202</i>	<i>64</i>	<i>266</i>	<i>627</i>	<i>121</i>	<i>748</i>	<i>3'137</i>	<i>1'258</i>	<i>4'395</i>	<i>4'395</i>
Numero di sigarette al giorno***																
0 a 10 sigarette al giorno	15.4	13.8	15.0	8.1	4.0	7.2	21.1	0.0	16.7	31.4	33.3	31.7	15.9	13.8	15.4	102
11 a 20 sigarette al giorno	47.5	56.0	49.6	60.5	72.0	63.1	57.9	60.0	58.3	47.1	33.3	44.4	49.6	56.0	51.1	339
21 a 30 sigarette al giorno	27.6	22.9	26.5	30.2	24.0	28.8	21.1	20.0	20.8	15.7	33.3	19.0	27.2	23.3	26.2	174
31 sigarette al giorno o più	9.5	7.3	9.0	1.2	0.0	0.9	0.0	20.0	4.2	5.9	0.0	4.8	7.3	6.9	7.2	48
N**	337	109	446	86	25	111	19	5	24	51	12	63	504	159	663	663
<i>dati mancanti</i>	<i>99</i>	<i>41</i>	<i>140</i>	<i>34</i>	<i>13</i>	<i>47</i>	<i>11</i>	<i>3</i>	<i>14</i>	<i>23</i>	<i>8</i>	<i>31</i>	<i>184</i>	<i>69</i>	<i>253</i>	<i>253</i>

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che hanno indicato un consumo di tabacco. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T39 Obiettivo di consumo all'uscita e pronostico, in rapporto alla principale sostanza problematica¹ (solamente pazienti) (2009)

	Pazienti: sostanza problematica ¹												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppiacei			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Obiettivo di consumo*																
astinenza definitiva	36.0	44.1	38.1	68.3	52.1	64.2	56.5	56.3	56.4	38.4	30.0	36.9	40.8	44.3	41.7	728
astinenza limitata nel tempo	13.9	10.5	13.0	2.1	6.3	3.1	1.6	0.0	1.3	5.8	10.0	6.5	10.5	8.9	10.1	176
consumo controllato	35.2	32.6	34.5	9.0	12.5	9.8	27.4	25.0	26.9	29.0	40.0	31.0	31.9	30.3	31.5	550
nessuna limitazione nel consumo prevista	5.5	4.5	5.2	6.2	6.3	6.2	3.2	0.0	2.6	13.0	6.7	11.9	6.1	5.1	5.8	102
nessuna decisione per il momento	8.6	7.7	8.4	13.1	20.8	15.0	9.7	18.8	11.5	12.3	13.3	12.5	9.7	10.0	9.8	171
altro	0.8	0.6	0.8	1.4	2.1	1.6	1.6	0.0	1.3	1.4	0.0	1.2	0.9	1.3	1.0	18
N**	870	313	1'183	145	48	193	62	16	78	138	30	168	1'296	449	1'745	1'745
<i>dati mancanti</i>	1'435	694	2'129	343	131	474	180	59	239	575	113	688	2'720	1'143	3'863	3'863
Pronostico*																
pronostico molto positivo	12.6	10.4	12.0	7.7	3.8	6.7	12.5	12.5	12.5	17.6	11.8	16.6	12.6	10.5	12.0	225
pronostico positivo	49.5	51.2	49.9	31.4	40.4	33.7	43.1	6.3	36.4	43.1	58.8	46.0	46.4	49.1	47.1	880
pronostico piuttosto sfavorevole	25.5	27.4	26.0	46.8	32.7	43.3	34.7	62.5	39.8	34.0	23.5	32.1	29.5	28.3	29.2	545
pronostico negativo	12.5	11.0	12.1	14.1	23.1	16.3	9.7	18.8	11.4	5.2	5.9	5.3	11.6	12.2	11.7	219
N**	922	336	1'258	156	52	208	72	16	88	153	34	187	1'392	477	1'869	1'869
<i>dati mancanti</i>	1'383	671	2'054	332	127	459	170	59	229	560	109	669	2'624	1'115	3'739	3'739

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto