

# Intervento ambulatoriale nelle problematiche di dipendenza

## Risultati dell'indagine presso gli utenti 2013

### Raccolta di tabelle statistiche

Luca Notari, Etienne Maffli, Mariana Astudillo

## Ringraziamenti

Ringraziamo vivamente sia i collaboratori e le collaboratrici che i pazienti delle istituzioni che hanno partecipato e che hanno gentilmente accettato di riempire i questionari del monitoraggio act-info. Ringraziamo ugualmente i collaboratori e le collaboratrici dei servizi di consultazione che hanno effettuato i lavori di logistica e di registrazione dei dati. I nostri migliori ringraziamenti vanno anche all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) che finanzia l'insieme della rete act-info. Grazie anche a Edith Bacher e Christiane Gmel per la grafica e l'impaginazione di questo rapporto come pure a Marina Delgrande Jordan per la sua preziosa collaborazione nell'elaborazione delle procedure d'analisi.

---

Complementi d'informazione: Etienne Maffli, tel. 021 321 29 54, fax 021 321 29 40,  
e-mail [emaffli@addictionsuisse.ch](mailto:emaffli@addictionsuisse.ch)

Realizzazione: Luca Notari, Etienne Maffli & Mariana Astudillo  
Dipendenze Svizzera

Diffusione: Ricerca, Dipendenze Svizzera, casella postale 870, 1001  
Losanna,  
tel. 021 321 29 46, fax 021 321 29 40,  
e-mail [ebacher@addictionsuisse.ch](mailto:ebacher@addictionsuisse.ch)

Prezzo: Fr. 10.–

Lingua del testo originale : tedesco

Grafica/impaginazione: Dipendenze Svizzera

Copyright: © Dipendenze Svizzera, Losanna 2014

Citazione raccomandata: Notari, L., Maffli, E. & Astudillo, M. (2014). Intervento ambulatoriale nelle problematiche di dipendenza. Risultati dell'indagine presso gli utenti 2013 – Raccolta di tabelle statistiche. Losanna: Dipendenze Svizzera.

---

## Indice

act-info –addiction care and therapy information .....	7
act-info nel settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale nel campo delle dipendenze .....	7

## ENTRATA

T1	Sesso e età dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2013)
T2	Stato civile e nazionalità dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2013)
T3	Grado di urbanizzazione del domicilio, tipo di nucleo familiare e situazione di domicilio dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2013)
T4	Tipo di relazione di coppia, numero di figli, di figli vivendo nel nucleo familiare dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2013)
T5	Più alta formazione portata a termine e statuto professionale dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2013)
T6	Fonte di reddito principale e attività dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2013)
T7	Reddito mensile netto e debiti dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2013)
T8	Incarcerazione o detenzione preventiva prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2013)
T9	Istanza d'invio principale, secondo il problema principale e per i parenti o conoscenti (2013)
T10	Intervento in seguito ad una misura giudiziaria e tipo di misura, secondo il problema principale e per i parenti o conoscenti (2013)
T11	Trattamenti/accompagnamenti anteriori l'ammissione e tipi di intervento, secondo il problema principale e per parenti o conoscenti (2013)
T12	Trattamento sostitutivo o prescrizione di eroina al momento dell'ammissione, secondo il problema principale (solo pazienti)
T13	Problema principale all'entrata (solamente pazienti) (2013)
T14	Uso di sostanze multiple e combinazioni di sostanze (2013)

- T15.1a Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata (2013), uomini
- T15.1b Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata (2013), donne
- T15.1c Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata (2013), uomini e donne
- T15.2a Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata (2013), uomini
- T15.2b Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata (2013), donne
- T15.2c Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata (2013), uomini e donne
- T16.1a Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2013), uomini
- T16.1b Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2013), donne
- T16.1c Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2013), uomini e donne
- T16.2a Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2013), uomini
- T16.2b Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2013), donne
- T16.2c Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2013), uomini e donne
- T17 Modo di amministrazione della principale sostanza problematica prima dell'entrata (2013)
- T18.1 Prevalenza a vita delle iniezioni, nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 12 mesi prima dell'entrata, scambio di materiale d'iniezione, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2013)
- T18.2 Età all'epoca della prima iniezione, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2013)
- T19.1a Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2013), uomini
- T19.1b Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2013), donne
- T19.1c Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2013), uomini e donne

- T19.2a Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2013), uomini
- T19.2b Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2013), donne
- T19.2c Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2013), uomini e donne
- T20.1a Frequenza del consumo delle sostanze secondarie secondo il problema principale (solo pazienti) (2013)
- T20.1b Frequenza del consumo delle sostanze secondarie secondo il problema principale (solo pazienti) (2013)
- T21 Frequenza del consumo di alcol, numero di "bicchieri standard" al giorno e frequenza di forti consumi di alcol prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti ) (2013)
- T22 Frequenza del consumo di tabacco e numero di sigarette al giorno nel corso dei 30 ultimi giorni prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2013)
- T23a Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2013), uomini
- T23b Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2013), donne
- T23c Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2013), uomini e donne
- T24a Problemi psichici nel corso della vita (2013), uomini
- T24b Problemi psichici nel corso della vita (2013), donne
- T24c Problemi psichici nel corso della vita (2013), uomini e donne
- T25 Parenti/conoscenti: legame tra l'utente e la persona sintomatica (2013)
- T26 Parenti/conoscenti: problema principale della persona sintomatica (2013)

## USCITA

- T27 Sesso e età dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2013)
- T28 Stato civile e grado di urbanizzazione del domicilio dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2013)
- T29 Tipo di nucleo familiare, situazione di domicilio e tipo di relazione di coppia dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2013)
- T30 Fonte di reddito principale e attività principale all'uscita, secondo il problema principale e per i parenti o conoscenti (2013) e dei parenti o conoscenti (2013)
- T31 Statuto professionale dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2013)

T32a	Ragione principale della fine del trattamento/accompagnamento dei pazienti (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2013)
T32b	Destinazione dei trasferimenti dei pazienti (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2013)
T32c	Causa di decesso dei pazienti (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2013)
T33	Durata dell'intervento sui pazienti (in rapporto al problema principale) e sui parenti o conoscenti (2013)
T34	Trattamento sostitutivo durante e immediatamente dopo l'intervento, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2013)
T35	Postassistenza prevista e preparata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2013)
T36	Problemi di dipendenza all'uscita, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2013)
T37	Frequenza delle ricadute e sostanza o comportamento implicato nel corso dell'intervento, in rapporto al problema principale <sup>1</sup> (solamente pazienti) (2013)
T38	Frequenza del consumo di tabacco e numero di sigarette al giorno nel corso dei 30 giorni precedenti l'uscita, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2013)
T39	Obiettivo di consumo all'uscita e pronostico, in rapporto alla principale sostanza problematica (solamente pazienti) (2013)

## Allegati

Dati di base delle istituzioni che non partecipano al monitoraggio act-info

A1	Sesso e età all'entrata, in funzione del problema principale (2013)
A2	Problema principale all'entrata (2013)

## act-info - addiction care and therapy information

La Rete di monitoraggio degli interventi e dei trattamenti delle dipendenze in Svizzera (act-info) raccoglie nel suo seno i cinque sistemi statistici che erano realizzati in materia di intervento e di trattamento della dipendenza in Svizzera. Tali sistemi sono:

- SAMBAD (Statistica del settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale in materia di dipendenza)
- Residalc (Statistica dei trattamenti residenziali della dipendenza all'alcol in Svizzera)
- FOS (Statistica della Lega per la valutazione dei trattamenti residenziali della tossicomania)
- HeGeBe (Statistica dei trattamenti con prescrizione di eroina)
- Metadone (Statistica nazionale dei trattamenti con prescrizione di metadone)

Dal 2004 queste cinque statistiche dispongono di strumenti armonizzati e ottimizzati. I dati comuni sono integrati in una banca dati centralizzata che permette di procedere ad analisi concernenti l'insieme dei settori. L'adozione degli standard europei (Treatment Demande Indicator) permette di garantire anche la comparabilità dei dati al livello internazionale.

act-info è finanziato dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e l'analisi e la raccolta dei dati nei differenti campi di trattamento sono affidate a Dipendenze Info Svizzera di Losanna e all'Istituto di ricerca sulla salute pubblica e sulle dipendenze affiliato all'Università di Zurigo (ISGF).

### act-info nel settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale in materia di dipendenza (SAMBAD)

Gli strumenti di monitoraggio act-info sono stati introdotti a partire dal 2004 nel settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale in materia di dipendenza e hanno rimpiazzato i vecchi questionari in vigore dal 1994. Dopo diversi anni di utilizzo, una revisione di questi strumenti ha avuto luogo e i nuovi questionari sono stati introdotti il 1° gennaio 2013. Questo processo è stato armonizzato con la revisione delle norme europee. Per poter rispondere ai differenti bisogni, per il settore ambulatoriale è stata introdotta pure una versione ridotta. La realizzazione di act-info in questo settore è affidata a Dipendenze Info Svizzera.

La statistica act-info SAMBAD da una visione dell'utenza dell'aiuto ambulatoriale in materia di dipendenza in Svizzera. I dati sono raccolti all'inizio e alla fine dell'intervento. Le informazioni rilevate al momento dell'entrata permettono di valutare in particolare le caratteristiche socio-demografiche degli utenti, l'eventuale presenza di trattamenti precedenti, le modalità di consumo e la presenza di problemi psicosociali precedenti l'intervento. Le informazioni finali rilevate al termine dell'intervento evidenziano in particolare le circostanze dell'uscita e le caratteristiche socio-demografiche dell'utenza in quel preciso momento.

Nel 2013, 72 tra le 193 istituzioni registrate nel settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale in materia di dipendenza hanno partecipato al monitoraggio act-info. Queste istituzioni sono sia servizi deputati alla consultazione specialistica dei problemi inerenti all'alcol e/o alle droghe illegali, sia servizi polivalenti offrenti ugualmente un aiuto per i problemi di dipendenza.

## Qualche spiegazione riguardo alle tabelle

La presente statistica descrittiva dei dati dell'indagine act-*info* presso gli utenti del settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale in materia di dipendenza si basa su due tipi di tabelle:

- quando la domanda contiene delle categorie di risposte predefinite o ricodificate in parti distinte (per esempio « stato civile » o « età »), la tabella indica le percentuali delle differenti categorie di risposte
- quando la domanda non contiene delle categorie predefinite, ma richiede un valore numerico (per esempio « età all'inizio del consumo problematico »), la tabella presenta dei parametri di posizione (media, mediana) e dei parametri di dispersione (deviazione standard, 1° quartile, 3° quartile)

La maggior parte delle tabelle presenta i risultati in maniera distinta per i sottogruppi di pazienti che hanno menzionato l'alcol, un oppiaceo (eroina in particolare), la cocaina (e derivati) o la canapa come problema principale al momento dell'entrata. I parenti o conoscenti che consultano per i problemi di un terzo sono ugualmente oggetto di analisi separate per gli aspetti socio-demografici. Invece, gli utenti (poco numerosi) che hanno menzionato altre sostanze come problema principale (per esempio un stimolante o le sostanze volatili) o un problema di dipendenza non inerente a una sostanza (per esempio gioco patologico), non sono differenziati nei risultati (eccetto nei temi direttamente inerenti ai modi di consumo o alle forme di comportamenti additivi non inerenti alle sostanze). Queste persone sono tuttavia incluse nelle analisi relative all'insieme degli interventi che figurano nei blocchi a destra delle tabelle rispettive. Tutte le analisi sono effettuate separatamente per gli uomini, per le donne e per i sessi riuniti (nel caso in cui ci fossero persone il cui sesso non è conosciuto, queste saranno comprese nella colonna « Totale »).

Solo le risposte valide sono considerate nelle analisi. Cioè, le risposte « non noto » e le informazioni mancanti (missings) sono escluse dalle analisi. Il numero di risposte valide  $N$  rappresenta il numero esatto di casi sui quali sono calcolati le percentuali o altri parametri; esso viene indicato per ogni gruppo o sottogruppo. In basso alla tabella viene anche indicato il numero corrispondente di dati mancanti. La presenza di numerosi dati mancanti costringe a interpretare i risultati con particolare prudenza.

Le note in basso alla tabella danno informazioni sulle eventuali particolarità dei gruppi di riferimento e sul tipo di domanda. Quando sono possibili più risposte a una stessa domanda (per esempio nelle tabelle del tema T19, « altri problemi di dipendenza ») le percentuali ottenute non si possono addizionare.

Le istituzioni che non partecipano al monitoraggio act-*info* sono state invitate a fornire i dati di base (età, sesso e problema principale all'entrata). Quattordici istituzioni hanno risposto a questa richiesta. I dati di queste 14 istituzioni sono stati analizzati separatamente e i risultati sono presenti in allegato.



## T1 Sesso e età dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2013)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Sesso*</b>																			
uomini	70.2			75.8			83.5			82.3			20.2			64.7			4'342
donne	29.8			24.2			16.5			17.7			79.8			35.3			2'374
sex non noto	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0
<b>N**</b>	<b>2'306</b>	<b>979</b>	<b>3'285</b>	<b>292</b>	<b>93</b>	<b>385</b>	<b>203</b>	<b>40</b>	<b>243</b>	<b>905</b>	<b>194</b>	<b>1'099</b>	<b>200</b>	<b>788</b>	<b>988</b>	<b>4'342</b>	<b>2'374</b>	<b>6'716</b>	<b>6'716</b>
<b>Età (in anni)*</b>																			
fino a 14	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	9.5	5.5	1.0	1.6	1.5	1.6	1.6	1.6	108
15-19	2.2	2.1	2.2	0.3	2.2	0.8	5.4	17.9	7.5	60.8	56.8	60.1	5.7	1.9	2.7	16.4	8.6	13.7	908
20-24	4.3	2.8	3.9	6.2	11.8	7.5	12.4	30.8	15.4	11.0	13.7	11.5	4.2	4.0	4.0	7.0	5.9	6.6	437
25-29	7.3	5.4	6.7	14.4	22.6	16.4	20.8	25.6	21.6	9.5	7.9	9.2	4.7	6.5	6.1	9.0	7.4	8.5	562
30-34	11.3	7.6	10.2	20.2	15.1	19.0	20.8	7.7	18.7	7.2	5.8	7.0	8.3	9.9	9.6	11.3	8.7	10.4	692
35-39	10.5	9.8	10.3	16.4	7.5	14.3	16.3	10.3	15.4	2.7	2.6	2.7	5.2	7.3	6.9	9.4	8.4	9.1	602
40-44	13.7	12.8	13.4	22.9	19.4	22.1	13.9	5.1	12.4	2.0	1.1	1.8	9.9	13.4	12.7	11.1	11.8	11.3	754
45-49	15.3	18.3	16.2	11.6	17.2	13.0	6.9	2.6	6.2	0.9	1.1	0.9	14.6	17.4	16.8	10.9	15.0	12.4	822
50-54	12.8	15.8	13.7	6.2	2.2	5.2	1.5	0.0	1.2	0.9	0.5	0.8	13.5	14.0	13.9	8.7	12.3	9.9	661
55-59	10.1	11.9	10.7	1.7	1.1	1.6	2.0	0.0	1.7	0.3	0.5	0.4	12.5	9.9	10.4	6.6	8.9	7.4	492
60-64	6.3	6.6	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	6.1	6.0	4.0	5.4	4.5	297
65-69	4.0	4.1	4.1	0.0	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	7.3	3.8	4.5	2.6	3.3	2.8	186
70-74	1.8	2.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	2.3	2.6	1.1	1.8	1.4	90
75 e più	0.3	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	2.1	2.4	0.3	1.1	0.6	38
<b>N**</b>	<b>2'301</b>	<b>973</b>	<b>3'274</b>	<b>292</b>	<b>93</b>	<b>385</b>	<b>202</b>	<b>39</b>	<b>241</b>	<b>899</b>	<b>190</b>	<b>1'089</b>	<b>192</b>	<b>771</b>	<b>963</b>	<b>4'312</b>	<b>2'337</b>	<b>6'649</b>	<b>6'649</b>
<i>dati mancanti</i>	5	6	11	0	0	0	1	1	2	6	4	10	8	17	25	30	37	67	67
<b>Età</b>																			
media	44.8	46.8	45.4	37.7	35.7	37.2	33.6	27.0	32.5	21.3	21.0	21.3	47.5	45.8	46.1	37.8	42.4	39.4	
deviazione standard	12.8	12.3	12.7	8.5	10.2	9.0	8.8	7.6	8.9	7.8	8.2	7.9	16.0	14.0	14.4	15.2	15.0	15.3	
1° quartile	35.0	38.6	36.1	31.2	26.5	30.1	28.1	22.2	25.9	16.6	16.4	16.5	36.2	35.7	35.8	25.0	30.7	27.2	
mediana	45.2	47.4	45.9	37.9	34.1	37.3	32.2	25.2	31.6	17.8	17.5	17.7	48.8	47.0	47.3	37.5	44.1	40.1	
3° quartile	53.7	55.2	54.3	43.9	44.0	44.0	39.67	31.5	39.0	24.2	22.7	24.0	58.2	54.5	55.5	49.1	53.2	50.7	
<b>N**</b>	<b>2'301</b>	<b>973</b>	<b>3'274</b>	<b>292</b>	<b>93</b>	<b>385</b>	<b>202</b>	<b>39</b>	<b>241</b>	<b>899</b>	<b>190</b>	<b>1'089</b>	<b>192</b>	<b>771</b>	<b>963</b>	<b>4'312</b>	<b>2'337</b>	<b>6'649</b>	
<i>dati mancanti</i>	5	6	11	0	0	0	1	1	2	6	4	10	8	17	25	30	37	67	

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

## T2 Stato civile e nazionalità dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2013)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			N
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Stato civile*</b>																			
celibe/nubile	40.9	33.3	38.6	66.2	70.4	67.1	63.5	75.7	65.5	94.0	89.7	93.2	28.1	24.3	25.1	56.5	40.0	50.8	3'194
sposato-a	33.1	30.1	32.2	20.3	9.9	18.0	19.8	13.5	18.8	3.5	3.3	3.4	58.9	53.6	54.6	25.6	33.5	28.3	1'783
separato-a	4.6	5.1	4.8	2.8	2.5	2.8	3.1	0.0	2.6	0.6	1.6	0.8	2.2	2.9	2.7	3.2	3.8	3.4	215
divorziato-a	19.3	26.8	21.5	8.9	12.3	9.7	12.5	10.8	12.2	1.6	3.8	2.0	8.1	16.8	15.0	13.0	19.2	15.2	958
vedovo-a	1.5	4.3	2.3	0.7	1.2	0.8	0.5	0.0	0.4	0.1	0.5	0.2	0.5	2.3	2.0	1.0	3.0	1.7	105
unione registrata	0.6	0.4	0.6	1.1	3.7	1.7	0.5	0.0	0.4	0.2	1.1	0.4	2.2	0.1	0.5	0.7	0.5	0.6	38
<b>N**</b>	<b>2'193</b>	<b>917</b>	<b>3'110</b>	<b>281</b>	<b>81</b>	<b>362</b>	<b>192</b>	<b>37</b>	<b>229</b>	<b>832</b>	<b>184</b>	<b>1'016</b>	<b>185</b>	<b>732</b>	<b>917</b>	<b>4'085</b>	<b>2'208</b>	<b>6'293</b>	<b>6'293</b>
<i>dati mancanti</i>	113	62	175	11	12	23	11	3	14	73	10	83	15	56	71	257	166	423	423
<b>Nazionalità*</b>																			
CH	79.2	85.7	81.1	64.1	83.6	69.0	66.5	73.5	67.6	81.5	90.2	83.1	82.8	85.2	84.7	78.3	85.7	81.0	4'735
EU	15.2	10.9	13.9	28.6	13.7	24.8	22.0	17.6	21.3	12.3	7.9	11.5	13.8	11.5	11.9	15.3	10.9	13.7	803
altra	5.6	3.4	4.9	7.4	2.7	6.2	11.6	8.8	11.1	6.2	1.8	5.4	3.4	3.3	3.3	6.4	3.4	5.3	310
<b>N**</b>	<b>2'020</b>	<b>855</b>	<b>2'875</b>	<b>217</b>	<b>73</b>	<b>290</b>	<b>173</b>	<b>34</b>	<b>207</b>	<b>780</b>	<b>164</b>	<b>944</b>	<b>174</b>	<b>723</b>	<b>897</b>	<b>3'743</b>	<b>2'105</b>	<b>5'848</b>	<b>5'848</b>
<i>dati mancanti</i>	286	124	410	75	20	95	30	6	36	125	30	155	26	65	91	599	269	868	868

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

## T3 Grado di urbanizzazione del domicilio, tipo di nucleo familiare e situazione di domicilio dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2013)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi				N
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale		
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale								
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
<b>Grado di urbanizzazione*</b>																				
grandi centri urbani	8.3	8.2	8.3	3.2	2.2	2.9	0.5	0.0	0.4	0.3	0.5	0.4	12.8	10.2	10.7	5.5	6.9	6.0	391	
periferia dei grandi centri	15.8	15.5	15.7	10.6	15.4	11.8	18.0	13.2	17.2	10.3	8.4	10.0	20.3	14.3	15.5	13.9	13.2	13.7	890	
città di media importanza	14.2	17.1	15.0	12.0	12.1	12.0	16.0	10.5	15.1	26.0	23.7	25.6	14.4	14.7	14.7	17.0	17.8	17.3	1'127	
piccole città	33.5	32.5	33.2	43.5	47.3	44.4	44.0	50.0	45.0	32.3	33.7	32.5	25.7	33.2	31.7	35.1	34.5	34.9	2'274	
campagne	28.1	26.8	27.7	30.7	23.1	28.9	21.5	26.3	22.3	31.0	33.7	31.5	26.7	27.6	27.4	28.4	27.6	28.1	1'831	
<b>N**</b>	<b>2'241</b>	<b>944</b>	<b>3'185</b>	<b>283</b>	<b>91</b>	<b>374</b>	<b>200</b>	<b>38</b>	<b>238</b>	<b>883</b>	<b>190</b>	<b>1'073</b>	<b>187</b>	<b>747</b>	<b>934</b>	<b>4'226</b>	<b>2'287</b>	<b>6'513</b>	<b>6'513</b>	
<i>dati mancanti</i>	65	35	100	9	2	11	3	2	5	22	4	26	13	41	54	116	87	203	203	
<b>Tipo di nucleo familiare (30 ultimi giorni)*</b>																				
da solo-a	35.9	35.2	35.6	35.2	23.7	32.5	28.9	30.6	29.2	12.5	10.3	12.1	23.0	13.2	15.0	28.5	27.2	28.1	1'494	
con famiglia d'origine (genitori, ecc.)	7.8	4.4	6.8	13.6	9.2	12.6	17.3	19.4	17.7	67.5	59.2	66.0	14.9	5.2	7.0	24.5	13.1	20.8	1'109	
con partner e/o figli	45.9	51.7	47.6	28.0	46.1	32.2	36.4	33.3	35.9	7.9	13.8	9.0	60.8	79.7	76.2	34.8	50.5	39.9	2'122	
con amici o altre persone	2.7	2.2	2.5	5.6	2.6	4.9	6.9	8.3	7.2	3.8	2.9	3.7	1.4	1.5	1.5	3.4	2.6	3.2	169	
in prigione	0.4	0.1	0.3	2.4	1.3	2.1	1.7	0.0	1.4	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	0.4	22	
istituzione terapeutica/foyer	1.4	1.4	1.4	3.2	3.9	3.4	2.3	0.0	1.9	2.7	4.0	2.9	0.0	0.0	0.0	1.9	1.3	1.7	90	
ospedale/clinica	2.5	1.9	2.3	1.2	5.3	2.1	3.5	2.8	3.3	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.9	1.3	1.7	93	
altro	3.5	3.1	3.4	10.8	7.9	10.1	2.9	5.6	3.3	4.6	9.8	5.5	0.0	0.3	0.3	4.3	3.8	4.2	221	
<b>N**</b>	<b>1'952</b>	<b>859</b>	<b>2'811</b>	<b>250</b>	<b>76</b>	<b>326</b>	<b>173</b>	<b>36</b>	<b>209</b>	<b>782</b>	<b>174</b>	<b>956</b>	<b>74</b>	<b>325</b>	<b>399</b>	<b>3'600</b>	<b>1'720</b>	<b>5'320</b>	<b>5'320</b>	
<i>dati mancanti</i>	354	120	474	42	17	59	30	4	34	123	20	143	126	463	589	742	654	1'396	1'396	
<b>Situazione di domicilio (30 ultimi giorni)*</b>																				
situazione abitativa stabile	90.9	92.9	91.5	82.3	80.3	81.9	86.1	84.4	85.8	90.3	85.5	89.4	96.4	97.1	97.0	90.3	93.0	91.2	4'577	
situazione abitativa instabile/ser	3.4	3.5	3.4	10.6	4.9	9.3	7.9	9.4	8.2	5.4	7.2	5.8	3.6	2.6	2.8	4.5	3.6	4.2	210	
in prigione	0.4	0.1	0.3	2.5	1.6	2.3	2.0	0.0	1.6	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.6	0.2	0.4	22	
istituzione/foyer/ospedale/altro	5.3	3.4	4.7	4.5	13.1	6.6	4.0	6.3	4.4	4.0	7.2	4.6	0.0	0.3	0.2	4.6	3.3	4.2	210	
<b>N**</b>	<b>1'893</b>	<b>817</b>	<b>2'710</b>	<b>198</b>	<b>61</b>	<b>259</b>	<b>151</b>	<b>32</b>	<b>183</b>	<b>698</b>	<b>152</b>	<b>850</b>	<b>83</b>	<b>350</b>	<b>433</b>	<b>3'363</b>	<b>1'656</b>	<b>5'019</b>	<b>5'019</b>	
<i>dati mancanti</i>	413	162	575	94	32	126	52	8	60	207	42	249	117	438	555	979	718	1697	1'697	

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

## T4 Tipo di relazione di coppia, numero di figli, di figli vivendo nel nucleo familiare dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2013)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Tipo di relazione di coppia*</b>																			
senza partner, sola-a	35.4	36.5	35.7	43.5	38.5	42.1	40.2	37.5	39.8	69.1	55.8	66.2	20.0	15.9	16.6	42.8	34.6	39.9	1'191
relazione-i saltuaria-e	4.0	3.9	4.0	8.7	7.7	8.4	2.4	25.0	6.1	5.3	4.8	5.2	4.0	2.6	2.9	4.6	4.4	4.6	136
relazione fissa, vivendo separato-a	11.8	13.6	12.3	14.5	7.7	12.6	26.8	18.8	25.5	17.6	26.0	19.4	20.0	10.1	11.9	14.0	14.7	14.3	426
relazione fissa, vivendo insieme	48.8	46.0	48.0	33.3	46.2	36.8	30.5	18.8	28.6	8.0	13.5	9.2	56.0	71.4	68.6	38.6	46.2	41.3	1'233
<b>N**</b>	<b>1'171</b>	<b>515</b>	<b>1'686</b>	<b>69</b>	<b>26</b>	<b>95</b>	<b>82</b>	<b>16</b>	<b>98</b>	<b>375</b>	<b>104</b>	<b>479</b>	<b>50</b>	<b>227</b>	<b>277</b>	<b>1'928</b>	<b>1'058</b>	<b>2'986</b>	<b>2'986</b>
<i>dati mancanti</i>	1'135	464	1'599	223	67	290	121	24	145	530	90	620	150	561	711	2'414	1'316	3'730	3'730
<b>Numero di figli*</b>																			
nessuno	53.6	47.1	51.7	70.0	64.8	68.7	71.0	75.8	71.8	92.9	90.2	92.4	47.7	26.5	30.6	66.7	51.0	61.6	2'997
1 figlio	13.5	19.3	15.3	16.7	21.1	17.8	14.2	9.1	13.3	3.7	3.7	3.7	15.1	17.7	17.2	11.0	16.4	12.7	619
2 figli	23.3	23.6	23.4	11.4	12.7	11.7	11.1	15.2	11.8	3.3	4.3	3.4	23.3	33.8	31.7	16.0	22.0	18.0	875
3 figli o più	9.6	9.9	9.7	1.9	1.4	1.8	3.7	0.0	3.1	0.1	1.8	0.4	14.0	22.0	20.4	6.3	10.6	7.7	374
<b>N**</b>	<b>1'765</b>	<b>745</b>	<b>2'510</b>	<b>210</b>	<b>71</b>	<b>281</b>	<b>162</b>	<b>33</b>	<b>195</b>	<b>736</b>	<b>163</b>	<b>899</b>	<b>86</b>	<b>355</b>	<b>441</b>	<b>3'281</b>	<b>1'584</b>	<b>4'865</b>	<b>4'865</b>
<i>dati mancanti</i>	541	234	775	82	22	104	41	7	48	169	31	200	114	433	547	1'061	790	1'851	1'851
<b>Numero dei figli vivendo nel nucleo familiare*</b>																			
nessuno	80.6	77.1	79.6	90.0	90.6	90.2	86.3	87.5	86.5	82.4	77.7	81.6	61.0	48.5	50.9	81.4	72.1	78.4	3'841
1 figlio	7.9	12.2	9.2	4.0	7.8	4.9	5.0	6.3	5.2	5.6	6.6	5.8	17.1	22.7	21.6	7.3	13.3	9.2	452
2 figli	8.9	7.7	8.6	5.5	0.0	4.2	6.8	6.3	6.7	9.3	13.3	10.0	15.9	20.9	20.0	8.8	11.0	9.5	466
3 figli o più	2.6	3.0	2.7	0.5	1.6	0.8	1.9	0.0	1.6	2.7	2.4	2.6	6.1	7.8	7.5	2.5	3.7	2.9	141
<b>N**</b>	<b>1'792</b>	<b>757</b>	<b>2'549</b>	<b>200</b>	<b>64</b>	<b>264</b>	<b>161</b>	<b>32</b>	<b>193</b>	<b>745</b>	<b>166</b>	<b>911</b>	<b>82</b>	<b>344</b>	<b>426</b>	<b>3'311</b>	<b>1'589</b>	<b>4'900</b>	<b>4'900</b>
<i>dati mancanti</i>	514	222	736	92	29	121	42	8	50	160	28	188	118	444	562	1'031	785	1'816	1'816

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

## T5 Più alta formazione portata a termine e statuto professionale dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2013)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			N
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Più alta formazione portata a termine*</b>																			
nessuna formazione terminata	3.1	4.7	3.6	4.7	5.3	4.8	6.1	10.3	6.8	18.5	25.8	19.9	3.6	3.2	3.3	8.0	7.2	7.7	349
scuola dell'obbligo	10.7	13.2	11.4	27.6	26.3	27.3	21.1	34.5	23.3	56.9	43.9	54.5	13.4	10.4	11.0	24.2	18.3	22.2	1'007
formazione prof. preliminar	3.1	3.8	3.3	3.5	3.5	3.5	1.4	0.0	1.1	2.5	4.5	2.9	2.7	1.8	2.0	2.8	3.3	3.0	134
formazione generale senza maturità	9.0	5.7	8.0	14.1	10.5	13.2	4.8	6.9	5.1	2.4	1.3	2.2	6.3	9.5	8.8	7.3	6.0	6.9	311
formazione prof. di base/apprendisti	51.3	52.5	51.7	41.8	49.1	43.6	55.8	37.9	52.8	15.8	16.8	16.0	38.4	47.6	45.7	40.9	45.0	42.3	1'916
maturità/scuola magistrale	4.3	6.6	4.9	0.6	3.5	1.3	2.7	0.0	2.3	1.9	3.2	2.2	9.8	8.5	8.8	3.7	6.9	4.8	216
formazione prof. superiore	9.7	7.0	8.9	5.3	1.8	4.4	6.1	6.9	6.3	0.7	0.6	0.7	15.2	7.6	9.2	6.9	5.7	6.5	294
scuola universitaria o università	8.0	5.5	7.3	1.2	0.0	0.9	1.4	3.4	1.7	1.2	2.6	1.5	8.0	9.9	9.5	5.5	6.8	5.9	268
dottorato o abilitazione	0.8	0.9	0.8	1.2	0.0	0.9	0.7	0.0	0.6	0.0	1.3	0.2	2.7	1.4	1.7	0.7	0.9	0.8	34
<b>N**</b>	<b>1'590</b>	<b>653</b>	<b>2'243</b>	<b>170</b>	<b>57</b>	<b>227</b>	<b>147</b>	<b>29</b>	<b>176</b>	<b>671</b>	<b>155</b>	<b>826</b>	<b>112</b>	<b>433</b>	<b>545</b>	<b>3'004</b>	<b>1'525</b>	<b>4'529</b>	<b>4'529</b>
<i>dati mancanti</i>	716	326	1'042	122	36	158	56	11	67	234	39	273	88	355	443	1'338	849	2'187	2'187
<b>Statuto professionale*</b>																			
senza attività professionale	20.3	32.6	23.9	32.4	36.8	33.3	16.7	25.0	18.0	14.4	18.0	14.9	50.0	14.0	19.0	20.2	29.0	22.6	567
apprendista, praticante	2.1	2.0	2.1	3.4	5.3	3.8	4.6	0.0	3.9	34.5	22.0	32.8	0.0	0.0	0.0	8.9	4.4	7.7	193
manovale, operaio-a ausiliare	3.7	4.9	4.0	4.8	7.9	5.5	10.2	10.0	10.2	2.9	0.0	2.5	0.0	6.0	5.2	4.1	5.1	4.4	110
operaio-a con formaz. pratica	7.6	7.4	7.5	11.0	18.4	12.6	10.2	10.0	10.2	1.9	4.0	2.2	0.0	10.0	8.6	7.2	8.0	7.4	186
oper. con formaz. certif. (AFC)	15.0	6.7	12.6	18.6	10.5	16.9	19.4	25.0	20.3	8.9	4.0	8.3	0.0	10.0	8.6	13.9	7.7	12.3	308
caposquadra	2.9	0.4	2.2	2.1	0.0	1.6	2.8	0.0	2.3	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	2.3	0.5	1.8	46
impiegato-a non qualificato-a	18.8	27.6	21.3	11.0	15.8	12.0	13.0	15.0	13.3	5.8	12.0	6.6	0.0	30.0	25.9	15.0	24.8	17.6	442
impieg. qualif., quadro medio	13.0	9.7	12.0	9.7	5.3	8.7	16.7	10.0	15.6	4.8	4.0	4.7	12.5	10.0	10.3	10.9	9.0	10.4	262
imp. funz. dirett., quadr. sup.	5.1	2.0	4.2	1.4	0.0	1.1	0.0	5.0	0.8	1.0	0.0	0.8	12.5	4.0	5.2	3.6	1.8	3.1	79
indipendente	8.5	5.2	7.5	4.1	0.0	3.3	5.6	0.0	4.7	1.3	4.0	1.7	25.0	12.0	13.8	6.4	5.3	6.1	153
scolaro-a, studente	1.0	0.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.7	32.0	24.0	0.0	4.0	3.4	5.6	4.1	5.2	130
altro statuto	2.0	0.4	1.6	1.4	0.0	1.1	0.9	0.0	0.8	1.6	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.8	0.6	1.5	38
<b>N**</b>	<b>1'093</b>	<b>445</b>	<b>1'538</b>	<b>145</b>	<b>38</b>	<b>183</b>	<b>108</b>	<b>20</b>	<b>128</b>	<b>313</b>	<b>50</b>	<b>363</b>	<b>8</b>	<b>50</b>	<b>58</b>	<b>1'848</b>	<b>666</b>	<b>2'514</b>	<b>2'514</b>
<i>dati mancanti</i>	1'213	534	1'747	147	55	202	95	20	115	592	144	736	192	738	930	2'494	1'708	4'202	4'202

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

## T6 Fonte di reddito principale e attività dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2013)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			N
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Fonte di reddito principale (nel corso dei 30 ultimi giorni)*</b>																			
stipendio/salario	54.5	39.6	50.0	33.7	22.1	30.8	60.1	40.5	57.0	28.3	19.8	26.8	64.8	65.0	65.0	46.9	41.9	45.3	2'589
risparmi	2.2	0.9	1.8	1.6	0.0	1.2	0.5	2.7	0.9	0.7	0.5	0.7	0.0	0.5	0.4	1.6	0.7	1.3	77
rendita (AVS/AI o altre)	14.5	21.6	16.7	12.9	26.7	16.4	9.8	2.7	8.7	2.4	6.0	3.0	12.5	11.7	11.8	11.0	17.8	13.2	754
assistenza sociale	14.7	14.7	14.7	31.8	37.2	33.1	12.4	32.4	15.7	9.8	17.6	11.2	2.3	2.2	2.2	14.4	13.2	14.0	802
assicurazione disoccupazione	7.7	5.0	6.9	8.2	4.7	7.3	5.2	10.8	6.1	3.5	2.7	3.3	3.4	1.9	2.2	6.4	3.8	5.6	318
sostegno del/della partner	2.0	13.9	5.5	3.1	2.3	2.9	1.6	2.7	1.7	0.8	1.1	0.9	3.4	13.8	11.8	1.7	10.7	4.6	263
sostegno dei genitori/conoscenti	2.3	1.6	2.1	2.7	3.5	2.9	5.2	8.1	5.7	52.6	51.6	52.4	13.6	3.0	5.0	15.6	9.8	13.7	785
spacciando, trafficando	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.2	1.6	0.0	1.3	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	11
altre entrate illegali	0.0	0.0	0.0	0.8	1.2	0.9	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	5
prostituzione	0.0	0.1	0.0	0.0	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	2
assicurazione d'indennità giornaliere	0.9	1.0	0.9	0.8	0.0	0.6	1.0	0.0	0.9	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.7	0.5	0.7	38
altra	1.2	1.7	1.4	2.7	1.2	2.3	2.1	0.0	1.7	1.1	0.5	1.0	0.0	1.9	1.5	1.2	1.4	1.3	73
<b>N**</b>	<b>2'102</b>	<b>901</b>	<b>3'003</b>	<b>255</b>	<b>86</b>	<b>341</b>	<b>193</b>	<b>37</b>	<b>230</b>	<b>837</b>	<b>182</b>	<b>1'019</b>	<b>88</b>	<b>369</b>	<b>457</b>	<b>3'883</b>	<b>1'834</b>	<b>5'717</b>	<b>5'717</b>
<i>dati mancanti</i>	204	78	282	37	7	44	10	3	13	68	12	80	112	419	531	459	540	999	999
<b>Attività principale (nel corso dei 30 ultimi giorni)*</b>																			
att. a tempo pieno (70% o più)	53.3	26.9	45.7	36.3	19.7	32.5	56.8	34.3	53.2	20.2	12.2	18.8	65.7	46.8	50.3	43.8	29.4	39.4	2'014
attività a tempo parziale	5.5	23.7	10.7	2.1	12.7	4.6	2.7	8.6	3.7	1.9	4.1	2.3	3.0	34.5	28.6	4.3	22.0	9.6	492
lavori occasionali	1.4	0.9	1.2	1.3	0.0	1.0	3.8	0.0	3.2	1.5	0.6	1.3	1.5	0.7	0.8	1.5	0.8	1.3	64
in formazione	2.9	2.5	2.8	2.6	4.2	3.0	5.5	5.7	5.5	57.5	58.1	57.6	11.9	4.4	5.8	17.7	12.5	16.1	823
disoccup., ricerc. di un lavoro	14.2	10.0	13.0	21.4	16.9	20.3	13.1	31.4	16.1	8.4	9.9	8.6	6.0	2.7	3.3	12.6	8.9	11.5	589
disoccup., senza ricerc. di un lavoro	5.2	6.5	5.6	12.4	16.9	13.4	4.4	5.7	4.6	2.2	1.7	2.2	0.0	2.4	1.9	5.0	5.2	5.1	259
rendita	4.5	7.0	5.2	2.1	1.4	2.0	2.2	0.0	1.8	0.5	0.6	0.5	3.0	2.4	2.5	3.0	4.3	3.4	173
incapacità di lavoro	4.9	7.6	5.7	7.7	9.9	8.2	5.5	2.9	5.0	1.4	1.2	1.3	0.0	1.4	1.1	4.1	5.2	4.4	227
casalinga/casalingo	0.2	5.1	1.6	0.0	2.8	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	2.7	3.1	0.2	3.3	1.1	57
altra	7.9	9.7	8.4	14.1	15.5	14.4	6.0	11.4	6.9	6.5	11.6	7.4	4.5	2.0	2.5	7.9	8.4	8.0	411
<b>N**</b>	<b>1'898</b>	<b>759</b>	<b>2'657</b>	<b>234</b>	<b>71</b>	<b>305</b>	<b>183</b>	<b>35</b>	<b>218</b>	<b>802</b>	<b>172</b>	<b>974</b>	<b>67</b>	<b>293</b>	<b>360</b>	<b>3'566</b>	<b>1'543</b>	<b>5'109</b>	<b>5'109</b>
<i>dati mancanti</i>	408	220	628	58	22	80	20	5	25	103	22	125	133	495	628	776	831	1'607	1'607

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

## T7 Reddito mensile netto e debiti dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2013)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Reddito mensile netto (6 ultimi mesi)*</b>																			
nessun reddito	39.4	48.2	41.5	54.1	52.9	53.8	24.5	33.3	25.9	53.7	76.0	56.4	100.0	82.5	85.3	43.8	60.7	48.2	618
fino a 1000 fr.	2.6	2.9	2.7	8.1	11.8	8.8	0.0	22.2	3.4	22.6	16.0	21.8	0.0	0.0	0.0	7.0	5.1	6.5	83
da 1001 a 2000 fr.	4.5	14.1	6.8	4.1	5.9	4.4	4.1	0.0	3.4	7.9	4.0	7.4	0.0	3.1	2.6	5.2	8.6	6.1	78
da 2001 a 3000 fr.	6.6	7.1	6.7	6.8	23.5	9.9	4.1	11.1	5.2	1.1	0.0	1.0	0.0	2.1	1.7	5.5	6.0	5.6	72
da 3001 a 4000 fr.	10.7	15.3	11.8	8.1	0.0	6.6	10.2	22.2	12.1	4.5	4.0	4.5	0.0	3.1	2.6	9.1	10.1	9.4	120
da 4001 a 5000 fr.	12.8	6.5	11.3	5.4	0.0	4.4	16.3	11.1	15.5	6.8	0.0	5.9	0.0	5.2	4.3	11.0	5.1	9.4	121
da 5001 a 6000 fr.	8.5	3.5	7.3	2.7	0.0	2.2	28.6	0.0	24.1	1.1	0.0	1.0	0.0	4.1	3.4	7.5	3.0	6.3	81
da 6001 a 8000 fr.	7.9	1.2	6.3	6.8	5.9	6.6	6.1	0.0	5.2	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	5.7	0.9	4.4	57
da 8001 a 10 000 fr.	5.1	1.2	4.1	4.1	0.0	3.3	6.1	0.0	5.2	1.7	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	4.1	0.6	3.2	41
da 10 001 a 15 000 fr.	1.3	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	7
più di 15 000 fr.	0.6	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	4
<b>N**</b>	<b>531</b>	<b>170</b>	<b>701</b>	<b>74</b>	<b>17</b>	<b>91</b>	<b>49</b>	<b>9</b>	<b>58</b>	<b>177</b>	<b>25</b>	<b>202</b>	<b>19</b>	<b>97</b>	<b>116</b>	<b>946</b>	<b>336</b>	<b>1'282</b>	<b>1'282</b>
<i>dati mancanti</i>	<i>1'775</i>	<i>809</i>	<i>2'584</i>	<i>218</i>	<i>76</i>	<i>294</i>	<i>154</i>	<i>31</i>	<i>185</i>	<i>728</i>	<i>169</i>	<i>897</i>	<i>181</i>	<i>691</i>	<i>872</i>	<i>3'396</i>	<i>2'038</i>	<i>5'434</i>	<i>5'434</i>
<b>Debiti*</b>																			
nessun debito	67.6	73.0	69.1	46.7	40.0	45.0	46.8	44.4	46.6	86.4	83.0	85.7	80.8	93.1	90.6	69.6	75.5	71.3	1'554
fino a 5000 fr.	3.6	4.3	3.8	2.2	6.7	3.3	5.1	22.2	6.8	2.7	6.6	3.5	7.7	2.0	3.1	4.1	5.6	4.5	99
da 5001 a 10 000 fr.	9.1	8.9	9.0	14.4	13.3	14.2	7.6	0.0	6.8	4.3	5.7	4.6	3.8	1.0	1.6	7.9	6.8	7.6	165
da 10 001 a 25 000 fr.	6.0	5.3	5.8	13.3	10.0	12.5	15.2	33.3	17.0	4.3	1.9	3.8	0.0	0.0	0.0	6.4	4.0	5.7	125
da 25 001 a 50 000 fr.	4.8	3.6	4.5	12.2	13.3	12.5	11.4	0.0	10.2	1.1	0.9	1.1	3.8	3.9	3.9	4.4	3.5	4.2	91
da 50 001 a 100 000 fr.	3.1	2.1	2.8	7.8	10.0	8.3	5.1	0.0	4.5	0.7	0.9	0.7	3.8	0.0	0.8	3.1	2.1	2.8	62
più di 100 000 fr.	2.5	0.4	1.9	0.0	6.7	1.7	2.5	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.8	1.6	34
importo sconosciuto	3.3	2.5	3.1	3.3	0.0	2.5	6.3	0.0	5.7	0.5	0.9	0.5	0.0	0.0	0.0	2.6	1.6	2.3	50
<b>N**</b>	<b>750</b>	<b>281</b>	<b>1'031</b>	<b>90</b>	<b>30</b>	<b>120</b>	<b>79</b>	<b>9</b>	<b>88</b>	<b>441</b>	<b>106</b>	<b>547</b>	<b>26</b>	<b>102</b>	<b>128</b>	<b>1'560</b>	<b>620</b>	<b>2'180</b>	<b>2'180</b>
<i>dati mancanti</i>	<i>1'556</i>	<i>698</i>	<i>2'254</i>	<i>202</i>	<i>63</i>	<i>265</i>	<i>124</i>	<i>31</i>	<i>155</i>	<i>464</i>	<i>88</i>	<i>552</i>	<i>174</i>	<i>686</i>	<i>860</i>	<i>2'782</i>	<i>1'754</i>	<i>4'536</i>	<i>4'536</i>

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

## T8 Incarcerazione o detenzione preventiva prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2013)

	Pazienti: problema principale												Tutti gli interventi			N
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Incarcerazione o detenzione preventiva*</b>																
nessuna	90.3	95.9	92.0	51.3	75.0	55.3	68.6	75.0	69.2	82.2	90.0	83.0	85.4	94.2	87.7	865
in prigione	2.5	0.9	2.0	5.1	12.5	6.4	8.6	0.0	7.7	2.2	10.0	3.0	3.2	1.5	2.7	27
in detenzione preventiva	5.6	2.3	4.6	15.4	12.5	14.9	17.1	25.0	17.9	10.0	0.0	9.0	7.6	3.1	6.4	63
in prigione e in detenzione preventiva	1.5	0.9	1.4	28.2	0.0	23.4	5.7	0.0	5.1	5.6	0.0	5.0	3.9	1.2	3.1	31
<b>N**</b>	<b>517</b>	<b>221</b>	<b>738</b>	<b>39</b>	<b>8</b>	<b>47</b>	<b>35</b>	<b>4</b>	<b>39</b>	<b>90</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>727</b>	<b>259</b>	<b>986</b>	<b>986</b>
<i>dati mancanti</i>	1'789	758	2'547	253	85	338	168	36	204	815	184	999	3'415	1'327	4'742	4'742
<b>Durata totale di detenzione***</b>																
fino a 1 mese	42.3	50.0	42.9	9.1	0.0	7.7	44.4	0.0	44.4	83.3	0.0	83.3	37.5	25.0	36.7	22
> 1 a 2 mesi	11.5	0.0	10.7	9.1	50.0	15.4	11.1	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	10.7	25.0	11.7	7
> 2 a 6 mesi	26.9	50.0	28.6	18.2	50.0	23.1	22.2	0.0	22.2	16.7	0.0	16.7	21.4	50.0	23.3	14
> 6 a 12 mesi	7.7	0.0	7.1	18.2	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	10.0	6
più di un anno	11.5	0.0	10.7	45.5	0.0	38.5	22.2	0.0	22.2	0.0	0.0	0.0	19.6	0.0	18.3	11
<b>N**</b>	<b>26</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>56</b>	<b>4</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<i>dati mancanti</i>	24	7	31	8	0	8	2	1	3	10	1	11	50	11	61	61

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti che hanno vissuto un'esperienza di detenzione. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile



## T9 Istanza d'invio principale, secondo il problema principale e per i parenti o conoscenti (2013)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Istanza d'invio principale*</b>																			
condanna/misure	17.3	6.4	14.0	15.8	8.3	14.0	20.8	14.3	19.7	50.9	39.1	48.7	0.6	1.1	1.0	22.9	7.2	17.3	1'044
studio medico	8.8	14.0	10.4	13.8	15.5	14.2	6.7	8.6	7.0	3.3	3.3	3.3	3.4	4.6	4.4	7.6	9.3	8.2	492
istit. specializzata (dipendenze)	7.2	9.8	8.0	11.5	21.4	14.0	5.6	5.7	5.6	1.3	2.2	1.5	2.8	2.9	2.9	5.6	6.8	6.0	363
altro servizio medico/sociale/sanitario	16.8	20.8	18.0	11.9	7.1	10.8	10.7	11.4	10.8	7.5	9.2	7.8	7.4	3.2	4.0	13.2	12.6	13.0	784
istit. formatrice/educativa	0.6	0.5	0.5	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	3.9	9.2	4.9	0.6	0.7	0.7	1.9	2.0	1.9	116
datore di lavoro	4.6	2.3	3.9	1.9	0.0	1.5	1.1	2.9	1.4	1.8	1.1	1.7	1.7	1.0	1.1	3.3	1.5	2.7	162
propria iniziativa/famiglia/amici	43.4	45.3	44.0	42.3	44.0	42.7	52.2	54.3	52.6	29.9	33.2	30.5	81.8	84.6	84.1	43.6	58.8	49.0	2'954
altra	1.3	1.0	1.2	2.3	3.6	2.6	2.8	2.9	2.8	1.2	2.7	1.5	1.7	1.9	1.8	1.9	1.8	1.8	111
<b>N**</b>	<b>2'060</b>	<b>880</b>	<b>2'940</b>	<b>260</b>	<b>84</b>	<b>344</b>	<b>178</b>	<b>35</b>	<b>213</b>	<b>815</b>	<b>184</b>	<b>999</b>	<b>176</b>	<b>697</b>	<b>873</b>	<b>3'879</b>	<b>2'147</b>	<b>6'026</b>	<b>6'026</b>
<i>dati mancanti</i>	246	99	345	32	9	41	25	5	30	90	10	100	24	91	115	463	227	690	690

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

## T10 Intervento in seguito ad una misura giudiziaria e tipo di misura, secondo il problema principale e per i parenti o conoscenti (2013)

	Pazienti: problema principale												Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Intervento conseguente ad una misura giudiziaria*</b>																
no, nessuna misura	86.5	95.0	89.0	89.2	90.3	89.4	94.7	93.3	94.5	64.0	74.5	65.5	83.5	93.2	86.0	1'964
sosp./rinuncia/avvert.(art. 19a c.2 LStup)	0.8	0.0	0.5	0.8	3.2	1.3	1.1	0.0	0.9	9.3	6.4	8.9	2.2	0.9	1.9	43
sì, consecutiva ad una misura	12.8	5.0	10.5	10.0	6.5	9.3	4.3	6.7	4.6	26.6	19.1	25.6	14.3	6.0	12.1	277
<b>N**</b>	<b>1'050</b>	<b>436</b>	<b>1'486</b>	<b>120</b>	<b>31</b>	<b>151</b>	<b>94</b>	<b>15</b>	<b>109</b>	<b>289</b>	<b>47</b>	<b>336</b>	<b>1'696</b>	<b>588</b>	<b>2'284</b>	<b>2'284</b>
<i>dati mancanti</i>	1'256	543	1'799	172	62	234	109	25	134	616	147	763	2'446	998	3'444	3'444
<b>Tipo di misura giudiziaria***</b>																
misure di prot. med. (art. 19a ch3 LStup)	4.4	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	20.0	5.0	3.6	4.3	3.7	6
misure terapeutiche stazionarie (art. 59 CP)	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	2.5	0.7	4.3	1.2	2
tratt. residenz. di tossicodipendenza (art. 60)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
presa in carico ambulatoriale	18.9	17.6	18.7	33.3	0.0	33.3	100.0	0.0	100.0	48.6	40.0	47.5	30.4	26.1	29.8	48
sistemazione in istituzione per giovani adulti	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
in attesa di giudizio	2.2	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.9	0.0	20.0	8.0	0.0	6.8	11
altro	75.6	82.4	76.6	33.3	0.0	33.3	100.0	0.0	100.0	25.7	20.0	25.0	58.7	65.2	59.6	96
<b>N**</b>	<b>90</b>	<b>17</b>	<b>107</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>35</b>	<b>5</b>	<b>40</b>	<b>138</b>	<b>23</b>	<b>161</b>	<b>161</b>
<i>dati mancanti</i>	52	5	57	10	3	13	4	1	5	69	7	76	142	17	159	159

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali possono comprendere ugualmente le persone il cui sesso non è noto

## T11 Trattamenti/accompagnamenti anteriori l'ammissione e tipi di intervento, secondo il problema principale e per parenti o conoscenti (2013)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			N
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Interventi precedenti*</b>																			
no	47.0	39.8	44.8	13.9	14.3	14.0	42.4	56.3	44.6	76.9	79.0	77.3	65.6	70.7	69.7	53.1	50.5	52.3	2'839
sì	53.0	60.2	55.2	86.1	85.7	86.0	57.6	43.8	55.4	23.1	21.0	22.7	34.4	29.3	30.3	46.9	49.5	47.7	2'592
<b>N**</b>	<b>2'050</b>	<b>886</b>	<b>2'936</b>	<b>259</b>	<b>84</b>	<b>343</b>	<b>172</b>	<b>32</b>	<b>204</b>	<b>824</b>	<b>176</b>	<b>1'000</b>	<b>61</b>	<b>276</b>	<b>337</b>	<b>3'737</b>	<b>1'694</b>	<b>5'431</b>	<b>5'431</b>
<i>dati mancanti</i>	256	93	349	33	9	42	31	8	39	81	18	99	139	512	651	605	680	1'285	1'285
<b>Tipo di intervento***</b>																			
trattamento con prescriz. di eroina	1.1	0.8	1.0	4.3	6.3	4.8	1.9	0.0	1.7	0.9	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	1.3	1.1	1.2	20
terapia sostitut. (metadone, subutex)	6.0	5.3	5.8	58.1	75.0	62.4	17.3	12.5	16.7	5.2	0.0	4.3	11.1	4.1	5.5	11.5	9.1	10.7	180
altro tratt. medicam. delle dipendenze	7.3	5.1	6.6	8.6	12.5	9.6	9.6	0.0	8.3	1.7	0.0	1.4	11.1	5.5	6.6	6.8	5.3	6.3	106
consulenza ambulatoriale	72.7	68.5	71.3	66.7	53.1	63.2	75.0	25.0	68.3	84.3	80.0	83.6	83.3	90.4	89.0	73.6	72.2	73.1	1'233
struttura di giorno/clinica di giorno	1.5	2.0	1.6	0.0	3.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.6	1.2	20
terapia residenziale	45.7	52.5	47.9	35.5	40.6	36.8	36.5	37.5	36.7	21.7	20.0	21.4	22.2	23.3	23.1	40.0	44.0	41.3	697
cura di disintossicazione	44.3	43.5	44.0	50.5	56.3	52.0	34.6	25.0	33.3	12.2	8.0	11.4	27.8	13.7	16.5	39.0	34.5	37.5	632
gruppo di aiuto reciproco/ autosost.	5.2	6.7	5.7	4.3	0.0	3.2	1.9	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	1.1	4.4	4.6	4.4	75
altro-i	2.3	2.2	2.3	0.0	3.1	0.8	0.0	0.0	0.0	6.1	8.0	6.4	5.6	2.7	3.3	2.6	2.6	2.6	44
<b>N**</b>	<b>750</b>	<b>356</b>	<b>1'106</b>	<b>93</b>	<b>32</b>	<b>125</b>	<b>52</b>	<b>8</b>	<b>60</b>	<b>115</b>	<b>25</b>	<b>140</b>	<b>18</b>	<b>73</b>	<b>91</b>	<b>1'116</b>	<b>571</b>	<b>1'687</b>	<b>1'687</b>
<i>dati mancanti</i>	345	183	528	130	40	170	47	6	53	80	13	93	4	10	14	655	279	934	934

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti che sono già stati presi in carico in precedenza. Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

## T12 Trattamento sostitutivo o prescrizione di eroina al momento dell'ammissione, secondo il problema principale (solo pazienti)

	Pazienti: problema principale												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Sostituzione o prescrizione di eroina al momento dell'ammissione*</b>																
no	97.9	96.9	97.6	39.7	42.9	40.6	92.0	93.8	92.2	99.4	99.1	99.3	95.5	95.2	95.4	2'744
sì	2.1	3.1	2.4	60.3	57.1	59.4	8.0	6.3	7.8	0.6	0.9	0.7	4.5	4.8	4.6	131
<b>N**</b>	<b>1'211</b>	<b>517</b>	<b>1'728</b>	<b>73</b>	<b>28</b>	<b>101</b>	<b>87</b>	<b>16</b>	<b>103</b>	<b>471</b>	<b>110</b>	<b>581</b>	<b>2'033</b>	<b>842</b>	<b>2'875</b>	<b>2'875</b>
<i>dati mancanti</i>	1'095	462	1'557	219	65	284	116	24	140	434	84	518	2'109	744	2'853	2'853
<b>Tipo di sostituzione/prescrizione***</b>																
eroina	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	1.6	2
metadone	80.8	87.5	83.3	86.4	86.7	86.4	80.0	100.0	83.3	100.0	100.0	100.0	83.1	87.2	84.4	108
altri oppiacei	15.4	12.5	14.3	4.5	13.3	6.8	20.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	11.2	12.8	11.7	15
altre sostanze	3.8	0.0	2.4	4.5	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	2.3	3
<b>N**</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>15</b>	<b>59</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>89</b>	<b>39</b>	<b>128</b>	<b>128</b>
<i>dati mancanti</i>	0	0	0	0	1	1	2	0	2	0	0	0	2	1	3	3
<b>Intervento di sostituzione nel corso della vita*</b>																
no	94.4	96.0	94.9	34.9	35.1	34.9	85.1	91.7	86.2	98.6	98.7	98.6	89.5	91.9	90.1	2'989
sì	5.6	4.0	5.1	65.1	64.9	65.1	14.9	8.3	13.8	1.4	1.3	1.4	10.5	8.1	9.9	327
<b>N**</b>	<b>1'419</b>	<b>622</b>	<b>2'041</b>	<b>192</b>	<b>57</b>	<b>249</b>	<b>121</b>	<b>24</b>	<b>145</b>	<b>429</b>	<b>77</b>	<b>506</b>	<b>2'404</b>	<b>912</b>	<b>3'316</b>	<b>3'316</b>
<i>dati mancanti</i>	887	357	1'244	100	36	136	82	16	98	476	117	593	1'738	674	2'412	2'412
<b>Età all'inizio del primo trattamento di sostituzione****</b>																
media	29.9	22.1	28.3	28.0	25.8	27.6	26.6	24.5	26.1	-	-	-	28.1	25.1	27.5	
deviazione standard	9.2	7.9	9.4	6.5	4.7	6.2	6.7	7.8	6.5	-	-	-	7.3	6.4	7.2	
1° quartile	25.0	18.0	22.0	23.0	22.5	23.0	21.0	19.0	21.0	-	-	-	23.0	19.0	23.0	
mediana	28.0	18.5	26.0	27.0	24.5	26.0	25.0	24.5	25.0	-	-	-	26.5	24.0	26.0	
3° quartile	32.0	24.0	32.0	32.0	30.5	32.0	30.0	30.0	30.0	-	-	-	32.0	30.0	31.0	
<b>N**</b>	<b>33</b>	<b>8</b>	<b>41</b>	<b>67</b>	<b>16</b>	<b>83</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>29</b>	<b>147</b>	

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti che seguono un programma di sostituzione o di prescrizione di eroina al momento dell'ammissione. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti che hanno segnalato un'esperienza di sostituzione nel corso della vita

## T13 Problema principale all'entrata (solamente pazienti) (2013)

Tutti i pazienti									
Problema principale	Uomini	Donne	Totale			Uomini	Donne	Totale	
	%	%	%	N		%	%	%	N
alcol	55.7	61.7	57.3	3'285	alcol	55.7	61.7	57.3	3'285
eroina	6.0	4.3	5.6	318					
metadone	0.8	0.9	0.8	47					
buprenorfina	0.0	0.0	0.0	1	oppioidi	7.0	5.9	6.7	385
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0					
altri oppioidi	0.2	0.6	0.3	19					
cocaina	4.8	2.5	4.1	237					
crack	0.1	0.1	0.1	6	cocaina e derivati	4.9	2.5	4.2	243
altra forma di cocaina	0.0	0.0	0.0	0					
anfetamine	0.7	0.9	0.7	42					
metanfetamine	0.1	0.0	0.1	5					
MDMA e affini (ecstasy)	0.3	0.6	0.4	24	altri stimolanti	1.3	1.6	1.3	77
catinoni sintetici	0.1	0.0	0.1	4					
altri stimolanti	0.0	0.1	0.0	2					
barbiturici	0.0	0.1	0.0	2					
benzodiazepina	0.7	1.6	0.9	53	ipnotici/sedativi	0.7	2.1	1.1	64
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0					
altri sonniferi e tranquillanti	0.1	0.4	0.2	9					
LSD	0.1	0.0	0.1	4					
ketamina	0.0	0.0	0.0	0	allucinogeni	0.1	0.0	0.1	5
altri allucinogeni	0.0	0.0	0.0	1					
canapa	21.8	12.2	19.2	1'099	canapa	21.8	12.2	19.2	1'099
tabacco	2.5	4.6	3.1	178	tabacco	2.5	4.6	3.1	178
sostanze volatili	0.0	0.1	0.0	1					
altra sostanza	0.6	0.2	0.5	26	altra/e sostanza/e	0.6	0.3	0.5	27
gioco patologico	2.4	1.5	2.1	122					
dipendenza al computer/Internet	1.0	0.2	0.8	45	problemi assimilabili a una dipendenza	5.3	9.1	6.4	365
disturbi alimentari	0.3	5.2	1.6	94					
altro/i problema/i di dipendenza	1.6	2.3	1.8	104					
<b>N**</b>	<b>4'142</b>	<b>1'586</b>	<b>5'728</b>	<b>5'728</b>		<b>4'142</b>	<b>1'586</b>	<b>5'728</b>	<b>5'728</b>
<i>dati mancanti</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

## T14 Uso di sostanze multiple e combinazioni di sostanze (2013)

Tutti i pazienti			
	Uomini	Donne	Totale
<b>Problema legato all'uso di sostanze multiple secondo la CIM 10*</b>			
sì	11.2	11.2	11.2
no	88.8	88.8	88.8
<b>N**</b>	<b>1'698</b>	<b>553</b>	<b>2'251</b>
<i>dati mancanti</i>	2'444	1'033	3'477
<b>Combinazioni più frequenti di sostanze***</b>			
coc/alc	10.4	5.5	9.2
can/alc	9.8	5.5	8.8
tab/alc	6.4	12.7	7.9
tab/can/alc	8.1	5.5	7.5
som/alc	4.6	10.9	6.1
op/alc	4.6	5.5	4.8
coc/op/alc	2.9	1.8	2.6
som/op	2.9	1.8	2.6
can/coc/alc	3.5	0.0	2.6
som/op/alc	1.7	3.6	2.2
tab/can/coc/alc	2.3	1.8	2.2
coc/op	2.3	0.0	1.8
tab/op/alc	2.3	0.0	1.8
tab/coc/alc	1.7	1.8	1.8
tab/can/coc	2.3	0.0	1.8
stim/coc/op/alc	1.2	1.8	1.3
som/coc	1.2	1.8	1.3
can/coc	1.2	1.8	1.3
can/coc/op/alc	0.6	3.6	1.3
tab/som/alc	0.6	3.6	1.3
tab/som/op/alc	1.2	1.8	1.3
tab/can	1.2	1.8	1.3
tab/can/som/op/alc	1.2	1.8	1.3
tab/can/hall/coc/op/alc	1.2	1.8	1.3
autres combinaisons	24.9	23.6	24.6
<b>N**</b>	<b>173</b>	<b>55</b>	<b>228</b>
<i>dati mancanti</i>	17	7	24

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

## T15.1a Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata (2013), uomini

	Pazienti: principale sostanza problematica								
	Alcol	Oppioidi	Cocaina e derivati	Stimolanti	Ipnocici/sedativi	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
<b>Frequenza di consumo 30 ultimi giorni (%)*</b>									
ogni giorno	42.3	43.1	13.7	14.3	62.5	0.0	28.9	84.6	60.0
4-6 giorni a settimana	11.4	7.7	13.0	4.8	12.5	0.0	8.1	7.7	13.3
2-3 giorni a settimana	12.2	12.4	18.6	21.4	0.0	0.0	17.8	5.5	26.7
max. 1 giorno a settimana	9.4	11.5	29.8	35.7	12.5	66.7	20.1	0.0	0.0
nessun consumo	24.7	25.4	24.8	23.8	12.5	33.3	25.1	2.2	0.0
<b>N**</b>	<b>1'833</b>	<b>209</b>	<b>161</b>	<b>42</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>786</b>	<b>91</b>	<b>15</b>
<i>dati mancanti</i>	473	83	42	10	7	2	119	14	8

## T15.1b Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata (2013), donne

<b>Frequenza di consumo 30 ultimi giorni (%)*</b>									
ogni giorno	44.7	50.0	11.4	17.4	63.2	0.0	31.5	92.4	33.3
4-6 giorni a settimana	14.3	4.8	8.6	13.0	0.0	0.0	7.9	0.0	0.0
2-3 giorni a settimana	12.9	8.1	28.6	13.0	5.3	0.0	13.9	1.5	0.0
max. 1 giorno a settimana	8.5	11.3	31.4	21.7	10.5	0.0	24.2	1.5	33.3
nessun consumo	19.7	25.8	20.0	34.8	21.1	0.0	22.4	4.5	33.3
<b>N**</b>	<b>778</b>	<b>62</b>	<b>35</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>66</b>	<b>3</b>
<i>dati mancanti</i>	201	31	5	2	14	0	29	7	1

## T15.1c Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata (2013), uomini e donne

<b>Frequenza di consumo 30 ultimi giorni (%)*</b>									
ogni giorno	43.0	44.6	13.3	15.4	62.8	0.0	29.3	87.9	55.6
4-6 giorni a settimana	12.3	7.0	12.2	7.7	7.0	0.0	8.1	4.5	11.1
2-3 giorni a settimana	12.4	11.4	20.4	18.5	2.3	0.0	17.1	3.8	22.2
max. 1 giorno a settimana	9.1	11.4	30.1	30.8	11.6	66.7	20.8	0.6	5.6
nessun consumo	23.2	25.5	24.0	27.7	16.3	33.3	24.6	3.2	5.6
<b>N**</b>	<b>2'611</b>	<b>271</b>	<b>196</b>	<b>65</b>	<b>43</b>	<b>3</b>	<b>951</b>	<b>157</b>	<b>18</b>
<i>dati mancanti</i>	674	114	47	12	21	2	148	21	9

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

## T15.2a Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata (2013), uomini

	Patient-e-s: problème principal			
	Gioco patologico	Dipendenza al computer/Internet	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
<b>Frequenza di manifestazione 30 ultimi giorni (%)*</b>				
ogni giorno	17.5	43.3	0.0	64.7
4 a 6 giorni alla settimana	7.0	3.3	25.0	3.9
2 a 3 giorni alla settimana	22.8	20.0	0.0	7.8
1 giorno alla settimana o meno	26.3	13.3	25.0	9.8
nessuna manifestazione	26.3	20.0	50.0	13.7
<b>N**</b>	<b>57</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>51</b>
<i>dati mancanti</i>	42	12	8	16

## T15.2b Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata (2013), donne

<b>Frequenza di manifestazione 30 ultimi giorni (%)*</b>				
ogni giorno	0.0	100.0	63.2	44.4
4 a 6 giorni alla settimana	0.0	0.0	17.5	3.7
2 a 3 giorni alla settimana	25.0	0.0	10.5	14.8
1 giorno alla settimana o meno	18.8	0.0	5.3	14.8
nessuna manifestazione	56.3	0.0	3.5	22.2
<b>N**</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>57</b>	<b>27</b>
<i>dati mancanti</i>	7	2	25	10

## T15.2c Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata (2013), uomini e donne

<b>Frequenza di manifestazione 30 ultimi giorni (%)*</b>				
ogni giorno	13.7	45.2	59.0	57.7
4 a 6 giorni alla settimana	5.5	3.2	18.0	3.8
2 a 3 giorni alla settimana	23.3	19.4	9.8	10.3
1 giorno alla settimana o meno	24.7	12.9	6.6	11.5
nessuna manifestazione	32.9	19.4	6.6	16.7
<b>N**</b>	<b>73</b>	<b>31</b>	<b>61</b>	<b>78</b>
<i>dati mancanti</i>	49	14	33	26

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)



## T16.1a Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2013), uomini

Pazienti: principale sostanza problematica									
Uomini	Alcol	Oppioidi	Cocaina e derivati	Stimolanti	Ipnocici/sedativi	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
<b>Età all'epoca del primo consumo</b>									
media	16.3	21.1	21.5	18.8	25.8	18.0	14.9	15.5	24.9
deviazione standard	3.8	5.5	5.5	4.3	6.2	-	2.4	5.4	13.6
1° quartile	14.0	18.0	18.0	16.0	22.5	18.0	14.0	13.0	15.5
mediana	16.0	20.0	20.0	18.0	25.5	18.0	15.0	14.0	24.0
3° quartile	18.0	23.0	25.0	20.5	29.5	18.0	16.0	16.0	32.5
<b>N*</b>	<b>1'054</b>	<b>188</b>	<b>126</b>	<b>36</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>627</b>	<b>60</b>	<b>16</b>
<i>dati mancanti</i>	1'252	104	77	16	23	4	278	45	7
<b>Età all'inizio del consumo regolare</b>									
media	22.4	23.5	24.4	19.8	23.8	-	15.7	16.8	50.0
deviazione standard	8.1	6.6	6.0	3.6	6.5	-	2.6	3.6	-
1° quartile	18.0	19.0	20.0	16.0	21.0	-	15.0	14.0	50.0
mediana	20.0	21.0	23.0	19.5	22.0	-	15.0	16.0	50.0
3° quartile	25.0	28.0	28.0	23.0	27.0	-	16.0	19.0	50.0
<b>N*</b>	<b>789</b>	<b>83</b>	<b>67</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>373</b>	<b>50</b>	<b>1</b>
<i>dati mancanti</i>	1'517	209	136	30	26	5	532	55	22
<b>Età all'inizio del consumo problematico</b>									
media	31.6	24.1	25.6	21.4	29.9	-	17.0	20.8	26.9
deviazione standard	12.3	7.1	7.3	4.5	8.2	-	4.1	10.4	12.7
1° quartile	21.0	19.0	20.0	18.0	25.0	-	15.0	15.0	16.5
mediana	30.0	22.0	24.0	21.0	27.0	-	16.0	16.0	26.5
3° quartile	40.0	27.0	30.0	24.5	35.0	-	17.0	20.0	35.0
<b>N*</b>	<b>1'096</b>	<b>167</b>	<b>117</b>	<b>40</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>560</b>	<b>55</b>	<b>16</b>
<i>dati mancanti</i>	1'210	125	86	12	20	5	345	50	7
<b>Periodo di latenza (in anni)**</b>									
media	24.9	9.3	7.8	8.4	3.6	0.6	4.5	10.8	7.4
deviazione standard	13.1	7.3	6.3	7.9	1.8	-	5.6	12.3	5.6
1° quartile	14.4	3.7	2.6	1.8	2.3	0.6	1.3	2.0	3.6
mediana	24.9	7.6	6.7	5.8	3.6	0.6	2.4	5.2	6.8
3° quartile	34.6	12.2	10.4	16.5	4.9	0.6	4.9	16.0	10.3
<b>N*</b>	<b>448</b>	<b>29</b>	<b>50</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>473</b>	<b>40</b>	<b>9</b>
<i>dati mancanti</i>	510	7	23	8	2	0	160	21	1

\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

\*\* Lasso di tempo tra il primo consumo della sostanza problematica e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

## T16.1b Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2013), donne

Pazienti: principale sostanza problematica									
Donne	Alcol	Oppioidi	Cocaina e derivati	Stimolanti	Ipnotici/sedativi	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
<b>Età all'epoca del primo consumo</b>									
media	17.7	21.6	17.7	16.3	31.3	-	14.8	16.1	15.0
deviazione standard	5.6	8.4	3.5	2.0	14.4	-	2.9	2.5	-
1° quartile	15.0	16.0	16.0	15.0	20.0	-	13.0	15.0	15.0
mediana	16.0	18.0	17.5	16.5	33.0	-	15.0	16.0	15.0
3° quartile	19.0	24.0	20.0	18.0	40.0	-	15.0	17.0	15.0
<b>N*</b>	<b>417</b>	<b>55</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>142</b>	<b>36</b>	<b>1</b>
<i>dati mancanti</i>	562	38	10	7	19	0	52	37	3
<b>Età all'inizio del consumo regolare</b>									
media	25.9	23.1	19.1	16.7	47.1	-	16.1	18.4	-
deviazione standard	10.0	7.5	4.8	1.9	14.6	-	3.6	4.0	-
1° quartile	18.0	17.5	15.5	15.0	37.5	-	15.0	16.0	-
mediana	23.0	22.0	18.0	17.0	49.0	-	15.0	18.0	-
3° quartile	30.0	25.5	23.5	18.0	58.0	-	16.0	20.0	-
<b>N*</b>	<b>315</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
<i>dati mancanti</i>	664	73	24	12	21	0	102	43	4
<b>Età all'inizio del consumo problematico</b>									
media	35.6	23.3	19.8	17.5	42.5	-	16.8	21.4	15.0
deviazione standard	12.7	8.2	4.3	2.2	16.0	-	4.9	8.1	-
1° quartile	25.0	17.5	17.0	16.0	29.0	-	14.0	16.0	15.0
mediana	35.0	20.5	19.0	17.0	42.0	-	16.0	20.0	15.0
3° quartile	45.0	25.5	23.0	19.0	53.0	-	17.0	24.0	15.0
<b>N*</b>	<b>515</b>	<b>52</b>	<b>26</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>34</b>	<b>1</b>
<i>dati mancanti</i>	464	41	14	8	17	0	57	39	3
<b>Periodo di latenza (in anni)**</b>									
media	26.5	5.2	7.0	5.5	11.7	-	4.5	20.5	0.4
deviazione standard	13.5	5.4	4.9	6.8	8.8	-	5.6	13.3	-
1° quartile	16.9	1.7	4.2	1.1	5.4	-	1.5	3.8	0.4
mediana	27.0	3.5	6.1	2.0	7.6	-	2.5	23.3	0.4
3° quartile	35.3	6.7	7.9	9.2	19.8	-	4.8	30.9	0.4
<b>N*</b>	<b>164</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>23</b>	<b>1</b>
<i>dati mancanti</i>	189	4	3	1	2	0	26	18	2

\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

\*\* Lasso di tempo tra il primo consumo della sostanza problematica e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

## T16.1c Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2013), uomini e donne

Pazienti: principale sostanza problematica									
<i>Uomini e donne</i>	Alcol	Oppioidi	Cocaina e derivati	Stimolanti	Ipnocici/sedativi	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
<b>Età all'epoca del primo consumo</b>									
media	16.7	21.2	20.8	18.0	29.3	18.0	14.9	15.7	24.4
deviazione standard	4.4	6.2	5.4	3.8	12.2	-	2.5	4.5	13.4
1° quartile	15.0	17.0	17.0	16.0	20.0	18.0	14.0	13.0	15.0
mediana	16.0	20.0	20.0	17.0	26.0	18.0	15.0	15.0	20.0
3° quartile	18.0	24.0	23.0	19.0	37.0	18.0	15.0	16.0	30.0
<b>N*</b>	<b>1'471</b>	<b>243</b>	<b>156</b>	<b>54</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>769</b>	<b>96</b>	<b>17</b>
<i>dati mancanti</i>	1'814	142	87	23	42	4	330	82	10
<b>Età all'inizio del consumo regolare</b>									
media	23.4	23.4	23.3	18.7	40.2	-	15.8	17.4	50.0
deviazione standard	8.8	6.7	6.2	3.4	16.6	-	2.8	3.8	-
1° quartile	18.0	19.0	19.0	16.0	27.0	-	15.0	15.0	50.0
mediana	20.0	21.0	22.0	18.0	39.0	-	15.0	16.5	50.0
3° quartile	27.0	27.0	27.0	20.0	50.0	-	16.0	20.0	50.0
<b>N*</b>	<b>1'104</b>	<b>103</b>	<b>83</b>	<b>35</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>465</b>	<b>80</b>	<b>1</b>
<i>dati mancanti</i>	2'181	282	160	42	47	5	634	98	26
<b>Età all'inizio del consumo problematico</b>									
media	32.9	23.9	24.6	20.3	37.4	-	17.0	21.0	26.2
deviazione standard	12.6	7.3	7.2	4.4	14.6	-	4.2	9.6	12.6
1° quartile	22.0	18.0	19.0	17.0	26.0	-	15.0	15.0	15.0
mediana	30.0	22.0	23.0	19.0	35.0	-	16.0	17.0	24.0
3° quartile	40.0	26.0	30.0	23.0	49.0	-	17.0	21.0	35.0
<b>N*</b>	<b>1'611</b>	<b>219</b>	<b>143</b>	<b>57</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>697</b>	<b>89</b>	<b>17</b>
<i>dati mancanti</i>	1'674	166	100	20	37	5	402	89	10
<b>Periodo di latenza (in anni)**</b>									
media	25.3	8.4	7.6	7.2	9.4	0.6	4.5	14.3	6.7
deviazione standard	13.2	7.1	6.0	7.5	8.2	-	5.6	13.4	5.8
1° quartile	14.9	3.3	3.6	1.3	3.3	0.6	1.4	2.1	1.7
mediana	25.7	6.8	6.2	4.2	5.4	0.6	2.4	9.3	5.5
3° quartile	34.8	11.4	10.2	12.5	19.8	0.6	4.9	24.5	10.3
<b>N*</b>	<b>612</b>	<b>37</b>	<b>65</b>	<b>30</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>586</b>	<b>63</b>	<b>10</b>
<i>dati mancanti</i>	699	11	26	9	4	0	186	39	3

\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

\*\* Lasso di tempo tra il primo consumo della sostanza problematica e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

## T16.2a Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2013), uomini

Pazienti: problema principale				
<i>Uomini</i>	Gioco patologico	Dipendenza al computer/Internet	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
<b>Età all'epoca della prima manifestazione</b>				
media	23.5	15.6	25.4	15.8
deviazione standard	12.6	2.7	19.5	8.3
1° quartile	16.0	13.0	16.0	13.0
mediana	20.0	15.0	17.0	14.0
3° quartile	27.0	18.0	20.0	16.0
<b>N*</b>	<b>35</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>31</b>
<i>dati mancanti</i>	64	31	7	36
<b>Età all'inizio della manifestazione regolare</b>				
media	25.6	17.0	30.5	17.0
deviazione standard	7.7	1.4	19.9	9.3
1° quartile	19.0	16.0	18.5	13.0
mediana	25.0	17.0	22.5	15.0
3° quartile	28.0	18.0	42.5	16.0
<b>N*</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>23</b>
<i>dati mancanti</i>	84	40	8	44
<b>Età all'inizio della manifestazione problematica</b>				
media	29.9	20.0	30.9	19.6
deviazione standard	12.1	7.2	20.9	9.3
1° quartile	22.0	15.0	17.0	14.5
mediana	28.0	17.0	20.0	17.0
3° quartile	35.0	24.0	60.0	20.0
<b>N*</b>	<b>45</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>32</b>
<i>dati mancanti</i>	54	31	5	35
<b>Periodo di latenza (in anni)**</b>				
media	9.7	11.7	-	5.0
deviazione standard	6.6	8.9	-	5.8
1° quartile	4.3	4.7	-	1.7
mediana	8.6	9.7	-	2.8
3° quartile	14.9	17.2	-	5.1
<b>N*</b>	<b>28</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
<i>dati mancanti</i>	36	17	2	18

\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

\*\* Lasso di tempo tra la prima manifestazione del comportamento problematico e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

**T16.2b Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2013), donne**

Pazienti: problema principale				
Donne	Gioco patologico	Dipendenza al computer/Internet	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
<b>Età all'epoca della prima manifestazione</b>				
media	36.6	-	17.5	25.1
deviazione standard	17.9	-	6.4	19.7
1° quartile	20.0	-	14.0	13.0
mediana	40.0	-	15.0	17.0
3° quartile	44.0	-	20.0	21.0
<b>N*</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>17</b>
<i>dati mancanti</i>	18	3	46	20
<b>Età all'inizio della manifestazione regolare</b>				
media	41.3	-	18.6	24.9
deviazione standard	18.5	-	6.4	20.6
1° quartile	29.0	-	15.0	15.0
mediana	42.0	-	16.0	16.0
3° quartile	53.5	-	19.0	21.0
<b>N*</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>13</b>
<i>dati mancanti</i>	19	3	57	24
<b>Età all'inizio della manifestazione problematica</b>				
media	41.8	-	21.7	28.2
deviazione standard	15.7	-	8.6	19.3
1° quartile	29.5	-	16.0	16.0
mediana	42.0	-	19.0	20.5
3° quartile	55.0	-	23.0	35.0
<b>N*</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>18</b>
<i>dati mancanti</i>	15	3	44	19
<b>Periodo di latenza (in anni)**</b>				
media	11.6	-	9.3	10.0
deviazione standard	10.9	-	9.8	8.3
1° quartile	3.3	-	2.7	4.1
mediana	8.7	-	5.9	6.7
3° quartile	19.9	-	13.3	16.2
<b>N*</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>14</b>
<i>dati mancanti</i>	11	2	19	7

\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

\*\* Lasso di tempo tra la prima manifestazione del comportamento problematico e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

### T16.2c Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2013), uomini et donne

Pazienti: problema principale					
<i>Uomini et donne</i>	Gioco patologico	Dipendenza al computer/Internet	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza	
<b>Età all'epoca della prima manifestazione</b>					
media	25.2	15.6	18.4	19.1	
deviazione standard	13.8	2.7	9.0	14.0	
1° quartile	17.0	13.0	14.0	13.0	
mediana	20.5	15.0	16.0	14.5	
3° quartile	29.0	18.0	20.0	18.0	
<b>N*</b>	<b>40</b>	<b>11</b>	<b>41</b>	<b>48</b>	
<i>dati mancanti</i>	82	34	53	56	
<b>Età all'inizio della manifestazione regolare</b>					
media	28.9	17.0	20.2	19.9	
deviazione standard	12.1	1.4	9.8	14.6	
1° quartile	19.0	16.0	15.0	14.0	
mediana	27.0	17.0	17.0	15.5	
3° quartile	37.0	18.0	21.0	19.0	
<b>N*</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	<b>36</b>	
<i>dati mancanti</i>	103	43	65	68	
<b>Età all'inizio della manifestazione problematica</b>					
media	31.7	20.0	23.2	22.7	
deviazione standard	13.3	7.2	11.5	14.2	
1° quartile	23.0	15.0	16.0	15.0	
mediana	30.0	17.0	19.0	17.0	
3° quartile	38.0	24.0	25.0	23.0	
<b>N*</b>	<b>53</b>	<b>11</b>	<b>45</b>	<b>50</b>	
<i>dati mancanti</i>	69	34	49	54	
<b>Periodo di latenza (in anni)**</b>					
media	10.0	11.7	9.3	6.7	
deviazione standard	7.1	8.9	9.8	7.1	
1° quartile	4.0	4.7	2.7	2.1	
mediana	8.6	9.7	5.9	3.5	
3° quartile	14.9	17.2	13.3	7.8	
<b>N*</b>	<b>32</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>40</b>	
<i>dati mancanti</i>	47	19	21	25	

\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

\*\* Lasso di tempo tra la prima manifestazione del comportamento problematico e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

## T17 Modo di amministrazione della principale sostanza problematica prima dell'entrata (2013)

Pazienti: principale sostanza problematica															
	Eroina			Cocaina			Amfetamine			Canapa			Benzodiazepine		
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Modo di amministrazione*</b>															
iniettato	34.7	39.5	35.7	5.3	6.1	5.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0
fumato/inalato	44.1	34.9	42.3	10.5	6.1	9.7	15.0	8.3	12.5	99.1	97.4	98.8	4.8	0.0	2.5
ingerito /bevuto	1.8	0.0	1.4	2.6	3.0	2.7	40.0	16.7	31.3	0.5	2.0	0.8	81.0	100.0	90.0
sniffato	19.4	25.6	20.7	80.9	84.8	81.6	40.0	75.0	53.1	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	7.5
altro	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	5.0	0.0	3.1	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
<b>N**</b>	<b>170</b>	<b>43</b>	<b>213</b>	<b>152</b>	<b>33</b>	<b>185</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>32</b>	<b>753</b>	<b>153</b>	<b>906</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>40</b>
<i>dati mancanti</i>	80	25	105	46	6	52	8	2	10	152	41	193	6	7	13

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

**T18.1 Prevalenza a vita delle iniezioni, nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 12 mesi prima dell'entrata, scambio di materiale d'iniezione, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2013)**

	Pazienti: principale sostanza problematica												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Iniezioni nel corso della vita*</b>																
sì	5,6	5,1	5,5	63,9	65,6	64,3	14,2	16,7	14,6	2,7	0,6	2,3	9,9	8,1	9,4	390
no	94,0	94,5	94,1	35,6	32,8	35,0	85,1	83,3	84,8	97,2	98,2	97,4	89,8	91,4	90,2	3'753
non vuole rispondere	0,4	0,4	0,4	0,5	1,6	0,7	0,7	0,0	0,6	0,1	1,2	0,3	0,3	0,5	0,4	16
<b>N**</b>	<b>1'620</b>	<b>704</b>	<b>2'324</b>	<b>216</b>	<b>64</b>	<b>280</b>	<b>148</b>	<b>30</b>	<b>178</b>	<b>715</b>	<b>165</b>	<b>880</b>	<b>3'005</b>	<b>1'154</b>	<b>4'159</b>	<b>4'159</b>
<i>dati mancanti</i>	686	275	961	76	29	105	55	10	65	190	29	219	1'137	432	1'569	1'569
<b>Iniezioni nel corso dei 12 ultimi mesi*</b>																
sì	0,5	1,2	0,7	30,6	34,9	31,6	6,5	10,3	7,2	0,3	0,0	0,2	2,5	2,4	2,5	99
no	99,5	98,8	99,3	69,4	65,1	68,4	93,5	89,7	92,8	99,7	100,0	99,8	97,5	97,6	97,5	3'844
<b>N**</b>	<b>1'566</b>	<b>683</b>	<b>2'249</b>	<b>147</b>	<b>43</b>	<b>190</b>	<b>138</b>	<b>29</b>	<b>167</b>	<b>701</b>	<b>162</b>	<b>863</b>	<b>2'840</b>	<b>1'103</b>	<b>3'943</b>	<b>3'943</b>
<i>dati mancanti</i>	740	296	1'036	145	50	195	65	11	76	204	32	236	1'302	483	1'785	1'785
<b>Iniezioni nel corso dei 30 ultimi giorni*</b>																
sì	0,5	0,7	0,6	23,9	24,5	24,0	5,0	10,3	5,9	0,3	0,0	0,2	2,1	1,8	2,0	80
no	99,5	99,3	99,4	76,1	75,5	76,0	95,0	89,7	94,1	99,7	100,0	99,8	97,9	98,2	98,0	3'944
<b>N**</b>	<b>1'600</b>	<b>693</b>	<b>2'293</b>	<b>155</b>	<b>49</b>	<b>204</b>	<b>141</b>	<b>29</b>	<b>170</b>	<b>708</b>	<b>163</b>	<b>871</b>	<b>2'899</b>	<b>1'125</b>	<b>4'024</b>	<b>4'024</b>
<i>dati mancanti</i>	706	286	992	137	44	181	62	11	73	197	31	228	1'243	461	1'704	1'704
<b>Scambio di materiale d'iniezione nel corso della vita***</b>																
sì	28,6	71,4	42,9	53,6	28,6	48,6	60,0	66,7	62,5	75,0	0,0	75,0	50,0	57,1	52,0	39
no	64,3	28,6	52,4	42,9	57,1	45,7	40,0	33,3	37,5	25,0	0,0	25,0	46,3	38,1	44,0	33
non vuole rispondere	7,1	0,0	4,8	3,6	14,3	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	4,8	4,0	3
<b>N**</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>28</b>	<b>7</b>	<b>35</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>54</b>	<b>21</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
<i>dati mancanti</i>	68	26	94	86	30	116	14	1	15	12	1	13	203	63	266	266
<b>Scambio di materiale d'iniezione nel corso dei 12 ultimi mesi****</b>																
sì	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	5,3	0,0	100,0	22,2	0,0	0,0	0,0	3,3	5,6	3,9	5
no	100,0	100,0	100,0	93,1	100,0	94,7	100,0	0,0	77,8	100,0	100,0	100,0	96,7	94,4	96,1	122
<b>N**</b>	<b>36</b>	<b>17</b>	<b>53</b>	<b>29</b>	<b>9</b>	<b>38</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>91</b>	<b>36</b>	<b>127</b>	<b>127</b>
<i>dati mancanti</i>	46	16	62	85	28	113	12	2	14	6	0	6	166	48	214	214
<b>Scambio di materiale d'iniezione nel corso dei 30 ultimi giorni*****</b>																
sì	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
no	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	15
<b>N**</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<i>dati mancanti</i>	82	31	113	105	35	140	18	4	22	16	1	17	246	80	326	326

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti che si sono iniettati una sostanza illegale nel corso della vita. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti che si sono iniettati una sostanza illegale nel corso dei 12 ultimi mesi. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\*\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti che si sono iniettati una sostanza illegale nel corso dei 30 ultimi giorni. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile



**T18.2 Età all'epoca della prima iniezione, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2013)**

	Pazienti: principale sostanza problematica												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Età all'epoca della prima iniezione*</b>																
fino a 14 anni	4.8	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.4	4
da 15 a 16 anni	4.8	26.7	10.5	7.0	12.5	8.2	37.5	0.0	27.3	0.0	100.0	7.7	7.1	20.0	10.2	17
da 17 a 18 anni	21.4	26.7	22.8	26.3	43.8	30.1	0.0	33.3	9.1	16.7	0.0	15.4	21.4	35.0	24.7	41
da 19 a 20 anni	21.4	26.7	22.8	17.5	6.3	15.1	0.0	0.0	0.0	41.7	0.0	38.5	21.4	12.5	19.3	32
da 21 a 25 anni	31.0	13.3	26.3	26.3	31.3	27.4	25.0	0.0	18.2	33.3	0.0	30.8	29.4	17.5	26.5	44
da 26 a 30 anni	11.9	0.0	8.8	10.5	6.3	9.6	12.5	66.7	27.3	8.3	0.0	7.7	10.3	7.5	9.6	16
da 31 a 39 anni	4.8	6.7	5.3	12.3	0.0	9.6	12.5	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	7.9	5.0	7.2	12
dai 40 anni in su	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
<b>N**</b>	<b>42</b>	<b>15</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>16</b>	<b>73</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>126</b>	<b>40</b>	<b>166</b>	<b>166</b>
<i>dati mancanti</i>	49	21	70	81	26	107	13	2	15	7	0	7	171	53	224	224

\* I risultati si basano solamente sui clienti che si sono iniettati una sostanza illegale nel corso della loro vita. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

## T19.1a Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2013), uomini

## Uomini

Pazienti: principale sostanza problematica									
	Alcol	Oppioidi	Cocaina e derivati	Stimolanti	Ipnotici/ sedativi	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Altri problemi*</b>									
alcol	-	18.3	19.5	12.0	28.6	25.0	7.5	6.9	0.0
eroina	1.1	2.0	5.9	4.0	32.1	0.0	0.4	2.0	0.0
metadone	0.3	7.5	1.1	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0
buprenorfina	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
altri oppioidi	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaina	2.4	14.7	0.5	10.0	25.0	50.0	2.7	2.0	0.0
crack	0.2	0.4	2.2	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0
altra forma di cocaina	0.1	0.4	1.1	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0
anfetamine	0.6	1.2	2.7	8.0	3.6	25.0	1.5	1.0	0.0
metanfetamine	0.2	0.8	0.5	6.0	0.0	50.0	0.1	0.0	0.0
MDMA e affini (ecstasy)	0.4	0.8	1.1	16.0	0.0	50.0	1.8	1.0	5.9
catinoni sintetici	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
altri stimolanti	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
barbiturici	0.1	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazepina	1.7	4.8	3.2	4.0	3.6	0.0	0.4	1.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
altri sonniferi e tranquillanti	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	5.9
LSD	0.1	1.2	1.6	6.0	0.0	0.0	0.9	1.0	0.0
ketamina	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
altri allucinogeni	0.1	0.0	0.5	0.0	0.0	25.0	0.2	0.0	0.0
canapa	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
tabacco	4.7	17.1	18.4	18.0	21.4	50.0	-	8.8	5.9
sostanze volatili	9.7	20.2	14.1	12.0	10.7	25.0	10.6	-	5.9
altra sostanza	0.1	0.0	0.5	2.0	3.6	0.0	0.2	0.0	0.0
gioco patologico	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
dipendenza al computer/Internet	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0
disturbi alimentari	0.1	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.2	0.0	0.0
altro/i problema/i di dipendenza	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
nessuno	85.8	61.5	63.8	58.0	39.3	50.0	82.0	82.4	94.1
<b>N**</b>	<b>2'074</b>	<b>252</b>	<b>185</b>	<b>50</b>	<b>28</b>	<b>4</b>	<b>851</b>	<b>102</b>	<b>17</b>
<i>dati mancanti</i>	232	40	18	2	3	1	54	3	6

\* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

## T19.1b Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2013), donne

## Donne

Pazienti: principale sostanza problematica									
	Alcol	Oppioidi	Cocaina e derivati	Stimolanti	Ipnotici/ sedativi	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Altri problemi*</b>									
alcol	-	15.2	10.3	4.2	29.6	0.0	3.9	0.0	0.0
eroina	0.8	2.5	5.1	4.2	3.7	0.0	1.1	1.4	0.0
metadone	0.5	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
buprenorfina	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
altri oppioidi	0.3	1.3	0.0	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaina	1.8	16.5	0.0	4.2	7.4	0.0	0.6	0.0	0.0
crack	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
altra forma di cocaina	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
anfetamine	0.2	1.3	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metanfetamine	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA e affini (ecstasy)	0.3	1.3	0.0	8.3	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0
catinoni sintetici	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
altri stimolanti	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
barbiturici	0.0	1.3	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazepina	3.1	15.2	0.0	4.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0
GHB/GBL	0.2	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
altri sonniferi e tranquillanti	0.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	2.6	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ketamina	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
altri allucinogeni	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
canapa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
tabacco	2.7	20.3	12.8	4.2	3.7	0.0	-	0.0	0.0
sostanze volatili	7.7	20.3	12.8	4.2	11.1	0.0	7.2	-	0.0
altra sostanza	0.2	1.3	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0
gioco patologico	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
dipendenza al computer/Internet	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
disturbi alimentari	0.6	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
altro/i problema/i di dipendenza	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
nessuno	87.6	54.4	71.8	83.3	55.6	0.0	89.5	98.6	100.0
<b>N**</b>	<b>879</b>	<b>79</b>	<b>39</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>181</b>	<b>70</b>	<b>3</b>
<i>dati mancanti</i>	<i>100</i>	<i>14</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>13</i>	<i>3</i>	<i>1</i>

\* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

## T19.1c Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2013), uomini e donne

## Uomini e donne

	Pazienti: principale sostanza problematica								
	Alcol	Oppioidi	Cocaina e derivati	Stimolanti	Ipnocici/sedativi	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Altri problemi*</b>									
alcol	-	17.5	17.9	9.5	29.1	25.0	6.9	4.1	0.0
eroina	1.0	2.1	5.8	4.1	18.2	0.0	0.5	1.7	0.0
metadone	0.4	7.3	0.9	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0
buprenorfina	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
altri oppioidi	0.1	0.3	0.0	2.7	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaina	2.2	15.1	0.4	8.1	16.4	50.0	2.3	1.2	0.0
crack	0.2	0.3	1.8	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0
altra forma di cocaina	0.1	0.3	0.9	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0
anfetamine	0.5	1.2	3.6	5.4	1.8	25.0	1.3	0.6	0.0
metanfetamine	0.2	0.6	0.4	4.1	0.0	50.0	0.1	0.0	0.0
MDMA e affini (ecstasy)	0.4	0.9	0.9	13.5	1.8	50.0	1.5	0.6	5.0
catinoni sintetici	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
altri stimolanti	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
barbiturici	0.1	0.3	0.4	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazepina	2.1	7.3	2.7	4.1	3.6	0.0	0.3	0.6	0.0
GHB/GBL	0.1	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
altri sonniferi e tranquillanti	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	5.0
LSD	0.1	0.9	1.8	5.4	0.0	0.0	0.8	0.6	0.0
ketamina	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
altri allucinogeni	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0	25.0	0.2	0.0	0.0
canapa	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
tabacco	4.1	17.8	17.4	13.5	12.7	50.0	-	5.2	5.0
sostanze volatili	9.1	20.2	13.8	9.5	10.9	25.0	10.0	-	5.0
altra sostanza	0.1	0.3	0.4	1.4	3.6	0.0	0.2	0.0	0.0
gioco patologico	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
dipendenza al computer/Internet	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0
disturbi alimentari	0.3	0.0	0.4	0.0	1.8	0.0	0.2	0.0	0.0
altro/i problema/i di dipendenza	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
nessuno	86.3	59.8	65.2	66.2	47.3	50.0	83.3	89.0	95.0
<b>N**</b>	<b>2'953</b>	<b>331</b>	<b>224</b>	<b>74</b>	<b>55</b>	<b>4</b>	<b>1'032</b>	<b>172</b>	<b>20</b>
<i>dati mancanti</i>	<i>332</i>	<i>54</i>	<i>19</i>	<i>3</i>	<i>9</i>	<i>1</i>	<i>67</i>	<i>6</i>	<i>7</i>

\* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

**T19.2a Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2013), uomini**
**Uomini**

Pazienti: problema principale				
	Gioco patologico	Dipendenza al computer/Internet	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
	%	%	%	%
<b>Altri problemi*</b>				
alcol	6.1	5.1	25.0	3.5
eroina	0.0	0.0	0.0	0.0
metadone	0.0	0.0	0.0	0.0
buprenorfina	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0
altri oppioidi	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaina	1.2	0.0	12.5	1.8
crack	0.0	0.0	0.0	0.0
altra forma di cocaina	0.0	0.0	0.0	0.0
anfetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
metanfetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA e affini (ecstasy)	0.0	0.0	0.0	0.0
catinoni sintetici	0.0	0.0	0.0	0.0
altri stimolanti	0.0	0.0	0.0	0.0
barbiturici	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazepina	0.0	0.0	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
altri sonniferi e tranquillanti	0.0	0.0	12.5	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
ketamina	0.0	0.0	0.0	0.0
altri allucinogeni	0.0	0.0	0.0	0.0
canapa	0.0	0.0	0.0	0.0
tabacco	2.4	0.0	0.0	0.0
sostanze volatili	3.7	5.1	12.5	3.5
altra sostanza	0.0	0.0	12.5	3.5
gioco patologico	-	5.1	12.5	0.0
dipendenza al computer/Internet	7.3	-	0.0	7.0
disturbi alimentari	0.0	2.6	-	0.0
altro/i problema/i di dipendenza	0.0	2.6	0.0	-
nessuno	82.9	84.6	50.0	86.0
<b>N**</b>	<b>82</b>	<b>39</b>	<b>8</b>	<b>57</b>
<i>dati mancanti</i>	17	3	4	10

\* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

## T19.2b Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2013), donne

Donne

	Pazienti: problema principale			
	Gioco patologico	Dipendenza al computer/Internet	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
	%	%	%	%
<b>Altri problemi*</b>				
alcol	0.0	0.0	6.1	0.0
eroina	0.0	0.0	0.0	0.0
metadone	0.0	0.0	0.0	0.0
buprenorfina	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.0	1.5	0.0
altri oppioidi	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaina	0.0	0.0	0.0	0.0
crack	0.0	0.0	0.0	0.0
altra forma di cocaina	0.0	0.0	0.0	0.0
anfetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
metanfetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA e affini (ecstasy)	0.0	0.0	0.0	0.0
catinoni sintetici	0.0	0.0	0.0	0.0
altri stimolanti	0.0	0.0	0.0	0.0
barbiturici	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazepina	0.0	0.0	4.5	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
altri sonniferi e tranquillanti	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
ketamina	0.0	0.0	0.0	0.0
altri allucinogeni	0.0	0.0	0.0	0.0
canapa	0.0	0.0	0.0	0.0
tabacco	0.0	0.0	1.5	0.0
sostanze volatili	0.0	0.0	1.5	0.0
altra sostanza	0.0	0.0	0.0	0.0
gioco patologico	-	0.0	1.5	3.4
dipendenza al computer/Internet	0.0	-	0.0	0.0
disturbi alimentari	0.0	33.3	-	0.0
altro/i problema/i di dipendenza	0.0	33.3	0.0	-
nessuno	100.0	33.3	93.9	96.6
<b>N**</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>66</b>	<b>29</b>
<i>dati mancanti</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>16</i>	<i>8</i>

\* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

**T19.2c Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2013),  
uomini e donne**

**Uomini e donne**

Pazienti: problema principale				
	Gioco patologico	Dipendenza al computer/Internet	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
	%	%	%	%
<b>Altri problemi*</b>				
alcol	5.0	4.8	8.1	2.3
eroina	0.0	0.0	0.0	0.0
metadone	0.0	0.0	0.0	0.0
buprenorfina	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.0	1.4	0.0
altri oppioidi	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaina	1.0	0.0	1.4	1.2
crack	0.0	0.0	0.0	0.0
altra forma di cocaina	0.0	0.0	0.0	0.0
anfetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
metanfetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA e affini (ecstasy)	0.0	0.0	0.0	0.0
catinoni sintetici	0.0	0.0	0.0	0.0
altri stimolanti	0.0	0.0	0.0	0.0
barbiturici	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazepina	0.0	0.0	4.1	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
altri sonniferi e tranquillanti	0.0	0.0	1.4	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
ketamina	0.0	0.0	0.0	0.0
altri allucinogeni	0.0	0.0	0.0	0.0
canapa	0.0	0.0	0.0	0.0
tabacco	2.0	0.0	1.4	0.0
sostanze volatili	3.0	4.8	2.7	2.3
altra sostanza	0.0	0.0	1.4	2.3
gioco patologico	-	4.8	2.7	1.2
dipendenza al computer/Internet	6.0	-	0.0	4.7
disturbi alimentari	0.0	4.8	-	0.0
altro/i problema/i di dipendenza	0.0	4.8	0.0	-
nessuno	86.0	81.0	89.2	89.5
<b>N**</b>	<b>100</b>	<b>42</b>	<b>74</b>	<b>86</b>
<i>dati mancanti</i>	22	3	20	18

\* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

## T20.1a Frequenza del consumo delle sostanze secondarie secondo il problema principale (solo pazienti) (2013)

	Pazienti: problema principale												comportamenti comparabili ad una dipendenza			Tutti i problemi principali			
	Uomini			Donne			Totale			Uomini			Donne			Totale			N
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Alcool*</b>	<b>Oppioidi</b>			<b>Cocaina e derivati</b>			<b>Canapa</b>			<b>Ipnotici/sedativi</b>			<b>Comp. comparabili ad una dip.</b>						
ogni giorno	45.0	36.4	43.1	30.0	50.0	32.4	12.7	33.3	14.8	85.7	28.6	57.1	10.0	0.0	7.1	27.7	30.3	28.2	53
4-6 giorni a settimana	12.5	9.1	11.8	10.0	25.0	11.8	12.7	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	20.0	25.0	21.4	12.3	9.1	11.7	22
2-3 giorni a settimana	12.5	27.3	15.7	43.3	0.0	38.2	21.8	16.7	21.3	0.0	14.3	7.1	0.0	25.0	7.1	20.0	21.2	20.2	38
max. 1 giorno a settimana	17.5	9.1	15.7	10.0	0.0	8.8	38.2	16.7	36.1	0.0	0.0	0.0	40.0	50.0	42.9	24.5	12.1	22.3	42
nessun consumo	12.5	18.2	13.7	6.7	25.0	8.8	14.5	33.3	16.4	14.3	57.1	35.7	30.0	0.0	21.4	15.5	27.3	17.6	33
<b>N**</b>	<b>40</b>	<b>11</b>	<b>51</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>34</b>	<b>55</b>	<b>6</b>	<b>61</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>155</b>	<b>33</b>	<b>188</b>	<b>188</b>
<i>dati mancanti</i>	252	82	334	173	36	209	850	188	1'038	24	26	50	210	141	351	4'187	2'341	6'528	6'528
<b>Opioides*</b>	<b>Alcol</b>			<b>Cocaina e derivati</b>			<b>Canapa</b>			<b>Ipnotici/sedativi</b>			<b>Comp. comparabili ad una dip.</b>						
ogni giorno	5.0	0.0	4.2	11.1	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	3.8	2
4-6 giorni a settimana	5.0	25.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	100.0	22.2	0.0	0.0	0.0	4.8	20.0	7.7	4
2-3 giorni a settimana	5.0	25.0	8.3	33.3	0.0	27.3	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	44.4	0.0	0.0	0.0	19.0	10.0	17.3	9
max. 1 giorno a settimana	20.0	0.0	16.7	22.2	0.0	18.2	33.3	0.0	25.0	25.0	0.0	22.2	0.0	0.0	0.0	26.2	10.0	23.1	12
nessun consumo	65.0	50.0	62.5	33.3	100.0	45.5	66.7	100.0	75.0	12.5	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	45.2	60.0	48.1	25
<b>N**</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>10</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
<i>dati mancanti</i>	2'286	975	3'261	194	38	232	902	193	1'095	23	32	55	220	145	365	4'300	2'364	6'664	6'664
<b>Cocaine et dérivés*</b>	<b>Alcol</b>			<b>Oppioidi</b>			<b>Canapa</b>			<b>Ipnotici/sedativi</b>			<b>Comp. comparabili ad una dip.</b>						
ogni giorno	4.8	14.3	7.1	0.0	9.1	2.9	5.9	0.0	5.6	16.7	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	4.1	10.3	5.6	7
4-6 giorni a settimana	0.0	0.0	0.0	4.3	9.1	5.9	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	3.1	3.4	3.2	4
2-3 giorni a settimana	11.9	14.3	12.5	13.0	18.2	14.7	11.8	0.0	11.1	16.7	100.0	37.5	0.0	0.0	0.0	11.3	20.7	13.5	17
max. 1 giorno a settimana	26.2	28.6	26.8	43.5	36.4	41.2	17.6	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	30.9	27.6	30.2	38
nessun consumo	57.1	42.9	53.6	39.1	27.3	35.3	64.7	100.0	66.7	33.3	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	50.5	37.9	47.6	60
<b>N**</b>	<b>42</b>	<b>14</b>	<b>56</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>34</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>97</b>	<b>29</b>	<b>126</b>	<b>126</b>
<i>dati mancanti</i>	2'264	965	3'229	269	82	351	888	193	1'081	25	31	56	217	145	362	4'245	2'345	6'590	6'590
<b>Cannabis*</b>	<b>Alcol</b>			<b>Oppioidi</b>			<b>Cocaina e derivati</b>			<b>Ipnotici/sedativi</b>			<b>Comp. comparabili ad una dip.</b>						
ogni giorno	29.3	40.9	31.7	42.4	35.7	40.4	44.8	60.0	47.1	16.7	0.0	14.3	100.0	0.0	66.7	35.7	38.6	36.3	78
4-6 giorni a settimana	12.2	27.3	15.4	15.2	7.1	12.8	17.2	0.0	14.7	33.3	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	14.0	15.9	14.4	31
2-3 giorni a settimana	11.0	4.5	9.6	12.1	14.3	12.8	13.8	0.0	11.8	50.0	100.0	57.1	0.0	100.0	33.3	13.5	11.4	13.0	28
max. 1 giorno a settimana	13.4	22.7	15.4	9.1	21.4	12.8	3.4	20.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	22.7	14.0	30
nessun consumo	34.1	4.5	27.9	21.2	21.4	21.3	20.7	20.0	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.1	11.4	22.3	48
<b>N**</b>	<b>82</b>	<b>22</b>	<b>104</b>	<b>33</b>	<b>14</b>	<b>47</b>	<b>29</b>	<b>5</b>	<b>34</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>171</b>	<b>44</b>	<b>215</b>	<b>215</b>
<i>dati mancanti</i>	2'224	957	3'181	259	79	338	174	35	209	25	32	57	218	144	362	4'171	2'330	6'501	6'501

\* Come problema secondario. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali possono comprendere anche le persone il cui sesso non è conosciuto.



## T20.1b Frequenza del consumo delle sostanze secondarie secondo il problema principale (solo pazienti) (2013)

	Pazienti: problema principale															Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			comportamenti comparabili ad una dipendenza			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
<b>Autres stimulants*</b>																			
ogni giorno	16.7	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	0.0	18.2	0.0	0.0	0.0	13.3	0.0	11.8	4
4-6 giorni a settimana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	2.9	1
2-3 giorni a settimana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	25.0	5.9	2
max 1 giorno a settimana	8.3	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	100.0	33.3	50.0	36.4	0.0	36.4	0.0	0.0	0.0	26.7	25.0	26.5	9
nessun consumo	75.0	100.0	76.9	100.0	0.0	100.0	0.0	33.3	25.0	36.4	0.0	36.4	0.0	0.0	0.0	53.3	50.0	52.9	18
<b>N**</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
<i>dati mancanti</i>	2'294	978	3'272	289	93	382	202	37	239	894	194	1'088	220	145	365	4'312	2'370	6'682	6'682
<b>Hypnotiques/sédatifs*</b>																			
ogni giorno	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
4-6 giorni a settimana	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	1
2-3 giorni a settimana	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	1
max 1 giorno a settimana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
nessun consumo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
<b>N**</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<i>dati mancanti</i>	2'304	979	3'283	292	93	385	203	40	243	905	194	1'099	220	145	365	4'340	2'374	6'714	6'714
<b>Hallucinogènes*</b>																			
ogni giorno	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
4-6 giorni a settimana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
2-3 giorni a settimana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
max 1 giorno a settimana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	31.3	0.0	27.8	5
nessun consumo	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	68.8	100.0	72.2	13
<b>N**</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<i>dati mancanti</i>	2'304	979	3'283	290	93	383	201	39	240	899	194	1'093	220	145	365	4'326	2'372	6'698	6'698
<b>Autres substances*</b>																			
ogni giorno	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	25.0	1
4-6 giorni a settimana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
2-3 giorni a settimana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
max 1 giorno a settimana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	25.0	1
nessun consumo	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7	0.0	50.0	2
<b>N**</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<i>dati mancanti</i>	2'305	979	3'284	291	93	384	203	40	243	904	194	1'098	220	145	365	4'339	2'373	6'712	6'712

\* Come problema secondario. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

**T21 Frequenza del consumo di alcol, numero di "bicchieri standard" al giorno e frequenza di forti consumi di alcol prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti ) (2013)**

	Pazienti: problema principale												Tutti i problemi principali			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Frequenza del consumo di alcol*</b>																
mai	12.8	11.0	12.3	12.2	14.8	12.8	10.8	13.3	11.2	15.5	17.5	15.8	13.6	13.6	13.6	402
1 volta al mese o meno	2.8	3.0	2.9	17.1	25.9	19.3	18.1	13.3	17.3	21.8	30.9	23.5	9.3	9.2	9.3	276
2 a 4 volte al mese	7.3	7.1	7.3	15.9	25.9	18.3	26.5	46.7	29.6	40.5	41.2	40.6	16.7	14.4	16.1	476
2 a 3 volte alla settimana	16.9	16.2	16.7	26.8	14.8	23.9	25.3	13.3	23.5	17.3	8.2	15.6	17.3	15.9	16.9	502
4 volte alla settimana o più	60.2	62.8	60.9	28.0	18.5	25.7	19.3	13.3	18.4	5.0	2.1	4.5	43.0	46.9	44.1	1'306
<b>N**</b>	<b>1'381</b>	<b>575</b>	<b>1'956</b>	<b>82</b>	<b>27</b>	<b>109</b>	<b>83</b>	<b>15</b>	<b>98</b>	<b>440</b>	<b>97</b>	<b>537</b>	<b>2'151</b>	<b>811</b>	<b>2'962</b>	<b>2'962</b>
<i>dati mancanti</i>	925	404	1'329	210	66	276	120	25	145	465	97	562	1'991	775	2'766	2'766
<b>Numero di "bicchieri standard" al giorno***</b>																
1 o 2	6.5	5.9	6.3	44.3	38.1	42.9	38.5	18.2	35.5	47.2	50.7	47.8	20.4	18.8	20.0	489
3 o 4	18.4	17.2	18.1	24.3	38.1	27.5	36.9	54.5	39.5	37.1	42.7	38.1	23.5	21.9	23.0	564
5 o 6	21.6	25.1	22.6	14.3	9.5	13.2	12.3	0.0	10.5	10.1	6.7	9.5	17.9	19.8	18.4	451
7 o 9	20.7	28.1	22.9	11.4	9.5	11.0	6.2	9.1	6.6	2.4	0.0	1.9	15.1	21.6	16.9	414
10 o più	32.7	23.8	30.1	5.7	4.8	5.5	6.2	18.2	7.9	3.3	0.0	2.7	23.0	18.0	21.7	530
<b>N**</b>	<b>1'177</b>	<b>495</b>	<b>1'672</b>	<b>70</b>	<b>21</b>	<b>91</b>	<b>65</b>	<b>11</b>	<b>76</b>	<b>337</b>	<b>75</b>	<b>412</b>	<b>1'776</b>	<b>672</b>	<b>2'448</b>	<b>2'448</b>
<i>dati mancanti</i>	1'129	484	1'613	222	72	294	138	29	167	568	119	687	2'366	914	3'280	3'280
<b>Frequenza di forti consumi di alcol***</b>																
mai	14.5	16.3	15.0	39.2	50.0	41.7	26.5	53.8	30.9	49.4	68.5	53.0	25.6	31.2	27.1	731
meno di una volta al mese	9.7	12.4	10.5	24.3	22.7	24.0	36.8	7.7	32.1	32.1	22.8	30.4	17.0	13.5	16.0	432
1 volta al mese	10.6	9.2	10.2	9.5	9.1	9.4	14.7	7.7	13.6	9.5	2.2	8.1	10.3	8.3	9.8	263
1 volta alla settimana	28.1	27.0	27.8	17.6	9.1	15.6	19.1	23.1	19.8	7.7	6.5	7.5	21.9	21.6	21.8	587
quasi ogni giorno	37.1	35.1	36.5	9.5	9.1	9.4	2.9	7.7	3.7	1.3	0.0	1.0	25.2	25.5	25.3	682
<b>N**</b>	<b>1'262</b>	<b>533</b>	<b>1'795</b>	<b>74</b>	<b>22</b>	<b>96</b>	<b>68</b>	<b>13</b>	<b>81</b>	<b>389</b>	<b>92</b>	<b>481</b>	<b>1'945</b>	<b>750</b>	<b>2'695</b>	<b>2'695</b>
<i>dati mancanti</i>	1'044	446	1'490	218	71	289	135	27	162	516	102	618	2'197	836	3'033	3'033

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti che hanno indicato un consumo d'alcol. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

## T22 Frequenza del consumo di tabacco e numero di sigarette al giorno nel corso dei 30 ultimi giorni prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti)

	Pazienti: problema principale												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Frequenza del consumo di tabacco*</b>																
mai	34.5	33.1	34.1	1.3	8.0	2.9	25.0	13.3	23.1	21.4	17.0	20.6	27.9	29.7	28.4	699
1 giorno alla settimana o meno	0.8	0.3	0.7	2.5	0.0	1.9	1.3	0.0	1.1	3.1	3.8	3.2	1.5	0.9	1.3	32
2 a 3 giorni alla settimana	0.4	1.5	0.7	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.1	4.6	2.8	4.3	1.7	1.5	1.6	40
4 a 6 giorni alla settimana	0.7	0.0	0.5	0.0	4.0	1.0	1.3	0.0	1.1	1.3	0.0	1.1	0.9	0.4	0.8	19
1 volta al giorno	2.1	2.3	2.1	2.5	0.0	1.9	0.0	6.7	1.1	5.2	2.8	4.8	2.9	2.2	2.7	67
più volte al giorno	61.5	62.9	61.9	93.7	88.0	92.3	71.1	80.0	72.5	64.4	73.6	66.1	65.1	65.4	65.2	1'607
<b>N**</b>	<b>969</b>	<b>396</b>	<b>1'365</b>	<b>79</b>	<b>25</b>	<b>104</b>	<b>76</b>	<b>15</b>	<b>91</b>	<b>458</b>	<b>106</b>	<b>564</b>	<b>1'776</b>	<b>688</b>	<b>2'464</b>	<b>2'464</b>
<i>dati mancanti</i>	1'337	583	1'920	213	68	281	127	25	152	447	88	535	2'366	898	3'264	3'264
<b>Numero di sigarette al giorno***</b>																
0 a 10	15.4	20.1	16.8	10.0	22.7	13.0	30.8	27.3	30.2	47.8	58.3	50.0	25.0	29.0	26.1	414
11 a 20	41.0	47.4	42.9	58.6	45.5	55.4	42.3	45.5	42.9	43.2	34.5	41.4	44.5	44.7	44.6	706
21 a 30	30.2	26.1	29.0	24.3	18.2	22.8	21.2	18.2	20.6	6.8	6.0	6.6	21.5	19.7	21.0	333
31 o più	13.4	6.4	11.3	7.1	13.6	8.7	5.8	9.1	6.3	2.2	1.2	2.0	8.9	6.6	8.3	131
<b>N**</b>	<b>559</b>	<b>234</b>	<b>793</b>	<b>70</b>	<b>22</b>	<b>92</b>	<b>52</b>	<b>11</b>	<b>63</b>	<b>324</b>	<b>84</b>	<b>408</b>	<b>1'143</b>	<b>441</b>	<b>1'584</b>	<b>1'584</b>
<i>dati mancanti</i>	76	31	107	8	1	9	5	2	7	36	4	40	138	43	181	181

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti che hanno indicato un consumo di tabacco. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

## T23a Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2013), uomini

Pazienti: principale sostanza problematica									
	Alcol	Oppioidi	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Obiettivo di consumo*</b>									
astinenza definitiva	31.7	81.0	78.2	61.5	60.0	0.0	57.5	22.2	0.0
astinenza limitata nel tempo	22.9	3.8	3.6	15.4	10.0	0.0	8.2	5.6	0.0
consumo controllato	31.4	7.6	5.5	23.1	30.0	0.0	20.9	50.0	50.0
non è prevista nessuna limitazione	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	5.6	0.0
nessuna decisione finora	11.6	7.6	12.7	0.0	0.0	0.0	11.2	16.7	50.0
altro	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>N*</b>	<b>751</b>	<b>79</b>	<b>55</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>134</b>	<b>18</b>	<b>2</b>
<i>dati mancanti</i>	1'555	213	148	39	21	5	771	87	21

## T23b Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2013), donne

<b>Obiettivo di consumo*</b>									
astinenza definitiva	35.6	71.4	80.0	50.0	57.1	0.0	50.0	0.0	0.0
astinenza limitata nel tempo	14.6	7.1	0.0	25.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0
consumo controllato	35.6	0.0	10.0	0.0	28.6	0.0	20.0	0.0	0.0
non è prevista nessuna limitazione	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
nessuna decisione finora	12.7	21.4	10.0	25.0	14.3	0.0	20.0	100.0	0.0
altro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>N*</b>	<b>267</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<i>dati mancanti</i>	712	79	30	21	26	0	174	72	4

## T23c Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2013), uomini e donne

<b>Obiettivo di consumo*</b>									
astinenza definitiva	32.7	79.6	78.5	58.8	58.8	0.0	56.5	21.1	0.0
astinenza limitata nel tempo	20.7	4.3	3.1	17.6	5.9	0.0	8.4	5.3	0.0
consumo controllato	32.5	6.5	6.2	17.6	29.4	0.0	20.8	47.4	50.0
non è prevista nessuna limitazione	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	5.3	0.0
nessuna decisione finora	11.9	9.7	12.3	5.9	5.9	0.0	12.3	21.1	50.0
altro	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>N*</b>	<b>1'018</b>	<b>93</b>	<b>65</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>154</b>	<b>19</b>	<b>2</b>
<i>dati mancanti</i>	2'267	292	178	60	47	5	945	159	25

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

## T24a Problemi psichici nel corso della vita (2013), uomini

## Uomini

Pazienti: problema principale									
	Alcol	Oppioidi	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Problemi psichici*</b>									
auto devalorizzazione o senso di colpa	26.4	21.9	25.0	18.2	33.3	0.0	23.5	16.7	0.0
stato ansioso/nervoso importante	28.0	32.8	30.0	36.4	55.6	0.0	26.5	8.3	100.0
difficoltà di comprensione/memoria	11.5	7.8	17.5	0.0	22.2	0.0	21.4	16.7	0.0
alterazione dell'attenzione o iperattività	10.6	10.9	12.5	0.0	44.4	0.0	22.4	8.3	0.0
pensieri o azioni compulsive	2.7	0.0	7.5	0.0	11.1	0.0	1.0	0.0	0.0
reaz. acuta da stress/ disturbi dell'adattamento	5.3	4.7	10.0	0.0	11.1	0.0	4.1	8.3	0.0
allucinazioni	0.8	1.6	5.0	0.0	11.1	0.0	5.1	0.0	0.0
diff. a controllare comp. violenti	9.6	9.4	10.0	18.2	11.1	0.0	15.3	8.3	100.0
problemi psichici curati con medicine	25.2	21.9	22.5	18.2	66.7	0.0	12.2	25.0	0.0
pensieri suicidari important	10.2	6.3	12.5	9.1	11.1	0.0	7.1	8.3	0.0
tentativi di suicidio	3.9	3.1	2.5	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0
altro/i problema/i psichico/i	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
nessuno	44.4	48.4	50.0	45.5	11.1	0.0	49.0	58.3	0.0
<b>N**</b>	<b>489</b>	<b>64</b>	<b>40</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>12</b>	<b>1</b>
<i>dati mancanti</i>	<i>1'817</i>	<i>228</i>	<i>163</i>	<i>41</i>	<i>22</i>	<i>5</i>	<i>807</i>	<i>93</i>	<i>22</i>

\* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

## T24b Problemi psichici nel corso della vita (2013), donne

## Donne

Pazienti: problema principale									
	Alcol	Oppioidi	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Problemi psichici*</b>									
auto devalorizzazione o senso di colpa	54.5	35.7	57.1	0.0	66.7	0.0	53.8	0.0	0.0
stato ansioso/nervoso importante	49.2	42.9	85.7	33.3	66.7	0.0	38.5	0.0	0.0
difficoltà di comprensione/memoria	15.7	7.1	28.6	0.0	0.0	0.0	15.4	0.0	0.0
alterazione dell'attenzione o iperattività	15.7	7.1	28.6	33.3	0.0	0.0	15.4	0.0	0.0
pensieri o azioni compulsive	2.6	7.1	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
reaz. acuta da stress/ disturbi dell'adattamento	12.0	7.1	0.0	0.0	33.3	0.0	7.7	0.0	0.0
allucinazioni	1.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0
diff. a controllare comp. violenti	8.9	14.3	28.6	0.0	0.0	0.0	15.4	0.0	0.0
problemi psichici curati con medicine	44.0	42.9	57.1	0.0	83.3	0.0	15.4	0.0	0.0
pensieri suicidari important	18.3	28.6	14.3	33.3	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0
tentativi di suicidio	8.9	21.4	14.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
altro/i problema/i psichico/i	4.2	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
nessuno	17.3	21.4	0.0	33.3	0.0	0.0	15.4	0.0	0.0
<b>N**</b>	<b>191</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>dati mancanti</i>	<i>788</i>	<i>79</i>	<i>33</i>	<i>22</i>	<i>27</i>	<i>0</i>	<i>181</i>	<i>73</i>	<i>4</i>

\* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

## T24c Problemi psichici nel corso della vita (2013), uomini e donne

## Uomini e donne

Pazienti: problema principale									
	Alcol	Oppioidi	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Problemi psichici*</b>									
auto devalorizzazione o senso di colpa	34.3	24.4	29.8	14.3	46.7	0.0	27.0	16.7	0.0
stato ansioso/nervoso importante	34.0	34.6	38.3	35.7	60.0	0.0	27.9	8.3	100.0
difficoltà di comprensione/memoria	12.6	7.7	19.1	0.0	13.3	0.0	20.7	16.7	0.0
alterazione dell'attenzione o iperattività	12.1	10.3	14.9	7.1	26.7	0.0	21.6	8.3	0.0
pensieri o azioni compulsive	2.6	1.3	8.5	0.0	6.7	0.0	0.9	0.0	0.0
reaz. acuta da stress/ disturbi dell'adattamento	7.2	5.1	8.5	0.0	20.0	0.0	4.5	8.3	0.0
allucinazioni	0.9	1.3	6.4	0.0	6.7	0.0	5.4	0.0	0.0
diff. a controllare comp. violenti	9.4	10.3	12.8	14.3	6.7	0.0	15.3	8.3	100.0
problemi psichici curati con medicine	30.4	25.6	27.7	14.3	73.3	0.0	12.6	25.0	0.0
pensieri suicidari important	12.5	10.3	12.8	14.3	13.3	0.0	6.3	8.3	0.0
tentativi di suicidio	5.3	6.4	4.3	7.1	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0
altro/i problema/i psichico/i	2.4	1.3	0.0	7.1	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0
nessuno	36.8	43.6	42.6	42.9	6.7	0.0	45.0	58.3	0.0
<b>N**</b>	<b>680</b>	<b>78</b>	<b>47</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>12</b>	<b>1</b>
<i>dati mancanti</i>	<i>2'605</i>	<i>307</i>	<i>196</i>	<i>63</i>	<i>49</i>	<i>5</i>	<i>988</i>	<i>166</i>	<i>26</i>

\* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

## T25 Parenti/conoscenti: legame tra l'utente e la persona sintomatica (2013)

Parenti o conoscenti				
	Uomini	Donne	Totale	N
	%	%	%	
<b>L'utente è... *</b>				
madre/padre	26.5	33.7	32.2	315
figlio/figlia	17.0	12.1	13.1	128
sorella/fratello	6.5	3.7	4.3	42
partner	37.5	44.8	43.3	423
altro parente	4.0	1.8	2.3	22
collega/amico/a	3.0	1.7	1.9	19
datore di lavoro/docente	1.5	0.1	0.4	4
tutore/curatore	0.0	0.0	0.0	0
altro	4.0	2.1	2.5	24
<b>N**</b>	<b>200</b>	<b>777</b>	<b>977</b>	<b>977</b>
<i>dati mancanti</i>	0	11	11	11

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)



## T26 Parenti/conoscenti: problema principale della persona sintomatica (2013)

Parenti o conoscenti		
	Totale	
	%	N
<b>Problema principale della persona sintomatica*</b>		
alcol	62.7	313
eroina	4.4	22
metadone	0.4	2
buprenorfina	0.0	0
fentanyl	0.0	0
altri oppioidi	0.0	0
cocaina	6.0	30
crack	0.0	0
altra forma di cocaina	0.2	1
anfetamine	1.0	5
metanfetamine	0.2	1
MDMA e affini (ecstasy)	0.6	3
catinoni sintetici	0.0	0
altri stimolanti	0.2	1
barbiturici	0.0	0
benzodiazepina	0.6	3
GHB/GBL	0.0	0
altri sonniferi e tranquillanti	0.2	1
LSD	0.0	0
ketamina	0.0	0
altri allucinogeni	0.0	0
sostanze volatili	0.0	0
canapa	13.6	68
tabacco	0.8	4
altra sostanza	0.2	1
gioco patologico	2.6	13
dipendenza al computer/Internet	4.0	20
disturbi alimentari	0.4	2
altro/i problema/i di dipendenza	2	9
<b>N**</b>	<b>499</b>	<b>499</b>
<i>dati mancanti</i>	489	489

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T27 Sesso e età dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale<sup>1</sup>) e dei parenti o conoscenti (2013)

	Pazienti: problema principale <sup>1</sup>												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Sesso*</b>																			
maschile				72.7			75.2			81.5			17.7			63.8			4'061
femminile				27.3			24.8			18.5			82.3			36.2			2'305
Sesso non noto	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0
<b>N**</b>	<b>2'224</b>	<b>954</b>	<b>3'178</b>	<b>295</b>	<b>111</b>	<b>406</b>	<b>167</b>	<b>55</b>	<b>222</b>	<b>875</b>	<b>199</b>	<b>1'074</b>	<b>157</b>	<b>732</b>	<b>889</b>	<b>4'061</b>	<b>2'305</b>	<b>6'366</b>	<b>6'366</b>
<b>Età (in anni)*</b>																			
fino a 14 anni	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	5.6	3.4	1.3	1.1	1.1	1.0	1.3	1.1	69
15-19	2.0	1.6	1.9	0.0	5.4	1.5	2.4	9.1	4.1	59.3	56.1	58.7	6.4	2.3	3.1	16.0	8.5	13.3	843
20-24	3.5	3.5	3.5	7.1	9.0	7.6	11.4	23.6	14.4	14.4	14.6	14.4	4.5	5.8	5.5	7.2	7.0	7.2	455
25-29	6.7	4.5	6.0	16.6	17.1	16.7	21.6	23.6	22.1	9.7	8.1	9.4	4.5	7.2	6.7	9.1	7.1	8.4	532
30-34	11.2	7.4	10.1	18.0	18.9	18.2	22.2	18.2	21.2	7.1	8.1	7.3	5.7	9.8	9.0	11.0	9.4	10.4	662
35-39	9.4	8.2	9.0	16.3	13.5	15.5	16.2	7.3	14.0	2.6	1.5	2.4	6.4	5.9	6.0	8.2	7.1	7.8	497
40-44	13.9	12.3	13.4	19.7	15.3	18.5	15.0	10.9	14.0	1.8	3.0	2.1	5.7	12.2	11.1	11.3	11.2	11.2	715
45-49	15.3	17.6	16.0	12.5	16.2	13.5	7.2	7.3	7.2	1.1	2.5	1.4	17.8	17.1	17.2	11.3	14.6	12.5	793
50-54	12.8	16.6	13.9	7.1	0.9	5.4	3.6	0.0	2.7	0.6	0.0	0.5	17.8	13.1	13.9	8.9	11.9	10.0	633
55-59	10.3	13.0	11.1	2.0	1.8	2.0	0.6	0.0	0.5	0.5	0.0	0.4	10.8	10.3	10.4	6.7	9.4	7.6	486
60-64	7.7	6.9	7.4	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	6.1	6.0	4.7	5.4	5.0	315
65-69	4.3	4.9	4.5	0.0	1.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	7.0	4.3	4.8	2.8	4.0	3.2	204
70-74	2.2	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	3.0	3.4	1.5	2.0	1.7	106
75 e più	0.8	1.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.9	1.8	0.5	1.2	0.7	47
<b>N**</b>	<b>2'221</b>	<b>954</b>	<b>3'175</b>	<b>295</b>	<b>111</b>	<b>406</b>	<b>167</b>	<b>55</b>	<b>222</b>	<b>875</b>	<b>198</b>	<b>1'073</b>	<b>157</b>	<b>727</b>	<b>884</b>	<b>4'058</b>	<b>2'299</b>	<b>6'357</b>	<b>6'357</b>
<i>dati mancanti</i>	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	5	3	6	9	9
<b>Età</b>																			
media	45.9	47.8	46.5	37.7	36.0	37.3	34.3	30.5	33.3	21.7	22.0	21.8	47.3	45.7	46.0	38.6	42.7	40.1	
deviazione standard	13.0	12.8	13.0	9.1	10.3	9.4	8.6	8.3	8.7	7.7	8.3	7.8	15.6	14.4	14.6	15.4	15.4	15.5	
1° quartile	36.0	40.0	37.0	30.6	28.5	29.7	27.8	24.3	26.7	17.0	17.0	17.0	37.5	34.2	34.5	25.4	30.5	27.5	
mediana	46.0	48.3	46.9	37.8	34.9	37.3	33.1	28.5	32.5	18.3	18.3	18.3	49.4	47.1	47.3	38.5	44.4	40.9	
3° quartile	55.2	56.5	55.7	44.4	43.6	44.3	40.8	36.1	39.6	24.7	24.4	24.6	56.9	55.6	56.0	50.0	53.9	51.5	
<b>N**</b>	<b>2'221</b>	<b>954</b>	<b>3'175</b>	<b>295</b>	<b>111</b>	<b>406</b>	<b>167</b>	<b>55</b>	<b>222</b>	<b>875</b>	<b>198</b>	<b>1'073</b>	<b>157</b>	<b>727</b>	<b>884</b>	<b>4'058</b>	<b>2'299</b>	<b>6'357</b>	
<i>dati mancanti</i>	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	5	3	6	9	

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T28 Stato civile e grado di urbanizzazione del domicilio dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale<sup>1</sup>) e dei parenti o conoscenti (2013)

	Pazienti: problema principale <sup>1</sup>												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite				N
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale		
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale								
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
<b>Stato civile*</b>																				
celibe/nubile	41.1	32.8	38.5	73.5	68.0	72.0	66.3	66.7	66.4	94.4	87.0	93.0	28.2	23.2	24.1	57.5	40.9	51.5	1'978	
sposato	30.6	27.7	29.7	11.4	6.0	9.9	18.1	16.7	17.7	3.7	5.3	4.0	52.6	53.0	52.9	22.9	30.2	25.6	982	
separato-a (giuridicamente)	5.6	7.5	6.2	1.5	6.0	2.7	6.0	0.0	4.4	0.6	1.5	0.7	3.8	6.8	6.3	4.0	5.8	4.6	177	
divorziato-a	20.3	26.1	22.1	10.6	14.0	11.5	9.6	16.7	11.5	1.1	6.1	2.1	12.8	14.8	14.4	13.9	19.1	15.8	605	
vedovo-a	1.9	5.7	3.1	1.5	2.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	2.6	1.9	2.0	1.4	3.7	2.2	85	
unione registrata	0.4	0.3	0.4	1.5	4.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	14	
<b>N**</b>	<b>1'401</b>	<b>629</b>	<b>2'030</b>	<b>132</b>	<b>50</b>	<b>182</b>	<b>83</b>	<b>30</b>	<b>113</b>	<b>537</b>	<b>131</b>	<b>668</b>	<b>78</b>	<b>366</b>	<b>444</b>	<b>2'454</b>	<b>1'387</b>	<b>3'841</b>	<b>3'841</b>	
<i>dati mancanti</i>	823	325	1'148	163	61	224	84	25	109	338	68	406	79	366	445	1'607	918	2'525	2'525	
<b>Grado di urbanizzazione*</b>																				
grandi centri urbani	11.0	12.2	11.3	9.2	4.3	7.8	2.0	5.4	2.9	1.5	0.7	1.3	25.0	16.8	18.3	8.3	10.6	9.1	411	
periferia dei grandi centri	16.3	14.1	15.7	11.5	22.9	14.8	8.8	8.1	8.6	10.0	10.1	10.0	5.4	9.3	8.7	13.2	11.8	12.7	575	
città di media importanza	19.2	17.0	18.5	14.9	14.3	14.8	33.3	21.6	30.2	30.9	30.2	30.8	18.5	21.5	21.0	22.5	21.6	22.2	1'002	
piccole città	28.1	30.3	28.8	42.0	40.0	41.4	29.4	43.2	33.1	31.1	28.9	30.6	21.7	22.7	22.5	30.5	28.8	29.9	1'352	
campagna	25.4	26.4	25.7	22.4	18.6	21.3	26.5	21.6	25.2	26.5	30.2	27.2	29.3	29.7	29.6	25.5	27.2	26.1	1'181	
<b>N**</b>	<b>1'678</b>	<b>716</b>	<b>2'394</b>	<b>174</b>	<b>70</b>	<b>244</b>	<b>102</b>	<b>37</b>	<b>139</b>	<b>618</b>	<b>149</b>	<b>767</b>	<b>92</b>	<b>428</b>	<b>520</b>	<b>2'917</b>	<b>1'604</b>	<b>4'521</b>	<b>4'521</b>	
<i>dati mancanti</i>	546	238	784	121	41	162	65	18	83	257	50	307	65	304	369	1'144	701	1'845	1'845	

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T29 Tipo di nucleo familiare, situazione di domicilio e tipo di relazione di coppia dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale <sup>1</sup>) e dei parenti o conoscenti (2013)

	Pazienti: problema principale <sup>1</sup>												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Tipo di nucleo familiare*</b>																			
da solo-a	40.9	38.9	40.3	46.7	27.9	41.2	27.1	22.6	26.2	11.5	11.6	11.5	28.8	20.0	21.6	31.6	29.8	31.0	1'281
con famiglia d'origine (genitori,ecc.)	5.8	4.3	5.3	13.3	14.7	13.7	16.1	16.1	16.1	68.5	54.2	65.8	6.1	5.8	5.8	24.8	13.5	20.9	864
con partner e/o figli	44.8	50.2	46.5	24.2	39.7	28.8	42.4	38.7	41.6	8.3	15.5	9.6	62.1	71.9	70.1	33.6	47.9	38.5	1'593
con amici o altre persone	2.4	2.5	2.4	3.0	2.9	3.0	5.1	9.7	6.0	3.2	1.9	3.0	3.0	0.7	1.1	2.8	2.4	2.7	110
in prigione	0.2	0.1	0.2	3.0	0.0	2.1	0.8	0.0	0.7	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.3	12
istituzione terapeutica/foyer	1.9	1.6	1.8	4.8	4.4	4.7	4.2	3.2	4.0	3.4	4.5	3.6	0.0	0.0	0.0	2.6	1.7	2.3	94
ospedale/clinica	0.4	0.1	0.3	0.6	5.9	2.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.3	14
altro	3.5	2.2	3.1	4.2	4.4	4.3	4.2	9.7	5.4	4.9	12.3	6.3	0.0	1.7	1.4	3.9	4.1	4.0	165
<b>N**</b>	<b>1'456</b>	<b>681</b>	<b>2'137</b>	<b>165</b>	<b>68</b>	<b>233</b>	<b>118</b>	<b>31</b>	<b>149</b>	<b>654</b>	<b>155</b>	<b>809</b>	<b>66</b>	<b>295</b>	<b>361</b>	<b>2'702</b>	<b>1'431</b>	<b>4'133</b>	<b>4'133</b>
dati mancanti	768	273	1'041	130	43	173	49	24	73	221	44	265	91	437	528	1'359	874	2'233	2'233
<b>Situazione di domicilio*</b>																			
situazione abitativa stabile	93.3	94.5	93.7	80.4	75.9	79.1	87.7	78.9	85.6	92.1	87.4	91.2	96.3	96.9	96.8	92.1	93.0	92.4	4'278
situazione abitativa instabile/senz	3.9	4.1	4.0	6.7	7.6	7.0	7.4	18.4	10.0	3.8	5.7	4.2	3.8	2.6	2.8	4.2	4.2	4.2	195
in prigione	0.4	0.0	0.3	2.1	1.3	1.8	0.8	0.0	0.6	0.3	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.4	17
istituzione/foyer/ospedale/altro	2.3	1.3	2.0	10.8	15.2	12.1	4.1	2.6	3.8	3.8	6.3	4.3	0.0	0.6	0.5	3.2	2.6	3.0	140
<b>N**</b>	<b>1'668</b>	<b>751</b>	<b>2'419</b>	<b>194</b>	<b>79</b>	<b>273</b>	<b>122</b>	<b>38</b>	<b>160</b>	<b>708</b>	<b>174</b>	<b>882</b>	<b>80</b>	<b>351</b>	<b>431</b>	<b>3'025</b>	<b>1'605</b>	<b>4'630</b>	<b>4'630</b>
dati mancanti	556	203	759	101	32	133	45	17	62	167	25	192	77	381	458	1'036	700	1'736	1'736
<b>Tipo di relazione di coppia*</b>																			
senza partner, sola-a	36.8	39.3	37.6	64.9	35.7	56.1	40.0	47.8	42.0	73.6	55.8	69.6	26.2	25.8	25.9	45.9	36.9	42.6	1'175
relazione-i saltuaria-e	5.5	5.6	5.5	5.2	4.8	5.0	4.6	4.3	4.5	6.4	10.5	7.3	4.9	2.2	2.7	5.6	5.1	5.4	149
relazione fissa, v iv endo separat.	9.5	9.8	9.6	5.2	9.5	6.5	13.8	17.4	14.8	8.2	20.0	10.8	6.6	11.2	10.4	9.2	12.1	10.3	283
relazione fissa, v iv endo insieme	48.3	45.3	47.3	24.7	50.0	32.4	41.5	30.4	38.6	11.8	13.7	12.2	62.3	60.7	61.0	39.3	45.9	41.8	1'152
<b>N**</b>	<b>1'044</b>	<b>481</b>	<b>1'525</b>	<b>97</b>	<b>42</b>	<b>139</b>	<b>65</b>	<b>23</b>	<b>88</b>	<b>330</b>	<b>95</b>	<b>425</b>	<b>61</b>	<b>267</b>	<b>328</b>	<b>1'733</b>	<b>1'026</b>	<b>2'759</b>	<b>2'759</b>
dati mancanti	1'180	473	1'653	198	69	267	102	32	134	545	104	649	96	465	561	2'328	1'279	3'607	3'607

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

**T30 Fonte di reddito principale e attività principale all'uscita, secondo il problema principale<sup>1</sup> e per i parenti o conoscenti (2013)  
e dei parenti o conoscenti (2013)**

	Pazienti: problema principale <sup>1</sup>												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
<b>Fonte di reddito principale*</b>																			
stipendio/salario	55.1	42.6	51.2	31.3	23.6	29.0	60.2	25.8	51.3	25.7	20.7	24.7	70.0	66.0	66.7	46.7	44.8	46.0	1'758
risparmi	1.4	1.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	0.4	0.0	0.3	0.2	1.0	0.7	0.9	35
rendita (AVS/AI o altre)	17.3	21.8	18.7	26.7	25.5	26.3	9.1	19.4	11.8	3.4	7.1	4.1	10.0	9.8	9.8	13.6	17.4	14.9	571
assistenza sociale	16.8	15.4	16.3	33.6	32.7	33.3	15.9	35.5	21.0	8.8	20.7	11.1	6.3	3.6	4.1	15.2	13.2	14.5	555
assicurazione disoccupazione	4.6	2.8	4.0	1.5	1.8	1.6	4.5	9.7	5.9	1.8	3.6	2.1	1.3	1.5	1.4	3.4	2.3	3.0	116
sostegno del/della partner	1.2	11.7	4.4	1.5	5.5	2.7	1.1	0.0	0.8	0.7	0.7	0.7	6.3	12.4	11.2	1.1	9.4	4.1	156
sostegno dei genitori/conoscenti	1.9	2.8	2.2	2.3	5.5	3.2	8.0	9.7	8.4	57.9	45.7	55.4	6.3	5.3	5.5	17.4	10.4	14.9	570
spacciando, trafficando	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
altre entrate illegali	0.1	0.0	0.0	0.0	1.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	3
prostituzione	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1
assicurazione d'indennità giornaliera	0.4	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.3	11
altra	1.3	1.6	1.4	3.1	1.8	2.7	1.1	0.0	0.8	0.5	0.7	0.6	0.0	1.2	1.0	1.1	1.4	1.2	46
<b>N**</b>	<b>1'390</b>	<b>618</b>	<b>2'008</b>	<b>131</b>	<b>55</b>	<b>186</b>	<b>88</b>	<b>31</b>	<b>119</b>	<b>560</b>	<b>140</b>	<b>700</b>	<b>80</b>	<b>338</b>	<b>418</b>	<b>2'460</b>	<b>1'363</b>	<b>3'823</b>	<b>3'823</b>
<i>dati mancanti</i>	834	336	1'170	164	56	220	79	24	103	315	59	374	77	394	471	1'601	942	2'543	2'543
<b>Attività principale*</b>																			
alt. a tempo pieno (70% o più)	53.1	32.4	46.8	36.8	25.7	33.8	55.6	28.0	48.5	16.1	12.8	15.5	67.6	44.3	49.1	42.5	33.2	39.3	1'195
attività a tempo parziale	5.9	21.4	10.6	2.1	2.9	2.3	4.2	16.0	7.2	3.4	6.0	3.9	8.5	29.7	25.3	5.1	20.2	10.4	316
lavori occasionali	1.4	2.3	1.7	5.3	2.9	4.6	1.4	0.0	1.0	1.9	0.9	1.7	0.0	0.4	0.3	1.7	1.3	1.6	48.0
in formazione	3.2	4.0	3.5	2.1	8.6	3.8	8.3	4.0	7.2	60.9	58.1	60.4	4.2	6.6	6.1	19.6	13.6	17.5	531
disoccup., ricerc. di un lavoro	7.8	7.6	7.8	6.3	20.0	10.0	8.3	16.0	10.3	5.3	6.8	5.6	1.4	3.3	2.9	6.7	6.5	6.6	202
disoccup., senza ricerc. di un lavoro	4.3	2.7	3.8	12.6	11.4	12.3	4.2	4.0	4.1	2.8	5.1	3.2	1.4	0.4	0.6	4.3	2.4	3.7	111
rendita	9.7	11.3	10.2	3.2	2.9	3.1	0.0	4.0	1.0	0.6	0.0	0.5	8.5	10.3	9.9	6.3	9.2	7.3	222
incapacità di lavoro	4.0	6.1	4.6	12.6	11.4	12.3	6.9	8.0	7.2	1.5	1.7	1.5	0.0	1.5	1.2	3.5	4.3	3.8	116
casalinga/casalingo	0.2	2.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.8	1.7	0.2	1.8	0.7	22.0
altra	10.4	9.2	10.1	18.9	14.3	17.7	11.1	20.0	13.4	7.4	8.5	7.7	7.0	1.8	2.9	10.1	7.3	9.1	278
<b>N**</b>	<b>1'085</b>	<b>476</b>	<b>1'561</b>	<b>95</b>	<b>35</b>	<b>130</b>	<b>72</b>	<b>25</b>	<b>97</b>	<b>471</b>	<b>117</b>	<b>588</b>	<b>71</b>	<b>273</b>	<b>344</b>	<b>1'979</b>	<b>1'062</b>	<b>3'041</b>	<b>3'041</b>
<i>dati mancanti</i>	1'139	478	1'617	200	76	276	95	30	125	404	82	486	86	459	545	2'082	1'243	3'325	3'325

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

**T31 Statuto professionale dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale<sup>1</sup>) e dei parenti o conoscenti (2013)**

	Pazienti: problema principale <sup>1</sup>												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Statuto professionale*</b>																			
senza attività professionale	29.1	41.9	32.8	48.8	71.4	54.4	34.8	10.0	27.3	17.3	14.3	16.8	20.0	21.4	21.2	28.5	35.9	30.7	290
apprendista, praticante	2.1	1.7	2.0	0.0	7.1	1.8	4.3	0.0	3.0	26.9	23.8	26.4	0.0	2.4	1.9	6.2	4.3	5.6	53
manovale, operaio-a ausiliar.	3.3	2.9	3.2	9.3	0.0	7.0	0.0	20.0	6.1	1.9	0.0	1.6	0.0	2.4	1.9	3.3	2.8	3.2	30
operaio-a con formaz. pratica	7.0	3.5	6.0	11.6	7.1	10.5	4.3	20.0	9.1	4.8	9.5	5.6	0.0	2.4	1.9	6.5	5.0	6.0	57
oper. con form. certif. (AFC)	12.2	4.7	10.0	16.3	14.3	15.8	0.0	0.0	0.0	11.5	9.5	11.2	10.0	0.0	1.9	12.4	5.7	10.4	98
caposquadra	2.1	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.0	9
impiegato-a non qualificato-a	15.0	22.1	17.1	2.3	0.0	1.8	13.0	10.0	12.1	9.6	9.5	9.6	10.0	35.7	30.8	12.8	21.0	15.3	144
impieg. qualif., quadro medio	13.1	12.8	13.0	4.7	0.0	3.5	26.1	30.0	27.3	4.8	0.0	4.0	20.0	9.5	11.5	11.0	10.7	10.9	103
imp. funz. dirett., quadr. sup.	3.1	0.6	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.6	0.0	4.8	3.8	2.9	1.1	2.3	22
indipendente	9.6	7.6	9.0	0.0	0.0	0.0	17.4	10.0	15.2	0.0	4.8	0.8	40.0	7.1	13.5	8.0	6.4	7.5	71
scolaro-a, studente	1.2	1.2	1.2	4.7	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	19.2	19.0	19.2	0.0	14.3	11.5	5.0	5.7	5.2	49
altro statuto	2.1	1.2	1.8	2.3	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.9	9.5	3.2	0.0	0.0	0.0	2.1	1.4	1.9	18
<b>N**</b>	<b>426</b>	<b>172</b>	<b>598</b>	<b>43</b>	<b>14</b>	<b>57</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>33</b>	<b>104</b>	<b>21</b>	<b>125</b>	<b>10</b>	<b>42</b>	<b>52</b>	<b>663</b>	<b>281</b>	<b>944</b>	<b>944</b>
<i>dati mancanti</i>	<i>1'798</i>	<i>782</i>	<i>2'580</i>	<i>252</i>	<i>97</i>	<i>349</i>	<i>144</i>	<i>45</i>	<i>189</i>	<i>771</i>	<i>178</i>	<i>949</i>	<i>147</i>	<i>690</i>	<i>837</i>	<i>3'398</i>	<i>2'024</i>	<i>5'422</i>	<i>5'422</i>

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T32a Ragione principale della fine del trattamento/accompagnamento dei pazienti (in rapporto al problema principale<sup>1</sup>) e dei parenti o conoscenti (2013)

	Pazienti: problema principale <sup>1</sup>												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			N
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Ragione principale*</b>																			
conclus. pianific. senza passag.	51.0	49.2	50.5	26.9	33.6	28.7	44.8	36.4	42.7	69.3	70.7	69.6	66.7	65.0	65.3	54.0	56.8	55.0	3'481
conclus. pianific. con passag.	6.2	7.7	6.6	12.2	14.0	12.7	10.9	9.1	10.5	4.0	5.1	4.2	1.9	4.1	3.7	6.3	6.9	6.5	414
cambio di domicilio	2.1	2.8	2.3	5.4	3.7	5.0	1.8	0.0	1.4	1.4	2.0	1.5	0.0	1.1	0.9	2.0	2.1	2.0	127
ospedalizzazione	1.0	1.1	1.0	1.0	2.8	1.5	0.6	0.0	0.5	0.1	0.0	0.1	0.0	0.3	0.2	0.6	0.7	0.6	41
incarcerazione	0.2	0.2	0.2	2.4	0.0	1.7	0.6	0.0	0.5	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.3	17
perdita di contatto	28.2	27.1	27.9	33.0	29.9	32.2	29.7	38.2	31.8	16.3	16.2	16.3	19.9	21.7	21.4	25.5	23.6	24.8	1'568
conclusione esplicita	8.2	9.0	8.5	12.2	11.2	12.0	9.1	14.5	10.5	7.6	5.1	7.1	7.1	6.4	6.6	8.4	7.7	8.1	514
decesso	2.0	1.9	2.0	6.1	2.8	5.2	1.8	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.1	1.7	1.0	1.4	90
altre cause	1.1	1.1	1.1	0.7	1.9	1.0	0.6	1.8	0.9	1.1	1.0	1.1	3.8	1.4	1.8	1.2	1.2	1.2	77
<b>N**</b>	<b>2'210</b>	<b>949</b>	<b>3'159</b>	<b>294</b>	<b>107</b>	<b>401</b>	<b>165</b>	<b>55</b>	<b>220</b>	<b>871</b>	<b>198</b>	<b>1'069</b>	<b>156</b>	<b>729</b>	<b>885</b>	<b>4'037</b>	<b>2'292</b>	<b>6'329</b>	<b>6'329</b>
dati mancanti	14	5	19	1	4	5	2	0	2	4	1	5	1	3	4	24	13	37	37

T32b Destinazione dei trasferimenti dei pazienti (in rapporto al problema principale<sup>1</sup>) e dei parenti o conoscenti (2013)

Destinazione dei trasferimenti***	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%								
terapia residenziale	34.6	40.0	36.2	13.6	20.0	14.8	27.3	0.0	18.8	47.6	14.3	39.3	0.0	21.4	21.4	31.5	27.3	30.0	66
struttura di giorno/clinica di giorno	1.2	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	7.1	1.4	1.3	1.4	3
consulenza ambulatoriale	44.4	37.1	42.2	45.5	20.0	40.7	54.5	40.0	50.0	38.1	57.1	42.9	0.0	28.6	28.6	44.8	41.6	43.6	96
appartamento protetto	1.2	5.7	2.6	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	6.3	4.8	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	2.8	2.6	2.7	6
altra istituzione specializzata	18.5	17.1	18.1	40.9	60.0	44.4	9.1	60.0	25.0	9.5	28.6	14.3	0.0	42.9	42.9	19.6	27.3	22.3	49
<b>N**</b>	<b>81</b>	<b>35</b>	<b>116</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>143</b>	<b>77</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
dati mancanti	55	38	93	14	10	24	7	0	7	14	3	17	3	16	19	112	82	194	194

T32c Causa di decesso dei pazienti (in rapporto al problema principale<sup>1</sup>) e dei parenti o conoscenti (2013)

Cause di decesso****	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%								
suicidio	16.7	0.0	12.2	14.3	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	0.0	11.5	7
infortunio	6.7	0.0	4.9	7.1	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	4.9	3
malattia	66.7	63.6	65.9	35.7	50.0	37.5	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	58.7	53.3	57.4	35
overdose o intossicazione acuta	3.3	18.2	7.3	35.7	50.0	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	26.7	16.4	10
altre cause di decesso	6.7	18.2	9.8	7.1	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	20.0	9.8	6.0
<b>N**</b>	<b>30</b>	<b>11</b>	<b>41</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>46</b>	<b>15</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
dati mancanti	15	7	22	4	1	5	2	0	2	0	0	0	0	0	0	21	8	29	29

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti trasferiti. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti deceduti durante l'intervento. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T33 Durata dell'intervento sui pazienti (in rapporto al problema principale<sup>1</sup>) e sui parenti o conoscenti (2013)

	Pazienti: problema principale <sup>1</sup>												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
<b>Durata della presa in carico* (%)</b>																			
1 settimana o meno	5.8	4.5	5.4	2.7	0.0	2.0	0.6	0.0	0.5	2.4	2.5	2.4	10.8	12.0	11.8	4.7	6.2	5.2	332
> 1 settimana a 1 mese	3.8	2.5	3.4	2.4	4.6	3.0	4.2	1.8	3.6	8.3	7.5	8.2	8.3	4.7	5.3	5.0	3.7	4.5	286
> 1 a 2 mesi	3.3	2.3	3.0	2.0	1.8	2.0	3.0	1.8	2.7	8.5	8.5	8.5	4.5	4.7	4.6	4.7	4.2	4.5	286
> 2 a 3 mesi	4.0	4.4	4.1	1.4	3.7	2.0	4.2	3.6	4.1	7.1	6.0	6.9	5.1	2.8	3.2	4.6	4.2	4.5	284
> 3 a 6 mesi	10.8	10.6	10.7	8.2	11.0	8.9	7.8	9.1	8.1	14.2	15.1	14.3	15.9	17.1	16.9	11.7	13.9	12.5	795
> 6 mesi a 1 anno	26.1	29.5	27.1	23.8	28.4	25.1	31.1	45.5	34.7	35.1	35.2	35.1	30.6	34.3	33.7	29.2	32.4	30.3	1'925
> 1 a 2 anni	21.7	23.2	22.1	24.8	17.4	22.8	21.0	21.8	21.2	16.3	19.1	16.9	19.1	15.7	16.3	20.3	19.6	20.0	1'271
> 2 a 3 anni	9.5	9.9	9.6	10.9	9.2	10.4	11.4	3.6	9.5	4.5	4.0	4.4	3.2	5.4	5.0	7.9	7.2	7.7	486
> 3 a 5 anni	9.2	8.4	9.0	13.3	9.2	12.2	10.2	9.1	9.9	3.0	2.0	2.8	1.3	2.3	2.2	7.4	5.5	6.7	425
> 5 a 10 anni	5.4	4.0	5.0	8.8	12.8	9.9	6.0	3.6	5.4	0.7	0.0	0.6	1.3	0.8	0.9	4.2	2.7	3.7	232
più di 10 anni	0.4	0.5	0.4	1.7	1.8	1.7	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	0.3	0.4	23
<b>N**</b>	<b>2'218</b>	<b>949</b>	<b>3'167</b>	<b>294</b>	<b>109</b>	<b>403</b>	<b>167</b>	<b>55</b>	<b>222</b>	<b>875</b>	<b>199</b>	<b>1'074</b>	<b>157</b>	<b>725</b>	<b>882</b>	<b>4'054</b>	<b>2'291</b>	<b>6'345</b>	<b>6'345</b>
<i>dati mancanti</i>	6	5	11	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	14	21	21
<b>Durata (in settimane)</b>																			
media	79.0	76.8	78.4	110.1	112.8	110.8	89.1	70.2	84.4	41.4	39.6	41.0	38.2	42.4	41.7	69.3	60.7	66.2	
deviazione standard	95.2	95.7	95.4	118.8	136.9	123.8	95.3	76.5	91.2	46.3	38.4	44.9	45.9	58.2	56.2	87.1	81.7	85.3	
1° quartile	21.3	25.0	22.6	32.4	27.1	30.7	31.9	28.3	30.7	11.4	12.3	11.6	9.1	12.9	12.4	18.0	17.7	17.9	
mediana	46.6	48.1	47.3	66.7	52.3	63.0	51.3	42.1	47.5	30.0	31.0	30.1	27.0	28.6	28.1	40.1	35.9	38.3	
3° quartile	102.9	94.9	100.4	147.6	133.7	147.6	124.3	72.7	111.0	50.9	52.3	51.0	51.4	51.6	51.6	82.1	70.0	78.0	
<b>N**</b>	<b>2'218</b>	<b>949</b>	<b>3'167</b>	<b>294</b>	<b>109</b>	<b>403</b>	<b>167</b>	<b>55</b>	<b>222</b>	<b>875</b>	<b>199</b>	<b>1'074</b>	<b>157</b>	<b>725</b>	<b>882</b>	<b>4'054</b>	<b>2'291</b>	<b>6'345</b>	
<i>dati mancanti</i>	6	5	11	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	14	21	

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto



T34 Trattamento sostitutivo durante e immediatamente dopo l'intervento, in rapporto al problema principale<sup>1</sup> (solamente pazienti) (2013)

	Pazienti: problema principale <sup>1</sup>												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Sostituzione nel corso dell'intervento*</b>																
no	98.4	98.7	98.5	43.7	50.8	45.8	94.0	87.5	92.2	99.8	100.0	99.9	94.9	95.4	95.1	3'275
sì	1.6	1.3	1.5	56.3	49.2	54.2	6.0	12.5	7.8	0.2	0.0	0.1	5.1	4.6	4.9	169
<b>N**</b>	<b>1'406</b>	<b>612</b>	<b>2'018</b>	<b>151</b>	<b>61</b>	<b>212</b>	<b>83</b>	<b>32</b>	<b>115</b>	<b>564</b>	<b>141</b>	<b>705</b>	<b>2'415</b>	<b>1'029</b>	<b>3'444</b>	<b>3'444</b>
<i>dati mancanti</i>	818	342	1'160	144	50	194	84	23	107	311	58	369	1'490	544	2'034	2'034
<b>Tipo di sostituzione***</b>																
eroina	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	1.6	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	4.0	3.2	3.8	4
metadone	88.2	87.5	88.0	87.0	88.9	87.5	50.0	75.0	62.5	100.0	0.0	100.0	85.3	87.1	85.8	91
altri oppiacei	11.8	12.5	12.0	10.9	11.1	10.9	25.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	10.7	9.7	10.4	11
altre sostanze	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
<b>N**</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>46</b>	<b>18</b>	<b>64</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>75</b>	<b>31</b>	<b>106</b>	<b>106</b>
<i>dati mancanti</i>	6	0	6	39	12	51	1	0	1	0	0	0	47	16	63	63
<b>Sostituzione dopo l'intervento*</b>																
no	99.0	99.1	99.1	70.7	75.7	72.1	100.0	92.0	97.9	99.6	100.0	99.7	97.8	98.1	97.9	2'917
sì	1.0	0.9	0.9	29.3	24.3	27.9	0.0	8.0	2.1	0.4	0.0	0.3	2.2	1.9	2.1	62
<b>N**</b>	<b>1'249</b>	<b>556</b>	<b>1'805</b>	<b>92</b>	<b>37</b>	<b>129</b>	<b>72</b>	<b>25</b>	<b>97</b>	<b>466</b>	<b>117</b>	<b>583</b>	<b>2'074</b>	<b>905</b>	<b>2'979</b>	<b>2'979</b>
<i>dati mancanti</i>	975	398	1'373	203	74	277	95	30	125	409	82	491	1'831	668	2'499	2'499
<b>Tipo di sostituzione***</b>																
prescrizione di eroina	25.0	20.0	23.5	3.7	0.0	2.8	0.0	50.0	50.0	50.0	0.0	50.0	11.1	11.8	11.3	7
trattamento sostitutivo	75.0	80.0	76.5	96.3	100.0	97.2	0.0	50.0	50.0	50.0	0.0	50.0	88.9	88.2	88.7	55
<b>N**</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>9</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>45</b>	<b>17</b>	<b>62</b>	<b>62</b>
<i>dati mancanti</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti ai quali è stata prescritta una sostituzione durante l'intervento. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T35 Postassistenza prevista e preparata, in rapporto al problema principale<sup>1</sup> (solamente pazienti) (2013)

	Pazienti: problema principale <sup>1</sup>												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Postassistenza prevista e preparata*</b>																
no	91.7	88.9	90.9	90.5	85.2	88.9	93.9	100.0	95.7	98.6	96.9	98.3	92.8	90.1	92.1	1'191
sì	8.3	11.1	9.1	9.5	14.8	11.1	6.1	0.0	4.3	1.4	3.1	1.7	7.2	9.9	7.9	102
<b>N**</b>	<b>637</b>	<b>244</b>	<b>881</b>	<b>63</b>	<b>27</b>	<b>90</b>	<b>33</b>	<b>14</b>	<b>47</b>	<b>147</b>	<b>32</b>	<b>179</b>	<b>948</b>	<b>345</b>	<b>1'293</b>	<b>1'293</b>
<i>dati mancanti</i>	<i>1'587</i>	<i>710</i>	<i>2'297</i>	<i>232</i>	<i>84</i>	<i>316</i>	<i>134</i>	<i>41</i>	<i>175</i>	<i>728</i>	<i>167</i>	<i>895</i>	<i>2'957</i>	<i>1'228</i>	<i>4'185</i>	<i>4'185</i>
<b>Tipo di postassistenza prevista***</b>																
appartamento protetto dell'istituzione	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	3.8	2.5	2
servizio di postassistenza dell'istituzione	2.4	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.2	1
appartamento protetto esterno	4.8	0.0	3.3	16.7	25.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	3.8	4.9	4
servizio di postassistenza esterno	2.4	10.5	4.9	33.3	25.0	30.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	33.3	7.3	11.5	8.6	7
centro di consulenza per problemi inerenti all'alcol	38.1	5.3	27.9	16.7	0.0	10.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	32.7	3.8	23.5	19
centro di consulenza per problemi inerenti alle droghe	7.1	5.3	6.6	16.7	50.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	11.5	8.6	7
altri centri di consulenza	11.9	42.1	21.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	33.3	10.9	34.6	18.5	15
gruppo di aiuto reciproco e di autosostegno	9.5	10.5	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	11.5	8.6	7
gruppo di precedenti utenti del centro/ dell'istituzione	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
altro-i	33.3	52.6	39.3	33.3	25.0	30.0	50.0	0.0	50.0	100.0	0.0	66.7	36.4	46.2	39.5	32
<b>N**</b>	<b>42</b>	<b>19</b>	<b>61</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>55</b>	<b>26</b>	<b>81</b>	<b>81</b>
<i>dati mancanti</i>	<i>11</i>	<i>8</i>	<i>19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13</i>	<i>8</i>	<i>21</i>	<i>21</i>

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti per i quali una postassistenza è prevista. Le categorie non sono esclusive (molte risposte possibili)

**T36 Problemi di dipendenza all'uscita, in rapporto al problema principale<sup>1</sup> (solamente pazienti) (2013)**

Problemi di dipendenza all'uscita*	Pazienti: problema principale <sup>1</sup>												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
alcol	63.0	67.8	64.5	17.6	16.1	17.2	21.0	20.6	20.9	13.7	16.3	14.2	41.7	46.0	43.0	1'562
eroina	0.9	0.5	0.8	54.9	43.5	51.5	6.7	11.8	7.9	0.5	1.3	0.6	4.2	3.4	4.0	144
metadone	0.3	0.9	0.5	19.0	14.5	17.6	0.0	2.9	0.7	0.0	0.0	0.0	1.3	1.6	1.4	50
buprenorfina	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
altri oppioidi	0.0	0.2	0.0	2.8	3.2	2.9	0.0	2.9	0.7	0.5	0.0	0.4	0.3	0.5	0.3	12
cocaina	1.4	0.3	1.1	9.9	16.1	11.8	56.2	64.7	58.3	2.4	2.0	2.3	4.4	3.7	4.2	152
crack	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.4	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	4
altra forma di cocaina	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
anfetamine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	3.6	1.3	1.3	1.3	0.9	0.4	0.7	26
metanfetamine	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.7	0.0	0.7	0.1	0.1	0.2	0.1	4
MDMA e affini (ecstasy)	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	1.9	5.9	2.9	1.3	1.3	1.3	0.7	0.9	0.8	29
catinoni sintetici	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1
altri stimolanti	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1
barbiturici	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	2
benzodiazepina	1.5	2.6	1.9	9.9	9.7	9.8	1.9	0.0	1.4	0.2	0.0	0.1	2.0	2.8	2.3	82
GHB/GBL	0.1	0.0	0.0	0.0	1.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	4
altri sonniferi e tranquillanti	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	3
LSD	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.7	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	3
ketamina	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
altri allucinogeni	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	3
sostanze volatili	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.1	0.1	0.1	4
canapa	4.5	2.1	3.7	18.3	12.9	16.7	18.1	5.9	15.1	66.1	61.4	65.2	21.4	11.9	18.5	672
tabacco	12.8	10.8	12.2	16.9	27.4	20.1	10.5	20.6	12.9	15.8	26.1	17.8	14.8	15.8	15.1	548
altra sostanza	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.7	0.3	0.0	0.3	0.2	0.3	0.2	9
gioco patologico	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.0	1.4	51
dipendenza al computer/Internet	0.1	0.2	0.1	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.3	1.1	0.3	0.9	31
disturbi alimentari	0.1	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.7	0.2	0.0	0.1	0.3	6.6	2.2	80
altro/i problema/i di dipendenza	0.0	0.2	0.0	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	1.3	0.5	1.1	39
nessuno	32.0	27.9	30.7	14.1	17.7	15.2	26.7	20.6	25.2	26.4	32.0	27.5	28.1	27.6	27.9	1'014
<b>N**</b>	<b>1'431</b>	<b>656</b>	<b>2'087</b>	<b>142</b>	<b>62</b>	<b>204</b>	<b>105</b>	<b>34</b>	<b>139</b>	<b>622</b>	<b>153</b>	<b>775</b>	<b>2'537</b>	<b>1'094</b>	<b>3'631</b>	<b>3'631</b>
<i>dati mancanti</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T37 Frequenza delle ricadute e sostanza o comportamento implicato nel corso dell'intervento, in rapporto al problema principale<sup>1</sup> (solamente pazienti) (2013)

	Pazienti: problema principale <sup>1</sup>												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Frequenza delle ricadute*</b>																
nessuna	56.2	43.3	52.5	38.6	33.3	37.1	61.9	20.0	48.4	67.0	55.2	64.3	57.5	44.2	53.7	475
1 volta	12.2	11.7	12.0	6.8	11.1	8.1	4.8	0.0	3.2	4.1	13.8	6.3	10.1	12.4	10.7	95
2 volte	5.9	11.7	7.5	6.8	5.6	6.5	9.5	30.0	16.1	7.2	6.9	7.1	6.5	10.8	7.7	68
3 o 4 volte	11.0	13.5	11.7	20.5	5.6	16.1	4.8	30.0	12.9	9.3	6.9	8.7	10.7	12.0	11.1	98
5 volte o più	14.8	19.9	16.2	27.3	44.4	32.3	19.0	20.0	19.4	12.4	17.2	13.5	15.3	20.5	16.7	148
<b>N**</b>	<b>427</b>	<b>171</b>	<b>598</b>	<b>44</b>	<b>18</b>	<b>62</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>31</b>	<b>97</b>	<b>29</b>	<b>126</b>	<b>635</b>	<b>249</b>	<b>884</b>	<b>884</b>
<i>dati mancanti</i>	1'797	783	2'580	251	93	344	146	45	191	778	170	948	3'270	1'324	4'594	4'594
<b>Sostanza/comportamento comparabile a una dipendenza al momento delle ricadute***</b>																
alcol	98.9	98.9	98.9	33.3	18.2	28.9	71.4	25.0	46.7	41.9	30.8	38.6	81.1	74.4	78.9	306
oppioidi	1.1	0.0	0.7	88.9	81.8	86.8	14.3	25.0	20.0	3.2	7.7	4.5	12.0	10.1	11.3	44
cocaina e derivati	2.2	0.0	1.5	29.6	27.3	28.9	100.0	87.5	93.3	3.2	7.7	4.5	7.7	8.5	8.0	31
altri stimolanti	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	0.0	9.1	1.5	0.0	1.0	4
ipnotici/sedativi	2.2	6.7	3.7	3.7	0.0	2.6	14.3	12.5	13.3	0.0	0.0	0.0	3.1	7.0	4.4	17
allucinogeni	0.6	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	1
sostanze volatili	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
canapa	5.5	0.0	3.7	33.3	36.4	34.2	42.9	0.0	20.0	96.8	76.9	90.9	20.8	12.4	18.0	70
tabacco	0.6	1.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	15.4	6.8	1.2	2.3	1.5	6
altra/e sostanza/e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
gioco patologico	0.6	1.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.8	1.0	4
dipendenza al computer/Internet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	2.3	2.3	0.0	1.5	6
disturbi alimentari	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	2.3	0.0	3.9	1.3	5
altri problemi assimilabili a una dipendenza	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
<b>N**</b>	<b>181</b>	<b>89</b>	<b>270</b>	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>38</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>31</b>	<b>13</b>	<b>44</b>	<b>259</b>	<b>129</b>	<b>388</b>	<b>388</b>
<i>dati mancanti</i>	6	8	14	0	1	1	1	0	1	1	0	1	11	10	21	21

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti che hanno indicato una o più ricadute. Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

**T38 Frequenza del consumo di tabacco e numero di sigarette al giorno nel corso dei 30 giorni precedenti l'uscita, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2013)**

	Pazienti: problema principale <sup>1</sup>												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Frequenza del consumo di tabacco*</b>																
mai	37.8	41.3	38.8	7.1	10.0	8.1	27.8	18.2	24.1	15.5	24.0	17.2	32.1	36.6	33.4	291
1 giorno alla settimana o meno	0.9	0.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.6	1.0	0.4	0.8	7
2 a 3 giorni alla settimana	0.2	1.8	0.7	0.0	5.0	1.6	11.1	9.1	10.3	4.9	0.0	3.9	1.6	2.1	1.7	15
4 a 6 giorni alla settimana	0.7	0.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	4.0	2.3	0.8	0.8	0.8	7
una volta al giorno	1.6	2.4	1.8	2.4	5.0	3.2	0.0	0.0	0.0	4.9	4.0	4.7	2.1	2.9	2.3	20
più volte al giorno	58.7	53.3	57.2	90.5	80.0	87.1	61.1	72.7	65.5	70.9	68.0	70.3	62.5	57.2	61.0	532
<b>N**</b>	<b>429</b>	<b>167</b>	<b>596</b>	<b>42</b>	<b>20</b>	<b>62</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>29</b>	<b>103</b>	<b>25</b>	<b>128</b>	<b>629</b>	<b>243</b>	<b>872</b>	<b>872</b>
<i>dati mancanti</i>	1'795	787	2'582	253	91	344	149	44	193	772	174	946	3'276	1'330	4'606	4'606
<b>Numero di sigarette al giorno***</b>																
0 a 10 sigarette al giorno	17.2	25.3	19.4	5.9	23.5	11.8	20.0	42.9	29.4	38.9	41.2	39.3	21.4	27.8	23.2	113
11 a 20 sigarette al giorno	42.5	53.0	45.4	52.9	47.1	51.0	50.0	28.6	41.2	41.7	35.3	40.4	43.9	49.6	45.5	222
21 a 30 sigarette al giorno	28.5	20.5	26.3	38.2	23.5	33.3	30.0	28.6	29.4	16.7	17.6	16.9	26.5	20.3	24.8	121
31 sigarette al giorno o più	11.8	1.2	8.9	2.9	5.9	3.9	0.0	0.0	0.0	2.8	5.9	3.4	8.2	2.3	6.6	32
<b>N**</b>	<b>221</b>	<b>83</b>	<b>304</b>	<b>34</b>	<b>17</b>	<b>51</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>72</b>	<b>17</b>	<b>89</b>	<b>355</b>	<b>133</b>	<b>488</b>	<b>488</b>
<i>dati mancanti</i>	46	15	61	5	1	6	3	2	5	15	2	17	72	21	93	93

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

\*\*\* I risultati si basano solamente sui clienti che hanno indicato un consumo di tabacco. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T39 Obiettivo di consumo all'uscita e pronostico, in rapporto alla principale sostanza problematica<sup>1</sup> (solamente pazienti) (2013)

	Pazienti: sostanza problematica <sup>1</sup>												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Obiettivo di consumo*</b>																
astinenza definitiva	34.3	36.7	35.0	70.2	73.9	71.4	86.4	60.0	78.1	54.1	46.7	52.5	42.0	41.2	41.7	427
astinenza limitata nel tempo	14.9	15.9	15.2	4.3	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	9.2	6.7	8.6	12.1	12.2	12.1	124
consumo controllato	32.9	31.4	32.5	8.5	17.4	11.4	9.1	40.0	18.8	19.3	20.0	19.4	29.2	29.9	29.4	301
nessuna limitazione nel consumo prevista	4.4	2.4	3.8	6.4	4.3	5.7	0.0	0.0	0.0	9.2	20.0	11.5	5.1	4.4	4.9	50
nessuna decisione per il momento	11.5	12.6	11.8	8.5	4.3	7.1	4.5	0.0	3.1	8.3	6.7	7.9	9.9	10.5	10.1	103
altro	2.0	1.0	1.7	2.1	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.7	1.8	18
<b>N**</b>	<b>504</b>	<b>207</b>	<b>711</b>	<b>47</b>	<b>23</b>	<b>70</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>32</b>	<b>109</b>	<b>30</b>	<b>139</b>	<b>729</b>	<b>294</b>	<b>1'023</b>	<b>1'023</b>
<i>dati mancanti</i>	1'720	747	2'467	248	88	336	145	45	190	766	169	935	3'176	1'279	4'455	4'455
<b>Pronostico*</b>																
pronostico molto positivo	15.5	14.7	15.3	0.0	13.6	4.7	20.0	21.4	20.5	22.6	23.1	22.7	16.0	15.8	16.0	168
pronostico positivo	45.7	43.5	45.1	45.2	40.9	43.8	40.0	7.1	28.2	44.3	46.2	44.7	45.9	43.2	45.2	475
pronostico piuttosto sfavorevole	26.3	30.4	27.4	33.3	31.8	32.8	36.0	50.0	41.0	27.8	26.9	27.7	27.0	30.2	27.9	293
pronostico negativo	12.5	11.5	12.2	21.4	13.6	18.8	4.0	21.4	10.3	5.2	3.8	5.0	11.1	10.8	11.0	116
<b>N**</b>	<b>536</b>	<b>191</b>	<b>727</b>	<b>42</b>	<b>22</b>	<b>64</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>39</b>	<b>115</b>	<b>26</b>	<b>141</b>	<b>774</b>	<b>278</b>	<b>1'052</b>	<b>1'052</b>
<i>dati mancanti</i>	1'688	763	2'451	253	89	342	142	41	183	760	173	933	3'131	1'295	4'426	4'426

<sup>1</sup> Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

## ALLEGATI

## A1 Dati di base delle istituzioni non partecipanti: sesso e età all'entrata, in funzione del problema principale (2013)

	Pazienti: problema principale												Tutti gli interventi***			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Sesso*</b>																
uomini	62.0			63.6			81.3			69.0			64.7			720
donne	38.0			36.4			18.8			31.0			35.3			393
Sesso non noto	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0
<b>N**</b>	<b>353</b>	<b>216</b>	<b>569</b>	<b>56</b>	<b>32</b>	<b>88</b>	<b>39</b>	<b>9</b>	<b>48</b>	<b>127</b>	<b>57</b>	<b>184</b>	<b>720</b>	<b>393</b>	<b>1'113</b>	<b>1'113</b>
<b>Età (in anni)*</b>																
fino a 14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	1.8	4.4	1.4	0.5	1.1	12
15-19	0.9	2.9	1.6	0.0	3.1	1.1	2.6	11.1	4.2	50.4	18.2	40.7	11.3	5.5	9.3	102
20-24	4.3	2.9	3.8	12.5	21.9	15.9	15.4	0.0	12.5	12.6	12.7	12.6	8.8	7.0	8.2	90
25-29	11.8	9.1	10.8	16.1	28.1	20.5	15.4	33.3	18.8	8.7	7.3	8.2	12.0	11.7	11.9	131
30-34	11.8	4.3	9.0	17.9	12.5	15.9	28.2	33.3	29.2	4.7	5.5	4.9	12.0	8.6	10.8	119
35-39	6.3	11.5	8.3	19.6	21.9	20.5	23.1	11.1	20.8	4.7	10.9	6.6	8.5	12.5	9.9	109
40-44	10.1	10.0	10.1	16.1	12.5	14.8	10.3	0.0	8.3	3.9	21.8	9.3	10.4	12.8	11.2	123
45-49	14.7	14.8	14.7	10.7	0.0	6.8	2.6	11.1	4.2	3.1	10.9	5.5	10.6	12.2	11.2	123
50-54	17.3	17.2	17.3	5.4	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	3.1	9.1	4.9	10.5	12.0	11.0	121
55-59	9.8	8.6	9.4	1.8	0.0	1.1	2.6	0.0	2.1	3.1	0.0	2.2	6.7	5.7	6.4	70
60-64	4.9	8.6	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.5	3.1	5.7	4.0	44
65-69	2.6	5.7	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	3.1	2.3	25
70-74	4.3	3.3	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.1	2.1	23
75 e più	1.2	1.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	0.5	6
<b>N**</b>	<b>347</b>	<b>209</b>	<b>556</b>	<b>56</b>	<b>32</b>	<b>88</b>	<b>39</b>	<b>9</b>	<b>48</b>	<b>127</b>	<b>55</b>	<b>182</b>	<b>714</b>	<b>384</b>	<b>1'098</b>	<b>1'098</b>
<i>dati mancanti</i>	6	7	13	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	9	15	15
<b>Età</b>																
media	45.2	47.1	45.9	35.6	31.0	33.9	32.9	30.8	32.5	24.5	34.4	27.5	38.4	41.8	39.5	
deviazione standard	13.7	13.6	13.7	8.9	7.2	8.6	8.1	7.3	7.9	11.6	13.1	12.8	14.9	14.1	14.7	
1° quartile	33.1	38.7	34.8	29.4	25.4	26.6	26.4	26.5	26.4	16.9	21.1	17.2	26.4	30.1	27.8	
mediana	46.6	48.1	47.4	35.3	29.2	33.2	32.4	30.5	31.6	19.3	37.5	22.0	36.9	42.3	39.3	
3° quartile	54.3	56.5	54.7	42.3	37.5	40.4	37.39	34.3	37.0	28.1	44.9	38.3	49.9	51.3	50.4	
<b>N**</b>	<b>347</b>	<b>209</b>	<b>556</b>	<b>56</b>	<b>32</b>	<b>88</b>	<b>39</b>	<b>9</b>	<b>48</b>	<b>127</b>	<b>55</b>	<b>182</b>	<b>714</b>	<b>384</b>	<b>1'098</b>	
<i>dati mancanti</i>	6	7	13	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	9	15	

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto



## A2 Dati di base delle istituzioni non partecipanti: problema principale all'entrata (2013)

Tutti i pazienti				
	Uomini	Donne	Totale	
	%	%	%	N
<b>Problema principale*</b>				
alcol	52.5	58.9	54.7	569
oppioidi	8.3	8.7	8.5	88
cocaina	5.8	2.5	4.6	48
altri stimolanti	1.2	1.4	1.3	13
ipnotici/sedativi	1.9	1.9	1.9	20
allucinogeni	0.4	0.3	0.4	4
sostanze volatili	0.0	0.0	0.0	0
canapa	18.9	15.5	17.7	184
tabacco	0.3	0.0	0.2	2
altra/e sostanza/e	1.9	0.5	1.4	15
uso multiplo**	8.3	9.3	8.7	90
altri problemi assimilabili a una dipendenza	0.4	1.1	0.7	7
<b>N***</b>	<b>673</b>	<b>367</b>	<b>1'040</b>	<b>1'040</b>
<i>dati mancanti</i>	47	26	73	73

\* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

\*\* Diverse istituzioni non definiscono il problema principale per act-info seguendo le direttive e indicano ad esempio "uso multiplo". Pertanto, la distribuzione risultante non è direttamente comparabile con quella delle istituzioni partecipanti

\*\*\* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto