

act-info - SAMBAD

Intervento ambulatoriale nelle problematiche di dipendenza

Risultati del monitoraggio dei utenti 2018



Etienne Maffli

Losanna, dicembre 2019

Ringraziamenti

Ringraziamo vivamente sia i collaboratori e le collaboratrici che i pazienti delle istituzioni che hanno partecipato e che hanno gentilmente accettato di riempire i questionari del monitoraggio *act-info*. Ringraziamo ugualmente i collaboratori e le collaboratrici dei servizi di consultazione che hanno effettuato i lavori di logistica e di registrazione dei dati. I nostri migliori ringraziamenti vanno anche all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) che finanzia l'insieme della rete *act-info*. Grazie anche a Edith Bacher e Diane Jaccard per l'impaginazione di questo rapporto come pure a Marina Delgrande Jordan per la sua preziosa collaborazione nell'elaborazione delle procedure d'analisi.

Complementi d'informazione: Etienne Maffli, tel. 021 321 29 54, fax 021 321 29 40,
e-mail emaffli@addictionsuisse.ch

Realizzazione: Etienne Maffli
Dipendenze Svizzera

Diffusione: Ricerca, Dipendenze Svizzera, Av. Louis-Ruchonnet 14,
1003 Losanna, tel. 021/321 29 46, fax 021 321 29 40,
e-mail cgmail@addictionsuisse.ch

Lingua del testo originale: tedesco

Grafica/impaginazione: Dipendenze Svizzera

Copyright: © Dipendenze Svizzera, Losanna 2019

Citazione raccomandata: Maffli, E. (2019). Intervento ambulatoriale nelle problematiche di dipendenza. Risultati del monitoraggio dei utenti 2018. Losanna: Dipendenze Svizzera.

Indice

act-info – addiction care and therapy information.....	6
act-info nel settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale nel campo delle dipendenze (SAMBAD).....	7

ENTRATA

T1	Sesso e età dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2018)
T2	Stato civile e nazionalità dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2018)
T3	Grado di urbanizzazione del domicilio, tipo di nucleo familiare e situazione di domicilio dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2018)
T4	Tipo di relazione di coppia, numero di figli, di figli che vivono nel nucleo familiare dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2018)
T5	Più alta formazione portata a termine e statuto professionale dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2018)
T6	Fonte di reddito principale e attività dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2018)
T7	Reddito mensile netto e debiti dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2018)
T8	Incarcerazione o detenzione preventiva prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2018)
T9	Istanza d'invio principale, secondo il problema principale e per i parenti o conoscenti (2018)
T10	Intervento in seguito ad una misura giudiziaria e tipo di misura, secondo il problema principale (solo pazienti) (2018)
T11	Trattamenti/accompagnamenti anteriori l'ammissione e tipi di intervento, secondo il problema principale e per parenti o conoscenti (2018)
T12	Trattamento sostitutivo o prescrizione di eroina al momento dell'ammissione, secondo il problema principale (solo pazienti) (2018)
T13	Problema principale all'entrata (solamente pazienti) (2018)
T14	Uso di sostanze multiple e combinazioni di sostanze (2018)

- T15.1a Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata (2018), uomini
- T15.1b Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata (2018), donne
- T15.1c Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata (2018), uomini e donne
- T15.2a Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata (2018), uomini
- T15.2b Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata (2018), donne
- T15.2c Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata (2018), uomini e donne
- T16.1a Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2018), uomini
- T16.1b Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2018), donne
- T16.1c Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2018), uomini e donne
- T16.2a Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2018), uomini
- T16.2b Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2018), donne
- T16.2c Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2018), uomini e donne
- T17 Modo di amministrazione della principale sostanza problematica prima dell'entrata (2018)
- T18.1 Prevalenza a vita delle iniezioni, nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 12 mesi prima dell'entrata, scambio di materiale d'iniezione, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2018)
- T18.2 Età all'epoca della prima iniezione, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2018)
- T19.1a Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2018), uomini
- T19.1b Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2018), donne
- T19.1c Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2018), uomini e donne

- T19.2a Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2018), uomini
- T19.2b Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2018), donne
- T19.2c Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2018), uomini e donne
- T20a Frequenza del consumo delle sostanze secondarie secondo il problema principale (solo pazienti) (2018)
- T20b Frequenza del consumo delle sostanze secondarie secondo il problema principale (solo pazienti) (2018)
- T21 Frequenza del consumo di alcol, numero di "bicchieri standard" al giorno e frequenza di forti consumi di alcol prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2018)
- T22 Frequenza del consumo di tabacco e numero di sigarette al giorno nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2018)
- T23a Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2018), uomini
- T23b Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2018), donne
- T23c Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2018), uomini e donne
- T24a Problemi psichici nel corso della vita (2018), uomini
- T24b Problemi psichici nel corso della vita (2018), donne
- T24c Problemi psichici nel corso della vita (2018), uomini e donne
- T25 Parenti/conoscenti: legame tra l'utente e la persona sintomatica (2018)
- T26 Parenti/conoscenti: problema principale della persona sintomatica (2018)

USCITA

- T27 Sesso e età dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2018)
- T28 Stato civile e grado di urbanizzazione del domicilio dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2018)
- T29 Tipo di nucleo familiare, situazione di domicilio e tipo di relazione di coppia dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2018)
- T30 Fonte di reddito principale e attività principale all'uscita, secondo il problema principale e per i parenti o conoscenti (2015) e dei parenti o conoscenti (2018)
- T31 Statuto professionale dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2018)

- T32a Ragione principale della fine del trattamento/accompagnamento dei pazienti (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2017)
- T32b Destinazione dei trasferimenti dei pazienti (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2017)
- T32c Causa di decesso dei pazienti (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2017)
- T33 Durata dell'intervento sui pazienti (in rapporto al problema principale) e sui parenti o conoscenti (2017)
- T34 Trattamento sostitutivo durante e immediatamente dopo l'intervento, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2017)
- T35 Postassistenza prevista e preparata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2017)
- T36 Problemi di dipendenza all'uscita, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2017)
- T37 Frequenza delle ricadute e sostanza o comportamento implicato nel corso dell'intervento, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2017)
- T38 Frequenza del consumo di tabacco e numero di sigarette al giorno nel corso dei 30 giorni precedenti l'uscita, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2017)
- T39 Obiettivo di consumo all'uscita e pronostico, in rapporto alla principale sostanza problematica (solamente pazienti) (2017)

TRENDS

- G1 Problema principale all'entrata alcol: evoluzione 2013-2018
- G2 Problema principale all'entrata oppioidi: evoluzione 2013-2018
- G3 Problema principale all'entrata cocaina e derivati: evoluzione 2013-2018
- G4 Problema principale all'entrata altri stimolanti: evoluzione 2013-2018
- G5 Problema principale all'entrata canapa: evoluzione 2013-2018
- G6 Problema principale all'entrata ipnotici/sedativi: evoluzione 2013-2018
- G7 Problema principale all'entrata gioco d'azzardo: evoluzione 2013-2018

act-info - addiction care and therapy information

La Rete di monitoraggio degli interventi e dei trattamenti delle dipendenze in Svizzera (*act-info*) raccoglie nel suo seno i cinque sistemi statistici che sono realizzati in materia di intervento e di trattamento della dipendenza in Svizzera. Tali sistemi sono:

- SAMBAD (Statistica del settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale in materia di dipendenza)
- Residalc (Statistica dei trattamenti residenziali della dipendenza all'alcol in Svizzera)
- FOS (Statistica della Lega per la valutazione dei trattamenti residenziali della tossicomania)
- HeGeBe (Statistica dei trattamenti con prescrizione di eroina)
- Sostituzione (Statistica nazionale dei trattamenti sostitutivi)

Dal 2004 queste cinque statistiche dispongono di strumenti armonizzati e ottimizzati. I dati comuni sono integrati in una banca dati centralizzata che permette di procedere ad analisi concernenti l'insieme dei settori. L'adozione degli standard europei (Treatment Demande Indicator) permette di garantire anche la comparabilità dei dati al livello internazionale.

act-info è finanziato dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP. A partire dal 2018, Dipendenze Svizzera effettua tutte le indagini statistiche in tutti i settori di trattamento).

act-info nel settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale in materia di dipendenza (SAMBAD)

Gli strumenti di monitoraggio *act-info* sono stati introdotti a partire dal 2004 nel settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale in materia di dipendenza e hanno rimpiazzato i vecchi questionari in vigore dal 1994. Dopo diversi anni di utilizzo, una revisione di questi strumenti ha avuto luogo e i nuovi questionari sono stati introdotti nel 2013. Questo processo è stato armonizzato con la revisione delle norme europee. Tuttavia, non tutte le istituzioni sono state in grado di implementare i questionari rivisti. Inoltre, è disponibile anche una versione ridotta in campo ambulatoriale per soddisfare le diverse esigenze. Queste particolarità spiegano in parte perché per alcune domande manca un numero relativamente elevato di valori.

La statistica *act-info* SAMBAD dà una visione dell'utenza dell'aiuto ambulatoriale in materia di dipendenza in Svizzera. I dati sono raccolti all'inizio e alla fine dell'intervento. Le informazioni rilevate al momento dell'entrata permettono di valutare in particolare le caratteristiche socio-demografiche degli utenti, l'eventuale presenza di trattamenti precedenti, le modalità di consumo e la presenza di problemi psicosociali precedenti l'intervento. Le informazioni finali rilevate al termine dell'intervento evidenziano in particolare le circostanze dell'uscita e le caratteristiche socio-demografiche dell'utenza in quel preciso momento.

Nel 2018, 67 istituzioni del settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale in materia di dipendenza hanno partecipato al monitoraggio *act-info*. Queste istituzioni sono sia servizi deputati alla consultazione specialistica dei problemi inerenti all'alcol e/o alle droghe illegali, sia servizi polivalenti che offrono ugualmente un aiuto per i problemi di dipendenza. Le istituzioni che non partecipano al monitoraggio di *act-info* sono state interrogate nell'ambito di una vasta indagine volta a stimare la domanda complessiva in materia di trattamento. I risultati

di questo sondaggio sono riportati nel rapporto globale *act-info* (rapporto annuale 2018) pubblicato anch'esso alla fine del 2019.

Spiegazioni sulle tabelle

La presente statistica descrittiva dei dati dell'indagine *act-info* presso gli utenti del settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale in materia di dipendenza si basa su due tipi di tabelle:

- quando la domanda contiene delle categorie di risposte predefinite o ricodificate in parti distinte (per esempio « stato civile » o « età »), la tabella indica le percentuali delle differenti categorie di risposte
- quando la domanda non contiene delle categorie predefinite, ma richiede un valore numerico (per esempio « età all'inizio del consumo problematico »), la tabella presenta dei parametri di posizione (media, mediana) e dei parametri di dispersione (deviazione standard, 1° quartile, 3° quartile)

La maggior parte delle tabelle presenta i risultati in maniera distinta per i sottogruppi di pazienti che hanno menzionato l'**alcol**, un **oppiaceo** (eroina in particolare), la **cocaina** (e derivati) o la **canapa** come problema principale al momento dell'entrata. I **parenti o conoscenti** che consultano per i problemi di un terzo sono ugualmente oggetto di analisi separate per gli aspetti socio-demografici. Invece, gli utenti (poco numerosi) che hanno menzionato altre sostanze come problema principale (per esempio un stimolante o le sostanze volatili) o un problema di dipendenza non inerente a una sostanza (per esempio gioco patologico), non sono differenziati nei risultati (eccetto nei temi direttamente inerenti ai modi di consumo o alle forme di comportamenti additivi non inerenti alle sostanze). Queste persone sono tuttavia incluse nelle analisi relative all'insieme degli interventi che figurano nei blocchi a destra delle tabelle rispettive. Tutte le analisi sono effettuate separatamente per gli uomini, per le donne e per i sessi riuniti (nel caso in cui ci fossero persone il cui sesso non è conosciuto, queste saranno comprese nella colonna « Totale »).

Solo le risposte valide sono considerate nelle analisi. Cioè, le risposte « non noto » e le informazioni mancanti (missings) sono escluse dalle analisi. Il numero di risposte valide **N** rappresenta il numero esatto di casi sui quali sono calcolati le percentuali o altri parametri; esso viene indicato per ogni gruppo o sottogruppo. In basso alla tabella viene anche indicato il numero corrispondente di dati mancanti. La presenza di numerosi dati mancanti costringe a interpretare i risultati con particolare prudenza.

Le note in basso alla tabella danno informazioni sulle eventuali particolarità dei gruppi di riferimento e sul tipo di domanda. Quando sono possibili più risposte a una stessa domanda (per esempio nelle tabelle del tema T19, « altri problemi di dipendenza ») le percentuali ottenute non si possono addizionare.

La sezione finale presenta in forma grafica le tendenze 2013-2018. Questi includono aspetti della domanda di trattamento, della distribuzione per sesso e per età per i più comuni problemi principali (alcol, oppioidi, cocaina o derivati, altri stimolanti, canape, ipnotico/sedativo gioco patologico).

T1 Sesso e età dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2018)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Sesso*																			
uomini			70.0			72.2			79.9			82.6			22.1			64.7	3 961
donne			30.0			27.8			20.1			17.4			77.9			35.3	2 160
Sesso non noto			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	0
N**	1 915	822	2 737	148	57	205	318	80	398	850	179	1 029	217	764	981	3 961	2 160	6 121	6 121
Età (in anni)*																			
fino a 14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	4.9	6.2	5.2	0.9	1.2	1.1	1.9	1.3	1.7	105
15-19	1.4	1.8	1.5	1.4	1.8	1.5	2.8	13.8	5.0	58.7	62.4	59.3	2.8	2.5	2.6	16.2	9.2	13.7	838
20-24	3.9	3.9	3.9	4.7	1.8	3.9	14.5	23.8	16.3	12.4	10.7	12.1	2.4	4.6	4.1	7.5	6.1	7.0	428
25-29	8.1	6.7	7.7	6.8	15.8	9.3	19.5	18.8	19.3	8.4	10.1	8.7	2.8	6.7	5.9	9.5	8.4	9.1	556
30-34	9.3	7.4	8.7	14.9	22.8	17.1	20.4	22.5	20.9	6.6	2.8	5.9	5.2	7.5	7.0	9.9	8.4	9.4	573
35-39	11.5	13.0	12.0	16.9	8.8	14.6	16.0	2.5	13.3	3.3	2.8	3.2	6.1	9.4	8.7	9.9	9.9	9.9	605
40-44	11.2	10.5	11.0	18.9	17.5	18.5	10.4	8.8	10.1	2.7	2.2	2.6	9.4	13.3	12.5	8.9	10.4	9.4	576
45-49	13.9	13.1	13.7	16.9	10.5	15.1	7.5	5.0	7.0	1.3	2.2	1.5	17.5	17.5	17.5	10.0	12.7	11.0	671
50-54	14.4	14.1	14.3	12.8	15.8	13.7	6.0	3.8	5.5	1.6	0.6	1.5	16.0	15.8	15.9	9.9	12.9	10.9	667
55-59	11.2	12.2	11.5	4.1	1.8	3.4	1.9	1.3	1.8	0.0	0.0	0.0	15.1	9.1	10.4	7.0	8.6	7.6	463
60-64	7.9	8.6	8.1	2.7	0.0	2.0	0.6	0.0	0.5	0.1	0.0	0.1	6.6	5.7	5.9	4.6	5.9	5.1	311
65-69	3.6	4.9	4.0	0.0	3.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	2.6	3.3	2.2	3.1	2.5	153
70-74	2.2	2.1	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	2.0	2.7	1.5	1.6	1.5	94
75 e più	1.3	1.7	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	2.0	2.5	0.9	1.5	1.1	67
N**	1 914	822	2 736	148	57	205	318	80	398	850	178	1 028	212	758	970	3 954	2 153	6 107	6 107
<i>dati mancanti</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>11</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>14</i>	<i>14</i>
Età																			
media	46.3	46.9	46.5	41.1	40.0	40.8	34.4	30.1	33.6	21.8	20.9	21.6	49.7	45.1	46.1	38.3	42.1	39.6	
deviazione standard	15.9	13.5	15.2	9.9	10.9	10.2	9.8	10.0	10.0	8.5	7.8	8.4	15.4	13.9	14.4	17.1	15.4	16.6	
1° quartile	36.0	37.3	36.3	33.7	32.3	32.8	27.3	22.2	26.2	16.5	16.4	16.5	42.1	36.4	37.4	24.6	29.9	26.6	
mediana	46.9	47.7	47.2	41.3	39.7	41.0	33.1	28.2	32.3	17.8	17.8	17.8	50.6	46.2	47.3	37.5	43.4	39.4	
3° quartile	55.5	56.5	55.8	48.8	48.9	48.9	40.98	33.7	39.9	24.7	22.7	24.3	57.8	53.7	54.9	50.5	53.1	51.5	
N**	1 914	822	2 736	148	57	205	318	80	398	850	178	1 028	216	763	979	3 958	2 158	6 116	
<i>dati mancanti</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T2 Stato civile e nazionalità dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2018)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Stato civile*																			
celibe/nubile	44.4	35.2	41.7	65.7	60.4	64.3	67.6	77.3	69.5	90.9	88.3	90.5	21.8	27.9	26.6	59.4	41.9	53.2	3 017
sposato-a	31.8	27.6	30.6	13.4	12.5	13.2	18.2	9.3	16.4	4.0	4.3	4.0	63.2	50.6	53.3	24.0	32.1	26.9	1 523
separato-a	4.2	6.1	4.8	3.7	6.3	4.4	4.4	5.3	4.6	1.5	0.6	1.4	2.6	3.5	3.3	3.2	4.3	3.6	205
divorziato-a	18.4	24.1	20.1	13.4	18.8	14.8	7.8	6.7	7.5	1.9	3.1	2.1	11.4	15.0	14.3	11.9	17.2	13.8	781
vedovo-a	0.7	5.9	2.3	3.7	2.1	3.3	1.0	0.0	0.8	1.4	3.1	1.7	0.0	2.0	1.6	1.0	3.6	1.9	110
unione registrata	0.4	1.0	0.6	0.0	0.0	0.0	1.0	1.3	1.1	0.3	0.6	0.3	1.0	0.9	0.9	0.4	0.9	0.6	33
N**	1 785	767	2 552	134	48	182	296	75	371	784	162	946	193	705	898	3 673	1 996	5 669	5 669
<i>dati mancanti</i>	130	55	185	14	9	23	22	5	27	66	17	83	24	59	83	288	164	452	452
Nazionalità*																			
CH	76.0	80.3	77.3	73.2	84.9	76.7	73.0	81.8	74.8	82.3	87.6	83.2	84.5	88.7	87.8	78.0	84.9	80.5	4 587
EU	15.4	12.3	14.4	19.7	7.5	16.1	15.3	11.7	14.6	11.0	4.7	9.9	12.5	7.9	8.9	13.8	9.4	12.3	700
altra	8.6	7.4	8.3	7.1	7.5	7.2	11.7	6.5	10.6	6.7	7.6	6.9	3.0	3.4	3.3	8.1	5.6	7.2	413
N**	1 771	772	2 543	127	53	180	300	77	377	801	170	971	200	707	907	3 678	2 022	5 700	5 700
<i>dati mancanti</i>	144	50	194	21	4	25	18	3	21	49	9	58	17	57	74	283	138	421	421

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T3 Grado di urbanizzazione del domicilio, tipo di nucleo familiare e situazione di domicilio dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2018)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Grado di urbanizzazione*																			
grandi centri urbani	9.6	9.3	9.5	1.4	0.0	1.0	1.0	0.0	0.8	0.1	1.7	0.4	9.0	9.4	9.3	5.4	7.1	6.0	353
periferia dei grandi centri	17.8	20.1	18.5	7.2	7.3	7.2	15.2	22.1	16.6	10.8	6.9	10.1	19.5	16.2	16.9	14.6	15.8	15.0	886
città di media importanza	12.3	15.0	13.1	15.1	7.3	12.9	22.9	13.0	20.9	26.1	30.3	26.9	23.5	20.8	21.4	18.0	18.8	18.3	1 080
piccole città	30.4	30.3	30.4	50.4	50.9	50.5	36.7	45.5	38.5	32.3	33.7	32.5	28.0	31.6	30.8	32.9	33.4	33.1	1 951
campagne	29.9	25.3	28.5	25.9	34.5	28.4	24.2	19.5	23.3	30.6	27.4	30.0	20.0	21.9	21.5	29.1	24.9	27.6	1 629
N**	1 850	795	2 645	139	55	194	297	77	374	830	175	1 005	200	721	921	3 819	2 080	5 899	5 899
<i>dati mancanti</i>	65	27	92	9	2	11	21	3	24	20	4	24	17	43	60	142	80	222	222
Tipo di nucleo familiare (30 ultimi giorni)*																			
da solo-a	36.5	35.7	36.3	38.8	33.3	37.3	31.5	32.4	31.6	13.6	13.8	13.6	14.5	13.0	13.3	29.0	27.8	28.7	1 376
con famiglia d'origine (genitori, ecc.)	7.6	4.4	6.7	11.6	11.1	11.4	20.2	26.5	21.5	62.3	52.0	60.6	13.3	8.1	9.2	24.5	13.5	21.1	1 011
con partner e/o figli	45.0	51.9	47.1	24.0	46.7	30.1	34.8	30.9	34.0	9.3	11.2	9.6	67.5	76.9	74.9	33.7	49.1	38.6	1 852
con amici o altre persone	3.5	2.6	3.2	5.8	0.0	4.2	5.2	4.4	5.1	3.2	3.3	3.2	2.4	1.3	1.5	3.7	3.4	3.6	173
in prigione	0.3	0.0	0.2	1.7	0.0	1.2	0.7	0.0	0.6	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	15
istituzione terapeutica/foyer	2.7	1.1	2.2	8.3	0.0	6.0	2.6	4.4	3.0	4.1	8.6	4.9	0.0	0.3	0.3	3.0	2.0	2.7	129
ospedale/clinica	1.9	2.0	1.9	1.7	2.2	1.8	0.4	0.0	0.3	0.5	0.7	0.6	0.0	0.0	0.0	1.2	1.3	1.2	58
altro	2.5	2.3	2.5	8.3	6.7	7.8	4.5	1.5	3.9	6.5	10.5	7.2	2.4	0.3	0.8	4.3	3.0	3.9	188
N**	1 608	703	2 311	121	45	166	267	68	335	751	152	903	83	307	390	3 284	1 518	4 802	4 802
<i>dati mancanti</i>	307	119	426	27	12	39	51	12	63	99	27	126	134	457	591	677	642	1 319	1 319
Situazione di domicilio (30 ultimi giorni)*																			
situazione abitativa stabile	92.2	93.2	92.5	79.8	81.8	80.4	89.8	88.4	89.6	91.0	81.6	89.4	92.6	95.3	94.7	91.3	91.9	91.5	4 544
situazione abitativa instabile/senza	3.4	3.7	3.5	8.4	13.6	9.8	5.6	10.1	6.6	3.4	8.9	4.3	5.3	4.4	4.6	3.8	4.9	4.1	206
in prigione	0.3	0.0	0.2	1.7	0.0	1.2	0.4	0.0	0.3	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	15
istituzione/foyer/ospedale/altro	4.2	3.1	3.8	10.1	4.5	8.6	4.1	1.4	3.6	5.2	9.5	5.9	2.1	0.3	0.7	4.5	3.2	4.1	202
N**	1 659	731	2 390	119	44	163	266	69	335	774	158	932	94	344	438	3 378	1 589	4 967	4 967
<i>dati mancanti</i>	256	91	347	29	13	42	52	11	63	76	21	97	123	420	543	583	571	1 154	1 154

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T4 Tipo di relazione di coppia, numero di figli, di figli che vivono nel nucleo familiare dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2018)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Tipo di relazione di coppia*																			
senza partner, sola-a	39.5	41.6	40.1	58.8	33.3	50.7	47.6	45.2	47.2	78.4	57.4	74.7	17.8	20.2	19.7	50.9	38.7	46.7	1 455
relazione-i saltuaria-e	1.9	4.2	2.6	3.9	4.2	4.0	2.7	3.2	2.8	1.7	6.9	2.6	1.4	1.4	1.4	1.8	3.6	2.4	76
relazione fissa, vivendo separato-a	12.9	12.3	12.7	3.9	16.7	8.0	17.0	29.0	19.1	12.2	25.7	14.6	6.8	11.9	10.9	12.7	14.3	13.2	412
relazione fissa, vivendo insieme	45.7	41.9	44.5	33.3	45.8	37.3	32.7	22.6	30.9	7.7	9.9	8.1	74.0	66.4	68.0	34.6	43.4	37.6	1 170
N**	1 031	454	1 485	51	24	75	147	31	178	468	101	569	73	277	350	2 060	1 053	3 113	3 113
<i>dati mancanti</i>	884	368	1 252	97	33	130	171	49	220	382	78	460	144	487	631	1 901	1 107	3 008	3 008
Numero di figli*																			
nessuno	42.2	33.5	39.5	59.6	52.2	57.3	58.3	66.7	60.2	92.7	97.4	93.5	32.1	35.8	35.0	60.1	46.3	55.3	1 891
1 figlio	18.4	23.6	20.1	26.9	39.1	30.7	17.4	16.7	17.2	4.4	1.8	3.9	15.5	17.0	16.7	13.8	18.1	15.3	523
2 figli	26.2	32.9	28.3	9.6	8.7	9.3	16.7	9.5	15.1	2.0	0.9	1.8	39.3	32.7	34.1	17.4	25.9	20.4	698
3 figli o più	13.2	10.0	12.2	3.8	0.0	2.7	7.6	7.1	7.5	0.9	0.0	0.8	13.1	14.5	14.3	8.7	9.7	9.0	309
N**	1 087	499	1 586	52	23	75	144	42	186	545	114	659	84	330	414	2 230	1 191	3 421	3 421
<i>dati mancanti</i>	828	323	1 151	96	34	130	174	38	212	305	65	370	133	434	567	1 731	969	2 700	2 700
Numero dei figli che vivono nel nucleo familiare*																			
nessuno	75.3	66.6	72.5	85.7	70.8	80.8	77.3	73.1	76.6	78.0	85.4	79.2	51.3	50.8	50.9	75.7	65.6	72.1	2 101
1 figlio	9.3	18.6	12.2	8.2	29.2	15.1	7.6	15.4	9.0	7.8	5.2	7.4	19.7	19.0	19.1	9.3	16.4	11.8	345
2 figli	10.7	12.3	11.2	4.1	0.0	2.7	10.9	11.5	11.0	9.7	6.3	9.2	26.3	22.7	23.4	10.5	13.8	11.7	340
3 figli o più	4.7	2.4	4.0	2.0	0.0	1.4	4.2	0.0	3.4	4.4	3.1	4.2	2.6	7.5	6.5	4.5	4.2	4.4	128
N**	894	413	1 307	49	24	73	119	26	145	472	96	568	76	321	397	1 877	1 037	2 914	2 914
<i>dati mancanti</i>	1 021	409	1 430	99	33	132	199	54	253	378	83	461	141	443	584	2 084	1 123	3 207	3 207

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T5 Più alta formazione portata a termine e statuto professionale dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2018)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Più alta formazione portata a termine*																			
nessuna formazione terminal	3.3	4.2	3.5	2.9	8.3	4.3	3.8	8.1	4.7	19.5	22.0	20.0	4.6	2.8	3.2	8.5	6.1	7.7	351
scuola dell'obbligo	11.1	11.6	11.3	28.8	25.0	27.9	18.8	32.3	21.6	52.5	50.7	52.2	8.5	7.2	7.4	24.0	16.7	21.6	989
formazione prof. preliminare	3.1	2.8	3.0	2.9	11.1	5.0	4.6	1.6	4.0	4.0	5.3	4.2	3.1	2.0	2.2	3.5	3.2	3.4	154
formazione generale senza maturità	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	0.5	0.0	0.9	0.7	0.5	0.7	0.6	27
formazione prof. di base/appi	57.1	57.1	57.1	56.7	47.2	54.3	55.6	46.8	53.8	19.3	12.7	18.1	42.3	49.5	47.9	45.6	47.6	46.3	2 117
maturità/scuola magistrale	3.8	5.9	4.4	2.9	2.8	2.9	2.9	1.6	2.7	2.0	4.7	2.5	6.2	9.1	8.5	3.5	7.2	4.7	216
formazione prof. superiore	9.3	7.4	8.8	1.9	2.8	2.1	6.7	6.5	6.6	1.0	2.7	1.2	12.3	13.0	12.9	6.4	8.4	7.1	324
scuola universitaria o univers	11.2	9.9	10.8	3.8	2.8	3.6	7.5	1.6	6.3	1.4	1.3	1.4	20.8	15.6	16.8	7.8	9.9	8.5	388
dottorato o abilitazione	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.3	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.5	0.2	0.3	0.2	10
N**	1 435	597	2 032	104	36	140	239	62	301	732	150	882	130	461	591	3 059	1 517	4 576	4 576
<i>dati mancanti</i>	480	225	705	44	21	65	79	18	97	118	29	147	87	303	390	902	643	1 545	1 545
Statuto professionale*																			
senza attività professionale	18.5	25.7	20.7	36.0	65.4	42.9	19.8	26.4	21.3	20.3	22.0	20.6	40.0	23.3	27.5	20.4	26.8	22.1	568
apprendista, praticante	1.7	2.3	1.9	2.3	0.0	1.8	5.6	1.9	4.8	24.9	28.8	25.5	0.0	0.0	0.0	7.0	4.9	6.4	165
manovale, operaio-a ausiliare	3.1	2.5	2.9	11.6	3.8	9.8	4.5	5.7	4.8	3.4	1.7	3.1	0.0	0.0	0.0	3.5	2.4	3.2	83
operaio-a con formaz. pratica	6.3	4.5	5.8	7.0	7.7	7.1	5.6	3.8	5.2	4.0	1.7	3.6	0.0	0.0	0.0	6.0	4.2	5.5	141
oper. con formaz. certif. (AFC)	14.9	5.2	12.0	19.8	3.8	16.1	22.6	3.8	18.3	8.3	5.1	7.8	0.0	6.7	5.0	14.7	5.7	12.2	314
caposquadra	2.4	0.2	1.8	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	2.6	1.5	0.0	1.3	10.0	0.0	2.5	2.0	0.1	1.5	39
impiegato-a non qualificato-a	25.0	33.6	27.6	15.1	7.7	13.4	16.4	34.0	20.4	14.8	11.9	14.3	10.0	30.0	25.0	21.0	29.8	23.4	600
impieg. qualif., quadro medio	10.7	9.7	10.4	4.7	3.8	4.5	8.5	7.5	8.3	3.4	6.8	3.9	20.0	20.0	20.0	8.6	9.3	8.8	226
imp. funz. dirett., quadr. sup.	5.2	2.7	4.4	0.0	0.0	0.0	5.1	5.7	5.2	0.9	0.0	0.8	20.0	0.0	5.0	3.7	2.4	3.4	87
indipendente	10.9	10.8	10.8	1.2	7.7	2.7	6.8	1.9	5.7	0.9	0.0	0.8	0.0	10.0	7.5	7.5	8.3	7.8	199
scolaro-a, studente	0.8	1.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.6	9.4	2.6	16.3	22.0	17.2	0.0	6.7	5.0	4.6	4.7	4.6	118
altro statuto	0.6	1.1	0.7	2.3	0.0	1.8	1.1	0.0	0.9	1.2	0.0	1.0	0.0	3.3	2.5	0.9	1.1	1.0	25
N**	1 041	443	1 484	86	26	112	177	53	230	325	59	384	10	30	40	1 868	697	2 565	2 565
<i>dati mancanti</i>	874	379	1 253	62	31	93	141	27	168	525	120	645	207	734	941	2 093	1 463	3 556	3 556

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T6 Fonte di reddito principale e attività dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2018)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Fonte di reddito principale (nel corso dei 30 ultimi giorni)*																			
stipendio/salario	54.4	42.5	50.8	21.6	23.9	22.2	57.5	43.5	54.7	24.5	20.9	23.9	65.9	71.2	70.0	45.5	45.5	45.5	2 287
risparmi	2.2	1.4	2.0	2.4	2.2	2.3	1.4	0.0	1.1	0.4	1.3	0.5	1.1	1.5	1.4	1.6	1.5	1.6	80
rendita (AVS/AI o altre)	16.5	20.1	17.6	18.4	26.1	20.5	7.5	14.5	8.9	4.6	5.1	4.7	17.6	8.4	10.4	12.8	15.7	13.7	688
assistenza sociale	15.1	15.9	15.3	46.4	34.8	43.3	17.5	14.5	16.9	12.4	15.8	13.0	2.2	1.5	1.7	15.0	12.3	14.2	711
assicurazione disoccupazione	5.1	3.6	4.6	5.6	2.2	4.7	5.0	4.3	4.9	2.8	1.3	2.6	1.1	1.2	1.2	4.3	2.6	3.7	188
sostegno del/della partner	1.4	10.6	4.1	0.8	6.5	2.3	1.8	8.7	3.2	1.1	4.4	1.7	1.1	10.2	8.3	1.3	9.0	3.7	187
sostegno dei genitori/conoscenti	2.2	3.0	2.5	0.0	4.3	1.2	6.4	11.6	7.4	52.9	50.6	52.5	9.9	6.0	6.8	17.0	11.6	15.3	769
spacciando, trafficando	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	2
altre entrate illegali	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	3
prostituzione	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	9
assicurazione d'indennità giornaliera	1.1	1.4	1.2	2.4	0.0	1.8	1.1	1.4	1.1	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	41
altra	1.7	1.4	1.6	2.4	0.0	1.8	0.7	1.4	0.9	0.8	0.6	0.7	1.1	0.0	0.2	1.3	0.9	1.2	59
N**	1 692	725	2 417	125	46	171	280	69	349	783	158	941	91	333	424	3 449	1 575	5 024	5 024
<i>dati mancanti</i>	223	97	320	23	11	34	38	11	49	67	21	88	126	431	557	512	585	1 097	1 097
Attività principale (nel corso dei 30 ultimi giorni)*																			
att. a tempo pieno (70% o più)	51.0	29.4	44.5	18.5	11.4	16.6	50.7	32.4	47.0	17.3	8.4	15.8	66.2	45.4	49.6	41.0	30.1	37.6	1 798
attività a tempo parziale	5.3	20.1	9.7	5.9	13.6	8.0	5.3	11.3	6.5	2.2	7.7	3.1	2.8	31.9	26.1	4.3	19.1	8.8	423
lavori occasionali	0.9	1.2	1.0	2.5	2.3	2.5	1.8	1.4	1.7	0.8	0.6	0.8	1.4	0.4	0.6	1.0	0.9	1.0	46
in formazione	2.4	2.9	2.5	1.7	0.0	1.2	6.7	11.3	7.6	59.9	61.9	60.2	8.5	8.2	8.2	19.7	13.6	17.8	851
disoccup., ricerc. di un lavoro	12.3	9.2	11.4	18.5	9.1	16.0	12.3	15.5	13.0	8.3	2.6	7.4	2.8	1.8	2.0	10.7	7.1	9.6	459
disoccup., senza ricerc. di un lavoro	8.1	9.2	8.4	24.4	38.6	28.2	9.5	7.0	9.0	3.8	5.2	4.0	0.0	1.1	0.8	7.3	7.2	7.3	347
rendita	7.2	9.9	8.0	0.0	6.8	1.8	0.7	1.4	0.8	0.0	1.9	0.3	15.5	8.5	9.9	4.4	7.8	5.4	259
incapacità di lavoro	5.9	6.3	6.0	13.4	6.8	11.7	7.0	11.3	7.9	1.8	0.6	1.6	1.4	0.0	0.3	5.1	4.7	5.0	238
casalinga/casalingo	0.1	5.1	1.6	0.8	0.0	0.6	0.0	5.6	1.1	0.1	0.6	0.2	0.0	1.4	1.1	0.2	3.3	1.1	54
altra	6.8	7.0	6.8	14.3	11.4	13.5	6.0	2.8	5.4	5.7	10.3	6.5	1.4	1.4	1.4	6.6	6.0	6.4	305
N**	1 605	688	2 293	119	44	163	284	71	355	768	155	923	71	282	353	3 306	1 474	4 780	4 780
<i>dati mancanti</i>	310	134	444	29	13	42	34	9	43	82	24	106	146	482	628	655	686	1 341	1 341

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T7 Reddito mensile netto e debiti dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2018)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Reddito mensile netto (6 ultimi mesi)*																			
nessun reddito	51.6	57.1	53.2	81.3	78.6	80.4	46.8	47.1	46.8	70.2	81.3	72.0	81.8	87.8	86.5	59.5	69.0	62.3	685
fino a 1000 fr.	2.5	5.8	3.4	3.1	14.3	6.5	8.1	11.8	8.9	13.0	9.4	12.4	0.0	0.0	0.0	5.7	5.2	5.6	61
da 1001 a 2000 fr.	4.5	5.8	4.9	3.1	7.1	4.3	3.2	5.9	3.8	5.0	3.1	4.7	0.0	1.4	1.0	4.3	4.0	4.2	46
da 2001 a 3000 fr.	5.0	13.6	7.4	12.5	0.0	8.7	14.5	17.6	15.2	3.1	6.3	3.6	0.0	0.0	0.0	5.3	8.2	6.2	68
da 3001 a 4000 fr.	6.0	8.4	6.7	0.0	0.0	0.0	6.5	17.6	8.9	1.2	0.0	1.0	0.0	5.4	4.2	4.7	6.4	5.2	57
da 4001 a 5000 fr.	12.3	5.8	10.5	0.0	0.0	0.0	8.1	0.0	6.3	3.7	0.0	3.1	0.0	1.4	1.0	8.3	4.0	7.0	77
da 5001 a 6000 fr.	7.3	1.3	5.6	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	5.1	3.1	0.0	2.6	4.5	1.4	2.1	5.3	1.2	4.1	45
da 6001 a 8000 fr.	6.3	1.3	4.9	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	2.5	0.6	0.0	0.5	4.5	2.7	3.1	4.2	1.8	3.5	38
da 8001 a 10 000 fr.	3.0	0.6	2.4	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.3	1.3	14
da 10 001 a 15 000 fr.	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	1.0	0.4	0.0	0.3	3
più di 15 000 fr.	0.8	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	1.0	0.6	0.0	0.5	5
N**	397	154	551	32	14	46	62	17	79	161	32	193	22	74	96	770	329	1 099	1 099
<i>dati mancanti</i>	<i>1 518</i>	<i>668</i>	<i>2 186</i>	<i>116</i>	<i>43</i>	<i>159</i>	<i>256</i>	<i>63</i>	<i>319</i>	<i>689</i>	<i>147</i>	<i>836</i>	<i>195</i>	<i>690</i>	<i>885</i>	<i>3 191</i>	<i>1 831</i>	<i>5 022</i>	<i>5 022</i>
Debiti*																			
nessun debito	66.8	77.2	69.8	24.2	20.0	23.3	49.6	50.0	49.7	85.8	88.8	86.3	90.9	94.4	93.6	69.3	79.9	72.4	1 530
fino a 5000 fr.	2.7	4.7	3.3	6.1	10.0	7.0	6.8	6.7	6.8	2.7	6.3	3.3	6.1	0.8	1.9	3.5	3.7	3.6	75
da 5001 a 10 000 fr.	6.8	7.1	6.9	12.1	40.0	18.6	8.5	16.7	10.2	2.7	3.8	2.9	0.0	2.4	1.9	6.3	7.2	6.5	138
da 10 001 a 25 000 fr.	5.2	2.0	4.3	3.0	10.0	4.7	10.3	3.3	8.8	3.0	1.3	2.7	0.0	0.0	0.0	5.0	2.1	4.2	88
da 25 001 a 50 000 fr.	4.6	2.0	3.8	9.1	10.0	9.3	7.7	10.0	8.2	1.8	0.0	1.5	3.0	0.8	1.3	4.2	1.9	3.5	74
da 50 001 a 100 000 fr.	6.3	3.1	5.4	33.3	0.0	25.6	6.0	3.3	5.4	2.5	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	6.2	2.2	5.0	106
più di 100 000 fr.	4.6	0.4	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.3	2.6	1.0	2.1	45
importo sconosciuto	2.9	3.5	3.1	12.1	10.0	11.6	7.7	10.0	8.2	1.4	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	2.9	2.1	2.7	56
N**	630	254	884	33	10	43	117	30	147	438	80	518	33	124	157	1 486	626	2 112	2 112
<i>dati mancanti</i>	<i>1 285</i>	<i>568</i>	<i>1 853</i>	<i>115</i>	<i>47</i>	<i>162</i>	<i>201</i>	<i>50</i>	<i>251</i>	<i>412</i>	<i>99</i>	<i>511</i>	<i>184</i>	<i>640</i>	<i>824</i>	<i>2 475</i>	<i>1 534</i>	<i>4 009</i>	<i>4 009</i>

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T8 Incarcerazione o detenzione preventiva prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2018)

	Pazienti: problema principale												Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Incarcerazione o detenzione preventiva*																
nessuna	89.4	98.3	92.0	40.0	83.3	50.0	61.2	92.3	67.7	89.7	100.0	91.5	84.7	97.9	88.3	768
in prigione	4.0	0.0	2.8	25.0	16.7	23.1	24.5	0.0	19.4	6.2	0.0	5.1	7.2	0.4	5.4	47
in detenzione preventiva	4.0	0.6	3.0	15.0	0.0	11.5	4.1	7.7	4.8	3.1	0.0	2.5	3.9	0.9	3.1	27
in prigione e in detenzione preventiva	2.6	1.1	2.2	20.0	0.0	15.4	10.2	0.0	8.1	1.0	0.0	0.8	4.1	0.9	3.2	28
N**	424	179	603	20	6	26	49	13	62	97	21	118	636	234	870	870
<i>dati mancanti</i>	1 491	643	2 134	128	51	179	269	67	336	753	158	911	3 108	1 162	4 270	4 270
Durata totale di detenzione***																
fino a 1 mese	32.3	0.0	29.4	0.0	0.0	0.0	15.4	-	15.4	20.0	-	20.0	25.9	0.0	24.1	14
> 1 a 2 mesi	12.9	0.0	11.8	0.0	100.0	33.3	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	7.4	25.0	8.6	5
> 2 a 6 mesi	19.4	33.3	20.6	0.0	0.0	0.0	15.4	-	15.4	40.0	-	40.0	18.5	25.0	19.0	11
> 6 a 12 mesi	9.7	33.3	11.8	50.0	0.0	33.3	15.4	-	15.4	20.0	-	20.0	14.8	25.0	15.5	9
più di un anno	25.8	33.3	26.5	50.0	0.0	33.3	53.8	-	53.8	20.0	-	20.0	33.3	25.0	32.8	19
N**	31	3	34	2	1	3	13	0	13	5	0	5	54	4	58	58
<i>dati mancanti</i>	14	0	14	10	0	10	6	1	7	5	0	5	43	1	44	44

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che hanno vissuto un'esperienza di detenzione. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T9 Istanza d'invio principale, secondo il problema principale e per i parenti o conoscenti (2018)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Istanza d'invio principale*																			
condanna/misure	13.9	6.3	11.6	5.5	6.1	5.7	13.3	2.7	11.1	50.7	41.9	49.2	2.8	0.9	1.3	20.4	7.3	15.8	885
studio medico	9.5	10.1	9.7	11.0	12.2	11.4	4.7	12.2	6.3	2.5	4.2	2.7	2.2	2.9	2.7	6.8	7.6	7.1	396
istit. specializzata (dipendenze)	6.0	4.4	5.5	13.4	8.2	11.9	6.1	5.4	6.0	2.0	3.0	2.1	3.9	3.2	3.3	4.7	3.9	4.4	249
altro servizio medico/sociale/sanitario	18.3	19.6	18.7	15.7	14.3	15.3	11.2	14.9	11.9	10.6	15.6	11.4	3.9	3.3	3.4	14.3	12.7	13.8	771
istit. formatrice/educativa	0.7	0.5	0.6	0.0	0.0	0.0	1.1	4.1	1.7	2.9	3.6	3.1	1.1	0.6	0.7	1.7	1.4	1.6	88
datore di lavoro	2.7	3.1	2.9	0.8	0.0	0.6	2.9	0.0	2.3	1.3	1.2	1.3	1.7	1.2	1.3	2.3	2.0	2.2	122
propria iniziativa/famiglia/amici	47.4	54.8	49.6	52.0	59.2	54.0	59.0	56.8	58.5	28.7	29.3	28.8	82.7	86.5	85.7	48.0	63.5	53.5	2 993
altra	1.5	1.2	1.4	1.6	0.0	1.1	1.8	4.1	2.3	1.3	1.2	1.3	1.7	1.5	1.5	1.7	1.6	1.7	94
N**	1 750	765	2 515	127	49	176	278	74	352	815	167	982	179	666	845	3 628	1 970	5 598	5 598
dati mancanti	165	57	222	21	8	29	40	6	46	35	12	47	38	98	136	333	190	523	523

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T10 Intervento in seguito ad una misura giudiziaria e tipo di misura, secondo il problema principale (solo pazienti) (2018)

	Pazienti: problema principale												Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Intervento conseguente ad una misura giudiziaria*																
no, nessuna misura	88.8	94.8	90.5	97.8	96.8	97.5	90.7	95.2	91.6	80.2	91.4	82.0	88.9	94.8	90.5	2 328
sosp./rinuncia/avvert.(art. 19a c.2 LStup)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	1.7	2.2	0.4	0.1	0.3	9
sì, consecutiva ad una misura	11.2	5.2	9.5	2.2	3.2	2.5	9.3	4.8	8.4	17.5	6.9	15.8	10.6	5.0	9.2	236
N**	1 124	461	1 585	89	31	120	161	42	203	308	58	366	1 899	674	2 573	2 573
<i>dati mancanti</i>	791	361	1 152	59	26	85	157	38	195	542	121	663	1 845	722	2 567	2 567
Tipo di misura giudiziaria***																
misure di prot. med. (art. 19a ch3 LStup)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
misure terapeutiche stazionarie (art. 59 CP)	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	2.9	1.5	0.0	1.3	2
tratt. residenz. di tossicodipendenza (art. 60 CP)	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	33.3	28.6	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	1.5	5.0	1.9	3
presa in carico ambulatoriale	24.7	13.3	23.1	50.0	0.0	33.3	42.9	100.0	50.0	63.6	50.0	62.9	36.8	20.0	34.6	54
sistemazione in istituzione per giovani adulti	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	1
in attesa di giudizio	2.2	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	50.0	11.4	3.7	5.0	3.8	6
altro	73.0	86.7	75.0	0.0	0.0	0.0	42.9	0.0	37.5	39.4	50.0	40.0	61.0	75.0	62.8	98
N**	89	15	104	2	1	3	7	1	8	33	2	35	136	20	156	156
<i>dati mancanti</i>	37	9	46	0	0	0	8	1	9	28	3	31	74	15	89	89

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali possono comprendere ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T11 Trattamenti/accompagnamenti anteriori l'ammissione e tipi di intervento, secondo il problema principale e per parenti o conoscenti (2018)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Interventi precedenti*																			
no	48.9	47.8	48.5	14.5	11.1	13.6	49.4	56.4	50.7	76.4	75.7	76.2	77.3	73.7	74.5	57.0	56.0	56.7	2 519
sì	51.1	52.2	51.5	85.5	88.9	86.4	50.6	43.6	49.3	23.6	24.3	23.8	22.7	26.3	25.5	43.0	44.0	43.3	1 921
N**	1 541	678	2 219	117	45	162	247	55	302	685	144	829	66	236	302	3 068	1 372	4 440	4 440
<i>dati mancanti</i>	374	144	518	31	12	43	71	25	96	165	35	200	151	528	679	893	788	1 681	1 681
Tipo di intervento***																			
trattamento con prescriv. di eroina	0.7	2.1	1.2	0.0	4.0	1.3	1.2	11.1	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.9	1.1	15
terapia sostitut. (metadone, subutex)	4.1	5.0	4.4	80.8	64.0	75.3	23.5	33.3	24.4	1.7	4.8	2.1	0.0	1.6	1.3	10.8	8.3	10.0	131
altro tratt. medicam. delle dipendenze	6.7	5.8	6.4	7.7	8.0	7.8	6.2	11.1	6.7	1.7	0.0	1.4	0.0	3.2	2.6	6.1	5.0	5.7	75
consulenza ambulatoriale	70.2	78.1	72.7	46.2	44.0	45.5	76.5	66.7	75.6	88.3	76.2	86.5	86.7	83.9	84.4	73.5	76.5	74.5	978
struttura di giorno/clinica di giorno	1.7	1.7	1.7	1.9	0.0	1.3	1.2	0.0	1.1	0.8	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	1.3	1.0	1.2	16
terapia residenziale	48.2	50.4	48.9	28.8	44.0	33.8	42.0	55.6	43.3	14.2	33.3	17.0	33.3	19.4	22.1	39.2	42.0	40.1	527
cura di disintossicazione	35.4	40.5	37.0	36.5	52.0	41.6	29.6	44.4	31.1	10.8	19.0	12.1	26.7	8.1	11.7	29.6	31.6	30.2	397
gruppo di aiuto reciproco/ autosost.	4.7	4.1	4.5	1.9	4.0	2.6	6.2	0.0	5.6	0.8	0.0	0.7	0.0	3.2	2.6	3.9	3.8	3.9	51
altro-i	2.0	1.2	1.8	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	2.2	5.0	4.8	5.0	0.0	4.8	3.9	2.4	2.4	2.4	31
N**	537	242	779	52	25	77	81	9	90	120	21	141	15	62	77	892	421	1 313	1 313
<i>dati mancanti</i>	258	115	373	48	15	63	45	15	60	47	15	62	0	3	3	440	191	631	631

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che sono già stati presi in carico in precedenza. Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

T12 Trattamento sostitutivo o prescrizione di eroina al momento dell'ammissione, secondo il problema principale (solo pazienti) (2018)

	Pazienti: problema principale												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Sostituzione o prescrizione di eroina al momento dell'ammissione*																
no	97.9	97.8	97.8	36.1	36.0	36.0	90.6	90.6	90.6	99.5	99.2	99.4	95.8	95.8	95.8	2 875
sì	2.1	2.2	2.2	63.9	64.0	64.0	9.4	9.4	9.4	0.5	0.8	0.6	4.2	4.2	4.2	126
N**	1 087	489	1 576	61	25	86	139	32	171	564	125	689	2 159	842	3 001	3 001
<i>dati mancanti</i>	828	333	1 161	87	32	119	179	48	227	286	54	340	1 585	554	2 139	2 139
Tipo di sostituzione/prescrizione***																
eroina	13.0	10.0	12.1	34.2	20.0	30.2	16.7	0.0	13.3	100.0	-	100.0	29.1	18.8	26.3	31
metadone	65.2	90.0	72.7	42.1	73.3	50.9	66.7	33.3	60.0	0.0	-	0.0	48.8	68.8	54.2	64
altri oppiacei	8.7	0.0	6.1	23.7	6.7	18.9	8.3	66.7	20.0	0.0	-	0.0	15.1	12.5	14.4	17
altre sostanze	13.0	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	6.7	0.0	-	0.0	7.0	0.0	5.1	6
N**	23	10	33	38	15	53	12	3	15	2	0	2	86	32	118	118
<i>dati mancanti</i>	0	1	1	1	1	2	1	0	1	1	1	2	5	3	8	8
Intervento di sostituzione nel corso della vita*																
no	94.5	95.6	94.8	13.9	22.2	16.1	85.7	84.2	85.4	98.1	98.1	98.1	88.8	90.5	89.2	2 008
sì	5.5	4.4	5.2	86.1	77.8	83.9	14.3	15.8	14.6	1.9	1.9	1.9	11.2	9.5	10.8	242
N**	925	406	1 331	101	36	137	168	38	206	258	53	311	1 629	621	2 250	2 250
<i>dati mancanti</i>	990	416	1 406	47	21	68	150	42	192	592	126	718	2 115	775	2 890	2 890
Età all'inizio del primo trattamento di sostituzione****																
media	32.3	21.8	29.5	29.0	30.5	29.3	23.5	33.5	25.1	29.3	24.0	28.0	28.6	28.1	28.5	
deviazione standard	9.9	7.4	10.3	7.1	11.1	7.7	6.3	12.0	7.7	8.1		7.1	8.0	10.4	8.5	
1° quartile	25.5	16.0	25.0	23.0	24.0	23.0	18.0	25.0	18.0	22.0	24.0	23.0	22.0	22.0	22.0	
mediana	29.0	20.0	27.0	30.0	26.5	29.0	21.0	33.5	25.0	28.0	24.0	26.0	28.0	25.0	27.0	
3° quartile	34.5	25.0	34.0	33.0	32.0	33.0	29.0	42.0	29.0	38.0	24.0	33.0	33.0	32.0	33.0	
N**	16	6	22	29	6	35	11	2	13	3	1	4	66	17	83	

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che seguono un programma di sostituzione o di prescrizione di eroina al momento dell'ammissione. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

**** I risultati si basano solamente sui clienti che hanno segnalato un'esperienza di sostituzione nel corso della vita

T13 Problema principale all'entrata (solamente pazienti) (2018)

Tutti i pazienti									
Problema principale	Uomini	Donne	Totale			Uomini	Donne	Totale	
	%	%	%	N		%	%	%	N
alcol	51.1	58.9	53.2	2 737	alcol	51.1	58.9	53.2	2 737
eroina	2.9	3.2	3.0	154					
metadone	0.5	0.4	0.4	23					
buprenorfina	0.0	0.0	0.0	0	oppioidi	4.0	4.1	4.0	205
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0					
altri oppioidi	0.6	0.5	0.5	28					
cocaina	8.2	5.4	7.4	382					
crack	0.3	0.3	0.3	14	cocaina e derivati	8.5	5.7	7.7	398
altra forma di cocaina	0.0	0.1	0.0	2					
anfetamine	1.1	0.9	1.1	56					
metanfetamine	0.1	0.0	0.1	3					
MDMA e affini (ecstasy)	0.3	0.8	0.4	22	altri stimolanti	1.6	1.9	1.7	87
catinoni sintetici	0.0	0.0	0.0	0					
altri stimolanti	0.1	0.1	0.1	6					
barbiturici	0.0	0.1	0.0	2					
benzodiazepina	0.9	2.0	1.2	61	ipnotici/sedativi	1.0	2.7	1.5	77
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	1					
altri sonniferi e tranquillanti	0.1	0.6	0.3	13					
LSD	0.2	0.0	0.2	8					
ketamina	0.1	0.1	0.1	3	allucinogeni	0.3	0.1	0.3	13
altri allucinogeni	0.1	0.0	0.0	2					
canapa	22.7	12.8	20.0	1 029	canapa	22.7	12.8	20.0	1 029
tabacco	2.4	3.4	2.7	137	tabacco	2.4	3.4	2.7	137
sostanze volatili	0.0	0.0	0.0	0					
altra sostanza	0.3	0.4	0.4	19	altra/e sostanza/e	0.3	0.4	0.4	19
gioco patologico	4.0	1.7	3.3	172					
dipendenza al computer/Internet	1.3	0.6	1.1	58	problemi assimilabili a una dipendenza	8.0	10.0	8.5	438
disturbi alimentari	0.2	4.8	1.5	75					
altro/i problema/i di dipendenza	2.5	2.9	2.6	133					
N**	3 744	1 396	5 140	5 140		3 744	1 396	5 140	5 140
<i>dati mancanti</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T14 Uso di sostanze multiple e combinazioni di sostanze (2018)

Tutti i pazienti			
	Uomini	Donne	Totale
	%	%	%
Problema legato all'uso di sostanze multiple secondo la CIM 10*			
si	8.6	7.9	8.4
no	91.4	92.1	91.6
N**	1 727	635	2 362
<i>dati mancanti</i>	2 017	761	2 778
Combinazioni più frequenti di sostanze***			
coc/alc	16.8	8.1	14.6
can/alc	7.5	8.1	7.6
med/alc	2.8	18.9	6.9
tab/alc	6.5	8.1	6.9
can/coc/alc	5.6	2.7	4.9
can/coc/op/alc	3.7	2.7	3.5
tab/can/alc	2.8	5.4	3.5
op/alc	3.7	0.0	2.8
coc/op	3.7	0.0	2.8
tab/can	2.8	2.7	2.8
can/op	2.8	0.0	2.1
can/med/alc	0.9	5.4	2.1
tab/coc/alc	2.8	0.0	2.1
tab/can/coc/alc	2.8	0.0	2.1
coc/op/alc	0.9	2.7	1.4
stim/alc	0.9	2.7	1.4
stim/coc	0.9	2.7	1.4
can/coc	1.9	0.0	1.4
can/stim/coc	0.0	5.4	1.4
tab/med/alc	0.9	2.7	1.4
tab/can/med/op/alc	0.9	2.7	1.4
tab/can/allu/stim/coc/alc	1.9	0.0	1.4
altre combinazioni	26.2	18.9	24.3
N**	107	37	144
<i>dati mancanti</i>	42	13	55

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T15.1a Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata (2018), uomini

	Pazienti: principale sostanza problematica								
	Alcol	Oppioidi	Cocaina e derivati	Stimolanti	Ipnocici/ sedativi	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
Frequenza di consumo 30 ultimi giorni (%)*									
ogni giorno	42.8	38.4	12.6	21.6	65.4	10.0	31.1	87.0	0.0
4-6 giorni a settimana	14.4	14.0	13.5	3.9	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0
2-3 giorni a settimana	12.7	9.3	20.6	15.7	7.7	10.0	19.3	3.9	0.0
max. 1 giorno a settimana	8.3	11.6	24.7	23.5	3.8	20.0	20.4	3.9	100.0
nessun consumo	21.7	26.7	28.7	35.3	23.1	60.0	22.8	5.2	0.0
N**	1 502	86	223	51	26	10	734	77	2
<i>dati mancanti</i>	413	62	95	10	13	2	116	13	11

T15.1b Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata (2018), donne

Frequenza di consumo 30 ultimi giorni (%)*									
ogni giorno	41.9	35.1	11.9	28.6	77.4	-	31.8	95.0	-
4-6 giorni a settimana	15.4	5.4	17.9	0.0	3.2	-	5.3	0.0	-
2-3 giorni a settimana	15.1	13.5	26.9	14.3	3.2	-	16.6	0.0	-
max. 1 giorno a settimana	9.4	16.2	16.4	23.8	6.5	-	19.9	2.5	-
nessun consumo	18.1	29.7	26.9	33.3	9.7	-	26.5	2.5	-
N**	668	37	67	21	31	0	151	40	0
<i>dati mancanti</i>	154	20	13	5	7	1	28	7	6

T15.1c Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata (2018), uomini e donne

Frequenza di consumo 30 ultimi giorni (%)*									
ogni giorno	42.5	37.4	12.4	23.6	71.9	10.0	31.2	89.7	0.0
4-6 giorni a settimana	14.7	11.4	14.5	2.8	1.8	0.0	6.2	0.0	0.0
2-3 giorni a settimana	13.5	10.6	22.1	15.3	5.3	10.0	18.9	2.6	0.0
max. 1 giorno a settimana	8.7	13.0	22.8	23.6	5.3	20.0	20.3	3.4	100.0
nessun consumo	20.6	27.6	28.3	34.7	15.8	60.0	23.4	4.3	0.0
N**	2 170	123	290	72	57	10	885	117	2
<i>dati mancanti</i>	567	82	108	15	20	3	144	20	17

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T15.2a Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata (2018), uomini

	Patient-e-s: problème principal			
	Gioco patologico	Dipendenza al computer/Internet	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
Frequenza di manifestazione 30 ultimi giorni (%)*				
ogni giorno	27.3	69.0	75.0	64.2
4 a 6 giorni alla settimana	12.1	17.2	12.5	11.1
2 a 3 giorni alla settimana	15.2	3.4	0.0	12.3
1 giorno alla settimana o meno	21.2	0.0	0.0	7.4
nessuna manifestazione	24.2	10.3	12.5	4.9
N**	99	29	8	81
<i>dati mancanti</i>	49	20	0	12

T15.2b Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata (2018), donne

Frequenza di manifestazione 30 ultimi giorni (%)*				
ogni giorno	18.8	100.0	50.0	48.1
4 a 6 giorni alla settimana	6.3	0.0	14.3	3.7
2 a 3 giorni alla settimana	12.5	0.0	17.9	11.1
1 giorno alla settimana o meno	31.3	0.0	12.5	18.5
nessuna manifestazione	31.3	0.0	5.4	18.5
N**	16	6	56	27
<i>dati mancanti</i>	8	3	11	13

T15.2c Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata (2018), uomini e donne

Frequenza di manifestazione 30 ultimi giorni (%)*				
ogni giorno	26.1	74.3	53.1	60.2
4 a 6 giorni alla settimana	11.3	14.3	14.1	9.3
2 a 3 giorni alla settimana	14.8	2.9	15.6	12.0
1 giorno alla settimana o meno	22.6	0.0	10.9	10.2
nessuna manifestazione	25.2	8.6	6.3	8.3
N**	115	35	64	108
<i>dati mancanti</i>	57	23	11	25

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T16.1a Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2018), uomini

Pazienti: principale sostanza problematica									
Uomini	Alcol	Oppioidi	Cocaina e derivati	Stimolanti	Ipnocici/sedativi	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
Età all'epoca del primo consumo									
media	16.4	21.9	22.5	19.9	28.8	17.8	15.2	16.0	23.7
deviazione standard	3.8	7.5	7.4	8.4	13.3	2.8	2.2	4.0	16.2
1° quartile	15.0	17.0	18.0	16.0	18.0	15.0	14.0	14.0	14.0
mediana	16.0	20.0	20.0	18.0	25.5	18.0	15.0	15.0	18.0
3° quartile	18.0	25.0	25.0	21.0	37.5	19.0	16.0	17.0	27.0
N*	985	78	190	40	16	9	589	50	7
<i>dati mancanti</i>	930	70	128	21	23	3	261	40	6
Età all'inizio del consumo regolare									
media	23.2	23.1	24.5	20.6	29.4	19.0	15.9	17.9	31.8
deviazione standard	8.4	6.7	8.2	7.6	13.8	4.0	2.2	5.6	18.5
1° quartile	18.0	18.0	19.0	16.0	21.0	15.0	15.0	15.0	20.5
mediana	20.0	20.0	22.5	18.5	25.0	19.0	16.0	16.0	25.0
3° quartile	26.0	29.0	29.0	21.0	30.0	23.0	16.0	20.0	43.0
N*	673	39	102	22	9	3	380	44	4
<i>dati mancanti</i>	1 242	109	216	39	30	9	470	46	9
Età all'inizio del consumo problematico									
media	32.0	24.5	26.7	23.9	36.4	19.6	17.4	22.6	31.3
deviazione standard	12.4	7.8	9.0	10.0	16.1	3.9	4.8	11.5	12.6
1° quartile	21.0	18.0	20.0	18.0	25.0	16.0	15.0	16.0	19.0
mediana	30.0	23.5	25.0	21.0	29.0	19.5	16.0	18.0	30.0
3° quartile	40.0	29.0	31.0	27.0	49.0	22.5	17.5	26.0	44.0
N*	1 031	70	181	38	12	8	548	54	6
<i>dati mancanti</i>	884	78	137	23	27	4	302	36	7
Periodo di latenza (in anni)**									
media	26.4	10.7	8.5	5.4	7.6	8.8	4.2	18.2	7.4
deviazione standard	12.8	10.6	7.7	7.0	8.5	13.0	6.0	15.8	11.6
1° quartile	17.2	2.9	2.6	1.1	0.7	0.7	1.1	2.1	0.4
mediana	25.4	5.3	6.1	3.1	5.1	3.3	2.0	16.3	1.0
3° quartile	35.1	14.3	12.0	6.9	17.1	16.9	4.3	28.9	20.8
N*	425	11	81	13	3	4	378	34	3
<i>dati mancanti</i>	328	6	41	5	6	2	145	22	4

* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

** Lasso di tempo tra il primo consumo della sostanza problematica e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

T16.1b Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2018), donne

Pazienti: principale sostanza problematica									
Donne	Alcol	Oppioidi	Cocaina e derivati	Stimolanti	Ipnocici/sedativi	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
Età all'epoca del primo consumo									
media	17.5	25.0	22.0	16.8	33.6	54.0	15.1	16.9	-
deviazione standard	5.3	12.4	8.6	2.4	16.8	-	1.7	3.2	-
1° quartile	15.0	18.0	16.5	15.0	18.0	-	14.0	15.0	-
mediana	16.0	21.0	19.0	17.0	30.0	54.0	15.0	16.0	-
3° quartile	18.0	27.0	24.0	18.0	48.0	-	16.0	18.0	-
N*	395	26	56	20	17	1	126	31	0
<i>dati mancanti</i>	427	31	24	6	21	0	53	16	6
Età all'inizio del consumo regolare									
media	26.6	24.3	21.2	17.2	33.8	-	16.0	19.5	-
deviazione standard	10.8	8.0	5.9	2.3	16.4	-	2.1	5.0	-
1° quartile	20.0	19.0	17.0	16.0	21.5	-	15.0	16.5	-
mediana	23.0	21.0	20.0	16.0	31.5	-	16.0	18.0	-
3° quartile	30.0	28.0	24.5	19.0	40.5	-	17.0	21.0	-
N*	301	17	24	10	12	0	83	28	0
<i>dati mancanti</i>	521	40	56	16	26	1	96	19	6
Età all'inizio del consumo problematico									
media	34.7	26.7	23.8	20.3	35.9	54.0	17.2	22.7	32.8
deviazione standard	13.4	12.2	8.3	6.1	12.7	-	4.5	7.4	7.8
1° quartile	25.0	20.0	18.0	16.0	30.0	-	15.0	17.0	26.5
mediana	33.0	21.0	20.0	18.0	33.0	54.0	16.0	19.5	34.0
3° quartile	44.0	33.0	29.0	21.0	47.0	-	18.0	30.0	39.0
N*	479	29	52	19	25	1	104	28	4
<i>dati mancanti</i>	343	28	28	7	13	0	75	19	2
Periodo di latenza (in anni)**									
media	26.7	8.2	7.0	5.3	4.9	-	4.5	25.3	-
deviazione standard	13.9	2.6	5.8	7.3	4.6	-	6.1	17.7	-
1° quartile	15.4	6.4	3.0	0.8	1.6	-	1.1	6.2	-
mediana	24.9	8.2	4.7	2.0	4.9	-	2.1	23.7	-
3° quartile	36.0	10.0	10.9	7.9	8.1	-	5.0	40.8	-
N*	172	2	23	8	2	0	82	24	0
<i>dati mancanti</i>	150	3	8	4	6	0	27	10	2

* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

** Lasso di tempo tra il primo consumo della sostanza problematica e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

T16.1c Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2018), uomini e donne

Pazienti: principale sostanza problematica									
<i>Uomini e donne</i>	Alcol	Oppioidi	Cocaina e derivati	Stimolanti	Ipnotici/sedativi	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
Età all'epoca del primo consumo									
media	16.7	22.6	22.4	18.8	31.3	21.4	15.2	16.3	23.7
deviazione standard	4.3	9.0	7.7	7.1	15.2	11.7	2.1	3.7	16.2
1° quartile	15.0	17.0	17.0	15.5	18.0	15.0	14.0	14.0	14.0
mediana	16.0	20.0	20.0	17.5	28.0	18.5	15.0	16.0	18.0
3° quartile	18.0	25.0	25.0	20.0	41.0	20.0	16.0	18.0	27.0
N*	1 380	104	246	60	33	10	715	81	7
<i>dati mancanti</i>	1 357	101	152	27	44	3	314	56	12
Età all'inizio del consumo regolare									
media	24.2	23.5	23.9	19.5	32.0	19.0	15.9	18.5	31.8
deviazione standard	9.3	7.1	7.9	6.6	15.1	4.0	2.2	5.4	18.5
1° quartile	18.0	18.0	18.0	16.0	21.0	15.0	15.0	16.0	20.5
mediana	20.0	20.0	22.0	18.0	28.0	19.0	16.0	17.0	25.0
3° quartile	30.0	28.5	27.0	20.0	35.0	23.0	16.0	20.0	43.0
N*	974	56	126	32	21	3	463	72	4
<i>dati mancanti</i>	1 763	149	272	55	56	10	566	65	15
Età all'inizio del consumo problematico									
media	32.9	25.2	26.0	22.7	36.1	23.4	17.4	22.6	31.9
deviazione standard	12.8	9.3	8.9	9.0	13.6	12.0	4.7	10.3	10.4
1° quartile	22.0	19.0	19.0	17.0	25.0	16.0	15.0	16.0	23.0
mediana	30.0	22.0	24.0	20.0	33.0	20.0	16.0	18.0	32.5
3° quartile	40.0	30.0	31.0	26.0	47.0	23.0	18.0	28.0	40.0
N*	1 510	99	233	57	37	9	652	82	10
<i>dati mancanti</i>	1 227	106	165	30	40	4	377	55	9
Periodo di latenza (in anni)**									
media	26.5	10.3	8.1	5.3	6.5	8.8	4.3	21.2	7.4
deviazione standard	13.1	9.8	7.3	6.9	6.6	13.0	6.0	16.9	11.6
1° quartile	16.9	3.5	2.8	1.0	1.6	0.7	1.1	4.7	0.4
mediana	25.4	6.4	6.1	2.6	5.1	3.3	2.0	20.4	1.0
3° quartile	35.8	13.6	11.2	6.9	8.1	16.9	4.4	35.0	20.8
N*	597	13	104	21	5	4	460	58	3
<i>dati mancanti</i>	478	9	49	9	12	2	172	32	6

* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

** Lasso di tempo tra il primo consumo della sostanza problematica e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

T16.2a Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2018), uomini

Pazienti: problema principale				
<i>Uomini</i>	Gioco patologico	Dipendenza al computer/Internet	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
Età all'epoca della prima manifestazione				
media	21.8	15.9	8.0	17.0
deviazione standard	8.6	10.7	8.7	10.6
1° quartile	17.0	12.0	2.0	12.0
mediana	20.0	13.5	4.0	14.0
3° quartile	22.5	15.0	18.0	16.0
N*	52	16	3	43
<i>dati mancanti</i>	96	33	5	50
Età all'inizio della manifestazione regolare				
media	28.4	14.5	25.0	17.4
deviazione standard	11.6	2.1	17.9	7.9
1° quartile	20.0	13.0	14.5	13.0
mediana	24.5	14.5	19.5	15.0
3° quartile	33.5	16.0	35.5	20.0
N*	28	4	4	41
<i>dati mancanti</i>	120	45	4	52
Età all'inizio della manifestazione problematica				
media	27.1	18.0	22.3	22.3
deviazione standard	9.0	10.8	19.9	11.6
1° quartile	20.0	14.0	9.0	14.5
mediana	25.0	16.0	15.0	17.5
3° quartile	30.0	18.0	35.5	25.0
N*	61	17	4	44
<i>dati mancanti</i>	87	32	4	49
Periodo di latenza (in anni)**				
media	9.0	6.2	31.0	8.4
deviazione standard	7.3	4.7	29.2	9.2
1° quartile	3.3	4.0	10.4	2.6
mediana	6.7	4.6	31.0	4.7
3° quartile	14.1	7.7	51.6	11.9
N*	41	13	2	39
<i>dati mancanti</i>	48	12	2	31

* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

** Lasso di tempo tra la prima manifestazione del comportamento problematico e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

T16.2b Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2018), donne

Pazienti: problema principale				
<i>Donne</i>	Gioco patologico	Dipendenza al computer/Internet	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
Età all'epoca della prima manifestazione				
media	32.2	25.0	16.0	22.2
deviazione standard	13.2	19.4	5.3	12.4
1° quartile	20.0	12.0	14.0	14.5
mediana	33.0	17.5	16.0	16.0
3° quartile	41.0	38.0	18.0	29.5
N*	11	4	43	20
<i>dati mancanti</i>	13	5	24	20
Età all'inizio della manifestazione regolare				
media	37.7	-	19.0	23.7
deviazione standard	13.5	-	6.0	14.6
1° quartile	30.0	-	15.0	16.0
mediana	33.0	-	18.0	17.0
3° quartile	45.0	-	20.0	30.0
N*	9	0	36	13
<i>dati mancanti</i>	15	9	31	27
Età all'inizio della manifestazione problematica				
media	37.1	26.3	20.5	26.2
deviazione standard	13.7	19.3	8.0	14.0
1° quartile	28.0	13.0	16.0	17.0
mediana	34.0	19.0	18.0	19.0
3° quartile	45.0	39.5	20.0	34.0
N*	13	4	46	18
<i>dati mancanti</i>	11	5	21	22
Periodo di latenza (in anni)**				
media	12.0	2.8	13.7	6.9
deviazione standard	8.1	1.6	13.9	7.0
1° quartile	5.4	1.7	3.5	1.4
mediana	13.3	2.8	7.1	3.5
3° quartile	14.1	3.9	18.5	11.2
N*	8	2	21	15
<i>dati mancanti</i>	6	1	10	6

* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

** Lasso di tempo tra la prima manifestazione del comportamento problematico e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

T16.2c Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2018), uomini et donne

Pazienti: problema principale				
<i>Uomini et donne</i>	Gioco patologico	Dipendenza al computer/Internet	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
Età all'epoca della prima manifestazione				
media	23.6	17.7	15.5	18.7
deviazione standard	10.3	12.8	5.8	11.4
1° quartile	18.0	12.0	14.0	13.0
mediana	20.0	13.5	16.0	14.0
3° quartile	25.0	16.0	18.0	18.0
N*	63	20	46	63
<i>dati mancanti</i>	109	38	29	70
Età all'inizio della manifestazione regolare				
media	30.6	14.5	19.6	18.9
deviazione standard	12.6	2.1	7.7	10.2
1° quartile	20.0	13.0	15.0	14.0
mediana	27.0	14.5	18.0	16.0
3° quartile	40.0	16.0	20.0	20.0
N*	37	4	40	54
<i>dati mancanti</i>	135	54	35	79
Età all'inizio della manifestazione problematica				
media	28.9	19.6	20.7	23.5
deviazione standard	10.6	12.6	9.1	12.3
1° quartile	21.0	14.0	15.0	15.0
mediana	27.5	16.0	18.0	18.0
3° quartile	32.0	18.0	20.0	29.0
N*	74	21	50	62
<i>dati mancanti</i>	98	37	25	71
Periodo di latenza (in anni)**				
media	9.5	5.8	15.2	8.0
deviazione standard	7.5	4.6	15.4	8.6
1° quartile	3.4	2.6	3.5	2.6
mediana	7.1	4.5	8.2	4.4
3° quartile	14.1	7.7	22.0	11.2
N*	49	15	23	54
<i>dati mancanti</i>	54	13	12	37

* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

** Lasso di tempo tra la prima manifestazione del comportamento problematico e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

T17 Modo di amministrazione della principale sostanza problematica prima dell'entrata (2018)

Pazienti: principale sostanza problematica															
Modo di amministrazione*	Eroina			Cocaina			Amfetamine			Canapa			Benzodiazepine		
	Uomini %	Donne %	Totale %	Uomini %	Donne %	Totale %	Uomini %	Donne %	Totale %	Uomini %	Donne %	Totale %	Uomini %	Donne %	Totale %
iniettato	22.2	18.8	21.3	5.4	3.8	5.0	2.9	0.0	2.4	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
fumato/inalato	53.3	50.0	52.5	6.5	5.8	6.3	20.6	12.5	19.0	98.8	99.1	98.9	10.5	6.3	8.6
ingerito /bevuto	4.4	0.0	3.3	0.5	5.8	1.7	32.4	50.0	35.7	0.3	0.9	0.4	89.5	93.8	91.4
sniffato	20.0	31.3	23.0	87.6	84.6	87.0	41.2	37.5	40.5	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
altro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N**	45	16	61	186	52	238	34	8	42	588	116	704	19	16	35
<i>dati mancanti</i>	65	28	93	121	23	144	9	5	14	262	63	325	14	12	26

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T18.1 Prevalenza a vita delle iniezioni, nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 12 mesi prima dell'entrata, scambio di materiale d'iniezione, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2018)

	Pazienti: principale sostanza problematica												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Iniezioni nel corso della vita*																
si	3.9	3.1	3.7	41.6	40.5	41.3	13.2	12.8	13.1	0.3	0.7	0.4	4.6	4.4	4.5	166
no	94.4	95.3	94.7	57.3	56.8	57.1	83.8	87.2	84.3	99.0	98.6	98.9	93.9	94.4	94.1	3 445
non vuole rispondere	1.8	1.6	1.7	1.1	2.7	1.6	3.0	0.0	2.5	0.7	0.7	0.7	1.5	1.2	1.4	51
N**	1 310	579	1 889	89	37	126	197	39	236	690	139	829	2 661	1 001	3 662	3 662
<i>dati mancanti</i>	605	243	848	59	20	79	121	41	162	160	40	200	1 083	395	1 478	1 478
Iniezioni nel corso dei 12 ultimi mesi*																
si	0.8	2.1	1.2	17.8	22.2	19.0	27.9	12.5	25.5	0.0	0.0	0.0	4.4	4.0	4.3	30
no	99.2	97.9	98.8	82.2	77.8	81.0	72.1	87.5	74.5	100.0	100.0	100.0	95.6	96.0	95.7	671
N**	237	97	334	45	18	63	43	8	51	116	21	137	525	176	701	701
<i>dati mancanti</i>	1 678	725	2 403	103	39	142	275	72	347	734	158	892	3 219	1 220	4 439	4 439
Iniezioni nel corso dei 30 ultimi giorni*																
si	0.4	0.0	0.3	14.3	16.7	15.0	18.6	12.5	17.6	0.0	0.0	0.0	3.1	2.3	2.9	20
no	99.6	100.0	99.7	85.7	83.3	85.0	81.4	87.5	82.4	100.0	100.0	100.0	96.9	97.7	97.1	675
N**	235	94	329	42	18	60	43	8	51	117	20	137	520	175	695	695
<i>dati mancanti</i>	1 680	728	2 408	106	39	145	275	72	347	733	159	892	3 224	1 221	4 445	4 445
Scambio di materiale d'iniezione nel corso della vita***																
si	35.7	40.0	36.8	30.8	50.0	36.8	12.5	0.0	11.1	-	0.0	0.0	27.8	38.5	30.6	15
no	57.1	60.0	57.9	53.8	50.0	52.6	87.5	100.0	88.9	-	100.0	100.0	63.9	61.5	63.3	31
non vuole rispondere	7.1	0.0	5.3	15.4	0.0	10.5	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	8.3	0.0	6.1	3
N**	14	5	19	13	6	19	8	1	9	0	1	1	36	13	49	49
<i>dati mancanti</i>	37	13	50	24	9	33	18	4	22	2	0	2	86	31	117	117
Scambio di materiale d'iniezione nel corso dei 12 ultimi mesi****																
si	0.0	0.0	0.0	18.2	16.7	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	4.5	5.3	4.8	3
no	100.0	100.0	100.0	81.8	83.3	82.4	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	95.5	94.7	95.2	60
N**	24	9	33	11	6	17	6	1	7	1	0	1	44	19	63	63
<i>dati mancanti</i>	27	9	36	26	9	35	20	4	24	1	1	2	78	25	103	103
Scambio di materiale d'iniezione nel corso dei 30 ultimi giorni*****																
si	-	-	-	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	-	100.0	1
no	-	-	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0
N**	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
<i>dati mancanti</i>	51	18	69	36	15	51	26	5	31	2	1	3	121	44	165	165

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che si sono iniettati una sostanza illegale nel corso della vita. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

**** I risultati si basano solamente sui clienti che si sono iniettati una sostanza illegale nel corso dei 12 ultimi mesi. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

***** I risultati si basano solamente sui clienti che si sono iniettati una sostanza illegale nel corso dei 30 ultimi giorni. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T18.2 Età all'epoca della prima iniezione, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2018)

	Pazienti: principale sostanza problematica												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Età all'epoca della prima iniezione*																
fino a 14 anni	0.0	9.1	2.8	11.8	0.0	7.4	9.1	50.0	15.4	-	0.0	0.0	7.1	8.0	7.4	6
da 15 a 16 anni	8.0	18.2	11.1	0.0	20.0	7.4	9.1	0.0	7.7	-	0.0	0.0	5.4	16.0	8.6	7
da 17 a 18 anni	20.0	36.4	25.0	17.6	20.0	18.5	18.2	0.0	15.4	-	0.0	0.0	17.9	28.0	21.0	17
da 19 a 20 anni	20.0	27.3	22.2	23.5	10.0	18.5	18.2	0.0	15.4	-	0.0	0.0	21.4	16.0	19.8	16
da 21 a 25 anni	40.0	9.1	30.6	23.5	50.0	33.3	27.3	0.0	23.1	-	100.0	100.0	32.1	28.0	30.9	25
da 26 a 30 anni	4.0	0.0	2.8	17.6	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	7.1	0.0	4.9	4
da 31 a 39 anni	8.0	0.0	5.6	5.9	0.0	3.7	9.1	0.0	7.7	-	0.0	0.0	7.1	0.0	4.9	4
dai 40 anni in su	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	50.0	15.4	-	0.0	0.0	1.8	4.0	2.5	2
N**	25	11	36	17	10	27	11	2	13	0	1	1	56	25	81	81
<i>dati mancanti</i>	26	7	33	20	5	25	15	3	18	2	0	2	66	19	85	85

* I risultati si basano solamente sui clienti che si sono iniettati una sostanza illegale nel corso della loro vita. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T19.1a Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2018), uomini

Uomini

	Pazienti: principale sostanza problematica								
	Alcol	Oppioidi	Cocaina e derivati	Stimolanti	Ipnocici/sedativi	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Altri problemi*									
alcol	-	23.0	23.9	12.7	8.6	18.2	10.4	26.4	15.4
eroina	1.5	2.9	3.7	3.6	8.6	0.0	1.3	2.3	7.7
metadone	0.5	9.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	7.7
buprenorfina	0.0	2.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	0.0
fentanyl	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
altri oppioidi	0.5	0.7	0.7	0.0	5.7	0.0	0.2	0.0	0.0
cocaina	6.0	20.1	1.0	12.7	11.4	18.2	6.4	1.1	7.7
crack	0.3	0.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
altra forma di cocaina	0.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
anfetamine	1.0	1.4	6.0	7.3	2.9	27.3	2.2	1.1	0.0
metanfetamine	0.6	0.7	1.3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
MDMA e affini (ecstasy)	0.8	2.2	4.0	9.1	0.0	27.3	2.7	0.0	0.0
catinoni sintetici	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0
altri stimolanti	0.1	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
barbiturici	0.1	0.0	0.0	1.8	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0
benzodiazepina	2.1	11.5	1.7	3.6	2.9	9.1	0.6	1.1	23.1
GHB/GBL	0.2	0.0	0.7	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
altri sonniferi e tranquillanti	0.1	1.4	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	1.1	0.0	2.7	3.6	0.0	9.1	1.5	0.0	0.0
ketamina	0.1	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
altri allucinogeni	0.2	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
canapa	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
tabacco	7.5	20.9	19.6	23.6	17.1	36.4	-	12.6	15.4
sostanze volatili	13.6	20.1	17.9	16.4	20.0	36.4	11.7	-	15.4
altra sostanza	0.2	2.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	0.0
gioco patologico	0.3	0.0	0.3	1.8	2.9	0.0	0.2	4.6	0.0
dipendenza al computer/Internet	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	1.2	4.6	7.7
disturbi alimentari	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	7.7
altro/i problema/i di dipendenza	0.1	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.2	1.1	0.0
nessuno	79.2	51.1	60.1	67.3	54.3	54.5	78.9	62.1	53.8
N**	1 770	139	301	55	35	11	823	87	13
<i>dati mancanti</i>	145	9	17	6	4	1	27	3	0

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T19.1b Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2018), donne

Donne

Pazienti: principale sostanza problematica

	Alcol	Oppioidi	Cocaina e derivati	Stimolanti	Ipnotici/sedativi	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Altri problemi*									
alcol	-	13.2	28.8	20.8	26.3	0.0	6.9	12.8	16.7
eroina	1.0	1.9	5.0	0.0	5.3	0.0	0.6	0.0	0.0
metadone	0.1	5.7	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
buprenorfina	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
altri oppioidi	0.3	1.9	0.0	0.0	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaina	3.8	11.3	0.0	16.7	5.3	0.0	2.9	0.0	0.0
crack	0.1	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
altra forma di cocaina	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
anfetamine	1.2	1.9	8.8	0.0	2.6	0.0	2.3	0.0	0.0
metanfetamine	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA e affini (ecstasy)	0.7	0.0	7.5	4.2	2.6	0.0	2.9	0.0	0.0
catinoni sintetici	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
altri stimolanti	0.0	0.0	0.0	4.2	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
barbiturici	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazepina	3.6	11.3	3.8	0.0	2.6	0.0	1.1	4.3	33.3
GHB/GBL	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
altri sonniferi e tranquillanti	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.3	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
ketamina	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
altri allucinogeni	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
canapa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
tabacco	5.9	9.4	27.5	29.2	7.9	0.0	-	10.6	0.0
sostanze volatili	10.2	13.2	21.3	8.3	13.2	0.0	10.3	-	0.0
altra sostanza	0.0	1.9	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
gioco patologico	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
dipendenza al computer/Internet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
disturbi alimentari	1.4	0.0	3.8	0.0	2.6	0.0	0.6	0.0	0.0
altro/i problema/i di dipendenza	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
nessuno	81.9	62.3	51.3	58.3	57.9	0.0	82.8	85.1	50.0
N**	768	53	80	24	38	1	174	47	6
<i>dati mancanti</i>	<i>54</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T19.1c Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2018), uomini e donne

Uomini e donne

	Pazienti: principale sostanza problematica									
	Alcol	Oppioidi	Cocaina e derivati	Stimolanti	Ipnotici/sedativi	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Altri problemi*										
alcol	-	20.3	24.9	15.2	17.8	16.7	9.8	21.6	15.8	
eroina	1.4	2.6	3.9	2.5	6.8	0.0	1.2	1.5	5.3	
metadone	0.4	8.3	0.5	0.0	1.4	0.0	0.1	0.7	5.3	
buprenorfina	0.0	1.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	5.3	
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	
altri oppioidi	0.4	1.0	0.5	0.0	6.8	0.0	0.2	0.0	0.0	
cocaina	5.4	17.7	0.8	13.9	8.2	16.7	5.8	0.7	5.3	
crack	0.3	0.5	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
altra forma di cocaina	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
anfetamine	1.0	1.6	6.6	5.1	2.7	25.0	2.2	0.7	0.0	
metanfetamine	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	
MDMA e affini (ecstasy)	0.8	1.6	4.7	7.6	1.4	25.0	2.7	0.0	0.0	
catinoni sintetici	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	
altri stimolanti	0.0	0.0	0.5	1.3	1.4	0.0	0.1	0.0	0.0	
barbiturici	0.0	0.0	0.0	1.3	1.4	8.3	0.0	0.0	0.0	
benzodiazepina	2.6	11.5	2.1	2.5	2.7	8.3	0.7	2.2	26.3	
GHB/GBL	0.2	0.0	0.5	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
altri sonniferi e tranquillanti	0.1	1.0	0.0	0.0	1.4	8.3	0.0	0.0	0.0	
LSD	0.8	0.0	2.1	3.8	0.0	8.3	1.3	0.0	0.0	
ketamina	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	
altri allucinogeni	0.2	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	
canapa	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	
tabacco	7.0	17.7	21.3	25.3	12.3	33.3	-	11.9	10.5	
sostanze volatili	12.5	18.2	18.6	13.9	16.4	33.3	11.4	-	10.5	
altra sostanza	0.1	2.1	0.3	0.0	1.4	0.0	0.1	0.7	0.0	
gioco patologico	0.2	0.0	0.3	1.3	1.4	0.0	0.2	3.0	0.0	
dipendenza al computer/Internet	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	1.1	3.0	5.3	
disturbi alimentari	0.6	0.0	0.8	0.0	1.4	0.0	0.2	0.0	5.3	
altro/i problema/i di dipendenza	0.1	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.3	0.7	0.0	
nessuno	80.0	54.2	58.3	64.6	56.2	50.0	79.5	70.1	52.6	
N**	2 538	192	381	79	73	12	997	134	19	
<i>dati mancanti</i>	199	13	17	8	4	1	32	3	0	

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T19.2a Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2018), uomini
Uomini

	Pazienti: problema principale			
	Gioco patologico	Dipendenza al computer/Internet	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
	%	%	%	%
Altri problemi*				
alcol	3.0	2.1	0.0	1.2
eroina	0.0	0.0	0.0	0.0
metadone	0.0	0.0	0.0	0.0
buprenorfina	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0
altri oppioidi	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaina	2.2	0.0	0.0	0.0
crack	0.0	0.0	0.0	0.0
altra forma di cocaina	0.0	0.0	0.0	0.0
anfetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
metanfetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA e affini (ecstasy)	1.5	0.0	0.0	0.0
catinoni sintetici	0.0	0.0	0.0	0.0
altri stimolanti	0.0	0.0	0.0	0.0
barbiturici	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazepina	0.0	0.0	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
altri sonniferi e tranquillanti	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
ketamina	0.0	0.0	0.0	0.0
altri allucinogeni	0.0	0.0	0.0	0.0
canapa	0.0	0.0	0.0	0.0
tabacco	2.2	4.2	0.0	1.2
sostanze volatili	4.5	2.1	0.0	1.2
altra sostanza	0.0	0.0	0.0	0.0
gioco patologico	0.0	2.1	0.0	0.0
dipendenza al computer/Internet	4.5	0.0	0.0	0.0
disturbi alimentari	0.0	2.1	0.0	0.0
altro/i problema/i di dipendenza	0.0	8.3	0.0	0.0
nessuno	88.1	85.4	100.0	97.6
N**	134	48	8	85
<i>dati mancanti</i>	<i>14</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>8</i>

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T19.2b Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2018), donne
Donne

	Pazienti: problema principale			
	Gioco patologico	Dipendenza al computer/Internet	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
	%	%	%	%
Altri problemi*				
alcol	9.1	0.0	1.7	3.1
eroina	0.0	0.0	0.0	0.0
metadone	0.0	0.0	0.0	0.0
buprenorfina	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0
altri oppioidi	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaina	0.0	0.0	0.0	0.0
crack	0.0	0.0	0.0	0.0
altra forma di cocaina	0.0	0.0	0.0	0.0
anfetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
metanfetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA e affini (ecstasy)	0.0	0.0	0.0	0.0
catinoni sintetici	0.0	0.0	0.0	0.0
altri stimolanti	0.0	0.0	0.0	0.0
barbiturici	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazepina	4.5	0.0	1.7	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
altri sonniferi e tranquillanti	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
ketamina	0.0	0.0	0.0	0.0
altri allucinogeni	0.0	0.0	0.0	0.0
canapa	0.0	0.0	0.0	0.0
tabacco	0.0	0.0	0.0	3.1
sostanze volatili	4.5	12.5	0.0	0.0
altra sostanza	0.0	0.0	0.0	0.0
gioco patologico	0.0	0.0	0.0	0.0
dipendenza al computer/Internet	4.5	0.0	0.0	6.3
disturbi alimentari	0.0	25.0	0.0	0.0
altro/i problema/i di dipendenza	0.0	12.5	0.0	0.0
nessuno	86.4	62.5	98.3	90.6
N**	22	8	58	32
<i>dati mancanti</i>	2	1	9	8

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T19.2c Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2018), uomini e donne

Uomini e donne

Pazienti: problema principale				
	Gioco patologico	Dipendenza al computer/Internet	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
	%	%	%	%
Altri problemi*				
alcol	3.8	1.8	1.5	1.7
eroina	0.0	0.0	0.0	0.0
metadone	0.0	0.0	0.0	0.0
buprenorfina	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0
altri oppioidi	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaina	1.9	0.0	0.0	0.0
crack	0.0	0.0	0.0	0.0
altra forma di cocaina	0.0	0.0	0.0	0.0
anfetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
metanfetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA e affini (ecstasy)	1.3	0.0	0.0	0.0
catinoni sintetici	0.0	0.0	0.0	0.0
altri stimolanti	0.0	0.0	0.0	0.0
barbiturici	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazepina	0.6	0.0	1.5	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
altri sonniferi e tranquillanti	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
ketamina	0.0	0.0	0.0	0.0
altri allucinogeni	0.0	0.0	0.0	0.0
canapa	0.0	0.0	0.0	0.0
tabacco	1.9	3.6	0.0	1.7
sostanze volatili	4.5	3.6	0.0	0.9
altra sostanza	0.0	0.0	0.0	0.0
gioco patologico	0.0	1.8	0.0	0.0
dipendenza al computer/Internet	4.5	0.0	0.0	1.7
disturbi alimentari	0.0	5.4	0.0	0.0
altro/i problema/i di dipendenza	0.0	8.9	0.0	0.0
nessuno	87.8	82.1	98.5	95.7
N**	156	56	66	117
<i>dati mancanti</i>	<i>16</i>	<i>2</i>	<i>9</i>	<i>16</i>

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T20a Frequenza del consumo delle sostanze secondarie secondo il problema principale (solo pazienti) (2018)

	Pazienti: problema principale												comportamenti comparabili ad una dipendenza			Tutti i problemi principali			
	Uomini			Donne			Totale			Uomini			Donne			Totale			N
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Alcol*	Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Ipnotici/sedativi			Comp. comparabili ad una dip.						
ogni giorno	46.2	20.0	41.9	17.9	13.6	16.7	14.5	10.0	13.9	50.0	33.3	36.4	40.0	0.0	28.6	21.8	16.9	20.6	51
4-6 giorni a settimana	11.5	20.0	12.9	19.6	18.2	19.2	2.9	10.0	3.8	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	14.3	11.7	11.9	11.7	29
2-3 giorni a settimana	15.4	40.0	19.4	26.8	31.8	28.2	11.6	0.0	10.1	50.0	22.2	27.3	20.0	0.0	14.3	16.0	25.4	18.2	45
max. 1 giorno a settimana	19.2	20.0	19.4	17.9	27.3	20.5	47.8	40.0	46.8	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	28.6	29.8	23.7	28.3	70
nessun consumo	7.7	0.0	6.5	17.9	9.1	15.4	23.2	40.0	25.3	0.0	44.4	36.4	20.0	0.0	14.3	20.7	22.0	21.1	52
N**	26	5	31	56	22	78	69	10	79	2	9	11	5	2	7	188	59	247	247
<i>dati mancanti</i>	122	52	174	262	58	320	781	169	950	37	29	66	293	138	431	3 773	2 101	5 874	5 874
Oppioidi*	Alcol			Cocaina e derivati			Canapa			Ipnotici/sedativi			Comp. comparabili ad una dip.						
ogni giorno	10.5	0.0	8.0	50.0	0.0	33.3	20.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	-	-	-	19.4	0.0	14.6	7
4-6 giorni a settimana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0
2-3 giorni a settimana	0.0	16.7	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	2.8	8.3	4.2	2
max. 1 giorno a settimana	21.1	0.0	16.0	16.7	66.7	33.3	20.0	0.0	16.7	100.0	0.0	33.3	-	-	-	22.2	16.7	20.8	10
nessun consumo	68.4	83.3	72.0	33.3	33.3	33.3	60.0	100.0	66.7	0.0	100.0	66.7	-	-	-	55.6	75.0	60.4	29
N**	19	6	25	6	3	9	5	1	6	1	2	3	0	0	0	36	12	48	48
<i>dati mancanti</i>	1 896	816	2 712	312	77	389	845	178	1 023	38	36	74	298	140	438	3 925	2 148	6 073	6 073
Cocaina e derivati*	Alcol			Oppioidi			Canapa			Ipnotici/sedativi			Comp. comparabili ad una dip.						
ogni giorno	1.3	4.8	2.0	5.6	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	16.7	0.0	-	0.0	1.9	2.9	2.1	4
4-6 giorni a settimana	6.4	0.0	5.1	5.6	0.0	4.5	2.2	0.0	2.0	25.0	0.0	16.7	0.0	-	0.0	5.0	0.0	4.1	8
2-3 giorni a settimana	7.7	14.3	9.1	16.7	0.0	13.6	6.5	0.0	6.0	25.0	0.0	16.7	66.7	-	66.7	10.1	8.8	9.8	19
max. 1 giorno a settimana	32.1	42.9	34.3	38.9	25.0	36.4	19.6	0.0	18.0	25.0	0.0	16.7	0.0	-	0.0	28.9	35.3	30.1	58
nessun consumo	52.6	38.1	49.5	33.3	75.0	40.9	71.7	100.0	74.0	0.0	100.0	33.3	33.3	-	33.3	54.1	52.9	53.9	104
N**	78	21	99	18	4	22	46	4	50	4	2	6	3	0	3	159	34	193	193
<i>dati mancanti</i>	1 837	801	2 638	130	53	183	804	175	979	35	36	71	295	140	435	3 802	2 126	5 928	5 928
Canapa*	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Ipnotici/sedativi			Comp. comparabili ad una dip.						
ogni giorno	31.4	35.1	32.3	28.0	33.3	28.6	33.3	38.1	34.8	60.0	33.3	50.0	16.7	-	16.7	32.2	37.0	33.3	100
4-6 giorni a settimana	8.5	2.7	7.1	16.0	0.0	14.3	15.6	9.5	13.6	20.0	0.0	12.5	33.3	-	33.3	11.0	4.1	9.3	28
2-3 giorni a settimana	9.3	10.8	9.7	32.0	33.3	32.1	13.3	19.0	15.2	0.0	0.0	0.0	33.3	-	33.3	14.1	12.3	13.7	41
max. 1 giorno a settimana	14.4	24.3	16.8	16.0	0.0	14.3	6.7	4.8	6.1	20.0	0.0	12.5	0.0	-	0.0	12.3	15.1	13.0	39
nessun consumo	36.4	27.0	34.2	8.0	33.3	10.7	31.1	28.6	30.3	0.0	66.7	25.0	16.7	-	16.7	30.4	31.5	30.7	92
N**	118	37	155	25	3	28	45	21	66	5	3	8	6	0	6	227	73	300	300
<i>dati mancanti</i>	1 797	785	2 582	123	54	177	273	59	332	34	35	69	292	140	432	3 734	2 087	5 821	5 821

* Come problema secondario. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali possono comprendere anche le persone il cui sesso non è conosciuto.

T20b Frequenza del consumo delle sostanze secondarie secondo il problema principale (solo pazienti) (2018)

	Pazienti: problema principale															Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			comportamenti comparabili ad una dipendenza			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Altri stimolanti*																			
ogni giorno	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	33.3	8.3	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	-	-	-	4.7	4.8	4.7	3
4-6 giorni a settimana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0
2-3 giorni a settimana	33.3	11.1	22.2	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	11.1	13.3	0.0	10.5	-	-	-	16.3	4.8	12.5	8
max. 1 giorno a settimana	22.2	33.3	27.8	50.0	0.0	33.3	8.3	33.3	16.7	26.7	0.0	21.1	-	-	-	20.9	23.8	21.9	14
nessun consumo	44.4	55.6	50.0	50.0	0.0	33.3	66.7	66.7	66.7	60.0	100.0	68.4	-	-	-	58.1	66.7	60.9	39
N**	9	9	18	2	1	3	12	6	18	15	4	19	0	0	0	43	21	64	64
<i>dati mancanti</i>	1 906	813	2 719	146	56	202	306	74	380	835	175	1 010	298	140	438	3 918	2 139	6 057	6 057
Ipnotici/sedativi*																			
ogni giorno	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0
4-6 giorni a settimana	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0
2-3 giorni a settimana	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0	-	50.0	1
max. 1 giorno a settimana	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0
nessun consumo	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0	-	50.0	1
N**	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
<i>dati mancanti</i>	1 914	822	2 736	148	57	205	318	80	398	850	179	1 029	298	140	438	3 959	2 160	6 119	6 119
Allucinogeni*																			
ogni giorno	0.0	0.0	0.0	-	-	-	12.5	-	12.5	0.0	0.0	0.0	-	-	-	3.0	0.0	2.7	1
4-6 giorni a settimana	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0
2-3 giorni a settimana	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0
max. 1 giorno a settimana	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	9.1	0.0	8.3	-	-	-	3.0	0.0	2.7	1
nessun consumo	100.0	100.0	100.0	-	-	-	87.5	-	87.5	90.9	100.0	91.7	-	-	-	93.9	100.0	94.6	35
N**	12	2	14	0	0	0	8	0	8	11	1	12	0	0	0	33	4	37	37
<i>dati mancanti</i>	1 903	820	2 723	148	57	205	310	80	390	839	178	1 017	298	140	438	3 928	2 156	6 084	6 084
Altra/e sostanza/e*																			
ogni giorno	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0
4-6 giorni a settimana	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0
2-3 giorni a settimana	-	-	-	-	-	-	100.0	-	100.0	0.0	100.0	50.0	-	-	-	50.0	100.0	66.7	2
max. 1 giorno a settimana	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0
nessun consumo	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	100.0	0.0	50.0	-	-	-	50.0	0.0	33.3	1
N**	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	0	0	0	2	1	3	3
<i>dati mancanti</i>	1 915	822	2 737	148	57	205	317	80	397	849	178	1 027	298	140	438	3 959	2 159	6 118	6 118

* Come problema secondario. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T21 Frequenza del consumo di alcol, numero di "bicchieri standard" al giorno e frequenza di forti consumi di alcol prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2018)

	Pazienti: problema principale												Tutti i problemi principali			N
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Frequenza del consumo di alcol*																
mai	9.3	9.3	9.3	18.9	37.5	24.5	13.3	9.1	12.6	17.5	13.1	16.8	13.8	13.6	13.8	340
1 volta al mese o meno	2.4	4.9	3.2	13.5	18.8	15.1	15.0	9.1	14.1	22.1	26.2	22.8	10.0	11.3	10.3	255
2 a 4 volte al mese	8.4	7.6	8.2	18.9	12.5	17.0	27.4	22.7	26.7	44.5	52.4	45.8	20.5	15.7	19.2	475
2 a 3 volte alla settimana	16.9	20.4	18.0	21.6	12.5	18.9	23.0	40.9	25.9	12.7	6.0	11.6	16.2	18.1	16.7	413
4 volte alla settimana o più	62.9	57.8	61.3	27.0	18.8	24.5	21.2	18.2	20.7	3.1	2.4	3.0	39.5	41.3	40.0	989
N**	1 021	450	1 471	37	16	53	113	22	135	416	84	500	1 797	675	2 472	2 472
<i>dati mancanti</i>	894	372	1 266	111	41	152	205	58	263	434	95	529	1 947	721	2 668	2 668
Numero di "bicchieri standard" al giorno***																
1 o 2	6.5	8.5	7.1	64.3	70.0	65.8	39.2	44.4	40.0	56.5	57.1	56.6	24.5	23.5	24.2	499
3 o 4	20.8	19.1	20.2	21.4	20.0	21.1	38.1	22.2	35.7	30.7	34.9	31.4	25.1	20.6	23.9	493
5 o 6	21.9	27.6	23.6	0.0	0.0	0.0	8.2	11.1	8.7	7.9	7.9	7.9	16.5	22.0	18.0	371
7 o 9	21.1	22.4	21.5	3.6	0.0	2.6	8.2	5.6	7.8	2.4	0.0	2.0	14.1	17.0	14.9	307
10 o più	29.8	22.4	27.5	10.7	10.0	10.5	6.2	16.7	7.8	2.4	0.0	2.0	19.8	16.8	19.0	392
N**	906	398	1 304	28	10	38	97	18	115	329	63	392	1 504	558	2 062	2 062
<i>dati mancanti</i>	1 009	424	1 433	120	47	167	221	62	283	521	116	637	2 240	838	3 078	3 078
Frequenza di forti consumi di alcol***																
mai	11.7	13.1	12.1	50.0	66.7	55.6	35.7	27.8	34.5	58.8	61.2	59.2	30.2	29.3	29.9	661
meno di una volta al mese	9.5	10.6	9.8	26.7	20.0	24.4	21.4	27.8	22.4	27.4	26.9	27.4	16.4	13.6	15.7	346
1 volta al mese	12.9	13.1	12.9	10.0	0.0	6.7	18.4	22.2	19.0	8.7	7.5	8.5	11.4	11.0	11.3	249
1 volta alla settimana	26.8	28.1	27.2	0.0	0.0	0.0	17.3	16.7	17.2	4.2	4.5	4.3	18.0	20.6	18.7	413
quasi ogni giorno	39.2	35.2	38.0	13.3	13.3	13.3	7.1	5.6	6.9	0.8	0.0	0.7	24.0	25.5	24.4	539
N**	918	406	1 324	30	15	45	98	18	116	379	67	446	1 607	601	2 208	2 208
<i>dati mancanti</i>	997	416	1 413	118	42	160	220	62	282	471	112	583	2 137	795	2 932	2 932

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che hanno indicato un consumo d'alcol. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T22 Frequenza del consumo di tabacco e numero di sigarette al giorno nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2018)

	Pazienti: problema principale												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Frequenza del consumo di tabacco*																
mai	39.3	41.3	40.0	19.4	31.6	23.6	20.7	29.2	22.1	29.1	26.0	28.5	34.7	40.7	36.4	820
1 giorno alla settimana o meno	1.7	1.4	1.6	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7	6.7	7.0	6.8	3.2	2.2	2.9	65
2 a 3 giorni alla settimana	0.6	0.8	0.7	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.4	6.7	4.0	6.2	2.5	1.1	2.1	47
4 a 6 giorni alla settimana	1.7	2.5	1.9	2.8	0.0	1.8	0.9	0.0	0.7	2.5	3.0	2.6	1.6	1.9	1.7	38
1 volta al giorno	1.8	1.1	1.6	2.8	0.0	1.8	0.9	0.0	0.7	1.8	2.0	1.8	1.8	1.1	1.6	36
più volte al giorno	54.9	52.8	54.2	75.0	68.4	72.7	75.0	70.8	74.3	53.2	58.0	54.1	56.2	53.1	55.3	1 246
N**	773	358	1 131	36	19	55	116	24	140	447	100	547	1 610	642	2 252	2 252
<i>dati mancanti</i>	1 142	464	1 606	112	38	150	202	56	258	403	79	482	2 134	754	2 888	2 888
Numero di sigarette al giorno***																
0 a 10	19.5	26.3	21.5	21.4	45.5	28.2	26.2	20.0	25.3	60.5	60.6	60.5	33.8	35.5	34.2	446
11 a 20	53.9	49.7	52.6	39.3	36.4	38.5	53.6	60.0	54.5	31.1	30.3	31.0	45.2	43.9	44.9	585
21 a 30	20.5	16.2	19.2	35.7	0.0	25.6	16.7	6.7	15.2	6.0	6.1	6.0	16.1	12.8	15.3	199
31 o più	6.1	7.8	6.6	3.6	18.2	7.7	3.6	13.3	5.1	2.3	3.0	2.5	4.9	7.8	5.6	73
N**	425	179	604	28	11	39	84	15	99	299	66	365	968	335	1 303	1 303
<i>dati mancanti</i>	44	31	75	1	2	3	8	2	10	18	8	26	83	46	129	129

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che hanno indicato un consumo di tabacco. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T23a Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2018), uomini

Pazienti: principale sostanza problematica									
	Alcol	Oppioidi	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Obiettivo di consumo*									
astinenza definitiva	28.5	83.3	75.0	80.0	16.7	0.0	41.8	40.0	55.6
astinenza limitata nel tempo	25.4	0.0	5.9	20.0	0.0	100.0	12.7	12.0	11.1
consumo controllato	30.1	3.3	4.4	0.0	33.3	0.0	20.9	28.0	0.0
non è prevista nessuna limitazione	0.9	0.0	1.5	0.0	16.7	0.0	5.5	8.0	0.0
nessuna decisione finora	14.7	10.0	11.8	0.0	16.7	0.0	16.4	8.0	0.0
altro	0.4	3.3	1.5	0.0	16.7	0.0	2.7	4.0	33.3
N*	558	30	68	5	6	1	110	25	9
<i>dati mancanti</i>	1 357	118	250	56	33	11	740	65	4

T23b Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2018), donne

Obiettivo di consumo*									
astinenza definitiva	41.2	81.8	76.5	75.0	40.0	-	47.1	42.9	60.0
astinenza limitata nel tempo	13.9	0.0	5.9	0.0	0.0	-	0.0	14.3	0.0
consumo controllato	29.0	18.2	5.9	0.0	30.0	-	17.6	14.3	20.0
non è prevista nessuna limitazione	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-	5.9	0.0	20.0
nessuna decisione finora	13.1	0.0	11.8	0.0	30.0	-	29.4	14.3	0.0
altro	1.2	0.0	0.0	25.0	0.0	-	0.0	14.3	0.0
N*	245	11	17	4	10	0	17	7	5
<i>dati mancanti</i>	577	46	63	22	28	1	162	40	1

T23c Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2018), uomini e donne

Obiettivo di consumo*									
astinenza definitiva	32.4	82.9	75.3	77.8	31.3	0.0	42.5	40.6	57.1
astinenza limitata nel tempo	21.9	0.0	5.9	11.1	0.0	100.0	11.0	12.5	7.1
consumo controllato	29.8	7.3	4.7	0.0	31.3	0.0	20.5	25.0	7.1
non è prevista nessuna limitazione	1.1	0.0	1.2	0.0	6.3	0.0	5.5	6.3	7.1
nessuna decisione finora	14.2	7.3	11.8	0.0	25.0	0.0	18.1	9.4	0.0
altro	0.6	2.4	1.2	11.1	6.3	0.0	2.4	6.3	21.4
N*	803	41	85	9	16	1	127	32	14
<i>dati mancanti</i>	1 934	164	313	78	61	12	902	105	5

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T24a Problemi psichici nel corso della vita (2018), uomini

Uomini

	Pazienti: problema principale								
	Alcol	Oppioidi	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problemi psichici*									
auto devalorizzazione o senso di colpa	25.7	30.8	38.3	25.0	60.0	100.0	16.8	28.0	44.4
stato ansioso/nervoso importante	26.7	46.2	38.3	25.0	60.0	100.0	27.4	60.0	66.7
difficoltà di comprensione/memoria	13.2	15.4	8.3	0.0	20.0	0.0	21.1	8.0	11.1
alterazione dell'attenzione o iperattività	11.9	15.4	18.3	0.0	20.0	0.0	18.9	8.0	11.1
pensieri o azioni compulsive	0.8	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
reaz. acuta da stress/ disturbi dell'adattamento	6.3	7.7	3.3	0.0	0.0	0.0	3.2	4.0	0.0
allucinazioni	1.1	3.8	6.7	0.0	0.0	0.0	6.3	4.0	0.0
diff. a controllare comp. violenti	9.8	11.5	11.7	0.0	20.0	0.0	18.9	28.0	0.0
problemi psichici curati con medicine	23.3	34.6	21.7	25.0	60.0	100.0	17.9	28.0	55.6
pensieri suicidari important	10.1	7.7	3.3	0.0	20.0	0.0	8.4	12.0	11.1
tentativi di suicidio	2.1	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	1.1	4.0	0.0
altro/i problema/i psichico/i	2.9	0.0	1.7	25.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0
nessuno	42.6	30.8	33.3	25.0	20.0	0.0	48.4	20.0	22.2
N**	378	26	60	4	5	1	95	25	9
<i>dati mancanti</i>	1 537	122	258	57	34	11	755	65	4

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T24b Problemi psichici nel corso della vita (2018), donne

Donne

	Pazienti: problema principale								
	Alcol	Oppioidi	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problemi psichici*									
auto devalorizzazione o senso di colpa	47.4	36.4	58.3	25.0	80.0	-	50.0	42.9	20.0
stato ansioso/nervoso importante	37.0	27.3	41.7	25.0	100.0	-	41.7	57.1	60.0
difficoltà di comprensione/memoria	15.0	9.1	8.3	25.0	30.0	-	0.0	14.3	40.0
alterazione dell'attenzione o iperattività	12.1	0.0	16.7	25.0	30.0	-	16.7	14.3	40.0
pensieri o azioni compulsive	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
reaz. acuta da stress/ disturbi dell'adattamento	9.2	0.0	16.7	0.0	10.0	-	0.0	0.0	0.0
allucinazioni	0.6	0.0	8.3	0.0	10.0	-	0.0	0.0	0.0
diff. a controllare comp. violenti	8.7	0.0	8.3	25.0	10.0	-	8.3	28.6	0.0
problemi psichici curati con medicine	37.0	27.3	33.3	25.0	70.0	-	41.7	28.6	40.0
pensieri suicidari important	12.1	18.2	16.7	25.0	20.0	-	16.7	0.0	20.0
tentativi di suicidio	2.9	0.0	16.7	0.0	10.0	-	8.3	0.0	0.0
altro/i problema/i psichico/i	5.2	18.2	8.3	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
nessuno	24.9	9.1	25.0	75.0	0.0	-	25.0	28.6	40.0
N**	173	11	12	4	10	0	12	7	5
<i>dati mancanti</i>	<i>649</i>	<i>46</i>	<i>68</i>	<i>22</i>	<i>28</i>	<i>1</i>	<i>167</i>	<i>40</i>	<i>1</i>

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T24c Problemi psichici nel corso della vita (2018), uomini e donne

Uomini e donne

	Pazienti: problema principale								
	Alcol	Oppioidi	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problemi psichici*									
auto devalorizzazione o senso di colpa	32.5	32.4	41.7	25.0	73.3	100.0	20.6	31.3	35.7
stato ansioso/nervoso importante	29.9	40.5	38.9	25.0	86.7	100.0	29.0	59.4	64.3
difficoltà di comprensione/memoria	13.8	13.5	8.3	12.5	26.7	0.0	18.7	9.4	21.4
alterazione dell'attenzione o iperattività	12.0	10.8	18.1	12.5	26.7	0.0	18.7	9.4	21.4
pensieri o azioni compulsive	1.3	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
reaz. acuta da stress/ disturbi dell'adattamento	7.3	5.4	5.6	0.0	6.7	0.0	2.8	3.1	0.0
allucinazioni	0.9	2.7	6.9	0.0	6.7	0.0	5.6	3.1	0.0
diff. a controllare comp. violenti	9.4	8.1	11.1	12.5	13.3	0.0	17.8	28.1	0.0
problemi psichici curati con medicine	27.6	32.4	23.6	25.0	66.7	100.0	20.6	28.1	50.0
pensieri suicidari important	10.7	10.8	5.6	12.5	20.0	0.0	9.3	9.4	14.3
tentativi di suicidio	2.4	0.0	5.6	0.0	6.7	0.0	1.9	3.1	0.0
altro/i problema/i psichico/i	3.6	5.4	2.8	12.5	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0
nessuno	37.0	24.3	31.9	50.0	6.7	0.0	45.8	21.9	28.6
N**	551	37	72	8	15	1	107	32	14
<i>dati mancanti</i>	<i>2 186</i>	<i>168</i>	<i>326</i>	<i>79</i>	<i>62</i>	<i>12</i>	<i>922</i>	<i>105</i>	<i>5</i>

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T25 Parenti/conoscenti: legame tra l'utente e la persona sintomatica (2018)

	Parenti o conoscenti			N
	Uomini	Donne	Totale	
	%	%	%	
L'utente è... *				
madre/padre	45.8	37.6	39.5	382
figlio/figlia	12.5	12.1	12.2	118
sorella/fratello	6.0	4.4	4.8	46
partner	25.9	39.4	36.4	352
altro parente	1.9	2.4	2.3	22
collega/amico/a	2.8	2.1	2.3	22
datore di lavoro/docente	4.2	0.4	1.2	12
tutore/curatore	0.0	0.0	0.0	0
altro	0.9	1.6	1.4	14
N**	216	752	968	968
<i>dati mancanti</i>	1	12	13	13

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T26 Parenti/conoscenti: problema principale della persona sintomatica (2018)

Parenti o conoscenti		
	Totale	
	%	N
Problema principale della persona sintomatica*		
alcol	54.8	274
eroina	2.4	12
metadone	0.2	1
buprenorfina	0.0	0
fentanyl	0.2	1
altri oppioidi	0.8	4
cocaina	8.2	41
crack	0.6	3
altra forma di cocaina	0.2	1
anfetamine	0.2	1
metanfetamine	0.0	0
MDMA e affini (ecstasy)	0.6	3
catinoni sintetici	0.0	0
altri stimolanti	0.0	0
barbiturici	0.0	0
benzodiazepina	0.6	3
GHB/GBL	0.0	0
altri sonniferi e tranquillanti	0.0	0
LSD	0.0	0
ketamina	0.0	0
altri allucinogeni	0.0	0
sostanze volatili	0.0	0
canapa	21.4	107
tabacco	0.4	2
altra sostanza	0.2	1
gioco patologico	3.2	16
dipendenza al computer/Internet	4.0	20
disturbi alimentari	0.4	2
altro/i problema/i di dipendenza	1.6	8
N**	500	500
<i>dati mancanti</i>	<i>481</i>	<i>481</i>

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T27 Sesso e età dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale¹) e dei parenti o conoscenti (2018)

	Pazienti: problema principale ¹												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Sesso*																			
maschile			70.1			77.0			79.6			81.2			22.7			64.8	4 028
femminile			29.9			23.0			20.4			18.8			77.3			35.2	2 186
sex non noto			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	0
N**	1 965	840	2 805	231	69	300	253	65	318	905	209	1 114	226	771	997	4 028	2 186	6 214	6 214
Età (in anni)*																			
fino a 14 anni	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.9	2.2	1.8	1.0	1.2	0.9	0.9	0.9	57
15-19	1.4	1.4	1.4	1.7	0.0	1.3	2.8	12.3	4.7	55.9	61.1	56.9	3.2	2.8	2.8	16.0	9.5	13.7	850
20-24	3.3	1.2	2.7	3.0	1.4	2.7	12.3	13.8	12.6	15.4	11.5	14.6	3.6	3.8	3.8	7.5	4.6	6.5	400
25-29	6.9	5.2	6.4	7.8	11.6	8.7	24.9	21.5	24.2	9.2	9.6	9.3	3.6	6.9	6.2	9.0	7.7	8.5	529
30-34	9.2	6.5	8.4	14.7	23.2	16.7	22.1	23.1	22.3	5.3	5.8	5.4	3.6	6.7	6.0	9.4	8.1	8.9	553
35-39	12.1	8.8	11.1	16.0	10.1	14.7	15.8	10.8	14.8	5.4	3.4	5.0	8.6	7.7	7.9	10.7	8.0	9.7	604
40-44	11.6	10.4	11.2	20.8	17.4	20.0	7.9	3.1	6.9	4.5	2.9	4.2	7.7	12.7	11.6	9.6	10.0	9.7	604
45-49	12.8	14.9	13.4	11.7	18.8	13.3	7.5	7.7	7.5	1.0	2.9	1.3	13.1	16.8	15.9	9.1	13.4	10.6	659
50-54	15.2	15.1	15.2	12.6	13.0	12.7	4.7	3.1	4.4	1.0	0.0	0.8	17.6	16.0	16.3	10.4	13.0	11.3	701
55-59	11.7	14.5	12.6	10.0	2.9	8.3	1.2	4.6	1.9	0.1	0.0	0.1	15.8	9.8	11.2	7.8	9.9	8.5	529
60-64	8.1	10.4	8.8	1.3	0.0	1.0	0.8	0.0	0.6	0.1	0.0	0.1	7.7	6.0	6.4	4.7	6.5	5.4	332
65-69	3.8	6.3	4.5	0.4	1.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	4.6	4.9	2.4	4.4	3.1	191
70-74	2.1	3.1	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	2.8	3.4	1.5	2.3	1.8	111
75 e più	1.7	2.1	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.4	2.4	1.0	1.7	1.3	79
N**	1 964	840	2 804	231	69	300	253	65	318	905	208	1 113	222	763	985	4 022	2 177	6 199	6 199
<i>dati mancanti</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>8</i>	<i>12</i>	<i>6</i>	<i>9</i>	<i>15</i>	<i>15</i>
Età																			
media	46.7	49.9	47.6	41.6	40.6	41.4	33.8	32.1	33.4	22.8	22.1	22.7	48.9	46.3	46.9	38.9	43.7	40.6	
deviazione standard	13.2	12.9	13.2	10.2	9.5	10.0	9.4	10.6	9.7	8.5	8.1	8.4	15.6	14.5	14.8	15.8	15.8	15.9	
1° quartile	36.6	40.7	37.7	34.1	32.6	33.5	27.4	24.2	27.1	17.2	17.1	17.2	39.6	37.3	37.7	25.3	31.8	27.4	
mediana	47.4	50.4	48.5	41.5	41.1	41.5	31.9	30.8	31.8	18.6	18.4	18.6	51.2	47.5	48.2	38.2	45.5	40.8	
3° quartile	55.8	59.1	56.8	49.3	48.8	48.9	39.3	37.1	39.0	25.7	24.9	25.6	57.8	55.3	55.9	51.3	54.9	52.8	
N**	1 964	840	2 804	231	69	300	253	65	318	905	208	1 113	225	768	993	4 025	2 182	6 207	
<i>dati mancanti</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>7</i>	

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T28 Stato civile e grado di urbanizzazione del domicilio dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale¹) e dei parenti o conoscenti (2018)

	Pazienti: problema principale ¹												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			N
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Stato civile*																			
celibe/nubile	44.4	32.3	40.7	69.5	44.0	61.9	69.0	83.3	71.5	95.1	94.6	95.0	22.5	25.8	25.1	61.6	43.8	55.6	1 916
sposato	33.0	27.4	31.3	16.9	20.0	17.9	20.4	8.3	18.2	2.4	1.6	2.2	60.7	53.5	55.1	23.6	29.6	25.6	883
separato-a (giuridicamente)	4.5	5.7	4.9	1.7	12.0	4.8	2.7	0.0	2.2	1.4	0.8	1.2	2.2	3.9	3.5	3.1	4.1	3.5	119
divorziato-a	16.5	28.0	20.0	11.9	20.0	14.3	8.0	8.3	8.0	1.2	2.3	1.4	13.5	14.8	14.5	10.7	18.5	13.3	457
vedovo-a	1.3	6.5	2.9	0.0	4.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.1	1.1	1.6	1.5	0.8	3.8	1.8	62
unione registrata	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	7
N**	1 171	508	1 679	59	25	84	113	24	137	592	129	721	89	310	399	2 290	1 154	3 444	3 444
<i>dati mancanti</i>	794	332	1 126	172	44	216	140	41	181	313	80	393	137	461	598	1 738	1 032	2 770	2 770
Grado di urbanizzazione*																			
grandi centri urbani	14.4	14.5	14.4	0.0	3.6	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	15.1	13.8	8.1	10.8	9.0	343
periferia dei grandi centri	13.7	12.5	13.3	6.3	7.1	6.5	14.6	16.7	15.0	4.9	3.6	4.7	2.7	0.5	1.0	9.7	6.6	8.6	329
città di media importanza	12.8	17.0	14.0	10.9	7.1	9.8	17.9	12.5	17.0	29.7	36.4	30.9	25.7	25.5	25.6	18.9	22.3	20.1	764
piccole città	29.9	30.6	30.1	60.9	50.0	57.6	36.6	54.2	39.5	33.8	32.1	33.5	34.5	27.2	28.9	33.2	31.9	32.8	1 247
campagna	29.3	25.3	28.1	21.9	32.1	25.0	30.9	16.7	28.6	31.7	27.9	31.0	27.4	31.6	30.6	30.1	28.4	29.5	1 122
N**	1 293	558	1 851	64	28	92	123	24	147	634	140	774	113	364	477	2 519	1 286	3 805	3 805
<i>dati mancanti</i>	672	282	954	167	41	208	130	41	171	271	69	340	113	407	520	1 509	900	2 409	2 409

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T29 Tipo di nucleo familiare, situazione di domicilio e tipo di relazione di coppia dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale¹) e dei parenti o conoscenti (2018)

	Pazienti: problema principale ¹												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Tipo di nucleo familiare*																			
da solo-a	39.1	40.8	39.6	42.0	31.3	39.2	36.5	21.1	33.1	11.6	14.8	12.1	12.1	13.0	12.8	28.9	29.0	29.0	1 131
con famiglia d'origine (genitori, ecc.)	6.6	3.7	5.7	13.6	6.3	11.7	17.5	23.7	18.9	65.1	64.8	65.0	7.7	7.4	7.4	25.6	15.5	22.4	873
con partner e/o figli	45.7	50.2	47.0	25.0	53.1	32.5	33.6	39.5	34.9	8.8	7.0	8.5	76.9	75.6	75.9	34.5	48.7	39.0	1 524
con amici o altre persone	2.7	1.8	2.4	4.5	3.1	4.2	2.9	2.6	2.9	2.8	2.1	2.7	2.2	1.7	1.8	2.9	2.1	2.6	103
in prigione	0.1	0.0	0.1	2.3	0.0	1.7	2.2	0.0	1.7	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	7
istituzione terapeutica/foyer	2.8	2.1	2.6	6.8	0.0	5.0	1.5	5.3	2.3	4.9	4.2	4.8	0.0	1.7	1.3	3.1	2.3	2.8	111
ospedale/clinica	0.3	0.2	0.3	1.1	0.0	0.8	1.5	2.6	1.7	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.3	11
altro	2.8	1.2	2.3	4.5	6.3	5.0	4.4	5.3	4.6	6.5	7.0	6.6	1.1	0.7	0.8	4.4	2.1	3.7	143
N**	1 337	568	1 905	88	32	120	137	38	175	673	142	815	91	299	390	2 646	1 257	3 903	3 903
<i>dati mancanti</i>	628	272	900	143	37	180	116	27	143	232	67	299	135	472	607	1 382	929	2 311	2 311
Situazione di domicilio*																			
situazione abitativa stabile	94.7	95.9	95.0	81.6	83.9	82.2	93.8	86.8	92.2	90.4	89.4	90.2	97.0	95.5	95.9	93.2	94.6	93.6	3 787
situazione abitativa instabile/senza d	2.9	3.0	2.9	8.0	12.9	9.3	2.3	5.3	3.0	4.0	5.6	4.3	3.0	3.0	3.0	3.5	3.3	3.4	138
in prigione	0.1	0.0	0.1	3.4	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	9
istituzione/foyer/ospedale/altro	2.3	1.2	2.0	6.9	3.2	5.9	3.9	7.9	4.8	5.2	4.9	5.1	0.0	1.5	1.1	3.0	2.1	2.7	110
N**	1 393	604	1 997	87	31	118	129	38	167	678	142	820	100	336	436	2 711	1 333	4 044	4 044
<i>dati mancanti</i>	572	236	808	144	38	182	124	27	151	227	67	294	126	435	561	1 317	853	2 170	2 170
Tipo di relazione di coppia*																			
senza partner, sola-a	41.1	42.1	41.4	59.1	36.8	52.4	43.4	47.1	44.0	76.1	63.6	73.9	18.2	27.1	25.1	50.0	40.8	47.0	1 272
relazione-i saltuaria-e	1.9	4.3	2.6	0.0	5.3	1.6	6.0	11.8	7.0	2.9	5.7	3.4	2.6	0.8	1.2	2.3	3.8	2.8	75
relazione fissa, vivendo separat.	10.5	8.9	10.1	9.1	5.3	7.9	10.8	11.8	11.0	12.2	20.5	13.7	5.2	5.7	5.6	10.6	9.8	10.3	279
relazione fissa, vivendo insieme	46.5	44.6	46.0	31.8	52.6	38.1	39.8	29.4	38.0	8.8	10.2	9.0	74.0	66.4	68.1	37.1	45.7	40.0	1 083
N**	970	392	1 362	44	19	63	83	17	100	410	88	498	77	262	339	1 807	902	2 709	2 709
<i>dati mancanti</i>	995	448	1 443	187	50	237	170	48	218	495	121	616	149	509	658	2 221	1 284	3 505	3 505

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T30 Fonte di reddito principale e attività principale all'uscita, secondo il problema principale¹ e dei parenti o conoscenti (2018)

	Pazienti: problema principale ¹												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			N
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Fonte di reddito principale*																			
stipendio/salario	61.3	45.9	56.6	35.4	35.0	35.3	67.0	26.3	60.0	27.7	17.4	25.8	72.4	69.0	69.8	51.0	48.1	50.0	1 624
risparmi	1.8	1.1	1.6	2.1	5.0	2.9	2.2	0.0	1.8	0.2	0.0	0.1	1.0	0.3	0.5	1.4	0.8	1.2	38
rendita (AVS/AI o altre)	16.4	25.8	19.2	16.7	15.0	16.2	5.5	26.3	9.1	2.4	5.8	3.0	16.2	11.3	12.5	11.8	17.9	13.9	452
assistenza sociale	11.7	14.4	12.5	25.0	30.0	26.5	18.7	10.5	17.3	9.0	11.6	9.5	3.8	1.8	2.3	11.0	10.0	10.7	347
assicurazione disoccupazione	3.1	2.1	2.8	12.5	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.3	0.0	0.9	0.7	2.5	1.4	2.1	69
sostegno del/della partner	1.5	7.2	3.2	0.0	10.0	2.9	0.0	10.5	1.8	0.5	0.8	0.6	1.0	10.7	8.4	1.2	7.7	3.4	111
sostegno dei genitori/conoscenti	2.0	1.9	2.0	4.2	5.0	4.4	3.3	15.8	5.5	57.9	62.8	58.8	5.7	5.8	5.8	19.4	12.9	17.2	557
spacciando, trafficando	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1
altre entrate illegali	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	2
prostituzione	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.9	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	4
assicurazione d'indennità giornaliera	0.3	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.2	8
altra	1.8	1.3	1.6	2.1	0.0	1.5	2.2	5.3	2.7	0.4	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	1.2	0.8	1.0	34
N**	1 082	473	1 555	48	20	68	91	19	110	553	121	674	105	326	431	2 136	1 111	3 247	3 247
<i>dati mancanti</i>	883	367	1 250	183	49	232	162	46	208	352	88	440	121	445	566	1 892	1 075	2 967	2 967
Attività principale*																			
att. a tempo pieno (70% o più)	57.9	34.8	51.1	28.6	12.5	24.6	59.8	31.6	54.7	17.8	7.3	16.0	67.4	48.4	53.0	45.0	34.3	41.5	1 212
attività a tempo parziale	6.4	17.4	9.6	6.1	31.3	12.3	8.0	0.0	6.6	2.5	4.6	2.8	6.7	27.2	22.3	5.6	18.0	9.7	284
lavori occasionali	2.1	1.0	1.8	6.1	0.0	4.6	2.3	0.0	1.9	1.3	0.9	1.3	0.0	0.7	0.5	1.8	0.8	1.5	43.0
in formazione	2.5	2.7	2.6	0.0	0.0	0.0	4.6	15.8	6.6	67.4	74.3	68.6	9.0	8.8	8.9	23.4	16.7	21.2	618
disoccup., ricerc. di un lavoro	7.4	5.2	6.8	26.5	6.3	21.5	2.3	10.5	3.8	4.4	0.9	3.8	0.0	1.4	1.1	6.1	3.6	5.3	155
disoccup., senza ricerc. di un lavoro	4.0	6.7	4.8	10.2	18.8	12.3	6.9	5.3	6.6	1.7	3.7	2.0	1.1	0.4	0.5	3.4	4.3	3.7	108
rendita	9.6	18.2	12.1	2.0	0.0	1.5	0.0	5.3	0.9	0.0	0.0	0.0	13.5	10.6	11.3	6.1	11.8	8.0	233
incapacità di lavoro	4.0	7.5	5.0	10.2	18.8	12.3	6.9	15.8	8.5	0.9	2.8	1.3	0.0	0.7	0.5	3.0	5.1	3.7	107
casalinga/casalingo	0.1	2.5	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.1	0.1	1.9	0.7	19.0
altra	6.0	4.0	5.4	10.2	12.5	10.8	9.2	5.3	8.5	4.0	5.5	4.2	2.2	0.4	0.8	5.6	3.4	4.9	142
N**	969	402	1 371	49	16	65	87	19	106	528	109	637	89	283	372	1 957	964	2 921	2 921
<i>dati mancanti</i>	996	438	1 434	182	53	235	166	46	212	377	100	477	137	488	625	2 071	1 222	3 293	3 293

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T31 Statuto professionale dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale¹) e dei parenti o conoscenti (2018)

	Pazienti: problema principale ¹												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Statuto professionale*																			
senza attività professionale	23.6	41.2	28.8	43.3	33.3	41.0	18.0	60.0	25.0	13.8	18.5	14.5	0.0	22.2	19.0	21.4	39.1	26.3	327
apprendista, praticante	2.1	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	2.0	20.0	5.0	35.2	22.2	33.1	0.0	5.6	4.8	8.6	5.0	7.6	95
manovale, operaio-a ausiliar.	1.5	3.3	2.1	13.3	11.1	12.8	6.0	0.0	5.0	3.4	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	2.5	2.6	2.6	32
operaio-a con formaz. pratica	6.7	3.3	5.7	3.3	0.0	2.6	4.0	0.0	3.3	4.1	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	6.1	2.6	5.1	64
oper. con form. certif. (AFC)	13.9	6.2	11.6	20.0	0.0	15.4	30.0	0.0	25.0	16.6	3.7	14.5	0.0	0.0	0.0	15.5	5.2	12.7	158
caposquadra	2.1	0.4	1.6	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	5.0	1.4	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	2.2	0.3	1.7	21
impiegato-a non qualificato-a	19.0	21.0	19.6	10.0	33.3	15.4	6.0	0.0	5.0	4.1	7.4	4.7	33.3	33.3	33.3	14.3	18.7	15.5	193
impieg. qualif., quadro medio	12.5	7.0	10.9	0.0	0.0	0.0	16.0	10.0	15.0	4.1	3.7	4.1	0.0	27.8	23.8	11.1	8.7	10.4	130
imp. funz. dirett., quadr. sup.	5.1	2.5	4.4	0.0	11.1	2.6	6.0	10.0	6.7	1.4	0.0	1.2	33.3	0.0	4.8	4.3	2.6	3.9	48
indipendente	11.0	9.1	10.4	6.7	11.1	7.7	2.0	0.0	1.7	1.4	0.0	1.2	33.3	0.0	4.8	8.2	7.0	7.9	98
scolaro-a, studente	0.9	1.6	1.1	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.7	13.1	44.4	18.0	0.0	11.1	9.5	4.1	6.4	4.7	59
altro statuto	1.7	2.5	1.9	3.3	0.0	2.6	2.0	0.0	1.7	1.4	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.6	1.7	1.6	20
N**	584	243	827	30	9	39	50	10	60	145	27	172	3	18	21	902	343	1 245	1 245
<i>dati mancanti</i>	<i>1 381</i>	<i>597</i>	<i>1 978</i>	<i>201</i>	<i>60</i>	<i>261</i>	<i>203</i>	<i>55</i>	<i>258</i>	<i>760</i>	<i>182</i>	<i>942</i>	<i>223</i>	<i>753</i>	<i>976</i>	<i>3 126</i>	<i>1 843</i>	<i>4 969</i>	<i>4 969</i>

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T32a Ragione principale della fine del trattamento/accompagnamento dei pazienti (in rapporto al problema principale¹) e dei parenti o conoscenti (2018)

Ragione principale*	Pazienti: problema principale ¹												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
conclus. pianific. senza passag.	49.8	46.9	49.0	25.5	19.1	24.1	34.0	27.7	32.7	67.7	56.5	65.6	73.9	69.0	70.1	52.8	55.1	53.6	3 319
conclus. pianific. con passag.	8.1	9.5	8.5	14.7	13.2	14.4	7.5	6.2	7.2	4.4	9.1	5.3	1.8	3.2	2.9	6.9	7.3	7.0	436
cambio di domicilio	2.0	2.2	2.1	3.5	2.9	3.3	2.8	4.6	3.1	0.8	1.9	1.0	1.8	0.3	0.6	1.8	1.6	1.7	107
ospedalizzazione	1.0	1.6	1.1	0.9	0.0	0.7	0.8	1.5	0.9	0.3	0.5	0.4	0.0	0.1	0.1	0.7	0.7	0.7	45
incarcerazione	0.2	0.0	0.1	1.3	0.0	1.0	2.4	0.0	1.9	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	15
perdita di contatto	28.8	29.7	29.1	22.1	27.9	23.4	40.7	40.0	40.6	18.6	23.0	19.4	14.2	21.3	19.7	26.3	25.6	26.0	1 613
conclusione esplicita	7.4	7.2	7.3	5.6	8.8	6.4	7.5	7.7	7.5	4.2	5.7	4.5	4.0	3.2	3.4	6.4	5.7	6.2	383
decesso	1.1	1.9	1.3	6.1	1.5	5.0	0.0	3.1	0.6	0.2	0.5	0.3	0.0	0.3	0.2	1.0	1.1	1.0	64
altre cause	1.6	1.1	1.5	20.3	26.5	21.7	4.3	9.2	5.3	3.5	2.9	3.4	4.4	2.6	3.0	3.7	2.9	3.4	212
N**	1 955	835	2 790	231	68	299	253	65	318	902	209	1 111	226	770	996	4 015	2 179	6 194	6 194
dati mancanti	10	5	15	0	1	1	0	0	0	3	0	3	0	1	1	13	7	20	20

T32b Destinazione dei trasferimenti dei pazienti (in rapporto al problema principale¹) e dei parenti o conoscenti (2018)

Destinazione dei trasferimenti***	Pazienti: problema principale ¹												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
terapia residenziale	45.6	35.8	42.3	9.5	20.0	11.5	36.4	66.7	42.9	24.0	12.5	21.2	50.0	10.0	16.7	36.0	29.7	33.8	90
struttura di giorno/clinica di giorno	1.9	5.7	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	1.7	3.3	2.3	6
consulenza ambulatoriale	36.9	47.2	40.4	52.4	0.0	42.3	54.5	0.0	42.9	52.0	50.0	51.5	0.0	50.0	41.7	42.9	45.1	43.6	116
appartamento protetto	1.0	0.0	0.6	14.3	40.0	19.2	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	3.0	0.0	10.0	8.3	2.9	3.3	3.0	8
altra istituzione specializzata	14.6	11.3	13.5	23.8	40.0	26.9	9.1	33.3	14.3	16.0	37.5	21.2	50.0	30.0	33.3	16.6	18.7	17.3	46
N**	103	53	156	21	5	26	11	3	14	25	8	33	2	10	12	175	91	266	266
dati mancanti	55	26	81	13	4	17	8	1	9	15	11	26	2	15	17	103	67	170	170

T32c Causa di decesso dei pazienti (in rapporto al problema principale¹) e dei parenti o conoscenti (2018)

Cause di decesso****	Pazienti: problema principale ¹												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
suicidio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	2.7	1
infortunio	7.1	0.0	4.5	28.6	0.0	25.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	8.3	10.8	4
malattia	78.6	87.5	81.8	28.6	100.0	37.5	0.0	50.0	50.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	60.0	83.3	67.6	25
overdose o intossicazione acuta	14.3	0.0	9.1	28.6	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	10.8	4
altre cause di decesso	0.0	12.5	4.5	14.3	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	8.3	8.1	3
N**	14	8	22	7	1	8	0	2	2	1	0	1	0	0	0	25	12	37	37
dati mancanti	7	8	15	7	0	7	0	0	0	1	1	2	0	2	2	16	11	27	27

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti trasferiti. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

**** I risultati si basano solamente sui clienti deceduti durante l'intervento. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T33 Durata dell'intervento sui pazienti (in rapporto al problema principale¹) e sui parenti o conoscenti (2018)

	Pazienti: problema principale ¹												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
Durata della presa in carico* (%)																			
1 settimana o meno	6.9	7.1	7.0	3.5	5.8	4.0	2.0	4.6	2.5	4.3	2.9	4.0	11.9	11.3	11.4	5.9	7.7	6.6	407
> 1 settimana a 1 mese	3.4	3.9	3.6	2.2	1.4	2.0	3.2	6.2	3.8	12.9	7.2	11.8	3.1	3.1	3.1	5.5	3.7	4.9	304
> 1 a 2 mesi	4.6	4.4	4.6	2.2	5.8	3.0	3.6	7.7	4.4	9.1	4.3	8.2	2.7	7.3	6.2	5.4	5.6	5.5	341
> 2 a 3 mesi	4.3	3.5	4.1	2.6	4.3	3.0	4.3	7.7	5.0	4.5	5.3	4.7	6.6	5.8	6.0	4.4	4.5	4.5	277
> 3 a 6 mesi	10.7	11.9	11.1	6.5	7.2	6.7	12.6	12.3	12.6	14.8	14.4	14.7	9.7	13.7	12.8	11.7	12.7	12.0	748
> 6 mesi a 1 anno	25.0	24.2	24.8	18.6	14.5	17.7	40.3	24.6	37.1	29.4	42.1	31.8	35.0	32.4	33.0	27.9	29.7	28.5	1 772
> 1 a 2 anni	23.4	21.5	22.8	16.9	13.0	16.0	22.5	20.0	22.0	16.5	15.3	16.2	22.1	17.8	18.8	21.1	19.7	20.6	1 281
> 2 a 3 anni	9.8	8.5	9.4	13.0	18.8	14.3	6.3	9.2	6.9	5.3	5.3	5.3	4.0	5.4	5.1	8.1	7.4	7.8	486
> 3 a 5 anni	6.5	8.1	7.0	20.8	13.0	19.0	3.2	4.6	3.5	2.4	2.4	2.4	2.7	2.3	2.4	5.7	5.1	5.5	340
> 5 a 10 anni	4.0	5.4	4.4	9.5	11.6	10.0	1.6	1.5	1.6	0.6	1.0	0.6	1.8	0.6	0.9	3.2	3.0	3.1	192
più di 10 anni	1.3	1.5	1.4	4.3	4.3	4.3	0.4	1.5	0.6	0.2	0.0	0.2	0.4	0.1	0.2	1.1	0.8	1.0	61
N**	1 965	840	2 805	231	69	300	253	65	318	905	209	1 114	226	771	997	4 027	2 182	6 209	6 209
<i>dati mancanti</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5
Durata (in settimane)																			
media	77.2	83.4	79.1	147.4	157.3	149.7	55.5	60.0	56.4	41.2	45.2	42.0	48.2	43.1	44.3	68.7	64.3	67.1	
deviazione standard	105.4	113.8	108.0	183.8	223.9	193.4	68.1	98.3	75.1	60.0	51.9	58.6	64.3	52.5	55.4	103.7	94.7	100.6	
1° quartile	18.3	18.3	18.3	32.3	25.6	30.2	24.0	12.0	21.1	7.7	17.0	9.0	13.0	11.0	11.1	15.3	15.1	15.3	
mediana	45.6	45.9	45.6	94.9	100.6	96.7	38.4	32.3	38.0	27.9	31.4	28.9	32.6	30.1	30.9	39.0	36.9	38.4	
3° quartile	91.9	98.7	93.1	173.6	164.3	173.4	68.0	59.1	68.0	52.0	51.1	51.9	59.1	54.0	55.1	79.1	75.0	77.9	
N**	1 965	840	2 805	231	69	300	253	65	318	905	209	1 114	226	771	997	4 027	2 182	6 209	
<i>dati mancanti</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T34 Trattamento sostitutivo durante e immediatamente dopo l'intervento, in rapporto al problema principale¹ (solamente pazienti) (2018)

	Pazienti: problema principale ¹												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Sostituzione nel corso dell'intervento*																
no	99.2	99.2	99.2	70.4	65.2	68.8	98.0	95.2	97.5	99.7	100.0	99.7	98.5	98.4	98.5	2 872
si	0.8	0.8	0.8	29.6	34.8	31.2	2.0	4.8	2.5	0.3	0.0	0.3	1.5	1.6	1.5	45
N**	1 122	485	1 607	54	23	77	101	21	122	575	128	703	2 110	807	2 917	2 917
<i>dati mancanti</i>	843	355	1 198	177	46	223	152	44	196	330	81	411	1 692	605	2 297	2 297
Tipo di sostituzione***																
eroina	0.0	50.0	15.4	6.3	0.0	4.2	50.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	6.3	15.4	8.9	4
metadone	55.6	50.0	53.8	68.8	75.0	70.8	50.0	100.0	66.7	100.0	0.0	100.0	65.6	69.2	66.7	30
altri oppiacei	33.3	0.0	23.1	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	15.4	22.2	10
altre sostanze	11.1	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	2.2	1
N**	9	4	13	16	8	24	2	1	3	2	0	2	32	13	45	45
<i>dati mancanti</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sostituzione dopo l'intervento*																
no	99.5	99.6	99.6	60.4	65.0	61.8	98.9	95.0	98.3	99.8	99.2	99.7	98.6	98.6	98.6	2 807
si	0.5	0.4	0.4	39.6	35.0	38.2	1.1	5.0	1.7	0.2	0.8	0.3	1.4	1.4	1.4	40
N**	1 103	475	1 578	48	20	68	95	20	115	556	127	683	2 056	791	2 847	2 847
<i>dati mancanti</i>	862	365	1 227	183	49	232	158	45	203	349	82	431	1 746	621	2 367	2 367
Tipo di sostituzione***																
prescrizione di eroina	20.0	50.0	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	9.1	7.5	3
trattamento sostitutivo	80.0	50.0	71.4	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	93.1	90.9	92.5	37
N**	5	2	7	19	7	26	1	1	2	1	1	2	29	11	40	40
<i>dati mancanti</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti ai quali è stata prescritta una sostituzione durante l'intervento. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T35 Postassistenza prevista e preparata, in rapporto al problema principale¹ (solamente pazienti) (2018)

	Pazienti: problema principale ¹												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Postassistenza prevista e preparata*																
no	90.8	88.0	90.0	94.9	92.9	94.3	94.6	91.7	94.1	97.8	97.1	97.7	92.6	90.0	92.0	1 325
si	9.2	12.0	10.0	5.1	7.1	5.7	5.4	8.3	5.9	2.2	2.9	2.3	7.4	10.0	8.0	116
N**	685	276	961	39	14	53	56	12	68	184	35	219	1 061	380	1 441	1 441
<i>dati mancanti</i>	1 280	564	1 844	192	55	247	197	53	250	721	174	895	2 741	1 032	3 773	3 773
Tipo di postassistenza prevista***																
appartamento protetto dell'istituzione	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
servizio di postassistenza dell'istituzione	6.7	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	3.7	4
appartamento protetto esterno	5.0	0.0	3.3	100.0	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	20.0	8.2	0.0	5.6	6
servizio di postassistenza esterno	15.0	16.7	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	33.3	0.0	0.0	0.0	12.3	17.1	13.9	15
centro di consulenza per problemi inerenti all'alcol	16.7	16.7	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	14.3	14.8	16
centro di consulenza per problemi inerenti alle droghe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	20.0	4.1	0.0	2.8	3
altri centri di consulenza	10.0	33.3	17.8	0.0	100.0	33.3	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	20.0	11.0	34.3	18.5	20
gruppo di aiuto reciproco e di autosostegno	6.7	10.0	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	8.6	7.4	8
gruppo di precedenti utenti del centro/ dell'istituzione	0.0	3.3	1.1	50.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	2.9	1.9	2
altro-i	45.0	23.3	37.8	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	66.7	25.0	100.0	40.0	42.5	25.7	37.0	40
N**	60	30	90	2	1	3	2	1	3	4	1	5	73	35	108	108
<i>dati mancanti</i>	3	3	6	0	0	0	1	0	1	0	0	0	5	3	8	8

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti per i quali una postassistenza è prevista. Le categorie non sono esclusive (molte risposte possibili)

T36 Problemi di dipendenza all'uscita, in rapporto al problema principale¹ (solamente pazienti) (2018)

	Pazienti: problema principale ¹												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Problemi di dipendenza all'uscita*																
alcol	72.0	77.0	73.5	16.5	12.9	15.7	15.6	11.1	14.7	9.0	7.2	8.7	42.8	49.9	44.7	1 609
eroina	0.7	0.3	0.6	53.4	58.1	54.5	3.2	2.8	3.2	0.4	1.3	0.6	2.8	2.5	2.7	98
metadone	0.1	0.0	0.1	16.5	12.9	15.7	0.0	2.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.8	0.5	0.7	25
buprenorfina	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	2
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
altri oppioidi	0.0	0.2	0.1	2.9	9.7	4.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.4	0.3	9
cocaina	3.4	2.4	3.1	12.6	6.5	11.2	68.2	63.9	67.4	1.9	2.0	1.9	7.1	4.7	6.4	232
crack	0.1	0.0	0.1	1.0	0.0	0.7	0.6	2.8	1.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	6
altra forma di cocaina	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
anfetamine	0.4	0.2	0.3	1.0	0.0	0.7	3.9	0.0	3.2	0.4	0.7	0.5	1.0	0.5	0.9	32
metanfetamine	0.1	0.0	0.1	1.0	0.0	0.7	0.0	2.8	0.5	0.0	0.7	0.1	0.3	0.2	0.3	9
MDMA e affini (ecstasy)	0.6	0.2	0.5	1.9	0.0	1.5	1.9	2.8	2.1	0.9	2.0	1.1	0.9	0.8	0.9	31
catinoni sintetici	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
altri stimolanti	0.0	0.2	0.1	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	5
barbiturici	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	2
benzodiazepina	1.1	1.4	1.2	8.7	6.5	8.2	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	0.4	1.3	2.4	1.6	56
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
altri sonniferi e tranquillanti	0.2	0.5	0.3	0.0	3.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.3	10
LSD	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.3	0.6	0.4	0.4	0.4	15
ketamina	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	4
altri allucinogeni	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.4	0.3	0.1	0.2	8
sostanze volatili	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1
canapa	5.6	4.5	5.3	11.7	16.1	12.7	14.9	11.1	14.2	62.8	69.7	64.1	21.3	15.6	19.8	712
tabacco	11.1	9.6	10.7	10.7	12.9	11.2	9.1	13.9	10.0	8.1	10.5	8.6	10.7	11.6	11.0	395
altra sostanza	0.3	0.0	0.2	1.0	3.2	1.5	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.3	11
gioco patologico	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	0.1	0.0	0.1	2.8	1.0	2.3	83
dipendenza al computer/Internet	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	1.1	0.3	0.9	33
disturbi alimentari	0.1	1.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.1	0.5	5.3	1.8	64
altro/i problema/i di dipendenza	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	0.7	0.0	0.6	1.9	1.8	1.8	66
nessuno	25.5	20.3	23.9	18.4	12.9	17.2	19.5	19.4	19.5	32.7	27.6	31.8	26.5	21.5	25.2	907
N**	1 369	582	1 951	103	31	134	154	36	190	675	152	827	2 633	966	3 599	3 599
<i>dati mancanti</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T37 Frequenza delle ricadute e sostanza o comportamento implicato nel corso dell'intervento, in rapporto al problema principale¹ (solamente pazienti) (2018)

	Pazienti: problema principale ¹												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Frequenza delle ricadute*																
nessuna	57.4	44.8	54.0	44.4	0.0	33.3	55.6	50.0	54.5	75.0	54.5	72.8	60.6	45.9	56.9	467
1 volta	8.1	9.7	8.5	22.2	0.0	16.7	7.4	33.3	12.1	6.5	9.1	6.8	8.1	10.2	8.6	71
2 volte	4.7	12.1	6.7	11.1	0.0	8.3	7.4	0.0	6.1	6.5	18.2	7.8	5.4	11.2	6.8	56
3 o 4 volte	13.2	17.6	14.4	11.1	0.0	8.3	14.8	0.0	12.1	3.3	0.0	2.9	11.4	15.1	12.3	101
5 volte o più	16.6	15.8	16.4	11.1	100.0	33.3	14.8	16.7	15.2	8.7	18.2	9.7	14.6	17.6	15.3	126
N**	446	165	611	9	3	12	27	6	33	92	11	103	616	205	821	821
<i>dati mancanti</i>	1 519	675	2 194	222	66	288	226	59	285	813	198	1 011	3 186	1 207	4 393	4 393
Sostanza/comportamento comparabile a una dipendenza al momento delle ricadute***																
alcol	98.9	96.5	98.1	25.0	0.0	14.3	27.3	66.7	35.7	39.1	0.0	33.3	86.1	87.3	86.4	287
oppioidi	1.1	1.2	1.1	100.0	33.3	71.4	0.0	33.3	7.1	0.0	25.0	3.7	3.0	3.9	3.3	11
cocaina e derivati	8.9	2.4	6.8	0.0	33.3	14.3	90.9	66.7	85.7	4.3	0.0	3.7	11.7	4.9	9.6	32
altri stimolanti	3.3	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	18.2	33.3	21.4	4.3	25.0	7.4	4.8	2.0	3.9	13
ipnotici/sedativi	2.8	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	3.7	2.2	2.9	2.4	8
allucinogeni	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	3.7	0.4	0.0	0.3	1
sostanze volatili	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
canapa	6.1	3.5	5.3	50.0	66.7	57.1	27.3	33.3	28.6	87.0	75.0	85.2	16.1	8.8	13.9	46
tabacco	1.1	2.4	1.5	0.0	33.3	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.9	1.5	5
altra/e sostanza/e	0.6	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	1
gioco patologico	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
dipendenza al computer/Internet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	1
disturbi alimentari	0.0	1.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.6	2
altri problemi assimilabili a una dipendenza	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	3.7	0.4	1.0	0.6	2
N**	180	85	265	4	3	7	11	3	14	23	4	27	230	102	332	332
<i>dati mancanti</i>	10	6	16	1	0	1	1	0	1	0	1	1	13	9	22	22

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che hanno indicato una o più ricadute. Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

T38 Frequenza del consumo di tabacco e numero di sigarette al giorno nel corso dei 30 giorni precedenti l'uscita, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2018)

	Pazienti: problema principale ¹												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Frequenza del consumo di tabacco*																
mai	44.8	50.0	46.3	15.4	33.3	21.1	21.7	0.0	18.5	27.2	0.0	23.1	39.1	42.8	40.1	325
1 giorno alla settimana o meno	0.5	1.8	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.9	0.5	1.8	0.9	7
2 a 3 giorni alla settimana	0.7	1.8	1.0	7.7	0.0	5.3	4.3	0.0	3.7	1.1	0.0	0.9	1.2	2.3	1.5	12
4 a 6 giorni alla settimana	0.5	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.9	0.7	0.5	0.6	5
una volta al giorno	1.9	2.4	2.1	7.7	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	2.8	2.4	2.3	2.3	19
più volte al giorno	51.6	43.4	49.2	69.2	66.7	68.4	73.9	100.0	77.8	66.3	100.0	71.3	56.1	50.5	54.6	442
N**	411	166	577	13	6	19	23	4	27	92	16	108	588	222	810	810
<i>dati mancanti</i>	1 554	674	2 228	218	63	281	230	61	291	813	193	1 006	3 214	1 190	4 404	4 404
Numero di sigarette al giorno***																
0 a 10 sigarette al giorno	47.4	50.8	48.2	66.7	50.0	63.6	60.0	50.0	57.9	71.2	78.6	72.7	54.4	57.3	55.1	221
11 a 20 sigarette al giorno	38.8	44.1	40.0	0.0	0.0	0.0	33.3	50.0	36.8	23.1	14.3	21.2	34.1	37.5	34.9	140
21 a 30 sigarette al giorno	10.7	1.7	8.6	33.3	50.0	36.4	6.7	0.0	5.3	1.9	7.1	3.0	8.5	3.1	7.2	29
31 sigarette al giorno o più	3.1	3.4	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	3.0	3.0	2.1	2.7	11
N**	196	59	255	9	2	11	15	4	19	52	14	66	305	96	401	401
<i>dati mancanti</i>	31	24	55	2	2	4	3	0	3	15	2	17	53	31	84	84

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che hanno indicato un consumo di tabacco. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T39 Obiettivo di consumo all'uscita e pronostico, in rapporto alla principale sostanza problematica¹ (solamente pazienti) (2018)





	Pazienti: sostanza problematica ¹												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Obiettivo di consumo*																
astinenza definitiva	32.3	38.8	34.1	92.3	50.0	76.2	71.4	66.7	70.7	42.0	26.3	39.9	37.8	38.4	37.9	384
astinenza limitata nel tempo	17.7	11.5	16.0	0.0	0.0	0.0	8.6	16.7	9.8	5.9	5.3	5.8	14.4	10.1	13.2	134
consumo controllato	36.5	35.9	36.3	0.0	25.0	9.5	8.6	0.0	7.3	26.9	26.3	26.8	32.7	35.1	33.3	337
nessuna limitazione nel consumo prevista	2.7	1.0	2.2	0.0	12.5	4.8	0.0	0.0	0.0	7.6	5.3	7.2	3.2	1.9	2.9	29
nessuna decisione per il momento	9.4	12.4	10.2	7.7	12.5	9.5	11.4	0.0	9.8	16.8	36.8	19.6	10.3	13.4	11.2	113
altro	1.5	0.5	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	2.4	0.8	0.0	0.7	1.6	1.1	1.5	15
N**	524	209	733	13	8	21	35	6	41	119	19	138	744	268	1 012	1 012
<i>dati mancanti</i>	1 441	631	2 072	218	61	279	218	59	277	786	190	976	3 058	1 144	4 202	4 202
Pronostico*																
pronostico molto positivo	20.3	15.8	19.0	21.4	25.0	22.7	27.3	0.0	23.7	31.3	6.7	28.5	22.8	14.8	20.7	204
pronostico positivo	42.9	49.8	44.9	64.3	37.5	54.5	39.4	60.0	42.1	44.3	66.7	46.9	43.6	52.5	45.9	453
pronostico piuttosto sfavorevole	25.4	23.9	25.0	14.3	37.5	22.7	18.2	40.0	21.1	21.7	26.7	22.3	24.2	24.0	24.1	238
pronostico negativo	11.4	10.5	11.2	0.0	0.0	0.0	15.2	0.0	13.2	2.6	0.0	2.3	9.4	8.7	9.2	91
N**	508	209	717	14	8	22	33	5	38	115	15	130	723	263	986	986
<i>dati mancanti</i>	1 457	631	2 088	217	61	278	220	60	280	790	194	984	3 079	1 149	4 228	4 228

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio


* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto




G1 Principale problema all'entrata alcol: evoluzione 2013-2018







G2 Principale problema all'entrata oppioidi: evoluzione 2013-2018




Numero di casi registrati da istituzioni con una partecipazione costante






G3 Principale problema all'entrata cocaina o derivati: evoluzione 2013-2018




G4 Principale problema all'entrata altri stimolanti: evoluzione 2013-2018






Numero di casi registrati da istituzioni con una partecipazione costante




G5 Principale problema all'entrata canapa: evoluzione 2013-2018






Numero di casi registrati da istituzioni con una partecipazione costante




G6 Principale problema all'entrata ipnotici/sedativi: evoluzione 2013-2018



Numero di casi registrati da istituzioni con una partecipazione costante



G7 Principale problema all'entrata gioco d'azzardo: evoluzione 2013-2018



Numero di casi registrati da istituzioni con una partecipazione costante

