



Prise en charge ambulatoire des problèmes de dépendance

Résultats de l'enquête auprès des client-e-s 2014

Recueil de tableaux statistiques

Mariana Astudillo, Luca Notari, Etienne Maffli



Remerciements

Nous remercions vivement les collaborateurs et collaboratrices ainsi que les patients et patientes des institutions participantes qui se sont donné la peine de remplir les questionnaires du monitoring act-info. Nous remercions également les collaborateurs et collaboratrices des services de consultation qui ont effectué les tâches de logistique et de saisie. Nos remerciements vont aussi à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui finance l'ensemble du réseau act-info. Un grand merci également à Edith Bacher et Christiane Gmel pour la conception graphique et la mise en page de ce rapport ainsi qu'à Marina Delgrande Jordan pour sa précieuse collaboration dans le développement des syntaxes d'analyse.

Compléments d'information: Etienne Maffli, tél. 021 321 29 54, fax 021 321 29 40,
e-mail emaffli@addictionsuisse.ch

Réalisation: Mariana Astudillo, Luca Notari & Etienne Maffli
Addiction Suisse

Diffusion: Recherche, Addiction Suisse, case postale 870,
1001 Lausanne, tél. 021/321 29 46, fax 021 321 29 40,
e-mail ebacher@addictionsuisse.ch

Prix: Fr. 10.–

Langue du texte original: allemand

Graphisme/mise en page: Addiction Suisse

Copyright: © Addiction Suisse, Lausanne 2016

Citation recommandée: Astudillo, M., Notari, L. & Maffli, E. (2016). Prise en charge ambulatoire des problèmes de dépendance: résultats de l'enquête auprès des client-e-s 2014 – Recueil de tableaux statistiques. Lausanne: Addiction Suisse.

Table des matières

act-info – addiction care and therapy information.....	7
act-info dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance (SAMBAD)	7

ADMISSION

T1	Sexe et âge à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2014)
T2	État civil et nationalité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2014)
T3	Degré d'urbanisation du domicile, type de ménage et situation de domicile à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2014)
T4	Type de relation de couple, nombre d'enfants propres et d'enfants vivant dans le ménage à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2014)
T5	Plus haute formation achevée et statut professionnel à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2014)
T6	Source de revenu principale et taux d'activité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2014)
T7	Revenu mensuel net et dettes à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2014)
T8	Emprisonnement ou détention préventive avant l'admission et durée totale de détention, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2014)
T9	Instance d'envoi principale, selon le problème principal et chez les proches (2014)
T10	Prise en charge consécutive à une mesure judiciaire et type de mesure, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2014)
T11	Traitements/prises en charge avant l'admission et type de prises en charge antérieures, selon le problème principal et chez les proches (2014)
T12	Substitution ou prescription d'héroïne à l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2014)
T13	Problème principal à l'admission (seulement patient-e-s) (2014)
T14	Usage de substances multiples et combinaisons de substances (2014)
T15.1a	Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2014), hommes
T15.1b	Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2014), femmes
T15.1c	Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2014), hommes

- T15.2a Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2014), hommes
- T15.2b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2014), femmes
- T15.2c Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2014), hommes et femmes
- T16.1a Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2014), hommes
- T16.1b Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2014), femmes
- T16.1c Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2014), hommes et femmes
- T16.2a Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2014), hommes
- T16.2b Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2014), femmes
- T16.2c Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2014), hommes et femmes
- T17 Mode d'administration prédominant de la principale substance posant problème avant l'admission (2014)
- T18.1 Prévalence à vie, sur les 30 derniers jours et sur les 12 derniers mois avant l'admission des injections et échange de matériel d'injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2014)
- T18.2 Âge lors de la première injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2014)
- T19.1a Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2014), hommes
- T19.1b Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2014), femmes
- T19.1c Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2014), hommes et femmes
- T19.2a Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2014), hommes
- T19.2b Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2014), femmes
- T19.2c Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2014), hommes et femmes

- T20.1a Fréquence de consommation des substances secondaires selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2014)
- T20.1b Fréquence de consommation des substances secondaires selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2014)
- T21 Fréquence de la consommation d'alcool, nombre de boissons standards par jour et fréquence de fortes consommations d'alcool avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2014)
- T22 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 derniers jours avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2014)
- T23a Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2014), hommes
- T23b Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2014), femmes
- T23c Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2014), hommes et femmes
- T24a Problèmes psychiques au cours de la vie (2014), hommes
- T24a Problèmes psychiques au cours de la vie (2014), femmes
- T24a Problèmes psychiques au cours de la vie (2014), hommes et femmes
- T25 Proches: lien entre le client/la cliente et la tierce personne (2014)
- T26 Proches: problème principal de la tierce personne (2014)

SORTIE

- T27 Sexe et âge, selon le problème principal et chez les proches (2014)
- T28 État civil et degré d'urbanisation du domicile à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2014)
- T29 Type de ménage, situation de domicile et type de relation de couple à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2014)
- T30 Source de revenu principale et taux d'activité principal à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2014)
- T31 Statut professionnel et revenu mensuel net à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2014)
- T32a Raison principale de la fin du traitement/de la prise en charge, selon le problème principal et chez les proches (2014)
- T32b Destination des transferts, selon le problème principal et chez les proches (2014)
- T32c Cause de décès, selon le problème principal et chez les proches (2014)
- T33 Durée de la prise en charge, selon le problème principal et chez les proches (2014)
- T34 Substitution pendant et immédiatement après la prise en charge, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2014)

- T35 Postcure prévue et mise en place, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2014)
- T36 Problèmes addictifs à la sortie, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2014)
- T37 Fréquence des rechutes et substance ou comportement impliqué pendant la prise en charge, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2014)
- T38 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 jours précédant la sortie, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2014)
- T39 Objectif de consommation à la sortie et pronostic, selon la principale substance posant problème (seulement patient-e-s) (2014)

Annexe

Données de base d'institutions ne participant pas au monitoring *act-info*

- A1 Sexe et âge à l'admission, selon le problème principal (2014)
- A2 Problème principal à l'admission (2014)

act-info - addiction care and therapy information

Le Réseau de monitoring (*act-info*) réunit sous le même toit les cinq statistiques menées dans le domaine de la prise en charge et du traitement en matière de dépendance en Suisse:

- SAMBAD (Statistique du secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance)
- Residalc (Statistique du traitement résidentiel de l'alcoolodépendance en Suisse)
- FOS (Statistique de la Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie)
- HeGeBe (Statistique du traitement avec prescription d'héroïne)
- Méthadone (Statistique nationale des traitements de substitution)

Ces cinq statistiques disposent depuis 2004 d'instruments harmonisés et optimisés. Les données communes sont intégrées dans une base de données centralisée, permettant ainsi de procéder à des analyses sur l'ensemble des secteurs. Avec l'adoption des standards européens (Treatment Demand Indicator), la comparabilité des données au plan international est également garantie.

act-info est financé par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). La réalisation des relevés effectués dans les différents domaines de traitement est confiée à Addiction Info Suisse à Lausanne et à l'Institut suisse de recherche sur les addictions et la santé à Zürich (ISGF).

act-info dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance (SAMBAD)

Dès 2004, les instruments de monitoring *act-info* ont été introduits dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance et ont remplacé les anciens questionnaires en vigueur depuis 1994. Après plusieurs années d'utilisation, une révision de ces instruments a eu lieu et les nouveaux questionnaires ont été introduits le 1^{er} janvier 2013. Ce processus a été harmonisé avec la révision des normes européennes. De façon à répondre aux différents besoins, une version raccourcie est également disponible dans le domaine ambulatoire. Le monitoring dans ce secteur est confié à Addiction Suisse à Lausanne.

La statistique *act-info* SAMBAD offre un aperçu de la clientèle de l'aide ambulatoire en matière de dépendance en Suisse. Les données sont récoltées au début et à la fin de la prise en charge. Les informations rassemblées à l'admission renseignent en particulier sur les caractéristiques sociodémographiques des client-e-s, sur leurs expériences de traitement ainsi que sur leurs modes de consommation et problèmes psychosociaux avant la prise en charge. Les informations récoltées à la sortie rendent principalement compte des circonstances de la fin de la prise en charge et des caractéristiques sociodémographiques des client-e-s à ce moment.

En 2014, 71 des 194 institutions recensées dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance ont participé au monitoring *act-info*. Il s'agit de services de consultation spécialisés pour les problèmes liés à l'alcool et/ou aux drogues illégales ainsi que de divers types de services polyvalents offrant également une aide pour les problèmes addictifs.

Explications concernant les tableaux

La présente statistique descriptive des données de l'enquête act-info auprès des client-e-s du secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance repose sur deux types de tableaux:

- lorsque la question a des catégories de réponses prédéfinies ou recodées en tranches distinctes (par exemple "état civil" ou "âge"), le tableau indique les pourcentages des différentes catégories de réponses
- lorsque la question n'a pas de catégories prédéfinies, mais requiert une valeur numérique (par exemple "âge au début de la consommation problématique"), le tableau présente des paramètres de position (moyenne, médiane) et des paramètres de dispersion (écart-type, 1er quartile, 3e quartile)

La plupart des tableaux présentent les résultats de façon distincte pour les sous-groupes de patients et patientes ayant mentionné l'**alcool**, un **opioïde** (héroïne notamment), la **cocaïne** (et dérivés) ou le **cannabis** comme problème principal au moment de leur admission. Les **proches** venant consulter pour les problèmes d'un tiers font également l'objet d'analyses séparées pour les aspects socio-démographiques. A l'exception des thèmes directement liés aux modes de consommation ou aux formes de comportements addictifs non liés aux substances, les résultats ne sont en revanche pas présentés séparément pour les client-e-s (peu nombreux) ayant mentionné d'autres substances (par exemple un stimulant ou les substances volatiles) ou un problème addictif non lié à une substance (par exemple jeu pathologique) comme problème principal. Ces personnes sont cependant incluses dans les analyses portant sur l'ensemble des prises en charge figurant dans les blocs à droite des tableaux respectifs. Toutes les analyses sont effectuées séparément pour les hommes et pour les femmes ainsi que pour les deux sexes confondus (colonnes "Total" comprenant le cas échéant également les quelques personnes dont le sexe n'est pas connu).

Seules les réponses valides sont prises en considération dans les analyses. Autrement dit, les réponses "pas connu" et les informations manquantes (missings) sont exclues des analyses. Le nombre de réponses valides **N** représente le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages ou autres paramètres. Il est indiqué pour chaque groupe ou sous-groupe considéré. Au dessous, le nombre correspondant de données manquantes figure également. Les résultats dont la part de données manquantes est importante doivent être interprétés particulièrement prudemment.

Des notes en bas de tableau renseignent sur les éventuelles particularités des groupes de référence ainsi que sur le type de question. Lorsque plusieurs réponses sont possibles (par exemple aux tableaux du thème T19, "autres problèmes addictifs") les pourcentages obtenus ne sont pas additifs.

Les institutions ne participant pas au monitoring act-info ont été invitées à fournir des données de base (âge, sexe et problème principal à l'admission). Quinze institutions ont répondu à cette demande. Les données de ces 15 institutions ont été analysées séparément et les résultats sont présentés en annexe.

T1 Sexe et âge à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2014)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Sexe*																			
hommes			68.5			71.2			83.2			83.5			21.7			63.5	3'809
femmes			31.5			28.8			16.8			16.5			78.3			36.5	2'190
sexe pas connu			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	0
N**	2'014	927	2'941	222	90	312	168	34	202	827	163	990	203	733	936	3'809	2'190	5'999	5'999
Age (en années)*																			
jusqu'à 14	0.0	0.3	0.1	0.0	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	4.8	6.1	5.1	3.5	0.8	1.4	1.7	1.3	1.5	92
15-19	2.2	2.1	2.1	1.4	4.5	2.3	4.8	11.8	6.0	58.1	55.2	57.6	3.0	2.2	2.4	16.0	8.0	13.1	781
20-24	4.0	2.6	3.6	8.1	12.4	9.3	13.2	5.9	11.9	12.4	11.0	12.1	4.0	4.4	4.3	7.2	5.4	6.6	392
25-29	7.9	6.0	7.3	10.4	14.6	11.6	19.8	14.7	18.9	9.1	11.0	9.4	5.0	7.2	6.7	9.0	7.6	8.5	508
30-34	10.9	9.2	10.4	17.6	20.2	18.3	23.4	20.6	22.9	6.5	8.0	6.8	4.5	11.3	9.9	10.9	10.2	10.7	637
35-39	10.2	11.2	10.5	21.6	14.6	19.6	17.4	17.6	17.4	4.1	1.2	3.6	7.0	9.0	8.6	9.7	9.7	9.7	580
40-44	13.4	12.0	13.0	17.6	10.1	15.4	12.6	14.7	12.9	2.3	3.1	2.4	7.0	14.9	13.2	10.2	12.1	10.9	649
45-49	14.0	16.8	14.9	14.9	15.7	15.1	6.6	14.7	8.0	1.8	2.5	1.9	15.6	17.7	17.2	10.6	14.9	12.2	726
50-54	14.9	13.9	14.6	5.4	5.6	5.5	1.2	0.0	1.0	0.4	1.2	0.5	17.1	14.0	14.6	9.8	11.9	10.5	629
55-59	9.3	10.3	9.6	2.3	1.1	1.9	0.6	0.0	0.5	0.5	0.0	0.4	9.5	7.7	8.1	6.1	7.8	6.7	402
60-64	7.1	8.0	7.4	0.9	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	8.5	3.5	4.6	4.5	5.2	4.8	284
65-69	3.6	3.7	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	3.9	4.1	2.2	3.2	2.6	154
70-74	1.5	2.8	1.9	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	4.5	2.2	2.7	1.2	2.0	1.5	88
75 et plus	1.0	1.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	1.2	2.2	0.8	0.9	0.9	51
N**	2'010	922	2'932	222	89	311	167	34	201	825	163	988	199	724	923	3'798	2'175	5'973	5'973
données manquantes	4	5	9	0	1	1	1	0	1	2	0	2	4	9	13	11	15	26	26
Age (valeurs centrales)																			
moyenne	45.1	46.5	45.5	38.0	35.3	37.3	33.4	34.1	33.5	21.9	22.2	21.9	48.6	44.4	45.3	38.1	42.2	39.6	
écart-type	13.0	13.0	13.0	9.0	10.0	9.4	8.8	9.4	8.9	8.3	9.3	8.4	16.5	13.1	14.0	15.4	14.7	15.3	
1er quartile	35.0	37.0	35.7	32.3	28.7	30.5	27.1	27.8	27.2	16.7	16.3	16.6	39.3	34.7	35.3	25.1	31.6	27.6	
valeur médiane	45.6	47.1	46.3	38.2	34.3	37.2	33.4	34.3	33.5	17.9	18.0	17.9	50.0	45.0	46.0	37.7	43.3	40.0	
3e quartile	54.0	55.3	54.3	44.8	43.0	44.5	38.64	40.2	39.5	24.8	25.8	25.1	58.8	52.7	54.0	49.9	52.3	50.8	
N**	2'010	922	2'932	222	89	311	167	34	201	825	163	988	199	724	923	3'798	2'175	5'973	
données manquantes	4	5	9	0	1	1	1	0	1	2	0	2	4	9	13	11	15	26	

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T2 État civil et nationalité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2014)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Etat civil*																			
célibataire	42.1	33.1	39.3	68.1	69.0	68.4	60.0	62.5	60.4	92.5	90.5	92.2	22.2	25.6	24.9	56.2	39.4	50.0	2'763
marié-e	33.9	28.8	32.3	17.6	9.5	15.3	23.2	12.5	21.4	4.6	2.7	4.3	63.1	50.8	53.4	26.9	32.5	28.9	1'598
séparé-e	5.3	4.9	5.2	2.0	6.0	3.1	5.2	0.0	4.3	1.1	0.0	0.9	1.7	2.1	2.0	3.8	3.4	3.7	203
divorcé-e	16.6	26.6	19.8	11.8	14.3	12.5	9.7	25.0	12.3	1.6	6.1	2.4	10.2	17.8	16.2	11.6	20.0	14.7	810
veuf/veuve	1.1	5.3	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.7	2.4	0.7	3.5	1.7	94
partenariat enregistré	0.9	1.3	1.0	0.5	1.2	0.7	1.9	0.0	1.6	0.3	0.7	0.3	1.7	1.0	1.2	0.8	1.2	1.0	53
N**	1'877	871	2'748	204	84	288	155	32	187	745	148	893	176	669	845	3'495	2'026	5'521	5'521
données manquantes	137	56	193	18	6	24	13	2	15	82	15	97	27	64	91	314	164	478	478
Nationalité*																			
CH	78.3	82.9	79.8	65.8	75.0	68.6	66.4	74.2	67.8	83.2	81.1	82.8	84.7	86.1	85.8	78.4	84.4	80.6	4'388
UE	16.6	12.2	15.2	25.1	19.0	23.3	21.5	19.4	21.1	9.6	15.5	10.6	13.1	9.5	10.2	15.4	11.1	13.8	753
autre	5.1	4.9	5.0	9.0	6.0	8.1	12.1	6.5	11.1	7.2	3.4	6.6	2.3	4.4	4.0	6.2	4.5	5.6	303
N**	1'824	855	2'679	199	84	283	149	31	180	748	148	896	176	656	832	3'445	1'999	5'444	5'444
données manquantes	190	72	262	23	6	29	19	3	22	79	15	94	27	77	104	364	191	555	555

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T3 Degré d'urbanisation du domicile, type de ménage et situation de domicile à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2014)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge				N
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total								
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Degré d'urbanisation*																				
grands centres urbains	9.5	10.6	9.9	1.4	0.0	1.0	0.6	2.9	1.0	0.0	0.6	0.1	10.2	9.2	9.4	5.7	7.8	6.5	375	
périphérie des grands centres	11.5	11.2	11.4	5.1	3.4	4.6	7.4	11.8	8.2	5.9	4.9	5.8	15.6	11.7	12.5	9.3	9.6	9.4	548	
villes de moyenne importance	15.2	16.1	15.5	15.3	13.5	14.8	21.6	29.4	23.0	27.7	27.2	27.6	16.1	19.9	19.1	19.0	19.2	19.0	1'104	
petites villes	34.9	35.3	35.0	45.6	53.9	48.0	47.5	41.2	46.4	35.5	34.0	35.2	28.5	34.5	33.2	36.4	36.6	36.5	2'118	
campagne	29.0	26.8	28.3	32.6	29.2	31.6	22.8	14.7	21.4	30.9	33.3	31.3	29.6	24.7	25.7	29.6	26.8	28.5	1'656	
N**	1'954	895	2'849	215	89	304	162	34	196	809	162	971	186	684	870	3'697	2'104	5'801	5'801	
données manquantes	60	32	92	7	1	8	6	0	6	18	1	19	17	49	66	112	86	198	198	
Type de ménage (30 derniers jours)*																				
seul-e en ménage	37.2	32.9	35.8	37.8	28.4	35.2	25.7	37.5	27.7	13.6	16.3	14.1	14.8	12.4	12.9	29.6	26.3	28.5	1'366	
avec famille d'origine	7.3	4.1	6.3	14.5	13.5	14.2	17.8	21.9	18.5	64.9	46.8	61.9	4.5	6.1	5.7	23.2	11.6	19.4	930	
avec partenaire et/ou avec enfant(s)	45.2	53.8	47.9	25.4	41.9	30.0	42.8	34.4	41.3	8.9	18.4	10.5	79.5	81.5	81.1	35.5	53.6	41.4	1'988	
avec des amis ou d'autres personnes	3.8	1.8	3.1	6.7	4.1	6.0	5.9	0.0	4.9	3.5	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	4.0	1.8	3.3	158	
en prison	0.4	0.0	0.3	0.5	0.0	0.4	1.3	0.0	1.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	13	
institution/foyer	1.7	1.2	1.5	4.1	8.1	5.2	1.3	0.0	1.1	2.8	3.5	2.9	0.0	0.0	0.0	2.0	1.4	1.8	85	
hôpital/clinique	1.8	2.5	2.0	2.1	1.4	1.9	1.3	3.1	1.6	0.3	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	1.3	1.6	1.4	68	
autre	2.7	3.7	3.0	8.8	2.7	7.1	3.9	3.1	3.8	6.0	10.6	6.7	1.1	0.0	0.2	4.0	3.7	3.9	189	
N**	1'733	812	2'545	193	74	267	152	32	184	720	141	861	88	314	402	3'210	1'587	4'797	4'797	
données manquantes	281	115	396	29	16	45	16	2	18	107	22	129	115	419	534	599	603	1'202	1'202	
Situation de domicile (30 dernier jours)*																				
logement stable	91.2	92.3	91.6	79.0	79.2	79.1	93.5	90.0	92.9	89.9	90.2	90.0	97.9	95.3	95.9	90.6	92.4	91.2	4'356	
logement instable/SDF	4.0	3.4	3.8	9.7	13.9	10.9	2.9	6.7	3.6	5.6	3.8	5.3	2.1	4.7	4.1	4.6	4.1	4.4	211	
en prison	0.5	0.0	0.3	2.2	0.0	1.6	1.4	0.0	1.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	17	
institution/foyer/hôpital/autre	4.4	4.3	4.4	9.1	6.9	8.5	2.2	3.3	2.4	4.4	6.0	4.7	0.0	0.0	0.0	4.2	3.5	4.0	190	
N**	1'744	829	2'573	186	72	258	139	30	169	684	133	817	96	339	435	3'155	1'619	4'774	4'774	
données manquantes	270	98	368	36	18	54	29	4	33	143	30	173	107	394	501	654	571	1'225	1'225	

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T4 Type de relation de couple, nombre d'enfants propres et d'enfants vivant dans le ménage à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2014)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
Type de relation de couple*	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
sans partenaire, seul-e	33.3	37.6	34.8	37.7	30.4	35.7	34.3	15.4	31.3	69.0	49.4	65.4	14.0	15.0	14.8	41.6	34.3	38.9	1'029
relations temporaires	4.5	4.1	4.3	8.2	8.7	8.3	10.0	7.7	9.6	6.3	11.1	7.2	0.0	2.8	2.3	4.9	4.6	4.8	127
partenaire fixe, vivant séparé	14.8	12.4	14.0	18.0	21.7	19.0	12.9	38.5	16.9	14.3	27.2	16.6	9.3	16.0	14.8	14.6	15.1	14.7	390
partenaire fixe, ménage commun	47.5	45.9	46.9	36.1	39.1	36.9	42.9	38.5	42.2	10.4	12.3	10.8	76.7	66.2	68.0	38.9	46.1	41.6	1'099
N**	988	510	1'498	61	23	84	70	13	83	364	81	445	43	213	256	1'682	963	2'645	2'645
données manquantes	1'026	417	1'443	161	67	228	98	21	119	463	82	545	160	520	680	2'127	1'227	3'354	3'354
Nombre d'enfants propres*																			
aucun	55.0	49.4	53.3	78.4	75.9	77.7	61.8	71.4	63.6	95.5	90.7	94.7	31.1	29.2	29.6	67.9	52.6	62.9	2'751
1 enfant	14.8	17.2	15.6	14.4	13.8	14.2	21.1	14.3	19.9	2.8	5.7	3.3	21.1	20.5	20.6	11.6	16.0	13.1	571
2 enfants	21.1	22.8	21.6	5.2	10.3	6.6	12.2	3.6	10.6	1.3	2.1	1.4	34.4	34.3	34.4	14.2	21.2	16.5	722
3 enfants ou plus	9.1	10.6	9.5	2.0	0.0	1.4	4.9	10.7	6.0	0.4	1.4	0.6	13.3	16.0	15.4	6.3	10.2	7.6	331
N**	1'565	698	2'263	153	58	211	123	28	151	716	140	856	90	332	422	2'939	1'436	4'375	4'375
données manquantes	449	229	678	69	32	101	45	6	51	111	23	134	113	401	514	870	754	1'624	1'624
Nombre d'enfants dans le ménage*																			
aucun	81.4	75.1	79.4	91.0	93.8	91.8	79.2	89.7	81.2	87.1	87.2	87.2	50.0	47.0	47.7	82.4	72.0	79.0	3'565
1 enfant	7.7	13.6	9.6	4.2	1.5	3.4	12.0	0.0	9.7	5.1	6.4	5.3	27.8	24.3	25.1	7.7	14.0	9.8	440
2 enfants	7.9	8.1	8.0	4.2	4.6	4.3	8.0	6.9	7.8	5.2	3.5	4.9	16.7	19.9	19.2	7.0	9.8	7.9	356
3 enfants ou plus	3.0	3.2	3.1	0.6	0.0	0.4	0.8	3.4	1.3	2.6	2.8	2.6	5.6	8.7	8.0	2.9	4.2	3.3	150
N**	1'626	726	2'352	167	65	232	125	29	154	731	141	872	90	321	411	3'042	1'469	4'511	4'511
données manquantes	388	201	589	55	25	80	43	5	48	96	22	118	113	412	525	767	721	1'488	1'488

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T5 Plus haute formation achevée et statut professionnel à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2014)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Plus haute formation achevée*																			
aucune formation achevée	3.4	3.8	3.5	5.3	10.7	6.8	1.6	13.3	3.9	17.9	19.7	18.2	3.4	1.6	2.0	7.4	5.7	6.8	289
école obligatoire	10.1	14.1	11.4	22.5	32.1	25.1	21.6	23.3	21.9	51.2	50.8	51.2	8.5	8.5	8.5	21.9	17.1	20.2	856
formation de transition	2.6	4.3	3.1	4.6	5.4	4.8	0.8	10.0	2.6	3.2	3.3	3.2	0.9	1.6	1.5	2.6	3.4	2.9	122
formation générale sans maturité	9.9	5.3	8.4	13.9	14.3	14.0	12.0	3.3	10.3	4.0	2.5	3.7	14.5	8.2	9.6	8.8	6.3	8.0	337
formation prof. de base et apprentissage	51.6	49.4	50.9	43.7	30.4	40.1	52.0	36.7	49.0	21.1	19.7	20.9	39.3	47.1	45.4	42.8	43.7	43.1	1'824
maturité ou école normale	4.5	4.4	4.5	4.0	3.6	3.9	1.6	3.3	1.9	0.9	0.8	0.9	3.4	5.9	5.4	3.3	4.9	3.8	162
formation prof. supérieure	9.2	7.9	8.8	2.6	1.8	2.4	4.8	0.0	3.9	0.9	0.8	0.9	6.8	8.5	8.1	6.3	6.9	6.5	275
haute école spécialisée et université	7.2	9.9	8.1	2.0	1.8	1.9	3.2	6.7	3.9	0.6	2.5	0.9	19.7	16.7	17.3	5.6	10.8	7.4	314
doctorat ou habilitation	1.5	0.9	1.3	1.3	0.0	1.0	2.4	3.3	2.6	0.2	0.0	0.1	3.4	1.9	2.2	1.3	1.1	1.2	51
N**	1'451	658	2'109	151	56	207	125	30	155	658	122	780	117	425	542	2'760	1'470	4'230	4'230
<i>données manquantes</i>	563	269	832	71	34	105	43	4	47	169	41	210	86	308	394	1'049	720	1'769	1'769
Statut professionnel*																			
sans activité professionnelle	20.1	30.1	23.1	33.3	40.4	35.4	23.1	23.8	23.2	14.1	19.4	14.9	42.9	15.2	20.0	20.0	28.1	22.3	568
apprenti-e, stagiaire	2.6	1.5	2.3	0.8	9.6	3.3	4.4	4.8	4.5	32.7	29.0	32.1	0.0	0.0	0.0	9.1	5.3	8.0	205
manœuvre, aide	4.3	4.1	4.2	13.2	0.0	9.4	4.4	4.8	4.5	3.1	0.0	2.6	0.0	3.0	2.5	4.7	3.3	4.3	110
ouvrier/ère formé-e sur le tas	8.4	4.7	7.3	8.5	5.8	7.7	7.7	9.5	8.0	5.1	3.2	4.8	0.0	0.0	0.0	7.4	4.5	6.5	167
ouvrier/ère formé-e (CFC)	14.9	4.7	11.8	20.9	7.7	17.1	20.9	19.0	20.5	11.5	4.8	10.6	14.3	0.0	2.5	14.9	5.4	12.2	312
contremaître-ssse	2.2	0.0	1.5	0.8	0.0	0.6	1.1	0.0	0.9	1.4	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.8	0.1	1.3	34
employé-e non qualifié-e	19.5	31.2	23.0	9.3	21.2	12.7	14.3	19.0	15.2	4.5	12.9	5.8	28.6	36.4	35.0	15.0	27.1	18.4	470
empl. qualifié-e, cadre moyen	12.5	12.2	12.4	5.4	7.7	6.1	12.1	9.5	11.6	4.8	1.6	4.3	14.3	27.3	25.0	9.7	11.5	10.2	260
employé-e, cadre supérieur	5.1	2.6	4.3	2.3	0.0	1.7	1.1	0.0	0.9	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	3.8	1.8	3.2	82
indépendant-e	9.2	7.7	8.8	4.7	3.8	4.4	8.8	0.0	7.1	0.8	0.0	0.7	0.0	18.2	15.0	7.0	7.1	7.0	179
écolier/ère, étudiant-e	0.6	0.4	0.6	0.0	3.8	1.1	1.1	9.5	2.7	21.1	29.0	22.3	0.0	0.0	0.0	5.9	4.6	5.6	142
autre statut	0.6	0.9	0.7	0.8	0.0	0.6	1.1	0.0	0.9	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.8	1.1	0.9	23
N**	1'082	468	1'550	129	52	181	91	21	112	355	62	417	7	33	40	1'833	719	2'552	2'552
<i>données manquantes</i>	932	459	1'391	93	38	131	77	13	90	472	101	573	196	700	896	1'976	1'471	3'447	3'447

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T6 Source de revenu principale et taux d'activité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2014)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Source de revenu principale (au cours des 30 derniers jours)*																			
salaire	55.8	41.5	51.2	30.2	17.9	26.8	59.3	32.4	54.3	31.4	24.7	30.3	63.0	66.7	65.8	48.8	43.5	47.0	2'360
économies, épargne	1.7	0.9	1.5	0.5	0.0	0.4	1.3	0.0	1.1	0.5	0.0	0.4	2.2	0.6	1.0	1.4	0.8	1.2	61
rente (AVS, AI ou autre)	15.7	21.4	17.5	14.9	17.9	15.7	5.3	23.5	8.7	3.7	5.2	3.9	18.5	12.3	13.7	11.9	18.0	13.9	697
aide sociale	14.5	15.0	14.7	36.1	41.0	37.5	16.7	20.6	17.4	10.7	16.2	11.7	3.3	1.9	2.2	14.4	13.0	13.9	698
assurance-chômage	5.8	4.7	5.5	7.4	9.0	7.9	8.0	8.8	8.2	3.4	3.2	3.4	3.3	2.6	2.7	5.3	4.1	4.9	245
soutien du/de la partenaire	1.7	12.4	5.1	3.0	5.1	3.6	1.3	5.9	2.2	1.2	2.6	1.4	3.3	12.9	10.7	1.7	10.4	4.5	228
soutien parents/proches/amis	2.9	2.6	2.8	4.5	6.4	5.0	4.0	5.9	4.3	48.2	46.1	47.8	6.5	2.9	3.7	14.8	9.0	12.9	647
deal, petit trafic	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	5
autres revenus illégaux	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	0.7	0.0	0.5	0.0	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	3
prostitution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1
assurance d'indemnités journalières	0.8	0.4	0.6	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.2	0.4	21
autre	1.2	1.2	1.2	1.5	2.6	1.8	2.0	0.0	1.6	0.7	0.6	0.7	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	51
N**	1'818	849	2'667	202	78	280	150	34	184	764	154	918	92	309	401	3'368	1'649	5'017	5'017
données manquantes	196	78	274	20	12	32	18	0	18	63	9	72	111	424	535	441	541	982	982
Taux d'activité principal (au cours des 30 derniers jours)*																			
activité à plein temps (dès 70%)	53.3	30.8	46.4	28.2	14.7	24.3	54.4	31.3	50.3	19.4	15.3	18.7	64.7	48.6	52.4	43.3	30.9	39.4	1'870
activité à temps partiel	4.2	19.4	8.8	3.2	8.0	4.6	3.4	6.3	3.9	2.3	3.3	2.5	4.7	28.3	22.7	3.6	18.8	8.4	399
jobs occasionnels	1.2	1.5	1.3	5.9	4.0	5.3	3.4	3.1	3.4	0.8	0.0	0.6	1.2	0.7	0.8	1.4	1.3	1.4	66
en formation	2.8	2.3	2.6	2.7	9.3	4.6	4.1	12.5	5.6	56.9	58.7	57.2	2.4	5.4	4.7	17.7	12.1	15.9	757
sans travail, en quête d'emploi	12.9	9.9	12.0	20.7	16.0	19.4	15.6	6.3	14.0	8.4	9.3	8.5	2.4	1.4	1.7	11.7	7.7	10.4	496
sans travail, sans recherche d'emploi	5.5	6.6	5.8	15.4	18.7	16.3	6.8	3.1	6.1	2.6	2.0	2.5	2.4	0.4	0.8	5.4	4.9	5.2	248
rentier/rentière	7.8	11.5	8.9	2.7	5.3	3.4	1.4	3.1	1.7	0.1	1.3	0.3	16.5	10.1	11.6	5.0	8.9	6.3	297
incapacité de travail	5.8	5.4	5.7	10.6	9.3	10.3	4.8	18.8	7.3	1.5	2.0	1.6	0.0	1.8	1.4	4.7	5.2	4.9	232
femme/homme au foyer	0.2	5.0	1.7	0.0	1.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.2	1.2	2.2	1.9	0.2	3.4	1.2	56
autre	6.4	7.6	6.7	10.6	13.3	11.4	6.1	15.6	7.8	7.9	7.3	7.8	4.7	1.1	1.9	7.0	6.7	6.9	327
N**	1'715	754	2'469	188	75	263	147	32	179	775	150	925	85	276	361	3'248	1'500	4'748	4'748
données manquantes	299	173	472	34	15	49	21	2	23	52	13	65	118	457	575	561	690	1'251	1'251

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T7 Revenu mensuel net et dettes à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2014)

	Patient-e-s: problème principale												Proches			Toutes prises en charge			N
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Revenu mensuel net (6 derniers mois)*																			
aucun revenu	46.8	50.9	48.0	60.0	66.7	61.7	42.6	50.0	43.4	48.4	69.0	51.1	97.4	87.5	90.6	51.5	63.1	54.9	756
moins de 1000 fr.	4.0	3.2	3.8	4.3	8.3	5.3	4.3	0.0	3.8	25.8	20.7	25.1	0.0	0.0	0.0	8.6	4.5	7.4	102
de 1001 à 2000 fr.	3.8	4.6	4.1	5.7	4.2	5.3	6.4	0.0	5.7	8.4	3.4	7.8	0.0	2.3	1.6	4.9	3.5	4.5	62
de 2001 à 3000 fr.	5.1	10.2	6.5	10.0	12.5	10.6	6.4	16.7	7.5	2.6	3.4	2.7	0.0	2.3	1.6	4.6	7.7	5.5	76
de 3001 à 4000 fr.	8.2	11.1	9.0	7.1	4.2	6.4	2.1	16.7	3.8	4.2	0.0	3.7	0.0	4.5	3.1	6.3	8.0	6.8	94
de 4001 à 5000 fr.	12.6	8.3	11.4	7.1	0.0	5.3	14.9	16.7	15.1	7.9	0.0	6.8	2.6	1.1	1.6	10.2	5.0	8.7	120
de 5001 à 6000 fr.	7.3	3.7	6.3	2.9	0.0	2.1	12.8	0.0	11.3	2.6	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	5.7	2.0	4.6	64
de 6001 à 8000 fr.	5.8	3.2	5.1	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	1.6	3.7	2.2	3.3	45
de 8001 à 10 000 fr.	4.6	3.2	4.2	2.9	4.2	3.2	6.4	0.0	5.7	0.0	3.4	0.5	0.0	0.0	0.0	3.3	3.2	3.3	45
de 10 001 à 15 000 fr.	1.1	0.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.5	0.7	9
plus de 15 000 fr.	0.7	0.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.4	5
N**	549	216	765	70	24	94	47	6	53	190	29	219	39	88	127	977	401	1'378	1'378
données manquantes	1'465	711	2'176	152	66	218	121	28	149	637	134	771	164	645	809	2'832	1'789	4'621	4'621
Dettes*																			
aucune dette	64.6	74.1	67.8	42.4	42.3	42.4	30.9	33.3	31.3	81.3	86.8	82.3	90.0	93.5	92.9	66.7	77.3	70.1	1'247
jusqu'à 5000 fr.	4.2	4.3	4.3	3.0	0.0	2.2	10.9	11.1	10.9	4.7	3.9	4.6	0.0	2.2	1.8	4.7	3.5	4.3	77
de 5001 à 10 000 fr.	10.3	10.0	10.2	15.2	23.1	17.4	20.0	11.1	18.8	5.6	3.9	5.3	5.0	2.2	2.7	9.5	8.3	9.2	163
de 10 001 à 25 000 fr.	7.6	4.7	6.6	15.2	3.8	12.0	10.9	0.0	9.4	3.9	2.6	3.7	0.0	0.0	0.0	7.1	3.5	6.0	106
de 25 001 à 50 000 fr.	5.8	3.3	4.9	7.6	19.2	10.9	9.1	22.2	10.9	2.5	1.3	2.3	5.0	2.2	2.7	5.0	4.1	4.7	84
de 50 001 à 100 000 fr.	2.7	1.7	2.4	7.6	7.7	7.6	7.3	0.0	6.3	0.6	1.3	0.7	0.0	0.0	0.0	3.0	1.6	2.5	45
plus de 100 000 fr.	1.7	0.3	1.2	3.0	0.0	2.2	5.5	0.0	4.7	0.8	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	1.7	0.2	1.2	22
montant inconnu	3.1	1.7	2.6	6.1	3.8	5.4	5.5	22.2	7.8	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	2.3	1.4	2.0	36
N**	590	301	891	66	26	92	55	9	64	359	76	435	20	92	112	1'215	565	1'780	1'780
données manquantes	1'424	626	2'050	156	64	220	113	25	138	468	87	555	183	641	824	2'594	1'625	4'219	4'219

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T8 Emprisonnement ou détention préventive avant l'admission et durée totale de détention, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2014)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Emprisonnement ou détention préventive*																
aucun-e	89.0	97.6	91.9	40.0	71.4	45.2	75.0	100.0	78.6	90.3	100.0	91.7	86.1	96.2	89.1	877
emprisonnement	3.6	0.8	2.7	20.0	14.3	19.0	4.2	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	3.9	1.4	3.2	31
détention préventive	4.8	1.6	3.7	14.3	14.3	14.3	12.5	0.0	10.7	6.8	0.0	5.8	5.9	2.1	4.8	47
emprisonnement et détention préventive	2.6	0.0	1.7	25.7	0.0	21.4	8.3	0.0	7.1	2.9	0.0	2.5	4.0	0.3	2.9	29
N**	502	248	750	35	7	42	24	4	28	103	18	121	692	292	984	984
données manquantes	1'512	679	2'191	187	83	270	144	30	174	724	145	869	2'914	1'165	4'079	4'079
Durée totale de détention***																
jusqu'à 1 mois	33.3	33.3	33.3	37.5	0.0	33.3	25.0	0.0	25.0	66.7	0.0	66.7	38.1	20.0	36.2	17
> 1 à 2 mois	4.2	0.0	3.7	0.0	100.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	20.0	4.3	2
> 2 à 6 mois	20.8	33.3	22.2	25.0	0.0	22.2	25.0	0.0	25.0	33.3	0.0	33.3	23.8	40.0	25.5	12
> 6 à 12 mois	12.5	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	6.4	3
plus de 1 an	29.2	33.3	29.6	37.5	0.0	33.3	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	28.6	20.0	27.7	13
N**	24	3	27	8	1	9	4	0	4	6	0	6	42	5	47	47
données manquantes	31	3	34	13	1	14	2	0	2	4	0	4	54	6	60	60

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant une expérience de détention. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T9 Instance d'envoi principale, selon le problème principal et chez les proches (2014)

Instance d'envoi principale*	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
condamnation/mesure/justice/police	14.9	6.0	12.1	8.6	8.4	8.6	15.9	8.8	14.7	47.7	32.7	45.3	2.8	2.0	2.1	20.6	6.5	15.5	876
cabinet médical	10.7	12.5	11.3	11.0	8.4	10.3	3.8	8.8	4.7	2.4	2.0	2.3	1.1	3.8	3.2	7.7	8.2	7.9	446
institution spécialisée dans les addictions	7.2	5.4	6.6	11.0	13.3	11.6	5.1	5.9	5.2	1.8	2.7	1.9	4.5	2.6	3.0	5.7	4.3	5.2	291
autre service médical/social/de santé	15.6	16.1	15.8	13.9	14.5	14.0	7.0	17.6	8.9	7.6	4.7	7.1	5.6	3.2	3.7	12.2	10.3	11.5	649
institution formatrice/éducative	0.5	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	2.7	3.4	1.1	0.3	0.5	1.3	0.9	1.2	67
employeur/employeuse	3.8	2.0	3.2	0.0	1.2	0.3	0.6	2.9	1.0	2.3	0.0	1.9	1.1	1.1	1.1	2.7	1.4	2.3	127
initiative personnelle/famille/amis	43.8	53.0	46.7	52.2	50.6	51.7	63.1	55.9	61.8	27.7	48.0	30.9	81.0	84.5	83.7	45.0	64.0	51.9	2'925
autre	3.6	4.2	3.8	3.3	3.6	3.4	4.5	0.0	3.7	7.0	7.3	7.0	2.8	2.7	2.7	4.7	4.5	4.6	259
N**	1'916	871	2'787	209	83	292	157	34	191	788	150	938	179	663	842	3'603	2'037	5'640	5'640
données manquantes	98	56	154	13	7	20	11	0	11	39	13	52	24	70	94	206	153	359	359

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T10 Prise en charge consécutive à une mesure judiciaire et type de mesure, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2014)

	Patient-e-s: problème principal												Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Prise en charge consécutive à une mesure judiciaire*																
non, pas de mesure	86.4	95.0	89.1	87.5	90.0	88.2	85.5	94.1	87.1	67.0	68.0	67.1	83.0	92.5	85.6	1'931
suspension/ renonciation/ réprimande (art 19a ch2 LStup)	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.2	12.3	8.0	11.7	2.6	0.8	2.1	47
oui, consécutive à une mesure	13.3	4.8	10.7	12.5	10.0	11.8	11.8	5.9	10.8	20.7	24.0	21.1	14.5	6.7	12.3	278
N**	1'030	462	1'492	104	40	144	76	17	93	300	50	350	1'632	624	2'256	2'256
données manquantes	984	465	1'449	118	50	168	92	17	109	527	113	640	1'974	833	2'807	2'807
Type de mesure judiciaire***																
mes. protect. méd. (art 19a ch3 LStup)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
mes. thérapeutiques institutionnelles (art 59 CP)	1.0	0.0	0.8	16.7	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.6	3
traitement résidentiel (art 60 CP)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
prise en charge ambulatoire	21.9	18.8	21.5	50.0	100.0	57.1	100.0	0.0	100.0	48.5	42.9	47.5	30.6	30.8	30.6	56
placement dans institution pour jeunes adultes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	14.3	7.5	1.9	3.8	2.2	4
en attente d'un jugement	1.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	0.0	10.0	5.1	0.0	4.4	8
autre	77.1	81.3	77.7	33.3	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	36.4	42.9	37.5	61.8	65.4	62.3	114
N**	105	16	121	6	1	7	4	0	4	33	7	40	157	26	183	183
données manquantes	35	7	42	7	3	10	7	1	8	66	9	75	121	21	142	142

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s dont le traitement est consécutif à une mesure judiciaire. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); Pourcentages par colonne

T11 Traitements/prises en charge avant l'admission et type de prises en charge antérieures, selon le problème principal et chez les proches (2014)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Prises en charge antérieures*																			
non	47.5	41.6	45.7	13.7	13.9	13.8	43.4	36.4	42.2	74.2	72.9	74.0	66.7	71.9	71.0	53.1	50.1	52.1	2'563
oui	52.5	58.4	54.3	86.3	86.1	86.2	56.6	63.6	57.8	25.8	27.1	26.0	33.3	28.1	29.0	46.9	49.9	47.9	2'352
N**	1'868	848	2'716	211	79	290	152	33	185	739	144	883	51	242	293	3'351	1'564	4'915	4'915
données manquantes	146	79	225	11	11	22	16	1	17	88	19	107	152	491	643	458	626	1'084	1'084
Type de prise en charge***																			
traitement avec prescription d'héroïne	1.2	0.5	1.0	9.3	8.8	9.2	3.8	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.9	1.6	26
substitution (méthadone, subutex)	4.3	3.8	4.1	58.8	70.6	61.8	5.7	30.0	9.5	2.5	8.0	3.4	12.5	1.6	3.8	9.5	8.1	9.1	145
autre traitement médicamenteux	7.3	7.1	7.2	9.3	14.7	10.7	9.4	10.0	9.5	1.6	8.0	2.7	0.0	0.0	0.0	6.8	7.3	7.0	112
prise en charge ambulatoire	72.8	73.9	73.2	69.1	67.6	68.7	83.0	80.0	82.5	83.6	80.0	83.0	93.8	84.4	86.3	75.0	75.9	75.3	1'207
structure/clinique de jour	1.8	2.7	2.1	3.1	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.8	4.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.5	1.9	1.7	27
traitement résidentiel	48.6	53.8	50.4	43.3	32.4	40.5	47.2	50.0	47.6	17.2	44.0	21.8	31.3	21.9	23.8	42.2	46.2	43.6	699
sev rage	40.1	46.7	42.4	47.4	50.0	48.1	34.0	40.0	34.9	15.6	20.0	16.3	18.8	15.6	16.3	35.6	38.1	36.5	584
groupe d'entraide ou d'auto-support	5.1	7.1	5.8	4.1	0.0	3.1	1.9	0.0	1.6	2.5	0.0	2.0	6.3	0.0	1.3	4.4	5.5	4.8	77
autre(s)	2.1	1.4	1.8	3.1	0.0	2.3	0.0	10.0	1.6	2.5	0.0	2.0	12.5	1.6	3.8	2.4	1.6	2.1	34
N**	673	364	1'037	97	34	131	53	10	63	122	25	147	16	64	80	1'037	565	1'602	1'602
données manquantes	312	135	447	87	34	121	33	11	44	71	14	85	1	5	6	543	223	766	766

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant une expérience de prise en charge antérieure. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

T12 Substitution ou prescription d'héroïne à l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2014)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			N
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Substitution ou prescription d'héroïne à l'admission*																
non	98.1	98.4	98.2	31.3	47.8	35.6	95.8	80.0	93.1	99.6	100.0	99.6	95.8	96.7	96.1	2'374
oui	1.9	1.6	1.8	68.7	52.2	64.4	4.2	20.0	6.9	0.4	0.0	0.4	4.2	3.3	3.9	97
N**	967	496	1'463	67	23	90	72	15	87	452	88	540	1'718	753	2'471	2'471
données manquantes	1'047	431	1'478	155	67	222	96	19	115	375	75	450	1'888	704	2'592	2'592
Type de substitution/prescription***																
héroïne	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.1	1
méthadone	88.2	87.5	88.0	73.3	91.7	77.2	100.0	33.3	66.7	100.0	0.0	100.0	78.3	84.0	79.8	75
autres opiacés	11.8	0.0	8.0	22.2	8.3	19.3	0.0	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	18.8	12.0	17.0	16
autres substances	0.0	12.5	4.0	2.2	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	4.0	2.1	2
N**	17	8	25	45	12	57	3	3	6	1	0	1	69	25	94	94
données manquantes	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	3	0	3	3
Traitement de substitution dans la vie?*																
non	96.2	96.6	96.3	33.5	31.5	32.9	95.7	72.0	91.5	98.6	97.4	98.4	91.3	91.2	91.3	2'966
oui	3.8	3.4	3.7	66.5	68.5	67.1	4.3	28.0	8.5	1.4	2.6	1.6	8.7	8.8	8.7	284
N**	1'334	648	1'982	185	73	258	116	25	141	439	77	516	2'287	963	3'250	3'250
données manquantes	680	279	959	37	17	54	52	9	61	388	86	474	1'319	494	1'813	1'813
Age lors du premier traitement de substitution****																
Moyenne	29.1	28.1	28.8	27.3	26.3	27.1	35.3	21.5	29.8	29.7	29.5	29.6	28.1	26.9	27.8	
Ecart-type	8.7	4.9	7.6	7.3	6.4	7.1	10.0	2.1	10.4	6.5	7.8	6.0	7.8	5.6	7.3	
25 centile	22.5	24.0	24.0	22.0	21.0	22.0	24.0	20.0	23.0	23.0	24.0	24.0	22.0	22.0	22.0	
Médiane	27.5	27.0	27.0	25.0	24.0	25.0	39.0	21.5	24.0	30.0	29.5	30.0	25.5	26.0	26.0	
75 centile	33.5	32.0	33.0	32.0	31.5	32.0	43.0	23.0	39.0	36.0	35.0	35.0	33.0	31.0	32.0	
N**	16	7	23	50	12	62	3	2	5	3	2	5	76	25	101	

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant signalé un traitement de substitution ou de prescription d'héroïne à l'admission. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant eu une expérience de substitution au cours de leur vie

T13 Problème principal à l'admission (seulement patient-e-s) (2014)

Tous patients et patientes												
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
	%	%	%	%	N	%	%	%	%	N		
Problème principal*												
alcool	55.9	63.6	58.1	2'941	alcool	55.9	63.6	58.1	2'941			
héroïne	5.3	4.5	5.1	257								
méthadone	0.6	1.1	0.8	39								
buprénorphine	0.1	0.1	0.1	3	opioïdes	6.2	6.2	6.2	312			
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0								
autres opioïdes	0.2	0.5	0.3	13								
cocaïne en poudre	4.3	2.2	3.7	187								
crack	0.3	0.1	0.3	14	cocaïne ou dérivés	4.7	2.3	4.0	202			
autre forme de cocaïne	0.0	0.0	0.0	1								
amphétamines	1.0	1.4	1.1	57								
méthamphétamines	0.0	0.0	0.0	1								
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.4	0.3	0.4	18	stimulants	1.4	1.8	1.5	78			
cathinones synthétiques	0.0	0.0	0.0	0								
autres stimulants	0.1	0.0	0.0	2								
barbituriques	0.0	0.0	0.0	0								
benzodiazépines	0.6	1.2	0.7	37	hypnotiques/sédatifs	0.7	1.4	0.9	44			
GHB/GBL	0.1	0.0	0.0	2								
autres somnifères et tranquillisants	0.1	0.2	0.1	5								
LSD	0.1	0.1	0.1	3								
kétamine	0.0	0.0	0.0	1	hallucinogènes	0.1	0.1	0.1	6			
autres hallucinogènes	0.0	0.1	0.0	2								
cannabis	22.9	11.2	19.6	990	cannabis	22.9	11.2	19.6	990			
tabac	2.8	4.7	3.3	169	tabac	2.8	4.7	3.3	169			
substances volatiles	0.0	0.1	0.0	2	autres substances	0.4	0.5	0.4	22			
autre substance	0.4	0.3	0.4	20								
jeu pathologique	2.5	1.2	2.1	107								
dépendances aux ordinateurs/Internet	1.6	0.4	1.2	63	comportement de type	5.0	8.2	5.9	299			
troubles alimentaires	0.2	5.2	1.7	84	addictif							
autre comportement de type addictif	0.7	1.3	0.9	45								
N**	3'606	1'457	5'063	5'063	3'606	1'457	5'063	5'063				
<i>données manquantes</i>	0	0	0	0	0	0	0	0				

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est p

T14 Usage de substances multiples et combinaisons de substances (2014)

Tous patients et patientes			
	Hommes	Femmes	Total
	%	%	%
Trouble lié à l'usage de substances multiples selon la CIM 10*			
oui	10.5	10.4	10.5
non	89.5	89.6	89.5
N**	1'625	603	2'228
<i>données manquantes</i>	1'981	854	2'835
Combinaisons de substances les plus fréquentes***			
can/alc	9.7	8.6	9.4
coc/alc	9.0	8.6	8.9
tab/alc	7.6	10.3	8.4
som/alc	4.1	17.2	7.9
tab/can/alc	6.9	1.7	5.4
can/coc	4.1	3.4	3.9
can/coc/alc	2.8	5.2	3.4
coc/op	2.8	3.4	3.0
som/op	2.8	3.4	3.0
op/alc	2.1	3.4	2.5
tab/op/alc	3.4	0.0	2.5
tab/coc/alc	1.4	5.2	2.5
coc/op/alc	2.1	1.7	2.0
som/op/alc	1.4	3.4	2.0
can/stim/alc	2.8	0.0	2.0
stim/coc/alc	0.7	3.4	1.5
can/stim	2.1	0.0	1.5
tab/can	1.4	1.7	1.5
tab/can/op/alc	1.4	1.7	1.5
tab/can/coc/op/alc	0.7	3.4	1.5
tab/can/stim/coc/alc	0.7	3.4	1.5
can/op	1.4	0.0	1.0
can/op/alc	1.4	0.0	1.0
tab/coc	1.4	0.0	1.0
tab/can/stim/coc	1.4	0.0	1.0
tab/can/stim/coc/op/alc	1.4	0.0	1.0
autres combinaisons	23.4	10.3	19.7
N**	145	58	203
<i>données manquantes</i>	25	5	30

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant un trouble lié à l'usage de substances multiples. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T15.1a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2014), hommes

Patient-e-s: principale substance posant problème									
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Fréquence de consommation 30 derniers jours (%)*									
chaque jour	40.5	39.8	12.0	19.5	58.3	0.0	31.8	88.8	75.0
4 à 6 jours par semaine	13.0	5.6	12.8	0.0	8.3	0.0	6.7	1.3	0.0
2 à 3 jours par semaine	13.9	14.3	22.4	17.1	0.0	0.0	16.5	1.3	25.0
1 jour par semaine ou moins	7.2	13.0	24.0	22.0	8.3	0.0	18.0	3.8	0.0
aucune consommation	25.3	27.3	28.8	41.5	25.0	0.0	27.0	5.0	0.0
N**	1'578	161	125	41	12	0	727	80	4
données manquantes	436	61	43	11	12	4	100	20	11

T15.1b Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2014), femmes

Fréquence de consommation 30 derniers jours (%)*									
chaque jour	41.9	36.7	33.3	23.8	70.0	0.0	41.0	90.5	100.0
4 à 6 jours par semaine	14.2	6.7	16.7	9.5	0.0	0.0	8.6	4.8	0.0
2 à 3 jours par semaine	14.1	10.0	16.7	19.0	0.0	0.0	17.3	1.6	0.0
1 jour par semaine ou moins	9.0	13.3	12.5	19.0	10.0	50.0	18.7	1.6	0.0
aucune consommation	20.8	33.3	20.8	28.6	20.0	50.0	14.4	1.6	0.0
N**	745	60	24	21	10	2	139	63	2
données manquantes	182	30	10	5	10	0	24	6	5

T15.1c Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2014), hommes et femmes

Fréquence de consommation 30 derniers jours (%)*									
chaque jour	40.9	38.9	15.4	21.0	63.6	0.0	33.3	89.5	83.3
4 à 6 jours par semaine	13.4	5.9	13.4	3.2	4.5	0.0	7.0	2.8	0.0
2 à 3 jours par semaine	14.0	13.1	21.5	17.7	0.0	0.0	16.6	1.4	16.7
1 jour par semaine ou moins	7.8	13.1	22.1	21.0	9.1	50.0	18.1	2.8	0.0
aucune consommation	23.9	29.0	27.5	37.1	22.7	50.0	24.9	3.5	0.0
N**	2'323	221	149	62	22	2	866	143	6
données manquantes	618	91	53	16	22	4	124	26	16

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T15.2a Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2014), hommes

	Patient-e-s: problème principal			
	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif
Fréquence d'apparition au cours des 30 derniers jours (%)*				
chaque jour	19.0	26.7	100.0	33.3
4 à 6 jours par semaine	6.3	0.0	0.0	0.0
2 à 3 jours par semaine	20.6	20.0	0.0	27.8
1 jour par semaine ou moins	25.4	26.7	0.0	11.1
aucune manifestation	28.6	26.7	0.0	27.8
N**	63	15	6	18
<i>données manquantes</i>	26	42	2	8

T15.2b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2014), femmes

Fréquence d'apparition au cours des 30 derniers jours (%)*				
chaque jour	0.0	100.0	56.9	50.0
4 à 6 jours par semaine	16.7	0.0	13.8	16.7
2 à 3 jours par semaine	16.7	0.0	19.0	16.7
1 jour par semaine ou moins	25.0	0.0	6.9	8.3
aucune manifestation	41.7	0.0	3.4	8.3
N**	12	2	58	12
<i>données manquantes</i>	6	4	18	7

T15.2c Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2014), hommes et femmes

Fréquence d'apparition au cours des 30 derniers jours (%)*				
chaque jour	16.0	35.3	60.9	40.0
4 à 6 jours par semaine	8.0	0.0	12.5	6.7
2 à 3 jours par semaine	20.0	17.6	17.2	23.3
1 jour par semaine ou moins	25.3	23.5	6.3	10.0
aucune manifestation	30.7	23.5	3.1	20.0
N**	75	17	64	30
<i>données manquantes</i>	32	46	20	15

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T16.1a Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2014),

Patients: principale substance posant problème									
Hommes	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Age lors de la première consommation									
moyenne	16.2	22.3	22.0	17.9	28.1	17.0	14.9	16.3	24.6
écart-type	3.6	7.2	7.0	3.6	10.1	.	2.4	3.8	7.7
1er quartile	14.0	17.0	18.0	16.0	17.5	17.0	14.0	14.0	20.0
valeur médiane	16.0	20.0	20.0	17.0	27.5	17.0	15.0	15.0	22.0
3e quartile	17.0	26.0	24.0	19.0	37.0	17.0	16.0	18.0	30.0
N*	943	138	107	27	12	1	551	46	5
données manquantes	1'071	84	61	25	12	3	276	54	10
Age lors du début de la consommation régulière									
moyenne	21.9	23.0	24.5	20.7	16.5	.	15.9	19.3	.
écart-type	7.7	6.9	8.3	5.4	2.1	.	2.6	5.9	.
1er quartile	17.0	18.0	19.0	17.0	15.0	.	15.0	16.0	.
valeur médiane	20.0	20.0	22.0	18.5	16.5	.	16.0	17.0	.
3e quartile	24.0	28.0	27.0	22.0	18.0	.	16.0	20.0	.
N*	725	78	62	18	2	0	363	43	0
données manquantes	1'289	144	106	34	22	4	464	57	15
Age lors du début de la consommation problématique									
moyenne	31.9	25.0	26.9	21.6	30.0	23.0	17.2	23.8	27.5
écart-type	12.6	7.5	8.0	6.2	10.3	.	4.5	11.6	10.4
1er quartile	21.0	19.0	20.5	17.0	18.0	23.0	15.0	16.0	20.0
valeur médiane	30.0	23.0	25.0	19.0	29.0	23.0	16.0	20.0	26.5
3e quartile	40.0	30.0	32.5	27.5	40.0	23.0	17.0	28.0	34.5
N*	1'003	130	100	28	15	1	510	50	8
données manquantes	1'011	92	68	24	9	3	317	50	7
Période de latence (en années)**									
moyenne	26.2	7.6	9.5	4.2	5.0	.	4.7	14.6	6.7
écart-type	13.6	6.2	7.2	3.8	.	.	5.7	15.6	3.4
1er quartile	14.9	3.7	3.6	0.9	5.0	.	1.3	1.8	2.8
valeur médiane	26.0	5.7	8.9	3.8	5.0	.	2.5	9.7	8.5
3e quartile	36.2	10.3	13.7	5.6	5.0	.	5.2	21.8	8.8
N*	445	16	51	16	1	0	397	28	3
données manquantes	442	13	15	12	4	1	151	33	7

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première consommation de la substance posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.1b Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2014),

Patientes: principale substance posant problème									
Femmes	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Age lors de la première consommation									
moyenne	17.5	20.5	23.8	17.1	30.3	15.5	14.8	15.7	30.3
écart-type	5.8	7.9	8.7	2.4	12.4	0.7	2.6	2.9	25.8
1er quartile	15.0	16.0	16.0	16.0	16.0	15.0	14.0	14.0	13.0
valeur médiane	16.0	18.0	20.5	16.5	30.0	15.5	14.0	15.0	18.0
3e quartile	18.0	22.0	30.5	19.0	37.0	16.0	16.0	17.0	60.0
N*	420	57	24	18	7	2	108	37	3
données manquantes	507	33	10	8	13	0	55	32	4
Age lors du début de la consommation régulière									
moyenne	26.5	21.5	25.6	18.6	31.6	16.0	17.4	20.4	16.5
écart-type	10.9	6.8	9.3	2.7	14.4	.	7.1	8.9	5.0
1er quartile	18.0	17.0	17.0	16.0	18.0	16.0	14.0	15.0	13.0
valeur médiane	22.0	20.0	25.0	19.0	27.0	16.0	15.0	17.0	16.5
3e quartile	31.0	23.5	34.0	21.0	40.0	16.0	17.0	20.0	20.0
N*	329	28	15	8	7	1	71	33	2
données manquantes	598	62	19	18	13	1	92	36	5
Age lors du début de la consommation problématique									
moyenne	34.9	23.9	26.0	19.6	35.7	16.0	18.0	24.4	27.5
écart-type	12.8	8.6	9.8	5.2	14.3	.	6.8	10.9	10.6
1er quartile	25.0	18.0	16.0	17.0	24.0	16.0	15.0	16.0	20.0
valeur médiane	35.0	21.0	25.0	17.5	37.0	16.0	16.0	20.0	27.5
3e quartile	45.0	28.0	35.0	21.0	50.0	16.0	18.0	30.0	35.0
N*	495	54	25	18	10	1	98	35	2
données manquantes	432	36	9	8	10	1	65	34	5
Période de latence (en années)**									
moyenne	26.1	4.1	4.9	3.7	14.1	.	4.8	19.7	32.9
écart-type	12.2	5.9	4.3	5.8	10.1	.	5.4	15.6	10.9
1er quartile	17.0	0.9	2.1	1.3	7.0	.	1.7	2.3	25.2
valeur médiane	25.9	1.6	3.2	1.7	14.1	.	2.7	18.2	32.9
3e quartile	34.8	2.4	10.0	3.1	21.2	.	5.2	32.9	40.6
N*	166	9	11	11	2	0	77	22	2
données manquantes	187	2	1	1	5	0	28	18	4

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première consommation de la substance posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.1c Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2014), hommes et femmes

Patient-e-s: principale substance posant problème									
Hommes & femmes	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Age lors de la première consommation									
moyenne	16.6	21.8	22.3	17.6	28.9	16.0	14.9	16.0	26.8
écart-type	4.5	7.4	7.4	3.2	10.7	1.0	2.4	3.4	15.3
1er quartile	15.0	17.0	18.0	16.0	17.0	15.0	14.0	14.0	17.0
valeur médiane	16.0	19.0	20.0	17.0	30.0	16.0	15.0	15.0	21.0
3e quartile	18.0	25.0	25.0	19.0	37.0	17.0	16.0	17.0	32.5
N*	1'363	195	131	45	19	3	659	83	8
données manquantes	1'578	117	71	33	25	3	331	86	14
Age lors du début de la consommation régulière									
moyenne	23.3	22.6	24.7	20.1	28.2	16	16.1	19.8	16.5
écart-type	9.1	6.9	8.4	4.8	14.2	.	3.7	7.3	5.0
1er quartile	18.0	18.0	19.0	16.0	18.0	16	15.0	15.0	13.0
valeur médiane	20.0	20.0	22.0	18.5	25.0	16	16.0	17.0	16.5
3e quartile	25.0	25.0	28.0	22.0	38.0	16	16.0	20.0	20.0
N*	1'054	106	77	26	9	1	434	76	2
données manquantes	1'887	206	125	52	35	5	556	93	20
Age lors du début de la consommation problématique									
moyenne	32.9	24.7	26.7	20.8	32.3	19.5	17.4	24.1	27.5
écart-type	12.7	7.8	8.3	5.9	12.1	5.0	5.0	11.3	9.9
1er quartile	22.0	19.0	20.0	17.0	24.0	16.0	15.0	16.0	20.0
valeur médiane	30.0	22.0	25.0	18.5	30.0	19.5	16.0	20.0	26.5
3e quartile	40.0	30.0	33.0	23.0	40.0	23.0	17.0	30.0	35.0
N*	1'498	184	125	46	25	2	608	85	10
données manquantes	1'443	128	77	32	19	4	382	84	12
Période de latence (en années)**									
moyenne	26.2	6.4	8.7	4.0	11.1	.	4.7	16.8	17.2
écart-type	13.3	6.2	7.0	4.6	8.9	.	5.6	15.6	15.6
1er quartile	15.4	1.1	3.0	1.0	5.0	.	1.4	2.2	8.5
valeur médiane	26.0	4.6	7.4	2.7	7.0	.	2.5	14.7	8.8
3e quartile	35.6	9.2	12.5	4.9	21.2	.	5.2	30.0	25.2
N*	611	25	62	27	3	0	474	50	5
données manquantes	629	15	16	13	9	1	179	51	11

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première consommation de la substance posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.2a Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2014), hommes

Patients: problème principal				
<i>Hommes</i>	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif
Age lors de la première apparition				
moyenne	23.6	18.3	19.0	23.5
écart-type	9.4	9.8	8.5	15.5
1er quartile	18.0	13.0	13.0	13.0
valeur médiane	21.0	14.0	19.0	17.0
3e quartile	28.0	19.0	25.0	30.5
N*	48	23	2	8
<i>données manquantes</i>	41	34	6	18
Age lors du début de l'apparition régulière				
moyenne	24.8	17.6	19.5	25.0
écart-type	7.6	5.1	7.8	10.0
1er quartile	20.0	14.0	14.0	18.0
valeur médiane	22.0	16.0	19.5	22.5
3e quartile	28.0	19.0	25.0	32.0
N*	21	22	2	4
<i>données manquantes</i>	68	35	6	22
Age lors du début de l'apparition problématique				
moyenne	28.4	21.4	20.8	24.6
écart-type	10.4	10.0	5.7	14.4
1er quartile	20.0	15.0	16.0	15.0
valeur médiane	26.0	16.5	21.5	19.0
3e quartile	32.0	25.0	25.5	30.5
N*	53	28	4	8
<i>données manquantes</i>	36	29	4	18
Période de latence (en années)**				
moyenne	8.2	6.4	.	11.1
écart-type	6.1	5.9	.	9.1
1er quartile	2.7	2.1	.	4.2
valeur médiane	8.7	4.8	.	8.5
3e quartile	12.1	8.3	.	13.2
N*	28	13	0	7
<i>données manquantes</i>	20	27	4	12

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première apparition du comportement posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.2b Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2014), femmes

Patientes: problème principal				
Femmes	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif
Age lors de la première apparition				
moyenne	41.3	35.0	18.1	24.1
écart-type	13.3	.	5.8	13.6
1er quartile	30.0	35.0	15.0	15.0
valeur médiane	38.0	35.0	16.0	20.0
3e quartile	56.0	35.0	20.0	38.0
N*	3	1	45	7
<i>données manquantes</i>	15	5	31	12
Age lors du début de l'apparition régulière				
moyenne	37.0	30.3	17.3	6.0
écart-type	6.4	14.5	3.6	.
1er quartile	32.0	16.0	15.0	6.0
valeur médiane	37.0	30.0	17.0	6.0
3e quartile	40.0	45.0	18.0	6.0
N*	5	3	31	1
<i>données manquantes</i>	13	3	45	18
Age lors du début de l'apparition problématique				
moyenne	42.1	35.0	19.3	27.6
écart-type	10.8	21.2	5.8	13.2
1er quartile	32.0	20.0	16.0	17.5
valeur médiane	40.0	35.0	18.0	29.0
3e quartile	55.0	50.0	22.0	39.0
N*	7	2	45	8
<i>données manquantes</i>	11	4	31	11
Période de latence (en années)**				
moyenne	10.5	20.3	10.6	10.8
écart-type	2.6	.	11.6	13.3
1er quartile	8.2	20.3	1.6	0.1
valeur médiane	10.0	20.3	5.6	6.7
3e quartile	13.3	20.3	15.3	25.7
N*	3	1	22	3
<i>données manquantes</i>	8	4	16	6

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première apparition du comportement posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.2c Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2014), hommes et femmes

Patient-e-s: problème principal				
Hommes et femmes	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif
Age lors de la première apparition				
moyenne	24.7	19.0	18.1	23.8
écart-type	10.4	10.2	5.8	14.1
1er quartile	18.0	13.0	14.0	14.0
valeur médiane	22.0	14.0	16.0	18.0
3e quartile	30.0	20.0	20.0	38.0
N*	51	24	47	15
données manquantes	56	39	37	30
Age lors du début de l'apparition régulière				
moyenne	27.2	19.1	17.5	21.2
écart-type	8.8	7.6	3.8	12.2
1er quartile	20.0	15.0	15.0	16.0
valeur médiane	24.0	16.0	17.0	20.0
3e quartile	31.0	20.0	18.0	25.0
N*	26	25	33	5
données manquantes	81	38	51	40
Age lors du début de l'apparition problématique				
moyenne	30.0	22.3	19.4	26.1
écart-type	11.3	11.0	5.7	13.5
1er quartile	20.5	15.0	16.0	15.5
valeur médiane	26.5	17.0	18.0	23.5
3e quartile	36.5	25.0	23.0	37.0
N*	60	30	49	16
données manquantes	47	33	35	29
Période de latence (en années)**				
moyenne	8.4	7.4	10.6	11.1
écart-type	5.9	6.8	11.6	9.7
1er quartile	2.7	2.1	1.6	4.2
valeur médiane	8.8	5.3	5.6	7.6
3e quartile	12.7	10.2	15.3	13.2
N*	31	14	22	10
données manquantes	28	31	20	18

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première apparition du comportement posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T17 Mode d'administration prédominant de la principale substance posant problème avant l'admission (2014)

Patient-e-s: principale substance posant problème															
	Héroïne			Cocaïne			Amphétamines			Cannabis			Benzodiazépines		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Mode d'administration*															
injection	27.4	45.7	32.4	5.6	23.1	8.7	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0
fumée/inhalation	40.3	30.4	37.6	12.9	7.7	12.0	13.0	11.8	12.5	97.6	99.3	97.9	0.0	0.0	0.0
ingestion (manger/boire)	5.6	4.3	5.3	2.4	0.0	2.0	34.8	23.5	30.0	0.7	0.7	0.7	92.9	100.0	96.3
sniff	25.8	19.6	24.1	78.2	69.2	76.7	52.2	64.7	57.5	0.3	0.0	0.2	7.1	0.0	3.7
autre	0.8	0.0	0.6	0.8	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
N**	124	46	170	124	26	150	23	17	40	672	137	809	14	13	27
<i>données manquantes</i>	67	20	87	31	6	37	13	4	17	155	26	181	6	4	10

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T18.1 Prévalence à vie, sur les 30 derniers jours et sur les 12 derniers mois avant l'admission des injections et échange de matériel d'injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2014)

	Patient-e-s: principale substance posant problème												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Injections au cours de la vie*																
oui	4.5	3.8	4.3	54.0	67.7	57.8	12.5	31.0	16.3	1.9	1.6	1.9	7.4	7.6	7.5	275
non	94.6	95.5	94.9	42.3	32.3	39.6	85.7	65.5	81.6	97.6	98.4	97.7	91.5	91.5	91.5	3'372
ne veut pas répondre	0.8	0.7	0.8	3.7	0.0	2.7	1.8	3.4	2.1	0.5	0.0	0.4	1.1	0.9	1.0	38
N**	1'438	706	2'144	163	62	225	112	29	141	630	124	754	2'583	1'102	3'685	3'685
données manquantes	576	221	797	59	28	87	56	5	61	197	39	236	1'023	355	1'378	1'378
Injections au cours des 12 derniers mois*																
oui	1.0	0.6	0.9	28.2	36.0	30.5	5.8	19.2	8.5	0.2	0.0	0.1	2.4	2.5	2.5	87
non	99.0	99.4	99.1	71.8	64.0	69.5	94.2	80.8	91.5	99.8	100.0	99.9	97.6	97.5	97.5	3'463
N**	1'404	690	2'094	124	50	174	104	26	130	622	122	744	2'487	1'063	3'550	3'550
données manquantes	610	237	847	98	40	138	64	8	72	205	41	246	1'119	394	1'513	1'513
Injections au cours des 30 derniers jours*																
oui	0.8	0.4	0.7	23.9	26.4	24.6	4.8	16.0	6.9	0.2	0.0	0.1	2.1	2.0	2.1	74
non	99.2	99.6	99.3	76.1	73.6	75.4	95.2	84.0	93.1	99.8	100.0	99.9	97.9	98.0	97.9	3'520
N**	1'421	698	2'119	134	53	187	105	25	130	625	123	748	2'518	1'076	3'594	3'594
données manquantes	593	229	822	88	37	125	63	9	72	202	40	242	1'088	381	1'469	1'469
Echange de matériel d'injection au cours de la vie***																
oui	43.8	20.0	38.1	23.8	80.0	41.9	80.0	66.7	75.0	50.0	0.0	50.0	37.3	57.9	42.9	30
non	50.0	60.0	52.4	71.4	10.0	51.6	0.0	33.3	12.5	50.0	0.0	50.0	56.9	31.6	50.0	35
ne veut pas répondre	6.3	20.0	9.5	4.8	10.0	6.5	20.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	5.9	10.5	7.1	5
N**	16	5	21	21	10	31	5	3	8	4	0	4	51	19	70	70
données manquantes	42	20	62	49	23	72	7	5	12	8	2	10	111	52	163	163
Echange de matériel d'injection au cours des 12 derniers mois****																
oui	0.0	0.0	0.0	4.0	26.7	12.5	40.0	0.0	22.2	0.0	0.0	0.0	4.8	12.1	7.4	7
non	100.0	100.0	100.0	96.0	73.3	87.5	60.0	100.0	77.8	100.0	100.0	100.0	95.2	87.9	92.6	88
N**	26	11	37	25	15	40	5	4	9	5	1	6	62	33	95	95
données manquantes	32	14	46	45	18	63	7	4	11	7	1	8	100	38	138	138
Echange de matériel d'injection au cours des 30 derniers jours*****																
oui	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	3.7	1
non	100.0	100.0	100.0	100.0	83.3	93.8	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	88.9	96.3	26
N**	4	1	5	10	6	16	3	2	5	1	0	1	18	9	27	27
données manquantes	54	24	78	60	27	87	9	6	15	11	2	13	144	62	206	206

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours de leur vie. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours des 12 derniers mois. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

***** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours des 30 derniers jours. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T18.2 Âge lors de la première injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2014)

	Patient-e-s: principale substance posant problème												Tous patient-e-s			N
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
Age lors de la première injection*																
jusqu'à 14 ans	0.0	25.0	5.0	2.1	18.2	7.1	16.7	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	3.1	21.1	8.1	11
de 15 à 16 ans	12.5	0.0	10.0	4.2	13.6	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	7.9	6.6	9
de 17 à 18 ans	31.3	37.5	32.5	27.1	31.8	28.6	66.7	33.3	55.6	0.0	100.0	16.7	28.6	36.8	30.9	42
de 19 à 20 ans	31.3	0.0	25.0	12.5	4.5	10.0	0.0	0.0	0.0	60.0	0.0	50.0	21.4	2.6	16.2	22
de 21 à 25 ans	18.8	37.5	22.5	37.5	13.6	30.0	16.7	0.0	11.1	20.0	0.0	16.7	27.6	15.8	24.3	33
de 26 à 30 ans	3.1	0.0	2.5	4.2	4.5	4.3	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	16.7	5.1	5.3	5.1	7
de 31 à 39 ans	3.1	0.0	2.5	12.5	13.6	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	10.5	8.8	12
dès 40 ans	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
N**	32	8	40	48	22	70	6	3	9	5	1	6	98	38	136	136
<i>données manquantes</i>	33	19	52	40	20	60	8	6	14	7	1	8	93	46	139	139

* Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours de leur vie. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T19.1a Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2014), hommes
Hommes

	Patients: principale substance posant problème								
	Alcool	Opioïdes	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Autres problèmes*									
alcool	-	15.8	16.4	10.0	30.0	33.3	7.2	26.6	8.3
héroïne	0.9	1.9	5.7	2.0	20.0	33.3	0.6	1.1	0.0
méthadone	0.2	6.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	0.0
buprénorphine	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres opioïdes	0.1	0.5	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaïne en poudre	2.3	14.4	2.5	6.0	10.0	33.3	3.4	5.3	0.0
crack	0.2	0.5	1.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
autre forme de cocaïne	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0
amphétamines	0.5	1.4	4.4	2.0	0.0	33.3	1.4	2.1	0.0
méthamphétamines	0.2	0.5	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.5	0.5	3.1	10.0	0.0	33.3	1.1	2.1	0.0
cathinones synthétiques	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.1	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.1	0.0	0.0
benzodiazépines	0.9	8.1	1.9	0.0	10.0	0.0	0.1	2.1	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.2	0.5	0.6	4.0	0.0	0.0	0.5	1.1	0.0
kétamine	0.1	0.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	0.0
autres hallucinogènes	0.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	0.0
cannabis	4.8	14.8	16.4	14.0	10.0	66.7	-	20.2	0.0
tabac	10.5	14.8	12.6	2.0	5.0	0.0	9.8	-	0.0
autre substance	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0
jeu pathologique	0.2	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0
dépendances aux ordinateurs/Internet	0.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.4	5.3	0.0
troubles alimentaires	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autre comportement de type addictif	0.2	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
aucun autre problème addictif	84.8	61.7	66.7	68.0	45.0	0.0	82.8	55.3	91.7
N**	1'847	209	159	50	20	3	793	94	12
<i>données manquantes</i>	167	13	9	2	4	1	34	6	3

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.1b Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2014), femmes

Femmes

Patientes: principale substance posant problème									
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Autres problèmes*									
alcool	-	11.1	12.9	8.3	29.4	0.0	5.2	10.1	0.0
héroïne	0.7	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
méthadone	0.4	3.7	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0
buprénorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres opioïdes	0.4	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaïne en poudre	0.7	13.6	0.0	20.8	5.9	0.0	3.2	4.3	0.0
crack	0.1	1.2	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autre forme de cocaïne	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.5	2.5	3.2	8.3	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0
méthamphétamines	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.4	1.2	3.2	4.2	5.9	0.0	3.2	0.0	0.0
cathinones synthétiques	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	1.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	2.7	8.6	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0
GHB/GBL	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.1	1.2	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	1.2	0.0	4.2	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
kétamine	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cannabis	2.7	14.8	9.7	16.7	5.9	0.0	-	10.1	16.7
tabac	8.7	17.3	6.5	12.5	11.8	0.0	9.7	-	16.7
autre substance	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
jeu pathologique	0.0	1.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0
dépendances aux ordinateurs/Internet	0.1	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
troubles alimentaires	0.9	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7
autre comportement de type addictif	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
aucun autre problème addictif	84.8	67.9	67.7	62.5	52.9	100.0	85.2	81.2	83.3
N**	851	81	31	24	17	2	155	69	6
données manquantes	76	9	3	2	3	0	8	0	1

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.1c Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2014), hommes et femmes
Hommes et femmes

	Patient-e-s: principale substance posant problème								
	Alcool	Opioïdes	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Autres problèmes*									
alcool	-	14.5	15.8	9.5	29.7	20.0	6.9	19.6	5.6
héroïne	0.8	1.4	5.8	1.4	10.8	20.0	0.5	0.6	0.0
méthadone	0.2	5.9	0.5	0.0	2.7	0.0	0.2	0.6	0.0
buprénorphine	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres opioïdes	0.1	0.7	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaïne en poudre	1.8	14.1	2.1	10.8	8.1	20.0	3.4	4.9	0.0
crack	0.2	0.7	2.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
autre forme de cocaïne	0.0	0.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0
amphétamines	0.5	1.7	4.2	4.1	0.0	20.0	1.4	1.2	0.0
méthamphétamines	0.1	0.3	1.1	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.5	0.7	3.2	8.1	2.7	20.0	1.5	1.2	0.0
cathinones synthétiques	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.3	0.5	0.0	2.7	0.0	0.1	0.0	0.0
benzodiazépines	1.5	8.3	2.1	0.0	5.4	0.0	0.1	3.1	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.1	0.7	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.1	0.7	0.5	4.1	0.0	0.0	0.5	0.6	0.0
kétamine	0.1	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.0
autres hallucinogènes	0.0	0.7	0.0	1.4	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.0
cannabis	4.1	14.8	15.3	14.9	8.1	40.0	-	16.0	5.6
tabac	9.9	15.5	11.6	5.4	8.1	0.0	9.8	-	5.6
autre substance	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0
jeu pathologique	0.1	0.3	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0
dépendances aux ordinateurs/Internet	0.3	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.3	3.1	0.0
troubles alimentaires	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6
autre comportement de type addictif	0.2	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
aucun autre problème addictif	84.8	63.4	66.8	66.2	48.6	40.0	83.2	66.3	88.9
N**	2'698	290	190	74	37	5	948	163	18
données manquantes	243	22	12	4	7	1	42	6	4

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.2a Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2014), hommes

Hommes

Patients: problème principal				
	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif
	%		%	%
Autres problèmes*				
alcool	0.0	0.0	33.3	0.0
héroïne	0.0	0.0	0.0	0.0
méthadone	0.0	0.0	0.0	0.0
buprénorphine	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0
autres opioïdes	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaïne en poudre	0.0	0.0	0.0	0.0
crack	0.0	0.0	0.0	0.0
autre forme de cocaïne	0.0	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.0	0.0	0.0	0.0
méthamphétamines	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.0	0.0	0.0	0.0
cathinones synthétiques	0.0	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	0.0	0.0	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
kétamine	0.0	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.0
cannabis	1.3	0.0	0.0	0.0
tabac	1.3	2.0	16.7	4.8
autre substance	0.0	0.0	16.7	0.0
jeu pathologique	-	0.0	0.0	4.8
dépendances aux ordinateurs/Internet	7.5	-	0.0	4.8
troubles alimentaires	0.0	0.0	-	0.0
autre comportement de type addictif	0.0	60.0	0.0	-
aucun autre problème addictif	91.3	38.0	66.7	90.5
N**	80	50	6	21
<i>données manquantes</i>	9	7	2	5

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.2b Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2014), femmes
Femmes

Patientes: problème principal				
	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif
	%		%	%
Autres problèmes*				
alcool	7.1	0.0	0.0	0.0
héroïne	0.0	0.0	0.0	0.0
méthadone	0.0	0.0	0.0	0.0
buprénorphine	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0
autres opioïdes	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaïne en poudre	0.0	0.0	0.0	0.0
crack	0.0	0.0	0.0	0.0
autre forme de cocaïne	0.0	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.0	0.0	0.0	0.0
méthamphétamines	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.0	0.0	0.0	0.0
cathinones synthétiques	0.0	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	0.0	0.0	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
kétamine	0.0	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.0
cannabis	0.0	0.0	0.0	0.0
tabac	0.0	0.0	1.5	0.0
autre substance	0.0	0.0	0.0	0.0
jeu pathologique	-	0.0	0.0	0.0
dépendances aux ordinateurs/Internet	0.0	-	0.0	0.0
troubles alimentaires	0.0	0.0	-	0.0
autre comportement de type addictif	0.0	60.0	0.0	-
aucun autre problème addictif	92.9	40.0	98.5	100.0
N**	14	5	65	15
<i>données manquantes</i>	4	1	11	4

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.2c Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2014), hommes et femmes

Hommes et femmes

	Patient-e-s: problème principal			
	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	autre comportement de type addictif
	%		%	%
Autres problèmes*				
alcool	1.1	0.0	2.8	0.0
héroïne	0.0	0.0	0.0	0.0
méthadone	0.0	0.0	0.0	0.0
buprénorphine	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0
autres opioïdes	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaïne en poudre	0.0	0.0	0.0	0.0
crack	0.0	0.0	0.0	0.0
autre forme de cocaïne	0.0	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.0	0.0	0.0	0.0
méthamphétamines	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.0	0.0	0.0	0.0
cathinones synthétiques	0.0	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	0.0	0.0	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
kétamine	0.0	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.0
cannabis	1.1	0.0	0.0	0.0
tabac	1.1	1.8	2.8	2.8
autre substance	0.0	0.0	1.4	0.0
jeu pathologique	-	0.0	0.0	2.8
dépendances aux ordinateurs/Internet	6.4	-	0.0	2.8
troubles alimentaires	0.0	0.0	-	0.0
autre comportement de type addictif	0.0	60.0	0.0	-
aucun autre problème addictif	91.5	38.2	95.8	94.4
N**	94	55	71	36
<i>données manquantes</i>	13	8	13	9

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T20.1a Fréquence de consommation des substances secondaires selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2014)

	Patient-e-s: problème principal															Tous problèmes principaux						
	Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			Hommes	Femmes	Total	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%					
Alcool*	Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hypnotiques/sédatifs			comportement addictif									
chaque jour	39.3	14.3	34.3	25.0	0.0	21.7	18.4	14.3	17.9	25.0	0.0	16.7	100.0	0.0	100.0	26.9	16.0	25.2	39			
4 à 6 jours par semaine	3.6	0.0	2.9	20.0	0.0	17.4	6.1	14.3	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	4.0	5.8	9			
2 à 3 jours par semaine	7.1	42.9	14.3	15.0	0.0	13.0	22.4	42.9	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	28.0	16.8	26			
1 jour par semaine ou moins	25.0	28.6	25.7	30.0	33.3	30.4	32.7	28.6	32.1	0.0	50.0	16.7	0.0	0.0	0.0	27.7	28.0	27.7	43			
aucune consomm.	25.0	14.3	22.9	10.0	66.7	17.4	20.4	0.0	17.9	75.0	50.0	66.7	0.0	0.0	0.0	24.6	24.0	24.5	38			
N**	28	7	35	20	3	23	49	7	56	4	2	6	2	0	2	130	25	155	155			
données manquantes	194	83	277	148	31	179	778	156	934	20	18	38	178	119	297	3'679	2'165	5'844	5'844			
Opioides*	Alcool			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hypnotiques/sédatifs			comportement addictif									
chaque jour	15.4	0.0	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	11.5	0.0	10.0	3			
4 à 6 jours par semaine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
2 à 3 jours par semaine	0.0	0.0	0.0	66.7	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	0.0	13.3	4			
1 jour par semaine ou moins	38.5	25.0	35.3	16.7	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	25.0	23.3	7			
aucune consomm.	46.2	75.0	52.9	16.7	0.0	16.7	100.0	0.0	100.0	66.7	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	50.0	75.0	53.3	16			
N**	13	4	17	6	0	6	2	0	2	3	0	3	0	0	0	26	4	30	30			
données manquantes	2'001	923	2'924	162	34	196	825	163	988	21	20	41	180	119	299	3'783	2'186	5'969	5'969			
Cocaïne et dérivés*	Alcool			Opioides			Cannabis			Hypnotiques/sédatifs			comportement addictif									
chaque jour	0.0	25.0	2.6	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.5	2.9	3			
4 à 6 jours par semaine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.0	1			
2 à 3 jours par semaine	5.9	25.0	7.9	26.3	12.5	22.2	4.5	20.0	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	18.2	11.4	12			
1 jour par semaine ou moins	32.4	50.0	34.2	21.1	25.0	22.2	31.8	60.0	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.7	36.4	29.5	31			
aucune consomm.	61.8	0.0	55.3	52.6	62.5	55.6	59.1	20.0	51.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.0	40.9	55.2	58			
N**	34	4	38	19	8	27	22	5	27	1	0	1	0	0	0	83	22	105	105			
données manquantes	1'980	923	2'903	203	82	285	805	158	963	23	20	43	180	119	299	3'726	2'168	5'894	5'894			
Cannabis*	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Hypnotiques/sédatifs			comportement addictif									
chaque jour	32.9	44.4	35.1	44.0	33.3	41.2	45.8	33.3	44.4	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	35.1	36.6	35.4	69			
4 à 6 jours par semaine	10.5	16.7	11.7	16.0	11.1	14.7	12.5	0.0	11.1	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	13.6	12.2	13.3	26			
2 à 3 jours par semaine	14.5	11.1	13.8	20.0	33.3	23.5	12.5	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	17.1	15.9	31			
1 jour par semaine ou moins	13.2	22.2	14.9	8.0	0.0	5.9	8.3	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	13.6	12.2	13.3	26			
aucune consomm.	28.9	5.6	24.5	12.0	22.2	14.7	20.8	66.7	25.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.1	22.0	22.1	43			
N**	76	18	94	25	9	34	24	3	27	2	0	2	1	0	1	154	41	195	195			
données manquantes	1'938	909	2'847	197	81	278	144	31	175	22	20	42	179	119	298	3'655	2'149	5'804	5'804			

* En tant que problème secondaire; pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T20.1b Fréquence de consommation des substances secondaires selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2014)

	Patient-e-s: problème principal															Tous problèmes principaux			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			comportement de type addictif			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
Autres stimulants*																			
chaque jour	12.5	33.3	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	7.4	20.0	9.4	3
4 à 6 jours par semaine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
2 à 3 jours par semaine	25.0	0.0	18.2	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	16.7	11.1	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	14.8	0.0	12.5	4
1 jour par semaine ou moins	12.5	66.7	27.3	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	33.3	44.4	50.0	45.5	0.0	0.0	0.0	25.9	60.0	31.3	10
aucune consomm.	50.0	0.0	36.4	100.0	0.0	100.0	50.0	0.0	50.0	33.3	50.0	36.4	0.0	0.0	0.0	51.9	20.0	46.9	15
N**	8	3	11	3	0	3	6	0	6	9	2	11	0	0	0	27	5	32	32
données manquantes	2'006	924	2'930	219	90	309	162	34	196	818	161	979	180	119	299	3'782	2'185	5'967	5'967
Hypnotiques/sédatifs*																			
chaque jour	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
4 à 6 jours par semaine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
2 à 3 jours par semaine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
1 jour par semaine ou moins	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
aucune consomm.	100.0	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	2
N**	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
données manquantes	2'013	927	2'940	222	89	311	168	34	202	827	163	990	180	119	299	3'808	2'189	5'997	5'997
Hallucinogènes*																			
chaque jour	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
4 à 6 jours par semaine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
2 à 3 jours par semaine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
1 jour par semaine ou moins	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	23.1	3
aucune consomm.	66.7	0.0	66.7	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	66.7	100.0	75.0	0.0	0.0	0.0	70.0	100.0	76.9	10
N**	3	0	3	1	1	2	0	0	0	3	1	4	0	0	0	10	3	13	13
données manquantes	2'011	927	2'938	221	89	310	168	34	202	824	162	986	180	119	299	3'799	2'187	5'986	5'986
Autres substances*																			
chaque jour	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
4 à 6 jours par semaine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
2 à 3 jours par semaine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	25.0	1
1 jour par semaine ou moins	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
aucune consomm.	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	66.7	100.0	75.0	3
N**	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	3	1	4	4
données manquantes	2'014	926	2'940	222	90	312	168	34	202	825	163	988	180	119	299	3'806	2'189	5'995	5'995

* En tant que problème secondaire; pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T21 Fréquence de la consommation d'alcool, nombre de boissons standards par jour et fréquence de fortes consommations d'alcool avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2014)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Fréquence de la consommation d'alcool*																
jamais	11.6	9.2	10.8	10.4	20.8	13.2	13.0	18.2	13.8	19.0	21.5	19.4	14.2	13.1	13.9	372
1 fois par mois ou moins	1.6	3.8	2.3	17.9	20.8	18.7	10.1	9.1	10.0	26.8	27.8	26.9	9.2	8.2	8.9	239
2 à 4 fois par mois	6.0	7.3	6.4	22.4	25.0	23.1	26.1	45.5	28.8	33.9	38.0	34.5	14.5	13.1	14.1	376
2 à 3 fois par semaine	17.9	17.7	17.8	17.9	16.7	17.6	27.5	27.3	27.5	14.9	8.9	14.0	17.6	17.0	17.4	465
4 fois ou plus par semaine	63.0	61.9	62.7	31.3	16.7	27.5	23.2	0.0	20.0	5.5	3.8	5.2	44.5	48.5	45.7	1'220
N**	1'208	586	1'794	67	24	91	69	11	80	422	79	501	1'895	777	2'672	2'672
données manquantes	806	341	1'147	155	66	221	99	23	122	405	84	489	1'711	680	2'391	2'391
Nbre de boissons standards par jour***																
1 ou 2	6.2	5.8	6.1	44.6	44.4	44.6	42.0	42.9	42.1	51.6	65.3	53.4	19.5	16.5	18.6	405
3 ou 4	19.2	18.3	18.9	25.0	16.7	23.0	26.0	42.9	28.1	32.8	22.4	31.4	23.8	19.1	22.5	489
5 ou 6	22.9	25.0	23.6	17.9	11.1	16.2	18.0	14.3	17.5	11.8	6.1	11.0	19.3	21.3	19.9	432
7 à 9	21.9	26.8	23.5	5.4	16.7	8.1	10.0	0.0	8.8	0.6	4.1	1.1	15.8	22.8	17.8	387
10 ou plus	29.8	24.2	28.0	7.1	11.1	8.1	4.0	0.0	3.5	3.2	2.0	3.0	21.6	20.2	21.2	462
N**	1'045	504	1'549	56	18	74	50	7	57	314	49	363	1'552	623	2'175	2'175
données manquantes	969	423	1'392	166	72	238	118	27	145	513	114	627	2'054	834	2'888	2'888
Fréquence de fortes consom. d'alcool***																
jamais	14.2	14.2	14.2	29.3	55.6	35.5	37.0	62.5	40.3	60.8	66.7	61.6	28.0	27.3	27.8	659
moins d'une fois par mois	8.5	9.1	8.7	36.2	11.1	30.3	22.2	0.0	19.4	22.9	20.0	22.5	13.9	10.2	12.8	304
1 fois par mois	12.2	9.7	11.4	8.6	11.1	9.2	14.8	37.5	17.7	9.4	6.7	9.0	11.3	9.1	10.6	252
1 fois par semaine	26.6	29.0	27.4	17.2	5.6	14.5	14.8	0.0	12.9	5.2	5.0	5.2	20.3	23.4	21.2	502
presque chaque jour	38.4	38.1	38.3	8.6	16.7	10.5	11.1	0.0	9.7	1.7	1.7	1.7	26.7	30.1	27.6	656
N**	1'104	528	1'632	58	18	76	54	8	62	362	60	422	1'688	685	2'373	2'373
données manquantes	910	399	1'309	164	72	236	114	26	140	465	103	568	1'918	772	2'690	2'690

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une consommation d'alcool. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T22 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 derniers jours avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2014)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Fréquence de la consommation de tabac*																
jamais	34.1	38.5	35.5	6.1	7.4	6.4	19.1	10.0	17.9	21.6	16.5	20.8	28.5	33.7	30.0	690
1 jour par semaine ou moins	0.9	0.5	0.8	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.3	3.1	3.5	3.2	1.5	0.9	1.3	30
2 à 3 jours par semaine	0.7	0.7	0.7	1.2	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	6.0	3.5	5.6	2.3	1.1	1.9	44
4 à 6 jours par semaine	0.3	0.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.7	0.8	0.8	0.8	18
1 fois par jour	2.9	0.7	2.2	8.5	11.1	9.2	2.9	0.0	2.6	3.5	1.2	3.2	3.3	1.2	2.7	62
plusieurs fois par jour	61.1	58.9	60.4	84.1	81.5	83.5	76.5	90.0	78.2	63.8	75.3	65.6	63.7	62.4	63.3	1'456
N**	877	418	1'295	82	27	109	68	10	78	453	85	538	1'641	659	2'300	2'300
<i>données manquantes</i>	1'137	509	1'646	140	63	203	100	24	124	374	78	452	1'965	798	2'763	2'763
Nombre de cigarettes par jour***																
0 à 10	16.1	19.3	17.1	11.6	13.0	12.0	22.0	28.6	22.9	54.7	49.2	53.8	28.2	24.7	27.3	392
11 à 20	42.9	51.6	45.5	52.2	52.2	52.2	46.3	42.9	45.8	37.0	44.4	38.2	41.6	49.5	43.7	629
21 à 30	31.1	20.2	27.8	30.4	26.1	29.3	26.8	14.3	25.0	5.8	6.3	5.9	22.3	17.0	20.9	300
31 ou plus	9.9	9.0	9.6	5.8	8.7	6.5	4.9	14.3	6.3	2.4	0.0	2.1	7.9	8.8	8.1	117
N**	515	223	738	69	23	92	41	7	48	327	63	390	1'050	388	1'438	1'438
<i>données manquantes</i>	63	34	97	8	2	10	14	2	16	28	8	36	123	49	172	172

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une consommation de tabac. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T23a Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2014), hommes

Patient-e-s: principale substance posant problème									
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Objectif de consommation*									
abstinence définitive	29.1	83.1	70.2	80.0	75.0	0.0	51.1	44.8	33.3
abstinence limitée dans le temps	21.9	4.6	2.1	20.0	25.0	0.0	7.8	17.2	0.0
consommation contrôlée	33.7	6.2	12.8	0.0	0.0	0.0	24.8	13.8	33.3
aucune limitation envisagée	1.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0
pas déterminé pour l'instant	14.0	6.2	12.8	0.0	0.0	0.0	14.2	24.1	33.3
autre	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N**	685	65	47	5	4	0	141	29	3
<i>données manquantes</i>	1'329	157	121	47	20	4	686	71	12

T23b Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2014), femmes

Objectif de consommation*									
abstinence définitive	33.8	81.8	85.7	0.0	57.1	0.0	59.1	70.0	100.0
abstinence limitée dans le temps	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0
consommation contrôlée	32.8	4.5	14.3	100.0	14.3	0.0	4.5	0.0	0.0
aucune limitation envisagée	0.7	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	10.0	0.0
pas déterminé pour l'instant	16.4	9.1	0.0	0.0	28.6	0.0	9.1	20.0	0.0
autre	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N**	299	22	7	1	7	0	22	10	2
<i>données manquantes</i>	628	68	27	25	13	2	141	59	5

T23c Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2014), hommes et femmes

Objectif de consommation*									
abstinence définitive	30.5	82.8	72.2	66.7	63.6	0.0	52.1	51.3	60.0
abstinence limitée dans le temps	20.2	3.4	1.9	16.7	9.1	0.0	8.6	12.8	0.0
consommation contrôlée	33.4	5.7	13.0	16.7	9.1	0.0	22.1	10.3	20.0
aucune limitation envisagée	0.9	1.1	1.9	0.0	0.0	0.0	3.7	2.6	0.0
pas déterminé pour l'instant	14.7	6.9	11.1	0.0	18.2	0.0	13.5	23.1	20.0
autres	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N**	984	87	54	6	11	0	163	39	5
<i>données manquantes</i>	1'957	225	148	72	33	6	827	130	17

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T24a Problèmes psychiques au cours de la vie (2014), hommes

Hommes

Patients: problème principal									
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problèmes psychiques*									
autodévalorisation/sentiment de culpabilité	31.6	29.8	30.0	0.0	40.0	0.0	15.9	35.3	0.0
états anxieux/tension nerv. importants	28.4	42.1	37.5	0.0	60.0	0.0	20.4	47.1	20.0
diffic. compréhension/mémoire	15.9	12.3	20.0	33.3	40.0	0.0	15.9	17.6	0.0
altération de l'attention ou hyperactivité	13.1	7.0	27.5	33.3	40.0	0.0	11.5	11.8	0.0
pensées obsessionnelles/actions compulsives	2.2	3.5	5.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.9	0.0
réaction aiguë au stress sévère/troubles adaptation	4.3	3.5	5.0	0.0	0.0	0.0	1.8	2.9	0.0
hallucinations	2.2	10.5	2.5	0.0	0.0	0.0	6.2	8.8	0.0
diffic. à contrôler comportement violent	10.4	5.3	12.5	33.3	20.0	0.0	11.5	11.8	0.0
problèmes psychiques traités avec médic.	22.2	28.1	22.5	0.0	100.0	0.0	16.8	35.3	20.0
pensées suicidaires sérieuses	9.8	7.0	7.5	0.0	20.0	0.0	8.8	14.7	20.0
tentatives de suicide	2.9	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	8.8	0.0
autre(s) problème(s) psychique(s)	2.2	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0
aucun	41.0	43.9	35.0	66.7	0.0	0.0	57.5	26.5	60.0
N**	490	57	40	3	5	0	113	34	5
<i>données manquantes</i>	<i>1'524</i>	<i>165</i>	<i>128</i>	<i>49</i>	<i>19</i>	<i>4</i>	<i>714</i>	<i>66</i>	<i>10</i>

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T24b Problèmes psychiques au cours de la vie (2014), femmes

Femmes

Patientes : problème principal									
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problèmes psychiques*									
autodévalorisation/sentiment de culpabilité	45.6	33.3	40.0	0.0	77.8	0.0	16.7	54.5	100.0
états anxieux/tension nerv. importants	45.1	47.6	60.0	0.0	55.6	0.0	27.8	45.5	100.0
diffic. compréhension/mémoire	16.7	33.3	0.0	0.0	33.3	0.0	11.1	45.5	33.3
altération de l'attention ou hyperactivité	12.1	28.6	0.0	0.0	33.3	0.0	5.6	45.5	33.3
pensées obsessionnelles/actions compulsives	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0
réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation	9.3	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0
hallucinations	0.5	4.8	20.0	0.0	0.0	0.0	16.7	18.2	0.0
diffic. à contrôler comportement violent	7.4	28.6	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	33.3
problèmes psychiques traités avec médic.	41.4	57.1	80.0	0.0	100.0	0.0	38.9	63.6	33.3
pensées suicidaires sérieuses	11.2	14.3	0.0	0.0	55.6	0.0	22.2	18.2	66.7
tentatives de suicide	6.5	4.8	0.0	0.0	33.3	0.0	5.6	9.1	33.3
autre(s) problème(s) psychique(s)	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0
aucun	16.3	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	27.3	0.0
N**	215	21	5	0	9	0	18	11	3
<i>données manquantes</i>	712	69	29	26	11	2	145	58	4

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T24c Problèmes psychiques au cours de la vie (2014), hommes et femmes

Hommes & femmes

	Patient-e-s: problème principal								
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problèmes psychiques*									
autodévalorisation/sentiment de culpabilité	35.9	30.8	31.1	0.0	64.3	0.0	16.0	40.0	37.5
états anxieux/tension nerv. importants	33.5	43.6	40.0	0.0	57.1	0.0	21.4	46.7	50.0
diffic. compréhension/mémoire	16.2	17.9	17.8	33.3	35.7	0.0	15.3	24.4	12.5
altération de l'attention ou hyperactivité	12.8	12.8	24.4	33.3	35.7	0.0	10.7	20.0	12.5
pensées obsessionnelles/actions compulsives	2.1	2.6	4.4	0.0	0.0	0.0	3.1	2.2	0.0
réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation	5.8	3.8	4.4	0.0	0.0	0.0	2.3	2.2	0.0
hallucinations	1.7	9.0	4.4	0.0	0.0	0.0	7.6	11.1	0.0
diffic. à contrôler comportement violent	9.5	11.5	11.1	33.3	14.3	0.0	9.9	8.9	12.5
problèmes psychiques traités avec médic.	28.1	35.9	28.9	0.0	100.0	0.0	19.8	42.2	25.0
pensées suicidaires sérieuses	10.2	9.0	6.7	0.0	42.9	0.0	10.7	15.6	37.5
tentatives de suicide	4.0	5.1	0.0	0.0	21.4	0.0	3.8	8.9	12.5
autre(s) problème(s) psychique(s)	3.4	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0
aucun	33.5	37.2	31.1	66.7	0.0	0.0	54.2	26.7	37.5
N**	705	78	45	3	14	0	131	45	8
<i>données manquantes</i>	<i>2'236</i>	<i>234</i>	<i>157</i>	<i>75</i>	<i>30</i>	<i>6</i>	<i>859</i>	<i>124</i>	<i>14</i>

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T25 Proches: lien entre le client/la cliente et la tierce personne (2014)

Proches				
	Hommes	Femmes	Total	
	%	%	%	N
Lien avec la tierce personne*				
mère/père	41.7	34.0	35.7	318
filles/fils	15.1	12.6	13.1	117
sœur/frère	3.1	3.9	3.7	33
conjoint-e/partenaire	30.7	41.8	39.4	351
autre proche/parent-e	3.1	2.4	2.6	23
collègue/ami-e	3.6	2.4	2.7	24
employeur/se, enseignant-e	0.0	0.6	0.4	4
tuteur/trice, curateur/trice	0.0	0.0	0.0	0
autre	2.6	2.3	2.4	21
N**	192	699	891	891
<i>données manquantes</i>	11	34	45	45

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T26 Proches: problème principal de la tierce personne (2014)

Proches		
	Total	
	%	N
Problème principal de la tierce personne*		
alcool	58.1	274
héroïne	6.1	29
méthadone	0.2	1
buprénorphine	0.0	0
fentanyl	0.0	0
autres opioïdes	0.2	1
cocaïne en poudre	4.7	22
crack	0.0	0
autre forme de cocaïne	0.0	0
amphétamines	1.3	6
méthamphétamines	0.0	0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.2	1
cathinones synthétiques	0.0	0
autres stimulants	0.0	0
barbituriques	0.0	0
benzodiazépines	0.4	2
GHB/GBL	0.0	0
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0
LSD	0.0	0
kétamine	0.0	0
autres hallucinogènes	0.0	0
substances volatiles	0.2	1
cannabis	21.0	99
tabac	0.6	3
autre substance	0.4	2
jeu pathologique	1.9	9
dépendances aux ordinateurs/Internet	4.0	19
troubles alimentaires	0.2	1
autre comportement de type addictif	0.4	2
N**	472	472
<i>données manquantes</i>	464	464

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T27 Sexe et âge, selon le problème principal¹ et chez les proches (2014)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Sexe*																			
hommes	70.6			74.7			82.6			83.2			20.9			64.3			3'904
femmes	29.4			25.3			17.4			16.8			79.1			35.7			2'164
sexe pas connu	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0
N**	2'160	900	3'060	233	79	312	176	37	213	775	156	931	200	759	959	3'904	2'164	6'068	6'068
Age (en années)*																			
jusqu'à 14	0.0	0.3	0.1	0.0	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	3.1	3.2	3.1	1.0	0.5	0.6	1.0	0.8	0.9	57
15-19	1.4	1.7	1.5	1.3	1.3	1.3	4.0	8.1	4.7	58.3	54.5	57.7	5.1	2.9	3.4	14.7	7.8	12.3	742
20-24	3.1	2.1	2.8	8.2	10.3	8.7	9.7	18.9	11.3	13.8	12.2	13.6	4.6	2.9	3.3	6.8	4.7	6.0	366
25-29	6.8	6.4	6.6	11.6	10.3	11.3	17.6	24.3	18.8	8.4	9.0	8.5	5.1	4.7	4.7	8.2	6.8	7.7	465
30-34	9.5	7.2	8.9	18.0	16.7	17.7	31.8	2.7	26.8	7.4	8.3	7.5	5.1	9.4	8.5	10.9	8.4	10.0	604
35-39	10.2	9.5	10.0	17.6	14.1	16.7	11.9	21.6	13.6	3.2	2.6	3.1	4.6	9.4	8.4	9.1	9.3	9.2	555
40-44	12.4	10.6	11.8	21.0	21.8	21.2	11.4	8.1	10.8	2.7	5.1	3.1	9.1	12.1	11.5	10.4	11.0	10.6	643
45-49	15.2	18.4	16.1	12.4	15.4	13.2	8.5	10.8	8.9	1.8	2.6	1.9	13.2	18.5	17.4	11.1	15.8	12.8	774
50-54	13.6	14.8	14.0	6.9	5.1	6.4	2.8	2.7	2.8	0.8	1.9	1.0	14.7	15.3	15.2	9.6	13.0	10.8	654
55-59	12.3	11.9	12.2	2.1	3.8	2.6	1.7	0.0	1.4	0.4	0.0	0.3	12.7	10.2	10.7	8.0	9.3	8.4	511
60-64	7.0	9.3	7.7	0.4	0.0	0.3	0.0	2.7	0.5	0.0	0.0	0.0	8.6	5.2	5.9	4.6	6.2	5.2	312
65-69	4.6	4.7	4.6	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	5.2	5.4	3.0	4.1	3.4	205
70-74	2.5	2.1	2.4	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	0.0	0.6	0.1	5.6	2.3	3.0	1.7	1.7	1.7	103
75 et plus	1.4	1.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	1.3	2.0	1.0	0.9	1.0	59
N**	2'158	897	3'055	233	78	311	176	37	213	773	156	929	197	752	949	3'897	2'153	6'050	6'050
données manquantes	2	3	5	0	1	1	0	0	0	2	0	2	3	7	10	7	11	18	18
Age (valeurs centrales)																			
moyenne	46.8	47.7	47.1	38.1	37.6	38.0	34.5	33.6	34.3	22.2	23.6	22.4	49.1	46.4	47.0	39.6	43.7	41.1	
écart-type	13.1	12.7	13.0	9.2	10.0	9.4	9.1	10.4	9.3	8.2	10.4	8.6	16.3	13.2	14.0	15.7	14.7	15.5	
1er quartile	37.5	39.0	37.9	31.8	30.9	31.1	28.8	25.0	28.2	17.1	16.8	17.0	39.4	37.8	37.9	26.7	33.1	28.9	
valeur médiane	47.4	48.4	47.7	38.4	37.8	38.3	33.4	29.6	33.4	18.4	18.5	18.4	50.5	47.4	48.0	39.7	45.4	42.1	
3e quartile	55.9	56.8	56.1	44.4	45.0	44.7	39.8	40.0	40.0	24.9	27.9	25.2	59.8	54.7	55.5	51.2	54.1	52.3	
N**	2'158	897	3'055	233	78	311	176	37	213	773	156	929	197	752	949	3'897	2'153	6'050	
données manquantes	2	3	5	0	1	1	0	0	0	2	0	2	3	7	10	7	11	18	

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T28 État civil et degré d'urbanisation du domicile à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2014)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Etat civil*																			
célibataire	37.4	34.5	36.6	67.8	61.1	66.2	61.7	75.0	64.0	94.6	89.6	93.8	24.7	23.9	24.0	54.7	40.5	50.1	1'905
marié-e	35.7	30.3	34.2	14.8	19.4	15.9	21.3	10.0	19.3	3.1	0.9	2.7	53.8	52.6	52.8	26.4	32.4	28.4	1'080
séparé-e	5.0	3.5	4.6	5.2	2.8	4.6	8.5	0.0	7.0	1.1	1.9	1.2	6.5	3.4	4.1	4.1	3.4	3.9	148
divorcé-e	20.1	27.7	22.3	11.3	13.9	11.9	8.5	15.0	9.6	1.3	6.6	2.1	14.0	17.2	16.6	13.6	20.5	15.9	604
veuf/veuve	1.6	3.6	2.1	0.9	2.8	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.2	0.0	2.9	2.3	0.9	3.0	1.6	62
partenariat enregistré	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	7
N**	1'474	577	2'051	115	36	151	94	20	114	556	106	662	93	348	441	2'558	1'248	3'806	3'806
données manquantes	686	323	1'009	118	43	161	82	17	99	219	50	269	107	411	518	1'346	916	2'262	2'262
Degré d'urbanisation*																			
grands centres urbains	9.9	12.6	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.4	11.4	12.2	12.0	6.3	9.7	7.4	307
périphérie des grands centre:	10.5	9.5	10.2	0.8	0.0	0.6	4.2	4.8	4.3	3.2	4.5	3.4	0.0	2.3	1.8	7.5	6.0	7.0	290
villes de moyenne importanc	17.0	20.0	17.8	13.1	13.2	13.1	24.0	33.3	25.6	31.1	30.6	31.0	23.8	23.3	23.4	20.9	22.5	21.4	886
petites villes	33.9	32.6	33.6	52.5	57.9	53.8	49.0	38.1	47.0	33.2	28.8	32.5	30.5	33.7	33.0	35.7	34.8	35.4	1'465
campagne	28.7	25.3	27.8	33.6	28.9	32.5	22.9	23.8	23.1	32.5	33.3	32.6	34.3	28.5	29.7	29.6	27.0	28.7	1'189
N**	1'626	644	2'270	122	38	160	96	21	117	569	111	680	105	386	491	2'766	1'371	4'137	4'137
données manquantes	534	256	790	111	41	152	80	16	96	206	45	251	95	373	468	1'138	793	1'931	1'931

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T29 Type de ménage, situation de domicile et type de relation de couple à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2014)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Type de ménage*																			
seul-e en ménage	39.6	33.3	37.8	39.7	29.4	37.0	29.4	43.5	32.0	12.7	13.3	12.8	21.3	16.8	17.7	30.8	27.2	29.7	1'223
avec famille d'origine	5.8	4.9	5.6	14.2	5.9	12.0	17.6	13.0	16.8	67.1	52.2	64.8	10.1	5.8	6.7	23.0	11.4	19.2	793
avec partenaire et/ou avec enfant(s)	48.1	52.9	49.5	26.2	56.9	34.4	44.1	34.8	42.4	6.5	14.2	7.7	67.4	75.9	74.1	36.6	53.6	42.1	1'737
avec des amis ou d'autres personnes	2.4	2.9	2.5	5.7	0.0	4.2	2.9	0.0	2.4	1.6	4.4	2.0	0.0	1.2	1.0	2.4	2.5	2.5	102
en prison	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.0	1.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	3
institution/foyer	1.3	1.8	1.5	2.8	2.0	2.6	2.0	4.3	2.4	5.2	4.4	5.1	0.0	0.0	0.0	2.7	1.6	2.3	95
hôpital/clinique	0.5	0.8	0.6	0.0	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.4	15
autre	2.2	3.4	2.6	9.9	3.9	8.3	2.9	4.3	3.2	6.7	11.5	7.4	1.1	0.3	0.5	4.0	3.2	3.7	154
N**	1'573	649	2'222	141	51	192	102	23	125	629	113	742	89	328	417	2'786	1'336	4'122	4'122
données manquantes	587	251	838	92	28	120	74	14	88	146	43	189	111	431	542	1'118	828	1'946	1'946
Situation de domicile*																			
logement stable	94.6	95.1	94.7	86.9	85.7	86.6	90.1	100.0	91.8	90.0	86.5	89.4	98.9	96.1	96.7	92.8	94.7	93.4	4'018
logement instable/SDF	3.3	3.3	3.3	6.9	8.2	7.2	7.9	0.0	6.6	3.4	5.4	3.7	1.1	3.9	3.3	3.6	3.5	3.6	154
en prison	0.4	0.0	0.3	2.1	0.0	1.5	1.0	0.0	0.8	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	14
institution/foyer/hôpital/autre	1.8	1.6	1.7	4.1	6.1	4.6	1.0	0.0	0.8	6.1	8.1	6.4	0.0	0.0	0.0	3.1	1.8	2.7	116
N**	1'690	689	2'379	145	49	194	101	21	122	618	111	729	93	359	452	2'898	1'404	4'302	4'302
données manquantes	470	211	681	88	30	118	75	16	91	157	45	202	107	400	507	1'006	760	1'766	1'766
Type de relation de couple*																			
sans partenaire, seul-e	31.0	37.6	33.1	34.9	17.6	30.0	29.2	23.1	27.9	68.7	42.0	64.4	18.9	19.0	18.9	38.4	31.6	35.9	797
relations temporaires	4.0	4.9	4.3	9.3	5.9	8.3	8.3	23.1	11.5	5.7	16.0	7.3	3.8	3.3	3.4	4.5	5.8	5.0	110
partenaire fixe, vivant séparé	11.7	13.6	12.3	23.3	23.5	23.3	22.9	30.8	24.6	16.6	30.0	18.7	15.1	11.4	12.1	13.4	14.9	13.9	309
partenaire fixe, ménage commun	53.3	43.9	50.4	32.6	52.9	38.3	39.6	23.1	36.1	9.1	12.0	9.5	62.3	66.4	65.5	43.7	47.8	45.2	1'001
N**	898	412	1'310	43	17	60	48	13	61	265	50	315	53	211	264	1'417	800	2'217	2'217
données manquantes	1'262	488	1'750	190	62	252	128	24	152	510	106	616	147	548	695	2'487	1'364	3'851	3'851

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T30 Source de revenu principale et taux d'activité principal à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2014)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Source de revenu principale*																			
salaire	61.4	46.5	57.1	31.6	25.0	30.0	63.0	31.6	57.0	29.3	18.8	27.6	69.8	65.2	66.2	52.5	48.9	51.3	1'843
économies, épargne	1.3	0.7	1.1	0.0	0.0	0.0	1.2	5.3	2.0	0.4	0.0	0.3	2.1	0.3	0.7	1.0	0.6	0.9	32
rente (AVS, AI ou autre)	15.5	21.8	17.3	14.3	21.9	16.2	4.9	26.3	9.0	3.1	6.3	3.6	12.5	12.8	12.7	11.9	17.6	13.8	497
aide sociale	13.9	14.2	14.0	34.7	34.4	34.6	12.3	31.6	16.0	9.2	16.7	10.4	6.3	3.3	3.9	13.0	11.1	12.3	443
assurance-chômage	4.0	3.6	3.9	4.1	6.3	4.6	6.2	0.0	5.0	2.1	3.1	2.3	2.1	1.2	1.4	3.7	2.5	3.3	118
soutien du/de la partenaire	1.2	9.1	3.5	4.1	6.3	4.6	3.7	0.0	3.0	0.2	1.0	0.3	2.1	14.3	11.6	1.2	9.2	3.9	140
soutien parents/proches/amis	1.7	2.3	1.8	6.1	6.3	6.2	6.2	5.3	6.0	54.7	52.1	54.3	5.2	2.7	3.2	15.4	8.9	13.2	475
deal, petit trafic	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	6
autres revenus illégaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1
prostitution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
assurance indemnités journalières	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.3	10
autre	0.6	1.4	0.9	2.0	0.0	1.5	2.5	0.0	2.0	0.8	0.0	0.7	0.0	0.3	0.2	0.8	0.9	0.8	30
N**	1'387	563	1'950	98	32	130	81	19	100	519	96	615	96	336	432	2'392	1'203	3'595	3'595
données manquantes	773	337	1'110	135	47	182	95	18	113	256	60	316	104	423	527	1'512	961	2'473	2'473
Taux d'activité principal*																			
activ. à plein temps (dès 70%)	56.5	33.5	50.1	30.9	23.1	29.0	64.6	26.3	57.1	17.9	15.9	17.6	65.2	49.0	52.7	46.1	36.4	42.9	1'358
activité à temps partiel	4.2	20.4	8.7	2.5	19.2	6.5	1.3	5.3	2.0	1.4	0.0	1.2	3.4	27.5	22.0	3.2	20.0	8.7	274
jobs occasionnels	1.5	1.3	1.5	4.9	0.0	3.7	1.3	0.0	1.0	1.0	0.0	0.8	2.2	1.7	1.8	1.5	1.4	1.5	46.0
en formation	1.9	2.6	2.1	3.7	7.7	4.7	3.8	5.3	4.1	62.4	59.1	61.9	3.4	4.3	4.1	18.4	10.6	15.8	501
sans travail, en quête d'emploi	7.2	6.8	7.1	12.3	7.7	11.2	13.9	15.8	14.3	4.4	9.1	5.1	2.2	1.0	1.3	6.7	5.1	6.2	196
sans travail, sans recherche d'emploi	4.3	5.7	4.7	13.6	3.8	11.2	3.8	5.3	4.1	2.4	6.8	3.0	2.2	1.0	1.3	4.3	3.8	4.1	131
rentier/rentière	10.4	14.9	11.7	0.0	7.7	1.9	1.3	5.3	2.0	0.2	2.3	0.5	13.5	9.9	10.7	6.7	11.1	8.1	257
incapacité de travail	5.1	5.0	5.0	14.8	15.4	15.0	2.5	5.3	3.1	2.2	1.1	2.0	0.0	1.7	1.3	4.3	4.0	4.2	133
femme/homme au foyer	0.2	2.4	0.8	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	1.8	0.2	1.8	0.7	22
autre	8.8	7.4	8.4	17.3	15.4	16.8	5.1	31.6	10.2	8.2	5.7	7.8	7.9	1.7	3.1	8.6	5.9	7.7	245
N**	1'188	457	1'645	81	26	107	79	19	98	503	88	591	89	302	391	2'135	1'028	3'163	3'163
données manquantes	972	443	1'415	152	53	205	97	18	115	272	68	340	111	457	568	1'769	1'136	2'905	2'905

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T31 Statut professionnel et revenu mensuel net à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2014)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Statut professionnel*																			
sans activité professionnelle	26.4	43.7	31.3	51.1	43.8	49.2	22.0	71.4	29.2	13.5	32.3	16.5	50.0	24.1	28.6	25.3	38.2	28.8	358
apprenti-e, stagiaire	1.8	0.9	1.5	2.2	0.0	1.6	7.3	0.0	6.3	47.2	25.8	43.8	0.0	0.0	0.0	11.4	5.5	9.8	121
manœuv re, aide	3.3	2.7	3.2	6.7	12.5	8.2	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	3.1	2.9	3.1	38
ouvrier/ère formé-e sur le tas	5.3	5.4	5.3	2.2	6.3	3.3	12.2	0.0	10.4	1.8	3.2	2.1	0.0	3.4	2.9	4.8	4.7	4.8	59
ouvrier/ère formé-e (CFC)	11.0	4.5	9.2	11.1	18.8	13.1	19.5	14.3	18.8	10.4	3.2	9.3	16.7	6.9	8.6	11.0	5.0	9.3	116
contremaître-sse	1.9	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.0	13
employé-e non qualifié-e	19.8	24.3	21.1	11.1	18.8	13.1	12.2	0.0	10.4	1.2	6.5	2.1	16.7	48.3	42.9	14.7	23.3	17.1	212
empl. qualifié-e, cadre moyen	14.2	10.8	13.2	8.9	0.0	6.6	9.8	14.3	10.4	1.8	3.2	2.1	16.7	6.9	8.6	10.7	8.2	10.0	124
employé-e, cadre supérieur	4.9	1.8	4.0	2.2	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	2.9	3.6	1.5	3.0	37
indépendant-e	9.1	4.1	7.7	2.2	0.0	1.6	14.6	0.0	12.5	0.6	0.0	0.5	0.0	6.9	5.7	6.8	4.1	6.0	75
écolier/ère, étudiant-e	0.9	0.5	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.9	25.8	21.6	0.0	0.0	0.0	5.7	5.2	5.6	69
autre statut	1.4	1.4	1.4	2.2	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.6	1.5	1.5	19
N**	571	222	793	45	16	61	41	7	48	163	31	194	6	29	35	898	343	1'241	1'241
données manquantes	1'589	678	2'267	188	63	251	135	30	165	612	125	737	194	730	924	3'006	1'821	4'827	4'827

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T32a Raison principale de la fin du traitement/de la prise en charge, selon le problème principal¹ et chez les proches (2014)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Raison principale*																			
fin régulière sans transfert	52.4	47.4	50.9	32.2	39.2	34.0	46.0	29.7	43.2	66.9	60.9	65.9	74.4	66.0	67.7	55.0	55.8	55.3	3'330
fin régulière avec transfert	5.1	6.9	5.6	15.7	10.1	14.2	7.4	10.8	8.0	4.1	5.1	4.3	1.5	2.1	2.0	5.5	5.3	5.4	328
changement de domicile	1.6	2.0	1.8	3.5	6.3	4.2	5.1	2.7	4.7	1.3	3.8	1.7	0.5	0.7	0.6	1.8	1.7	1.7	105
hospitalisation	0.7	1.6	0.9	0.4	1.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.4	0.3	0.5	0.8	0.6	39
détention	0.1	0.0	0.1	2.2	0.0	1.6	0.6	0.0	0.5	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	11
perte de contact	25.3	28.3	26.2	26.1	29.1	26.9	29.5	40.5	31.5	16.0	17.9	16.3	17.1	21.4	20.5	23.3	24.4	23.7	1'426
rupture explicite	11.2	9.8	10.8	14.8	10.1	13.6	9.1	10.8	9.4	8.1	9.0	8.3	3.5	6.5	5.9	10.2	8.3	9.5	573
décès	1.9	2.0	2.0	3.0	2.5	2.9	0.0	2.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.2	1.4	1.0	1.2	75
autre raison	1.5	2.0	1.7	2.2	1.3	1.9	2.3	2.7	2.3	2.7	3.2	2.8	2.5	2.8	2.7	2.0	2.6	2.2	134
N**	2'136	889	3'025	230	79	309	176	37	213	774	156	930	199	756	955	3'872	2'149	6'021	6'021
données manquantes	24	11	35	3	0	3	0	0	0	1	0	1	1	3	4	32	15	47	47

T32b Destination des transferts, selon le problème principal¹ et chez les proches (2014)

Destination des transferts***	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Proches	Toutes sorties	N				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
traitement résidentiel	28.6	31.3	29.4	16.7	33.3	20.0	12.5	0.0	10.0	19.0	25.0	20.0	0.0	12.5	12.5	22.0	27.9	23.8	46
structure/clinique de jour	1.4	6.3	2.9	4.2	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	3.3	2.6	5
prise en charge ambulatoire	42.9	37.5	41.2	62.5	50.0	60.0	75.0	0.0	60.0	38.1	75.0	44.0	0.0	50.0	50.0	49.2	44.3	47.7	92
appartement protégé	2.9	9.4	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	10.0	9.5	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	3.0	6.6	4.1	8
autre institution spécialisée	24.3	15.6	21.6	16.7	16.7	16.7	12.5	50.0	20.0	33.3	0.0	28.0	0.0	37.5	37.5	23.5	18.0	21.8	42
N**	70	32	102	24	6	30	8	2	10	21	4	25	0	8	8	132	61	193	193
données manquantes	39	29	68	12	2	14	5	2	7	11	4	15	3	8	11	82	53	135	135

T32c Cause de décès, selon le problème principal¹ et chez les proches (2014)

Cause de décès****	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Proches	Toutes sorties	N				
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
suicide	10.7	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	0.0	8.2	4
accident	7.1	16.7	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	14.3	8.2	4
maladie	78.6	83.3	80.0	50.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	74.3	78.6	75.5	37
surdose ou intoxication aiguë	0.0	0.0	0.0	50.0	100.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	7.1	6.1	3
autre cause de décès	3.6	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.0	1.0
N**	28	12	40	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	35	14	49	49
données manquantes	13	6	19	3	1	4	0	1	1	0	0	0	1	0	1	18	8	26	26

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s transféré-e-s. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s décédé-e-s durant la prise en charge. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T33 Durée de la prise en charge, selon le problème principal¹ et chez les proches (2014)

Durée de la prise en charge* (%)	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
1 semaine ou moins	4.2	5.2	4.5	2.1	3.8	2.6	2.3	0.0	1.9	3.4	3.8	3.4	15.5	10.5	11.6	4.4	6.7	5.2	316
> 1 semaine à 1 mois	3.4	2.9	3.3	1.3	1.3	1.3	2.3	0.0	1.9	11.4	7.7	10.7	4.5	4.9	4.8	4.9	3.9	4.5	275
> 1 à 2 mois	3.6	3.0	3.4	2.6	5.1	3.2	5.7	5.4	5.6	8.9	5.8	8.4	3.5	5.0	4.7	4.8	4.5	4.7	286
>2 à 3 mois	3.5	4.4	3.8	1.3	0.0	1.0	2.8	2.7	2.8	8.1	6.4	7.8	7.0	5.1	5.5	4.7	4.4	4.6	279
>3 à 6 mois	11.0	12.0	11.3	8.6	7.6	8.3	10.8	13.5	11.3	17.8	13.5	17.1	15.0	14.6	14.7	12.6	13.3	12.9	779
>6 mois à 1 an	25.3	28.1	26.2	29.6	27.8	29.2	27.8	35.1	29.1	32.9	44.2	34.8	33.0	30.2	30.8	28.8	30.7	29.4	1'784
>1 à 2 ans	21.6	23.3	22.1	18.5	19.0	18.6	29.5	27.0	29.1	12.5	12.8	12.6	12.0	20.9	19.1	19.5	21.5	20.2	1'226
>2 à 3 ans	9.0	9.1	9.1	6.0	6.3	6.1	9.1	5.4	8.5	3.4	3.8	3.4	4.0	4.2	4.2	7.0	6.6	6.8	415
>3 à 5 ans	7.4	6.8	7.2	12.4	17.7	13.8	5.7	2.7	5.2	1.3	0.6	1.2	3.5	3.3	3.3	5.7	5.1	5.5	334
>5 à 10 ans	10.2	4.9	8.6	15.9	10.1	14.4	2.8	8.1	3.8	0.4	1.3	0.5	2.0	0.9	1.1	7.1	3.0	5.6	341
plus de 10 ans	0.6	0.2	0.5	1.7	1.3	1.6	1.1	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.5	0.3	0.4	27
N**	2'155	900	3'055	233	79	312	176	37	213	775	156	931	200	759	959	3'899	2'163	6'062	6'062
données manquantes	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	6	6
Durée (en semaines)																			
moyenne	96.0	74.8	89.8	127.0	115.8	124.2	72.8	76.9	73.5	33.3	39.5	34.4	43.4	46.4	45.8	77.4	61.6	71.8	
écart-type	119.1	89.9	111.7	140.4	134.3	138.7	86.1	96.7	87.8	38.6	53.0	41.4	59.9	61.7	61.3	105.1	80.5	97.3	
1er quartile	23.4	22.4	23.0	32.0	33.1	32.1	24.5	26.1	25.6	9.0	13.0	9.1	9.8	12.0	11.1	18.0	16.6	17.3	
valeur médiane	50.3	44.1	48.1	58.1	55.9	57.0	45.9	50.0	45.9	24.1	28.8	25.4	26.0	29.7	29.3	39.0	36.9	38.1	
3e quartile	112.0	89.7	106.3	182.6	177.1	182.1	84.7	77.0	82.0	41.9	45.5	42.3	49.5	58.4	56.4	84.0	73.6	79.9	
N**	2'155	900	3'055	233	79	312	176	37	213	775	156	931	200	759	959	3'899	2'163	6'062	
données manquantes	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	6	

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T34 Substitution pendant et immédiatement après la prise en charge, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2014)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Substitution pendant la prise en charge*																
non	98.7	97.6	98.4	56.4	61.8	57.8	95.2	85.0	93.3	99.8	100.0	99.8	96.7	96.5	96.6	2'928
oui	1.3	2.4	1.6	43.6	38.2	42.2	4.8	15.0	6.7	0.2	0.0	0.2	3.3	3.5	3.4	102
N**	1'286	548	1'834	101	34	135	84	20	104	513	93	606	2'196	834	3'030	3'030
données manquantes	874	352	1'226	132	45	177	92	17	109	262	63	325	1'508	572	2'080	2'080
Type de substitution***																
héroïne	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.0	1
méthadone	86.7	83.3	85.2	88.4	84.6	87.5	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	87.0	85.7	86.6	84
autres opioïdes	6.7	8.3	7.4	4.7	15.4	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	10.7	6.2	6
autres substances	6.7	8.3	7.4	4.7	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	3.6	6.2	6
N**	15	12	27	43	13	56	3	3	6	1	0	1	69	28	97	97
données manquantes	2	1	3	1	0	1	1	0	1	0	0	0	4	1	5	5
Substitution après la prise en charge*																
non	98.8	98.9	98.8	71.8	72.4	71.9	96.1	73.3	92.4	99.6	98.8	99.5	97.7	97.6	97.7	2'845
oui	1.2	1.1	1.2	28.2	27.6	28.1	3.9	26.7	7.6	0.4	1.2	0.5	2.3	2.4	2.3	68
N**	1'275	536	1'811	85	29	114	77	15	92	473	81	554	2'120	793	2'913	2'913
données manquantes	885	364	1'249	148	50	198	99	22	121	302	75	377	1'584	613	2'197	2'197
Type de substitution***																
prescription d'héroïne	0.0	16.7	4.8	8.3	0.0	6.3	33.3	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	8.2	5.3	7.4	5
traitement de substitution	100.0	83.3	95.2	91.7	100.0	93.8	66.7	100.0	85.7	100.0	100.0	100.0	91.8	94.7	92.6	63
N**	15	6	21	24	8	32	3	4	7	2	1	3	49	19	68	68
données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s substitué-e-s durant la prise en charge. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T35 Postcure prévue et mise en place, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2014)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Postcure prévue et mise en place*																
non	90.9	84.8	89.3	88.6	69.6	83.9	92.0	62.5	87.9	97.3	87.5	95.9	92.3	83.8	90.3	1'326
oui	9.1	15.2	10.7	11.4	30.4	16.1	8.0	37.5	12.1	2.7	12.5	4.1	7.7	16.2	9.7	142
N**	726	256	982	70	23	93	50	8	58	188	32	220	1'122	346	1'468	1'468
<i>données manquantes</i>	1'434	644	2'078	163	56	219	126	29	155	587	124	711	2'582	1'060	3'642	3'642
Type de la postcure prévue***																
appartement protégé de l'institution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	12.5	1.2	0.0	0.8	1
service de postcure de l'institution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
appartement protégé extérieur	7.9	2.9	6.1	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	7.3	2.0	5.3	7
service de postcure extérieur	12.7	20.0	15.3	14.3	14.3	14.3	50.0	0.0	28.6	20.0	0.0	12.5	14.6	15.7	15.0	20
centre de consultation pour problèmes liés à l'alcool	27.0	22.9	25.5	42.9	0.0	21.4	0.0	33.3	14.3	20.0	0.0	12.5	25.6	19.6	23.3	31
centre de consultation pour problèmes liés aux drogues	1.6	5.7	3.1	28.6	0.0	14.3	25.0	0.0	14.3	0.0	33.3	12.5	4.9	7.8	6.0	8
autre centre de consultation	12.7	8.6	11.2	0.0	14.3	7.1	0.0	33.3	14.3	40.0	33.3	37.5	13.4	13.7	13.5	18
groupe d'entraide	9.5	8.6	9.2	0.0	14.3	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	7.8	7.5	10
groupe d'ancien-ne-s client-e-s de l'institution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
autre	33.3	37.1	34.7	14.3	57.1	35.7	50.0	33.3	42.9	20.0	66.7	37.5	32.9	39.2	35.3	47
N**	63	35	98	7	7	14	4	3	7	5	3	8	82	51	133	133
<i>données manquantes</i>	3	4	7	1	0	1	0	0	0	0	1	1	4	5	9	9

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s pour lesquels une postcure est prévue. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles)

T36 Problèmes addictifs à la sortie, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2014)

Problèmes addictifs à la sortie*	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
alcool	70.3	73.3	71.2	21.4	6.1	17.5	23.5	22.7	23.4	11.4	13.9	11.8	46.4	50.8	47.6	1'740
héroïne	1.2	0.6	1.0	64.1	53.1	61.3	4.3	27.3	8.0	0.3	1.7	0.5	4.8	3.7	4.5	164
méthadone	0.3	0.5	0.4	10.3	10.2	10.3	0.0	9.1	1.5	0.0	0.0	0.0	0.8	1.0	0.8	31
buprénorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
autres opioïdes	0.0	0.2	0.0	2.1	6.1	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.3	10
cocaïne en poudre	2.1	1.2	1.9	13.8	8.2	12.4	58.3	31.8	54.0	1.3	1.7	1.4	5.1	2.1	4.3	157
crack	0.1	0.2	0.1	0.0	2.0	0.5	3.5	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	7
autre forme de cocaïne	0.1	0.0	0.0	1.4	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	5
amphétamines	0.6	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.9	4.5	1.5	0.5	0.9	0.5	1.1	0.7	1.0	35
méthamphétamines	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	7
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.3	0.2	0.2	0.7	0.0	0.5	1.7	0.0	1.5	1.3	1.7	1.4	0.9	0.6	0.8	30
cathinones synthétiques	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
autres stimulants	0.1	0.0	0.1	0.0	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	4
barbituriques	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
benzodiazépines	1.2	2.6	1.6	6.9	8.2	7.2	0.0	9.1	1.5	0.0	0.0	0.0	1.4	3.2	1.9	70
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
autres somnifères et tranquillisants	0.1	0.5	0.2	0.0	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	0.4	14
LSD	0.1	0.0	0.1	0.0	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.8	0.4	0.1	0.3	11
kétamine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.1	0.0	0.1	3
cannabis	4.1	2.3	3.6	15.2	6.1	12.9	12.2	13.6	12.4	63.7	73.9	65.3	20.0	11.1	17.5	640
tabac	13.5	11.6	12.9	14.5	10.2	13.4	13.0	22.7	14.6	15.9	13.9	15.6	15.0	13.8	14.7	536
autre substance	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7	0.2	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	8
jeu pathologique	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.1	1.4	50
dépendances aux ordinateurs/Internet	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.8	1.8	0.5	1.4	52
troubles alimentaires	0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.1	0.2	6.4	1.9	71
autre comportement de type addictif	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.5	0.7	26
aucun	26.2	23.0	25.2	13.1	20.4	14.9	27.0	40.9	29.2	28.6	22.6	27.7	25.6	22.2	24.7	901
N**	1'496	656	2'152	145	49	194	115	22	137	615	115	730	2'624	1'030	3'654	3'654
données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T37 Fréquence des rechutes et substance ou comportement impliqué pendant la prise en charge, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2014)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Fréquence des rechutes*																
aucune	56.1	47.0	54.0	37.8	52.9	42.6	52.9	42.9	51.2	66.9	65.2	66.7	56.8	51.1	55.5	563
une fois	6.8	6.0	6.6	0.0	5.9	1.9	20.6	14.3	19.5	6.0	13.0	7.1	7.4	6.6	7.2	73
deux fois	8.3	10.8	8.9	8.1	0.0	5.6	5.9	0.0	4.9	9.8	0.0	8.3	8.1	8.4	8.2	83
trois ou quatre fois	11.5	15.7	12.5	8.1	11.8	9.3	8.8	14.3	9.8	4.5	8.7	5.1	9.8	14.1	10.7	109
cinq fois ou plus	17.2	20.5	18.0	45.9	29.4	40.7	11.8	28.6	14.6	12.8	13.0	12.8	17.9	19.8	18.3	186
N**	529	166	695	37	17	54	34	7	41	133	23	156	787	227	1'014	1'014
<i>données manquantes</i>	1'631	734	2'365	196	62	258	142	30	172	642	133	775	2'917	1'179	4'096	4'096
Substance/comportement addictif lors des rechutes***																
alcool	98.2	97.6	98.0	27.3	14.3	24.1	40.0	75.0	47.4	26.3	0.0	21.7	77.4	83.8	79.0	331
opioïdes	1.4	4.8	2.3	77.3	85.7	79.3	13.3	25.0	15.8	2.6	0.0	2.2	7.6	10.5	8.4	35
cocaïne et dérivés	3.7	6.0	4.3	40.9	14.3	34.5	86.7	75.0	84.2	10.5	0.0	8.7	12.1	8.6	11.2	47
autres stimulants	1.4	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	4.3	2.2	0.0	1.7	7
somnifères/tranquillisants	0.0	9.5	2.6	4.5	0.0	3.4	0.0	25.0	5.3	0.0	0.0	0.0	1.3	9.5	3.3	14
hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	3.4	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.2	0.3	1.0	0.5	2
substances volatiles	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	1
cannabis	5.9	3.6	5.3	27.3	14.3	24.1	20.0	0.0	15.8	86.8	100.0	89.1	20.1	12.4	18.1	76
tabac	3.2	6.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	12.5	8.7	3.8	6.7	4.5	19
autres substances	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
jeu pathologique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	2
dépendances aux ordinateurs/Internet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	2
troubles alimentaires	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
autre comportement de type addictif	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
N**	219	84	303	22	7	29	15	4	19	38	8	46	314	105	419	419
<i>données manquantes</i>	13	4	17	1	1	2	1	0	1	6	0	6	26	6	32	32

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une ou plusieurs rechutes. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

T38 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 jours précédant la sortie, selon le problème principal¹ (selement patient-e-s) (2014)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Fréquence de la consommation de tabac*																
jamais	41.3	44.7	42.2	11.6	14.3	12.3	20.0	0.0	17.6	13.3	27.8	15.1	33.3	40.2	34.9	332
1 jour par semaine ou moins	1.3	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	2.1	1.4	0.4	1.2	11
2 à 3 jours par semaine	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	4.8	1.1	0.0	0.8	8
4 à 6 jours par semaine	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	5.6	2.1	0.7	0.4	0.6	6
une fois par jour	2.8	5.6	3.5	11.6	14.3	12.3	3.3	25.0	5.9	6.3	0.0	5.5	3.7	5.7	4.2	40
plusieurs fois par jour	53.8	49.7	52.7	76.7	71.4	75.4	76.7	75.0	76.5	71.1	66.7	70.5	59.8	53.3	58.2	553
N**	470	179	649	43	14	57	30	4	34	128	18	146	721	229	950	950
<i>données manquantes</i>	1'690	721	2'411	190	65	255	146	33	179	647	138	785	2'983	1'177	4'160	4'160
Nombre de cigarettes par jour***																
0 à 10 cigarettes par jour	18.9	25.8	20.8	13.3	20.0	15.0	30.0	33.3	30.4	40.2	55.6	41.5	24.1	28.6	25.1	134
11 à 20 cigarettes par jour	41.2	56.2	45.3	60.0	70.0	62.5	55.0	66.7	56.5	42.3	44.4	42.5	42.7	56.3	45.7	244
21 à 30 cigarettes par jour	28.2	16.9	25.1	26.7	10.0	22.5	5.0	0.0	4.3	15.5	0.0	14.2	25.1	14.3	22.7	121
31 cigarettes par jour ou plus	11.8	1.1	8.9	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	8.7	2.1	0.0	1.9	8.2	0.8	6.6	35
N**	238	89	327	30	10	40	20	3	23	97	9	106	415	119	534	534
<i>données manquantes</i>	38	10	48	8	2	10	4	1	5	14	4	18	66	18	84	84

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une consommation de tabac. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T39 Objectif de consommation à la sortie et pronostic, selon la principale substance posant problème¹ (seulement patient-e-s) (2014)

	Patient-e-s: principale substance posant problème ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Objectif de consommation*																
abstinence définitive	36.2	37.5	36.6	81.6	93.3	84.9	82.9	71.4	81.0	45.8	52.4	46.6	42.1	45.3	42.9	468
abstinence limitée dans le temps	12.5	8.5	11.5	2.6	6.7	3.8	5.7	14.3	7.1	8.5	0.0	7.4	10.7	7.8	10.0	109
consommation contrôlée	36.9	36.5	36.8	7.9	0.0	5.7	5.7	0.0	4.8	29.6	19.0	28.2	32.8	30.2	32.2	351
aucune limitation envisagée	3.5	4.0	3.7	2.6	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	6.3	19.0	8.0	4.0	5.0	4.2	46
pas déterminé pour l'instant	9.7	12.5	10.4	5.3	0.0	3.8	5.7	14.3	7.1	9.2	9.5	9.2	9.4	10.9	9.7	106
autre	1.1	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	1.1	0.8	1.0	11
N**	566	200	766	38	15	53	35	7	42	142	21	163	833	258	1'091	1'091
données manquantes	1'594	700	2'294	195	64	259	141	30	171	633	135	768	2'871	1'148	4'019	4'019
Pronostic*																
très bon pronostic	19.2	9.4	16.6	15.6	5.3	12.5	19.5	0.0	16.7	20.6	21.7	20.8	18.8	10.4	16.8	186
bon pronostic	44.6	43.6	44.3	31.1	68.4	42.2	46.3	28.6	43.8	50.0	43.5	49.1	45.4	47.0	45.8	507
plutôt mauvais pronostic	26.8	33.2	28.5	40.0	26.3	35.9	24.4	71.4	31.3	26.5	30.4	27.0	27.3	31.7	28.3	314
mauvais pronostic	9.4	13.9	10.6	13.3	0.0	9.4	9.8	0.0	8.3	2.9	4.3	3.1	8.6	10.8	9.1	101
N**	566	202	758	45	19	64	41	7	48	136	23	159	840	268	1'108	1'108
données manquantes	1'604	698	2'302	188	60	248	135	30	165	639	133	772	2'864	1'138	4'002	4'002

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

ANNEXE

A1 Données de base d'institutions non participantes: sexe et âge à l'admission, selon le problème principal (2014)

	Patient-e-s: problème principal												Toutes prises en charge***			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Sexe*																
hommes			65.6			69.1			78.9			79.6			68.2	1034
femmes			34.4			30.9			21.1			20.4			31.8	483
sexe pas connu			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	0
N**	578	303	881	85	38	123	60	16	76	172	44	216	1'034	483	1'517	1'517
Age (en années)*																
jusqu'à 14	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	1.4	0.2	1.1	0.5	7
15-19	1.6	1.3	1.5	1.2	2.6	1.6	1.7	12.5	3.9	25.3	21.4	24.5	6.3	4.5	5.8	86
20-24	3.1	4.7	3.7	7.1	10.5	8.1	15.0	0.0	11.8	22.4	4.8	18.9	9.1	5.7	8.0	120
25-29	8.0	6.7	7.6	10.6	15.8	12.2	16.7	31.3	19.7	21.8	11.9	19.8	12.3	8.9	11.2	168
30-34	9.4	11.8	10.2	18.8	18.4	18.7	31.7	18.8	28.9	10.6	9.5	10.4	13.0	12.1	12.7	190
35-39	12.1	10.8	11.6	17.6	13.2	16.3	21.7	6.3	18.4	11.8	4.8	10.4	13.0	10.0	12.0	180
40-44	12.4	9.1	11.3	21.2	21.1	21.1	8.3	12.5	9.2	3.5	7.1	4.2	10.9	11.0	11.0	164
45-49	16.3	13.1	15.2	16.5	13.2	15.4	5.0	6.3	5.3	2.9	14.3	5.2	11.6	12.3	11.8	177
50-54	14.3	20.5	16.5	2.4	2.6	2.4	0.0	0.0	0.0	0.6	16.7	3.8	9.5	16.8	11.8	176
55-59	10.7	10.8	10.7	3.5	2.6	3.3	0.0	6.3	1.3	1.2	2.4	1.4	6.8	8.7	7.4	111
60-64	5.6	4.0	5.1	1.2	0.0	0.8	0.0	6.3	1.3	0.0	0.0	0.0	3.3	3.4	3.3	50
65-69	4.4	2.7	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	1.9	2.4	36
70-74	1.4	2.7	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.9	1.1	17
75 et plus	0.5	1.7	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.7	0.9	13
N**	572	297	869	85	38	123	60	16	76	170	42	212	1'024	471	1'495	1'495
<i>données manquantes</i>	6	6	12	0	0	0	0	0	0	2	2	4	10	12	22	22
Age (valeurs centrales)																
moyenne	45.3	45.8	45.4	38.1	35.9	37.4	32.6	34.8	33.1	26.9	33.8	28.3	39.5	42.8	40.5	
écart-type	12.4	13.3	12.7	9.2	9.4	9.3	7.2	12.5	8.5	8.9	14.5	10.6	13.5	14.2	13.8	
1er quartile	35.6	35.3	35.5	31.5	28.4	30.3	26.4	26.4	26.4	19.9	17.9	19.6	28.9	32.1	29.7	
valeur médiane	45.9	47.0	46.1	38.3	36.6	37.8	33.3	30.9	32.7	25.3	34.4	25.7	38.3	43.0	39.9	
3e quartile	54.1	54.8	54.3	44.2	41.4	43.7	37.39	43.0	37.7	31.4	48.0	35.3	49.2	53.2	51.0	
N**	572	297	869	85	38	123	60	16	76	170	42	212	1'024	471	1'495	
<i>données manquantes</i>	6	6	12	0	0	0	0	0	0	2	2	4	10	12	22	

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Plusieurs institutions ne définissent pas le problème principal selon les directives d'act-info et répertorient notamment la "consommation multiple". Ainsi, la distribution résultante n'est pas directement comparable avec celle des institutions participantes

A2 Données de base d'institutions non participantes: problème principal à l'admission (2014)

Tous patients et patientes				
	Hommes	Femmes	Total	
	%	%	%	N
Problème principal*				
alcool	55.9	62.7	58.1	881
opioïdes	8.2	7.9	8.1	123
cocaïne	5.8	3.3	5.0	76
autres stimulants	1.6	2.5	1.9	29
hypnotiques/sedatives	1.1	3.1	1.7	26
hallucinogènes	0.1	0.0	0.1	1
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0
cannabis	16.6	9.1	14.2	216
tabac	0.4	1.0	0.6	9
autre substance	0.3	2.7	1.1	16
consommation multiple**	4.4	1.4	3.4	52
non lié à une substance	5.6	6.2	5.8	88
N***	1'034	483	1'517	1'517
<i>données manquantes</i>	0	0	0	0

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Plusieurs institutions ne définissent pas le problème principal selon les directives d'act-info et répertorient notamment la "consommation multiple". Ainsi, la distribution résultante n'est pas directement comparable avec celle des institutions participantes

*** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu