



Prise en charge ambulatoire des problèmes de dépendance

Résultats de l'enquête auprès des client-e-s 2015

Recueil de tableaux statistiques

Mariana Astudillo & Etienne Maffli



Remerciements

Nous remercions vivement les collaborateurs et collaboratrices ainsi que les patients et patientes des institutions participantes qui se sont donné la peine de remplir les questionnaires du monitoring act-info. Nous remercions également les collaborateurs et collaboratrices des services de consultation qui ont effectué les tâches de logistique et de saisie. Nos remerciements vont aussi à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui finance l'ensemble du réseau act-info. Un grand merci également à Edith Bacher et Christiane Gmel pour la conception graphique et la mise en page de ce rapport ainsi qu'à Marina Delgrande Jordan pour sa précieuse collaboration dans le développement des syntaxes d'analyse.

Compléments d'information: Etienne Maffli, tél. 021 321 29 54, fax 021 321 29 40,
e-mail emaffli@addictionsuisse.ch

Réalisation: Mariana Astudillo & Etienne Maffli
Addiction Suisse

Diffusion: Recherche, Addiction Suisse, case postale 870,
1001 Lausanne, tél. 021/321 29 46, fax 021 321 29 40,
e-mail ebacher@addictionsuisse.ch

Prix: Fr. 10.–

Langue du texte original: allemand

Graphisme/mise en page: Addiction Suisse

Copyright: © Addiction Suisse, Lausanne 2017

Citation recommandée: Astudillo, M. & Maffli, E. (2017). Prise en charge ambulatoire des problèmes de dépendance: résultats de l'enquête auprès des client-e-s 2015 – Recueil de tableaux statistiques. Lausanne: Addiction Suisse.

Table des matières

act-info – addiction care and therapy information.....	7
act-info dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance (SAMBAD)	7

ADMISSION

T1	Sexe et âge à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2015)
T2	État civil et nationalité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2015)
T3	Degré d'urbanisation du domicile, type de ménage et situation de domicile à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2015)
T4	Type de relation de couple, nombre d'enfants propres et d'enfants vivant dans le ménage à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2015)
T5	Plus haute formation achevée et statut professionnel à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2015)
T6	Source de revenu principale et taux d'activité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2015)
T7	Revenu mensuel net et dettes à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2015)
T8	Emprisonnement ou détention préventive avant l'admission et durée totale de détention, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2015)
T9	Instance d'envoi principale, selon le problème principal et chez les proches (2015)
T10	Prise en charge consécutive à une mesure judiciaire et type de mesure, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2015)
T11	Traitements/prises en charge avant l'admission et type de prises en charge antérieures, selon le problème principal et chez les proches (2015)
T12	Substitution ou prescription d'héroïne à l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2015)
T13	Problème principal à l'admission (seulement patient-e-s) (2015)
T14	Usage de substances multiples et combinaisons de substances (2015)
T15.1a	Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2015), hommes
T15.1b	Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2015), femmes
T15.1c	Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2015), hommes

- T15.2a Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2015), hommes
- T15.2b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2015), femmes
- T15.2c Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2015), hommes et femmes
- T16.1a Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2015), hommes
- T16.1b Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2015), femmes
- T16.1c Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2015), hommes et femmes
- T16.2a Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2015), hommes
- T16.2b Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2015), femmes
- T16.2c Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2015), hommes et femmes
- T17 Mode d'administration prédominant de la principale substance posant problème avant l'admission (2015)
- T18.1 Prévalence à vie, sur les 30 derniers jours et sur les 12 derniers mois avant l'admission des injections et échange de matériel d'injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2015)
- T18.2 Âge lors de la première injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2015)
- T19.1a Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2015), hommes
- T19.1b Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2015), femmes
- T19.1c Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2015), hommes et femmes
- T19.2a Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2015), hommes
- T19.2b Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2015), femmes
- T19.2c Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2015), hommes et femmes

- T20.1a Fréquence de consommation des substances secondaires selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2015)
- T20.1b Fréquence de consommation des substances secondaires selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2015)
- T21 Fréquence de la consommation d'alcool, nombre de boissons standards par jour et fréquence de fortes consommations d'alcool avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2015)
- T22 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 derniers jours avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2015)
- T23a Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2015), hommes
- T23b Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2015), femmes
- T23c Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2015), hommes et femmes
- T24a Problèmes psychiques au cours de la vie (2015), hommes
- T24a Problèmes psychiques au cours de la vie (2015), femmes
- T24a Problèmes psychiques au cours de la vie (2015), hommes et femmes
- T25 Proches: lien entre le client/la cliente et la tierce personne (2015)
- T26 Proches: problème principal de la tierce personne (2015)

SORTIE

- T27 Sexe et âge, selon le problème principal et chez les proches (2015)
- T28 État civil et degré d'urbanisation du domicile à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2015)
- T29 Type de ménage, situation de domicile et type de relation de couple à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2015)
- T30 Source de revenu principale et taux d'activité principal à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2015)
- T31 Statut professionnel et revenu mensuel net à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2015)
- T32a Raison principale de la fin du traitement/de la prise en charge, selon le problème principal et chez les proches (2015)
- T32b Destination des transferts, selon le problème principal et chez les proches (2015)
- T32c Cause de décès, selon le problème principal et chez les proches (2015)
- T33 Durée de la prise en charge, selon le problème principal et chez les proches (2015)
- T34 Substitution pendant et immédiatement après la prise en charge, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2015)

- T35 Postcure prévue et mise en place, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2015)
- T36 Problèmes addictifs à la sortie, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2015)
- T37 Fréquence des rechutes et substance ou comportement impliqué pendant la prise en charge, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2015)
- T38 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 jours précédant la sortie, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2015)
- T39 Objectif de consommation à la sortie et pronostic, selon la principale substance posant problème (seulement patient-e-s) (2015)

Annexe

Données de base d'institutions ne participant pas au monitoring *act-info*

- A1 Sexe et âge à l'admission, selon le problème principal (2015)
- A2 Problème principal à l'admission (2015)

act-info - addiction care and therapy information

Le Réseau de monitoring (act-info) réunit sous le même toit les cinq statistiques menées dans le domaine de la prise en charge et du traitement en matière de dépendance en Suisse:

- SAMBAD (Statistique du secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance)
- Residalc (Statistique du traitement résidentiel de l'alcoolodépendance en Suisse)
- FOS (Statistique de la Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie)
- HeGeBe (Statistique du traitement avec prescription d'héroïne)
- Méthadone (Statistique nationale des traitements de substitution)

Ces cinq statistiques disposent depuis 2004 d'instruments harmonisés et optimisés. Les données communes sont intégrées dans une base de données centralisée, permettant ainsi de procéder à des analyses sur l'ensemble des secteurs. Avec l'adoption des standards européens (Treatment Demand Indicator), la comparabilité des données au plan international est également garantie.

act-info est financé par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). La réalisation des relevés effectués dans les différents domaines de traitement est confiée à Addiction Info Suisse à Lausanne et à l'Institut suisse de recherche sur les addictions et la santé à Zürich (ISGF).

act-info dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance (SAMBAD)

Dès 2004, les instruments de monitoring act-info ont été introduits dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance et ont remplacé les anciens questionnaires en vigueur depuis 1994. Après plusieurs années d'utilisation, une révision de ces instruments a eu lieu et les nouveaux questionnaires ont été introduits le 1^{er} janvier 2013. Ce processus a été harmonisé avec la révision des normes européennes. De façon à répondre aux différents besoins, une version raccourcie est également disponible dans le domaine ambulatoire. Le monitoring dans ce secteur est confié à Addiction Suisse à Lausanne.

La statistique act-info SAMBAD offre un aperçu de la clientèle de l'aide ambulatoire en matière de dépendance en Suisse. Les données sont récoltées au début et à la fin de la prise en charge. Les informations rassemblées à l'admission renseignent en particulier sur les caractéristiques sociodémographiques des client-e-s, sur leurs expériences de traitement ainsi que sur leurs modes de consommation et problèmes psychosociaux avant la prise en charge. Les informations récoltées à la sortie rendent principalement compte des circonstances de la fin de la prise en charge et des caractéristiques sociodémographiques des client-e-s à ce moment.

En 2015, 66 des 183 institutions recensées dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance ont participé au monitoring act-info. Il s'agit de services de consultation spécialisés pour les problèmes liés à l'alcool et/ou aux drogues illégales ainsi que de divers types de services polyvalents offrant également une aide pour les problèmes addictifs.

Explications concernant les tableaux

La présente statistique descriptive des données de l'enquête *act-info* auprès des client-e-s du secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance repose sur deux types de tableaux:

- lorsque la question a des catégories de réponses prédéfinies ou recodées en tranches distinctes (par exemple "état civil" ou "âge"), le tableau indique les pourcentages des différentes catégories de réponses
- lorsque la question n'a pas de catégories prédéfinies, mais requiert une valeur numérique (par exemple "âge au début de la consommation problématique"), le tableau présente des paramètres de position (moyenne, médiane) et des paramètres de dispersion (écart-type, 1er quartile, 3e quartile)

La plupart des tableaux présentent les résultats de façon distincte pour les sous-groupes de patients et patientes ayant mentionné l'alcool, un opioïde (héroïne notamment), la cocaïne (et dérivés) ou le cannabis comme problème principal au moment de leur admission. Les proches venant consulter pour les problèmes d'un tiers font également l'objet d'analyses séparées pour les aspects socio-démographiques. A l'exception des thèmes directement liés aux modes de consommation ou aux formes de comportements addictifs non liés aux substances, les résultats ne sont en revanche pas présentés séparément pour les client-e-s (peu nombreux) ayant mentionné d'autres substances (par exemple un stimulant ou les substances volatiles) ou un problème addictif non lié à une substance (par exemple jeu pathologique) comme problème principal. Ces personnes sont cependant incluses dans les analyses portant sur l'ensemble des prises en charge figurant dans les blocs à droite des tableaux respectifs. Toutes les analyses sont effectuées séparément pour les hommes et pour les femmes ainsi que pour les deux sexes confondus (colonnes "Total" comprenant le cas échéant également les quelques personnes dont le sexe n'est pas connu).

Seules les réponses valides sont prises en considération dans les analyses. Autrement dit, les réponses "pas connu" et les informations manquantes (missings) sont exclues des analyses. Le nombre de réponses valides N représente le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages ou autres paramètres. Il est indiqué pour chaque groupe ou sous-groupe considéré. Au dessous, le nombre correspondant de données manquantes figure également. Les résultats dont la part de données manquantes est importante doivent être interprétés particulièrement prudemment.

Des notes en bas de tableau renseignent sur les éventuelles particularités des groupes de référence ainsi que sur le type de question. Lorsque plusieurs réponses sont possibles (par exemple aux tableaux du thème T19, "autres problèmes addictifs") les pourcentages obtenus ne sont pas additifs.

Les institutions ne participant pas au monitoring *act-info* ont été invitées à fournir des données de base (âge, sexe et problème principal à l'admission). 21 institutions ont répondu à cette demande. Les données de ces institutions ont été analysées séparément et les résultats sont présentés en annexe.

T1 Sexe et âge à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2015)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Sexe*																			
hommes	69.8			79.2			82.2			84.6			22.6			65.8			4 043
femmes	30.2			20.8			17.8			15.4			77.4			34.2			2 098
sexe pas connu	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0
N**	2 132	924	3 056	210	55	265	199	43	242	880	160	1 040	207	708	915	4 043	2 098	6 141	6 141
Age (en années)*																			
jusqu'à 14	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	3.1	4.2	2.0	1.3	1.4	1.8	1.1	1.5	93
15-19	2.0	2.8	2.3	0.5	0.0	0.4	4.0	7.0	4.5	53.8	56.0	54.1	4.5	2.9	3.2	14.6	8.3	12.4	762
20-24	4.5	3.2	4.2	10.0	18.2	11.7	11.6	23.3	13.6	16.5	9.4	15.4	4.0	3.9	3.9	8.6	5.5	7.6	463
25-29	7.3	4.3	6.4	11.9	12.7	12.1	19.6	18.6	19.4	7.6	11.9	8.3	4.0	7.2	6.5	8.8	7.1	8.2	502
30-34	12.5	9.3	11.5	18.6	16.4	18.1	24.1	25.6	24.4	8.1	6.9	7.9	6.4	9.0	8.5	12.2	9.3	11.2	686
35-39	11.7	11.0	11.5	17.6	7.3	15.5	18.6	14.0	17.8	4.4	4.4	4.4	6.9	7.0	7.0	10.3	9.2	9.9	607
40-44	11.4	10.6	11.2	19.0	20.0	19.2	12.6	2.3	10.7	2.1	3.8	2.3	9.4	12.6	11.9	9.4	10.6	9.8	598
45-49	14.0	14.7	14.2	13.3	14.5	13.6	5.5	4.7	5.4	2.1	1.9	2.0	15.8	17.1	16.8	10.4	13.9	11.6	710
50-54	14.0	14.2	14.1	5.2	7.3	5.7	3.0	2.3	2.9	0.8	2.5	1.1	16.3	15.9	16.0	9.3	12.8	10.5	644
55-59	10.2	12.8	11.0	1.4	0.0	1.1	1.0	2.3	1.2	0.0	0.0	0.0	11.4	9.3	9.8	6.6	9.5	7.6	464
60-64	5.7	8.1	6.4	1.9	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	6.4	4.7	5.1	3.8	5.5	4.4	267
65-69	3.9	5.3	4.4	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	4.2	4.8	2.6	4.0	3.1	189
70-74	1.3	2.4	1.6	0.0	1.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.3	3.2	0.9	2.3	1.4	83
75 et plus	1.1	1.2	1.1	0.0	1.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	1.6	1.9	0.7	1.2	0.9	53
N**	2 132	924	3 056	210	55	265	199	43	242	878	159	1 037	202	697	899	4 036	2 085	6 121	6 121
données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	5	11	16	7	13	20	20
Age (valeurs centrales)																			
moyenne	44.7	47.1	45.4	37.9	37.5	37.8	33.6	31.0	33.2	22.3	22.9	22.4	47.5	45.6	46.0	37.9	43.1	39.7	
écart-type	13.1	13.3	13.2	9.6	12.4	10.2	8.5	9.1	8.6	8.4	9.2	8.5	15.3	14.0	14.3	15.2	15.2	15.4	
1er quartile	34.5	37.3	35.3	31.3	26.8	30.5	27.1	23.2	26.8	16.8	16.7	16.8	37.8	35.9	36.2	25.0	31.9	27.0	
valeur médiane	45.2	47.8	46.1	37.8	35.4	37.6	33.1	30.4	32.6	18.3	17.9	18.3	49.0	46.9	47.3	36.9	44.6	39.5	
3e quartile	53.8	56.6	54.8	44.5	45.6	44.5	39.39	35.1	38.7	25.2	27.2	25.5	56.9	54.4	55.0	49.5	54.0	51.1	
N**	2 132	924	3 056	210	55	265	199	43	242	878	159	1 037	202	697	899	4 036	2 085	6 121	
données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	5	11	16	7	13	20	

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T2 État civil et nationalité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2015)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Etat civil*																			
célibataire	44.0	34.6	41.1	65.8	60.8	64.7	65.2	81.6	68.1	93.0	90.1	92.5	25.7	24.3	24.6	57.3	38.7	51.0	2 836
marié-e	30.4	30.6	30.4	16.3	15.7	16.2	18.5	10.5	17.1	5.0	4.6	4.9	51.4	52.8	52.4	24.7	34.7	28.1	1 563
séparé-e	5.3	5.4	5.3	3.7	2.0	3.3	1.1	0.0	0.9	0.0	1.5	0.2	5.5	3.6	4.0	3.5	3.8	3.6	201
divorcé-e	18.3	25.7	20.6	13.2	21.6	14.9	12.9	7.9	12.0	1.4	3.8	1.8	15.8	15.4	15.5	12.9	19.2	15.0	837
veuf/veuve	1.6	3.5	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	1.6	3.0	2.7	1.0	2.9	1.7	92
partenariat enregistré	0.5	0.2	0.4	1.1	0.0	0.8	2.2	0.0	1.9	0.4	0.0	0.3	0.0	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	37
N**	1 973	856	2 829	190	51	241	178	38	216	767	131	898	183	635	818	3 671	1 895	5 566	5 566
données manquantes	159	68	227	20	4	24	21	5	26	113	29	142	24	73	97	372	203	575	575
Nationalité*																			
CH	77.2	84.5	79.4	69.7	83.3	72.7	64.3	87.2	68.3	80.4	81.8	80.6	83.7	84.1	84.0	76.7	84.4	79.4	4 461
UE	16.8	12.3	15.4	22.1	7.4	18.9	23.1	7.7	20.4	11.3	8.4	10.8	11.2	11.7	11.6	16.0	11.1	14.3	804
autre	6.0	3.2	5.2	8.2	9.3	8.4	12.6	5.1	11.3	8.4	9.8	8.6	5.1	4.3	4.4	7.3	4.5	6.3	356
N**	1 968	864	2 832	195	54	249	182	39	221	789	143	932	178	634	812	3 692	1 929	5 621	5 621
données manquantes	164	60	224	15	1	16	17	4	21	91	17	108	29	74	103	351	169	520	520

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T3 Degré d'urbanisation du domicile, type de ménage et situation de domicile à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2015)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge				N
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total								
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Degré d'urbanisation*																				
grands centres urbains	8.3	12.1	9.4	3.0	3.7	3.1	3.8	4.8	3.9	2.0	0.7	1.8	6.5	10.1	9.3	5.6	9.2	6.8	396	
périphérie des grands centres	15.1	13.8	14.7	5.0	5.6	5.1	23.7	16.7	22.4	15.2	13.0	14.8	17.9	16.3	16.6	14.5	13.5	14.2	823	
villes de moyenne importance	11.6	11.6	11.6	5.9	11.1	7.0	11.8	14.3	12.3	16.5	11.0	15.7	11.4	12.2	12.0	12.6	13.2	12.8	745	
petites villes	35.0	33.7	34.6	56.9	51.9	55.9	38.2	38.1	38.2	35.5	41.1	36.4	37.5	35.3	35.8	37.7	35.7	37.0	2 154	
campagne	30.1	28.9	29.7	29.2	27.8	28.9	22.6	26.2	23.2	30.8	34.2	31.3	26.6	26.2	26.3	29.6	28.3	29.2	1 697	
N**	2 059	887	2 946	202	54	256	186	42	228	811	146	957	184	646	830	3 844	1 971	5 815	5 815	
données manquantes	73	37	110	8	1	9	13	1	14	69	14	83	23	62	85	199	127	326	326	
Type de ménage (30 derniers jours)*																				
seul-e en ménage	38.4	34.0	37.1	42.2	24.5	38.1	32.5	25.7	31.3	14.0	16.8	14.4	8.3	12.8	11.8	30.7	26.9	29.6	1 404	
avec famille d'origine	8.6	4.3	7.3	13.0	8.2	11.9	21.1	22.9	21.4	64.8	51.1	62.7	19.4	6.0	8.9	24.3	11.4	20.4	968	
avec partenaire et/ou avec enfant(s)	42.8	54.2	46.2	26.1	51.0	31.9	32.5	40.0	33.8	11.0	15.3	11.6	68.1	80.1	77.5	34.3	53.2	40.1	1 903	
avec des amis ou d'autres personnes	3.2	2.0	2.8	1.9	6.1	2.9	4.8	8.6	5.5	3.5	3.1	3.5	1.4	1.1	1.2	3.3	2.7	3.1	148	
en prison	0.2	0.0	0.2	3.1	2.0	2.9	1.2	0.0	1.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.3	15	
institution/foyer	2.7	1.0	2.2	6.2	8.2	6.7	1.8	2.9	2.0	2.0	5.3	2.5	0.0	0.0	0.0	2.6	1.7	2.3	109	
hôpital/clinique	1.6	1.3	1.5	1.2	0.0	1.0	1.8	0.0	1.5	0.3	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	1.1	1.2	1.1	54	
autre	2.5	3.2	2.7	6.2	0.0	4.8	4.2	0.0	3.5	4.3	7.6	4.8	2.8	0.0	0.6	3.3	2.9	3.2	150	
N**	1 805	783	2 588	161	49	210	166	35	201	738	131	869	72	266	338	3 299	1 452	4 751	4 751	
données manquantes	327	141	468	49	6	55	33	8	41	142	29	171	135	442	577	744	646	1 390	1 390	
Situation de domicile (30 dernier jours)*																				
logement stable	92.0	93.6	92.5	80.1	88.4	82.0	87.4	92.9	88.3	94.6	89.5	93.8	94.8	96.1	95.8	91.7	93.4	92.2	4 129	
logement instable/SDF	3.9	2.7	3.6	10.6	4.7	9.3	6.7	3.6	6.1	2.0	5.3	2.5	5.2	3.9	4.2	4.1	3.3	3.8	171	
en prison	0.2	0.0	0.2	2.6	2.3	2.6	1.5	0.0	1.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.3	14	
institution/foyer/hôpital/autre	3.9	3.6	3.8	6.6	4.7	6.2	4.4	3.6	4.3	3.3	5.3	3.6	0.0	0.0	0.0	3.8	3.3	3.6	162	
N**	1 729	769	2 498	151	43	194	135	28	163	643	114	757	77	282	359	3 061	1 415	4 476	4 476	
données manquantes	403	155	558	59	12	71	64	15	79	237	46	283	130	426	556	982	683	1 665	1 665	

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T4 Type de relation de couple, nombre d'enfants propres et d'enfants vivant dans le ménage à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2015)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
Type de relation de couple*	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
sans partenaire, seul-e	39.2	38.7	39.1	61.5	46.2	57.7	51.6	35.3	48.1	64.6	54.8	62.8	31.7	23.1	25.0	45.7	36.9	42.8	1 258
relations temporaires	2.6	3.7	3.0	3.8	3.8	3.8	1.6	5.9	2.5	4.5	5.5	4.7	0.0	1.3	1.0	2.9	3.2	3.0	87
partenaire fixe, vivant séparé	10.2	10.6	10.4	5.1	11.5	6.7	9.4	29.4	13.6	19.2	28.8	20.9	4.8	7.9	7.2	11.3	12.2	11.6	341
partenaire fixe, ménage commun	47.9	47.0	47.6	29.5	38.5	31.7	37.5	29.4	35.8	11.7	11.0	11.6	63.5	67.7	66.8	40.2	47.7	42.7	1 255
N**	1 211	517	1 728	78	26	104	64	17	81	333	73	406	63	229	292	1 964	977	2 941	2 941
données manquantes	921	407	1 328	132	29	161	135	26	161	547	87	634	144	479	623	2 079	1 121	3 200	3 200
Nombre d'enfants propres*																			
aucun	56.9	48.2	54.3	74.5	68.4	73.3	77.6	90.3	79.9	95.1	90.8	94.4	33.3	30.5	31.1	69.1	52.9	64.1	2 789
1 enfant	13.7	19.5	15.4	11.5	21.1	13.3	11.2	6.5	10.3	2.5	3.8	2.7	16.7	17.6	17.4	10.3	16.2	12.1	526
2 enfants	20.2	21.1	20.5	11.5	7.9	10.8	5.6	3.2	5.2	1.5	2.3	1.7	38.5	38.0	38.1	14.1	21.2	16.3	709
3 enfants ou plus	9.2	11.2	9.8	2.5	2.6	2.6	5.6	0.0	4.6	0.8	3.1	1.2	11.5	13.9	13.4	6.5	9.7	7.5	326
N**	1 612	681	2 293	157	38	195	143	31	174	712	130	842	78	295	373	3 015	1 335	4 350	4 350
données manquantes	520	243	763	53	17	70	56	12	68	168	30	198	129	413	542	1 028	763	1 791	1 791
Nombre d'enfants dans le ménage*																			
aucun	86.1	80.2	84.4	97.4	89.2	95.7	93.0	97.1	93.8	92.2	89.7	91.8	74.5	57.8	61.2	88.4	78.4	85.4	3 592
1 enfant	5.5	10.7	7.1	2.0	8.1	3.2	2.1	2.9	2.3	2.1	4.0	2.4	5.5	14.7	12.8	4.2	9.7	5.9	247
2 enfants	5.9	7.0	6.3	0.7	2.7	1.1	2.8	0.0	2.3	4.1	3.2	3.9	10.9	22.5	20.1	5.0	9.1	6.3	263
3 enfants ou plus	2.5	2.1	2.3	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	1.7	1.7	3.2	1.9	9.1	5.0	5.9	2.4	2.8	2.5	105
N**	1 587	682	2 269	151	37	188	143	34	177	715	126	841	55	218	273	2 947	1 260	4 207	4 207
données manquantes	545	242	787	59	18	77	56	9	65	165	34	199	152	490	642	1 096	838	1 934	1 934

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T5 Plus haute formation achevée et statut professionnel à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2015)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Plus haute formation achevée*																			
aucune formation achevée	4.0	6.1	4.6	4.6	8.6	5.4	5.8	9.1	6.4	16.9	16.4	16.9	2.4	2.7	2.6	7.8	6.2	7.3	320
école obligatoire	9.7	10.9	10.0	21.4	17.1	20.5	23.2	21.2	22.9	46.1	50.9	46.7	5.6	7.5	7.1	20.1	15.1	18.5	808
formation de transition	1.8	2.3	2.0	1.5	11.4	3.6	2.6	6.1	3.2	2.5	3.6	2.7	0.0	1.9	1.5	1.9	2.6	2.2	94
formation générale sans maturité	10.6	6.1	9.3	16.8	8.6	15.1	9.7	9.1	9.6	4.5	2.7	4.2	21.0	11.9	14.0	9.6	7.3	8.9	388
formation prof. de base et apprentissage	53.4	51.9	53.0	42.0	37.1	41.0	49.0	39.4	47.3	25.1	20.9	24.5	31.5	47.4	43.7	44.0	46.1	44.7	1 952
maturité ou école normale	4.0	6.4	4.7	0.8	11.4	3.0	1.9	6.1	2.7	3.0	1.8	2.8	8.1	7.1	7.3	3.7	6.7	4.7	204
formation prof. supérieure	7.6	7.0	7.4	4.6	2.9	4.2	4.5	3.0	4.3	0.4	2.7	0.8	11.3	8.3	9.0	5.6	6.6	5.9	258
haute école spécialisée et université	7.5	8.4	7.8	7.6	0.0	6.0	3.2	6.1	3.7	1.5	0.9	1.4	15.3	12.4	13.1	6.2	8.4	6.9	302
doctorat ou habilitation	1.3	1.1	1.3	0.8	2.9	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.7	1.7	1.0	1.0	1.0	44
N**	1 591	644	2 235	131	35	166	155	33	188	673	110	783	124	411	535	2 982	1 388	4 370	4 370
<i>données manquantes</i>	<i>541</i>	<i>280</i>	<i>821</i>	<i>79</i>	<i>20</i>	<i>99</i>	<i>44</i>	<i>10</i>	<i>54</i>	<i>207</i>	<i>50</i>	<i>257</i>	<i>83</i>	<i>297</i>	<i>380</i>	<i>1 061</i>	<i>710</i>	<i>1 771</i>	<i>1 771</i>
Statut professionnel*																			
sans activité professionnelle	18.0	30.8	21.9	32.4	31.3	32.2	16.7	43.8	20.8	13.4	9.4	12.8	0.0	24.1	23.3	17.3	27.8	20.1	414
apprenti-e, stagiaire	2.2	1.8	2.1	5.4	0.0	4.4	4.4	12.5	5.7	28.7	34.0	29.4	0.0	0.0	0.0	8.6	5.8	7.8	161
manœuvre, aide	3.9	4.5	4.1	5.4	6.3	5.6	4.4	0.0	3.8	2.8	1.9	2.7	0.0	0.0	0.0	3.8	4.0	3.8	79
ouvrier/ère formé-e sur le tas	7.2	4.2	6.3	8.1	0.0	6.7	11.1	0.0	9.4	5.0	1.9	4.5	0.0	3.4	3.3	7.1	3.4	6.1	126
ouvrier/ère formé-e (CFC)	15.5	6.1	12.7	20.3	12.5	18.9	22.2	18.8	21.7	12.8	3.8	11.5	0.0	3.4	3.3	15.1	6.7	12.8	264
contremaître-ssse	2.9	0.0	2.0	1.4	12.5	3.3	3.3	0.0	2.8	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	2.5	0.4	1.9	40
employé-e non qualifié-e	20.6	34.7	24.8	9.5	18.8	11.1	15.6	12.5	15.1	8.1	7.5	8.0	100.0	37.9	40.0	17.2	30.5	20.8	427
empl. qualifié-e, cadre moyen	12.2	8.7	11.2	6.8	18.8	8.9	14.4	12.5	14.2	2.2	1.9	2.1	0.0	20.7	20.0	9.4	8.9	9.3	191
employé-e, cadre supérieur	5.2	1.6	4.1	4.1	0.0	3.3	2.2	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.3	3.7	1.6	3.2	65
indépendant-e	10.0	5.8	8.7	4.1	0.0	3.3	5.6	0.0	4.7	2.2	1.9	2.1	0.0	3.4	3.3	7.4	4.5	6.6	136
écolier/ère, étudiant-e	1.5	0.8	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.7	37.7	25.7	0.0	0.0	0.0	7.0	5.1	6.5	133
autre statut	0.8	1.1	0.9	2.7	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	0.0	3.4	3.3	0.9	1.3	1.0	21
N**	892	380	1 272	74	16	90	90	16	106	321	53	374	1	29	30	1 506	551	2 057	2 057
<i>données manquantes</i>	<i>1 240</i>	<i>544</i>	<i>1 784</i>	<i>136</i>	<i>39</i>	<i>175</i>	<i>109</i>	<i>27</i>	<i>136</i>	<i>559</i>	<i>107</i>	<i>666</i>	<i>206</i>	<i>679</i>	<i>885</i>	<i>2 537</i>	<i>1 547</i>	<i>4 084</i>	<i>4 084</i>

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T6 Source de revenu principale et taux d'activité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2015)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			N
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Source de revenu principale (au cours des 30 derniers jours)*																			
salaire	54.0	41.2	50.1	28.5	29.4	28.7	59.9	26.3	54.1	30.0	26.3	29.4	74.3	62.3	65.0	47.2	43.0	45.9	2 299
économies, épargne	2.3	1.1	1.9	0.0	0.0	0.0	2.2	2.6	2.3	0.3	0.0	0.2	0.0	0.8	0.6	1.7	0.9	1.5	73
rente (AVS, AI ou autre)	15.7	21.3	17.4	12.9	21.6	14.8	8.2	15.8	9.5	5.0	5.1	5.0	13.5	14.4	14.2	12.2	18.0	14.0	700
aide sociale	14.1	12.5	13.6	39.8	33.3	38.4	11.0	23.7	13.2	9.6	13.9	10.2	0.0	2.3	1.8	13.8	11.2	13.0	650
assurance-chômage	7.5	5.4	6.9	8.6	3.9	7.6	6.0	15.8	7.7	4.7	5.8	4.9	0.0	1.9	1.5	6.3	4.7	5.9	293
soutien du/de la partenaire	1.9	13.4	5.4	2.7	5.9	3.4	3.3	2.6	3.2	0.9	1.5	1.0	4.1	12.8	10.9	1.9	11.1	4.7	233
soutien parents/proches/amis	2.4	3.0	2.6	2.7	2.0	2.5	6.0	7.9	6.4	47.7	45.3	47.3	8.1	5.1	5.7	14.5	9.1	12.9	644
deal, petit trafic	0.1	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	0.5	0.0	0.5	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	10
autres revenus illégaux	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
prostitution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
assurance d'indemnités journalières	1.1	0.8	1.0	2.2	2.0	2.1	1.1	5.3	1.8	0.4	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	1.0	0.7	0.9	45
autre	1.0	1.3	1.1	1.6	2.0	1.7	1.6	0.0	1.4	0.8	1.5	0.9	0.0	0.4	0.3	1.1	1.2	1.1	56
N**	1 907	837	2 744	186	51	237	182	38	220	763	137	900	74	257	331	3 497	1 507	5 004	5 004
données manquantes	225	87	312	24	4	28	17	5	22	117	23	140	133	451	584	546	591	1 137	1 137
Taux d'activité principal (au cours des 30 derniers jours)*																			
activité à plein temps (dès 70%)	50.2	27.6	43.7	25.3	26.2	25.5	57.9	23.7	51.7	21.0	15.4	20.2	65.7	37.2	43.4	42.1	28.7	38.2	1 810
activité à temps partiel	5.3	19.6	9.4	3.9	4.8	4.1	5.8	5.3	5.7	2.5	7.4	3.2	9.0	33.5	28.2	4.6	19.9	9.0	426
jobs occasionnels	1.6	0.8	1.4	1.1	2.4	1.4	2.3	0.0	1.9	0.7	0.0	0.6	0.0	1.7	1.3	1.4	1.0	1.2	59
en formation	3.1	3.1	3.1	1.7	2.4	1.8	5.3	7.9	5.7	50.7	54.4	51.3	11.9	5.8	7.1	16.1	11.2	14.7	697
sans travail, en quête d'emploi	13.2	11.8	12.8	20.8	11.9	19.1	9.9	31.6	13.9	10.8	11.0	10.9	0.0	2.5	1.9	12.6	10.1	11.8	561
sans travail, sans recherche d'emploi	5.5	6.2	5.7	20.2	11.9	18.6	9.4	7.9	9.1	4.1	5.9	4.3	4.5	0.8	1.6	6.2	5.0	5.8	277
rentier/rentière	8.8	13.3	10.1	1.7	9.5	3.2	0.6	0.0	0.5	0.4	0.7	0.4	9.0	9.9	9.7	5.5	10.0	6.8	322
incapacité de travail	6.1	6.8	6.3	13.5	11.9	13.2	5.8	10.5	6.7	3.3	2.9	3.2	0.0	3.3	2.6	5.4	5.9	5.6	264
femme/homme au foyer	0.2	5.5	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	1.0	0.1	0.7	0.2	0.0	4.5	3.6	0.1	4.1	1.3	60
autre	6.0	5.3	5.8	11.8	19.0	13.2	2.9	7.9	3.8	6.4	1.5	5.7	0.0	0.8	0.6	6.1	4.1	5.5	261
N**	1 823	739	2 562	178	42	220	171	38	209	765	136	901	67	242	309	3 370	1 367	4 737	4 737
données manquantes	309	185	494	32	13	45	28	5	33	115	24	139	140	466	606	673	731	1 404	1 404

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T7 Revenu mensuel net et dettes à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2015)

	Patient-e-s: problème principale												Proches			Toutes prises en charge			N
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Revenu mensuel net (6 derniers mois)*																			
aucun revenu	49.7	54.5	50.9	81.3	70.6	79.0	45.0	66.7	49.0	62.5	78.8	65.4	97.6	95.0	95.7	56.8	70.3	60.6	807
moins de 1000 fr.	2.4	1.5	2.2	1.6	0.0	1.2	2.5	0.0	2.0	13.8	12.1	13.5	0.0	1.0	0.7	4.5	2.4	3.9	52
de 1001 à 2000 fr.	3.6	4.5	3.8	7.8	5.9	7.4	2.5	0.0	2.0	4.6	3.0	4.3	0.0	2.0	1.4	3.9	3.4	3.8	50
de 2001 à 3000 fr.	6.0	11.1	7.3	1.6	0.0	1.2	2.5	11.1	4.1	2.6	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	4.3	6.1	4.8	64
de 3001 à 4000 fr.	8.0	14.1	9.6	3.1	0.0	2.5	10.0	11.1	10.2	3.3	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	6.3	7.7	6.7	89
de 4001 à 5000 fr.	10.8	7.6	10.0	1.6	11.8	3.7	17.5	0.0	14.3	8.6	3.0	7.6	0.0	0.0	0.0	9.3	4.8	8.0	107
de 5001 à 6000 fr.	7.7	4.0	6.8	3.1	0.0	2.5	10.0	0.0	8.2	1.3	0.0	1.1	2.4	0.0	0.7	6.0	2.1	4.9	65
de 6001 à 8000 fr.	6.3	1.5	5.1	0.0	0.0	0.0	5.0	11.1	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.4	4.3	1.6	3.5	47
de 8001 à 10 000 fr.	4.5	1.0	3.6	0.0	11.8	2.5	5.0	0.0	4.1	3.3	3.0	3.2	0.0	0.0	0.0	4.1	1.6	3.4	45
de 10 001 à 15 000 fr.	0.9	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	5
plus de 15 000 fr.	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	1
N**	584	198	782	64	17	81	40	9	49	152	33	185	41	100	141	955	377	1 332	1 332
données manquantes	1 548	726	2 274	146	38	184	159	34	193	728	127	855	166	608	774	3 088	1 721	4 809	4 809
Dettes*																			
aucune dette	63.9	77.3	67.5	29.1	54.5	33.3	33.3	58.3	37.3	79.8	83.7	80.4	72.2	95.9	91.2	63.8	80.2	68.3	1 170
jusqu'à 5000 fr.	3.9	3.9	3.9	1.8	0.0	1.5	6.3	16.7	8.0	5.6	4.1	5.3	0.0	0.0	0.0	4.5	3.6	4.3	73
de 5001 à 10 000 fr.	12.6	10.2	12.0	27.3	27.3	27.3	17.5	8.3	16.0	5.6	6.1	5.6	11.1	0.0	2.2	11.7	7.6	10.6	181
de 10 001 à 25 000 fr.	5.4	4.7	5.2	9.1	18.2	10.6	17.5	0.0	14.7	6.3	2.0	5.6	11.1	2.7	4.4	6.5	4.4	5.9	101
de 25 001 à 50 000 fr.	5.4	0.4	4.0	12.7	0.0	10.6	9.5	16.7	10.7	0.8	2.0	1.0	0.0	1.4	1.1	5.3	1.7	4.3	74
de 50 001 à 100 000 fr.	3.6	0.8	2.9	10.9	0.0	9.1	6.3	0.0	5.3	2.0	0.0	1.7	5.6	0.0	1.1	3.6	0.6	2.7	47
plus de 100 000 fr.	1.7	0.0	1.3	3.6	0.0	3.0	7.9	0.0	6.7	0.0	2.0	0.3	0.0	0.0	0.0	2.3	0.4	1.8	31
montant inconnu	3.5	2.7	3.3	5.5	0.0	4.5	1.6	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	1.5	2.0	35
N**	689	256	945	55	11	66	63	12	75	252	49	301	18	73	91	1 238	474	1 712	1 712
données manquantes	1 443	668	2 111	155	44	199	136	31	167	628	111	739	189	635	824	2 805	1 624	4 429	4 429

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T8 Emprisonnement ou détention préventive avant l'admission et durée totale de détention, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2015)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Emprisonnement ou détention préventive*																
aucun-e	91.7	99.1	94.2	60.0	100.0	66.7	95.2	100.0	96.0	89.8	100.0	91.4	91.3	99.2	93.8	720
emprisonnement	3.2	0.4	2.3	20.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.4	2.2	17
détention préventive	3.0	0.4	2.1	20.0	0.0	16.7	4.8	0.0	4.0	8.2	0.0	6.9	3.8	0.4	2.7	21
emprisonnement et détention préventive	2.1	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.7	1.9	0.0	1.3	10
N**	432	225	657	10	2	12	21	4	25	49	9	58	527	241	768	768
données manquantes	1 700	699	2 399	200	53	253	178	39	217	831	151	982	3 309	1 149	4 458	4 458
Durée totale de détention***																
jusqu'à 1 mois	20.8	0.0	20.8	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	33.3	0.0	33.3	22.6	0.0	22.6	7
> 1 à 2 mois	12.5	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	0.0	9.7	3
> 2 à 6 mois	16.7	0.0	16.7	66.7	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	33.3	22.6	0.0	22.6	7
> 6 à 12 mois	20.8	0.0	20.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	0.0	16.1	5
plus de 1 an	29.2	0.0	29.2	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	33.3	29.0	0.0	29.0	9
N**	24	0	24	3	0	3	1	0	1	3	0	3	31	0	31	31
données manquantes	12	2	14	1	0	1	0	0	0	2	0	2	15	2	17	17

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant une expérience de détention. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T9 Instance d'envoi principale, selon le problème principal et chez les proches (2015)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Instance d'envoi principale*																			
condamnation/mesure/justice/police	19.7	6.3	15.6	10.5	6.0	9.5	22.6	10.3	20.4	47.9	32.6	45.6	3.3	1.1	1.6	23.2	6.0	17.3	973
cabinet médical	7.6	11.3	8.7	9.9	6.0	9.1	5.1	5.1	5.1	3.7	5.1	3.9	2.2	2.9	2.7	6.4	7.8	6.9	387
institution spécialisée dans les addictions	7.8	7.5	7.7	11.6	8.0	10.8	3.4	2.6	3.2	0.8	2.9	1.1	1.1	2.9	2.5	5.5	5.0	5.3	300
autre service médical/social/de santé	17.2	16.6	17.0	9.4	12.0	10.0	11.3	17.9	12.5	7.8	13.0	8.5	4.4	4.3	4.3	13.3	12.3	13.0	728
institution formatrice/éducative	0.6	0.8	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.5	2.9	5.1	3.2	0.6	1.1	1.0	1.4	1.4	1.4	77
employeur/employeuse	2.7	2.8	2.7	2.8	0.0	2.2	2.3	5.1	2.8	2.9	2.9	2.9	0.6	0.8	0.7	2.6	2.0	2.4	135
initiative personnelle/famille/amis	42.9	52.7	45.9	55.2	64.0	57.1	53.1	53.8	53.2	32.5	37.0	33.2	87.3	86.0	86.3	45.9	63.4	51.8	2 908
autre	1.5	2.1	1.6	0.6	4.0	1.3	2.3	2.6	2.3	1.5	1.4	1.5	0.6	1.0	0.9	1.7	2.0	1.8	102
N**	1 994	858	2 852	181	50	231	177	39	216	787	138	925	181	629	810	3 706	1 904	5 610	5 610
données manquantes	138	66	204	29	5	34	22	4	26	93	22	115	26	79	105	337	194	531	531

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T10 Prise en charge consécutive à une mesure judiciaire et type de mesure, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2015)

	Patient-e-s: problème principal												Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Prise en charge consécutive à une mesure judiciaire*																
non, pas de mesure	87.2	95.5	89.6	93.2	94.4	93.5	85.5	90.5	86.2	76.5	77.5	76.7	86.3	93.8	88.2	2 602
suspension/ renonciation/ réprimande (art 19a ch2 LStup)	0.1	0.2	0.2	1.5	0.0	1.2	0.9	0.0	0.7	3.9	8.5	4.5	1.0	0.9	1.0	29
oui, consécutive à une mesure	12.6	4.3	10.3	5.3	5.6	5.4	13.7	9.5	13.0	19.6	14.1	18.8	12.7	5.2	10.8	320
N**	1 352	539	1 891	132	36	168	117	21	138	413	71	484	2 206	745	2 951	2 951
données manquantes	780	385	1 165	78	19	97	82	22	104	467	89	556	1 630	645	2 275	2 275
Type de mesure judiciaire***																
mes. protect. méd. (art 19a ch3 LStup)	0.8	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	1
mes. thérapeutiques institutionnelles (art 59 CP)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	3.3	0.6	0.0	0.6	1
traitement résidentiel (art 60 CP)	1.7	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	3.3	1.9	0.0	1.7	3
prise en charge ambulatoire	20.0	28.6	20.9	50.0	100.0	60.0	20.0	100.0	33.3	46.4	50.0	46.7	25.6	36.8	26.8	48
placement dans institution pour jeunes adultes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	3.3	1.3	5.3	1.7	3
en attente d'un jugement	1.7	0.0	1.5	50.0	0.0	40.0	40.0	0.0	33.3	7.1	50.0	10.0	5.6	5.3	5.6	10
autre	76.7	71.4	76.1	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	33.3	35.7	0.0	33.3	65.0	52.6	63.7	114
N**	120	14	134	4	1	5	5	1	6	28	2	30	160	19	179	179
données manquantes	53	10	63	5	1	6	11	1	12	69	14	83	142	27	169	169

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s dont le traitement est consécutif à une mesure judiciaire. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); Pourcentages par colonne

T11 Traitements/prises en charge avant l'admission et type de prises en charge antérieures, selon le problème principal et chez les proches (2015)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Prises en charge antérieures*																			
non	50.3	41.2	47.6	18.3	15.4	17.7	47.0	41.2	46.0	76.0	72.0	75.4	70.6	72.4	72.1	56.1	49.5	54.2	2 586
oui	49.7	58.8	52.4	81.7	84.6	82.3	53.0	58.8	54.0	24.0	28.0	24.6	29.4	27.6	27.9	43.9	50.5	45.8	2 189
N**	1 933	821	2 754	180	52	232	168	34	202	718	125	843	34	174	208	3 387	1 388	4 775	4 775
<i>données manquantes</i>	199	103	302	30	3	33	31	9	40	162	35	197	173	534	707	656	710	1 366	1 366
Type de prise en charge***																			
traitement avec prescription d'héroïne	0.7	0.0	0.4	8.1	9.1	8.3	3.2	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.5	1.0	13
substitution (méthadone, subutex)	5.4	4.2	5.0	68.9	59.1	66.7	16.1	40.0	19.4	2.4	0.0	2.1	0.0	2.4	2.0	11.0	6.7	9.5	123
autre traitement médicamenteux	8.9	7.4	8.4	8.1	13.6	9.4	3.2	0.0	2.8	1.2	7.1	2.1	10.0	2.4	3.9	7.9	7.3	7.7	99
prise en charge ambulatoire	75.9	73.4	75.1	59.5	68.2	61.5	80.6	60.0	77.8	85.5	85.7	85.6	70.0	92.7	88.2	76.8	76.1	76.6	987
structure/clinique de jour	1.0	2.6	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.9	1.8	1.2	16
traitement résidentiel	46.0	52.6	48.2	39.2	31.8	37.5	22.6	20.0	22.2	30.1	7.1	26.8	50.0	4.9	13.7	40.8	43.1	41.6	536
sev rage	37.5	43.9	39.7	43.2	54.5	45.8	25.8	0.0	22.2	13.3	7.1	12.4	20.0	4.9	7.8	33.2	35.8	34.1	439
groupe d'entraide ou d'auto-support	5.7	7.1	6.2	2.7	4.5	3.1	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	4.7	5.7	5.0	65
autre(s)	1.7	2.2	1.9	0.0	4.5	1.0	0.0	0.0	0.0	7.2	0.0	6.2	0.0	4.9	3.9	1.9	2.5	2.1	27
N**	594	312	906	74	22	96	31	5	36	83	14	97	10	41	51	853	436	1 289	1 289
<i>données manquantes</i>	372	174	546	73	22	95	58	15	73	93	21	114	0	9	9	645	271	916	916

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant une expérience de prise en charge antérieure. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

T12 Substitution ou prescription d'héroïne à l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2015)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			N
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Substitution ou prescription d'héroïne à l'admission*																
non	97.8	99.1	98.3	40.9	36.4	40.0	89.7	72.7	86.0	99.7	100.0	99.7	96.2	97.8	96.7	2 030
oui	2.2	0.9	1.7	59.1	63.6	60.0	10.3	27.3	14.0	0.3	0.0	0.3	3.8	2.2	3.3	69
N**	914	466	1 380	44	11	55	39	11	50	305	57	362	1 454	645	2 099	2 099
données manquantes	1 218	458	1 676	166	44	210	160	32	192	575	103	678	2 382	745	3 127	3 127
Type de substitution/prescription***																
héroïne	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	3.2	2
méthadone	76.5	75.0	76.2	48.0	85.7	56.3	75.0	50.0	66.7	0.0	0.0	0.0	59.2	76.9	62.9	39
autres opiacés	17.6	25.0	19.0	40.0	14.3	34.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	15.4	25.8	16
autres substances	5.9	0.0	4.8	4.0	0.0	3.1	25.0	50.0	33.3	100.0	0.0	100.0	8.2	7.7	8.1	5
N**	17	4	21	25	7	32	4	2	6	1	0	1	49	13	62	62
données manquantes	3	0	3	1	0	1	0	1	1	0	0	0	6	1	7	7
Traitement de substitution dans la vie?*																
non	96.0	96.6	96.2	35.8	38.3	36.4	89.8	87.5	89.4	98.8	98.7	98.8	92.0	93.6	92.4	2 859
oui	4.0	3.4	3.8	64.2	61.7	63.6	10.2	12.5	10.6	1.2	1.3	1.2	8.0	6.4	7.6	234
N**	1 326	589	1 915	159	47	206	118	24	142	431	76	507	2 254	839	3 093	3 093
données manquantes	806	335	1 141	51	8	59	81	19	100	449	84	533	1 582	551	2 133	2 133
Age lors du premier traitement de substitution****																
Moyenne	31.1	34.2	31.9	28.3	26.3	28.0	26.8	19.5	25.0	26.5	-	26.5	28.6	28.3	28.5	
Ecart-type	9.6	11.1	9.8	7.5	7.6	7.5	3.9	2.1	4.8	0.7	-	0.7	7.6	9.3	7.9	
25 centile	26.0	32.0	26.0	22.0	21.0	22.0	22.0	18.0	21.5	26.0	-	26.0	23.0	21.0	22.0	
Médiane	29.5	33.0	30.0	28.0	24.0	27.0	28.0	19.5	25.0	26.5	-	26.5	28.0	25.0	28.0	
75 centile	35.0	35.0	35.0	31.0	33.0	31.0	30.0	21.0	29.0	27.0	-	27.0	30.0	33.0	31.0	
N**	14	5	19	30	7	37	6	2	8	2	0	2	55	15	70	

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant signalé un traitement de substitution ou de prescription d'héroïne à l'admission. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant eu une expérience de substitution au cours de leur vie

T13 Problème principal à l'admission (seulement patient-e-s) (2015)

Tous patients et patientes												
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
	%	%	%	%	N	%	%	%	%	N		
Problème principal*												
alcool	55.6	66.5	58.5		3 056	alcool	55.6	66.5	58.5		3 056	
héroïne	4.8	3.2	4.4		231							
méthadone	0.4	0.3	0.4		19							
buprénorphine	0.0	0.1	0.0		2	opioïdes	5.5	4.0	5.1		265	
fentanyl	0.0	0.0	0.0		0							
autres opioïdes	0.2	0.3	0.2		13							
cocaïne en poudre	5.2	3.0	4.6		240							
crack	0.0	0.1	0.0		2	cocaïne ou dérivés	5.2	3.1	4.6		242	
autre forme de cocaïne	0.0	0.0	0.0		0							
amphétamines	0.6	0.7	0.7		34							
méthamphétamines	0.1	0.0	0.1		5							
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.3	0.4	0.3		17	stimulants	1.1	1.2	1.1		58	
cathinones synthétiques	0.0	0.0	0.0		0							
autres stimulants	0.0	0.1	0.0		2							
barbituriques	0.0	0.2	0.1		3							
benzodiazépines	0.5	0.8	0.6		31	hypnotiques/sédatifs	0.7	1.3	0.9		46	
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0		1							
autres somnifères et tranquillisants	0.2	0.3	0.2		11							
LSD	0.1	0.1	0.1		4							
kétamine	0.0	0.0	0.0		0	hallucinogènes	0.1	0.1	0.1		6	
autres hallucinogènes	0.1	0.0	0.0		2							
cannabis	22.9	11.5	19.9		1 040	cannabis	22.9	11.5	19.9		1 040	
tabac	2.0	3.7	2.4		128	tabac	2.0	3.7	2.4		128	
substances volatiles	0.0	0.0	0.0		0	autres substances	0.5	0.4	0.5		25	
autre substance	0.5	0.4	0.5		25							
jeu pathologique	2.9	1.2	2.4		127							
dépendances aux ordinateurs/Internet	2.5	0.4	1.9		99	comportement de type addictif	6.4	8.3	6.9		360	
troubles alimentaires	0.3	5.2	1.6		82							
autre comportement de type addictif	0.8	1.5	1.0		52							
N**	3 836	1 390	5 226		5 226	3 836	1 390	5 226		5 226		
<i>données manquantes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est p

T14 Usage de substances multiples et combinaisons de substances (2015)

Tous patients et patientes			
	Hommes	Femmes	Total
	%	%	%
Trouble lié à l'usage de substances multiples selon la CIM 10*			
oui	10.3	10.1	10.3
non	89.7	89.9	89.7
N**	1 658	536	2 194
<i>données manquantes</i>	2 178	854	3 032
Combinaisons de substances les plus fréquentes***			
coc/alc	11.0	13.0	11.5
tab/alc	7.6	21.7	11.0
can/alc	11.7	0.0	8.9
som/alc	2.1	17.4	5.8
can/coc/alc	3.4	8.7	4.7
tab/can/alc	5.5	0.0	4.2
coc/op/alc	2.8	4.3	3.1
can/coc	3.4	0.0	2.6
op/alc	2.1	2.2	2.1
coc/op	2.1	2.2	2.1
can/stim	2.1	2.2	2.1
tab/coc/alc	2.1	2.2	2.1
tab/can/coc/alc	2.1	2.2	2.1
som/op	2.1	0.0	1.6
som/op/alc	2.1	0.0	1.6
can/op/alc	1.4	2.2	1.6
can/stim/alc	2.1	0.0	1.6
can/stim/coc/alc	2.1	0.0	1.6
tab/op/alc	1.4	2.2	1.6
stim/alc	0.7	2.2	1.0
stim/op	0.7	2.2	1.0
stim/coc/alc	0.7	2.2	1.0
som/coc/alc	1.4	0.0	1.0
som/coc/op	1.4	0.0	1.0
som/coc/op/alc	0.7	2.2	1.0
can/op	1.4	0.0	1.0
can/coc/op	0.7	2.2	1.0
tab/can/op/alc	1.4	0.0	1.0
tab/can/coc/op/alc	1.4	0.0	1.0
tab/can/hal/stim/coc/alc	1.4	0.0	1.0
autres combinaisons	19.3	8.7	16.8
N**	145	46	191
<i>données manquantes</i>	26	8	34

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant un trouble lié à l'usage de substances multiples. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T15.1a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2015), hommes

Patient-e-s: principale substance posant problème									
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Fréquence de consommation 30 derniers jours (%)*									
chaque jour	42.2	41.5	14.7	18.8	86.4	33.3	35.1	90.6	83.3
4 à 6 jours par semaine	12.1	5.4	12.7	12.5	0.0	0.0	8.4	1.9	0.0
2 à 3 jours par semaine	12.0	10.8	21.3	25.0	0.0	0.0	18.0	5.7	16.7
1 jour par semaine ou moins	9.1	13.1	22.7	9.4	0.0	0.0	16.9	0.0	0.0
aucune consommation	24.5	29.2	28.7	34.4	13.6	66.7	21.6	1.9	0.0
N**	1 663	130	150	32	22	3	693	53	6
données manquantes	469	80	49	9	6	2	187	23	14

T15.1b Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2015), femmes

Fréquence de consommation 30 derniers jours (%)*									
chaque jour	41.8	40.0	14.3	16.7	76.9	0.0	45.9	88.4	0.0
4 à 6 jours par semaine	15.3	5.0	14.3	16.7	0.0	0.0	9.0	2.3	0.0
2 à 3 jours par semaine	13.6	7.5	32.1	25.0	0.0	0.0	12.3	4.7	0.0
1 jour par semaine ou moins	9.2	17.5	14.3	33.3	0.0	0.0	15.6	4.7	0.0
aucune consommation	20.1	30.0	25.0	8.3	23.1	0.0	17.2	0.0	0.0
N**	737	40	28	12	13	0	122	43	0
données manquantes	187	15	15	5	5	1	38	9	5

T15.1c Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2015), hommes et femmes

Fréquence de consommation 30 derniers jours (%)*									
chaque jour	42.1	41.2	14.6	18.2	82.9	33.3	36.7	89.6	83.3
4 à 6 jours par semaine	13.1	5.3	12.9	13.6	0.0	0.0	8.5	2.1	0.0
2 à 3 jours par semaine	12.5	10.0	23.0	25.0	0.0	0.0	17.2	5.2	16.7
1 jour par semaine ou moins	9.2	14.1	21.3	15.9	0.0	0.0	16.7	2.1	0.0
aucune consommation	23.1	29.4	28.1	27.3	17.1	66.7	21.0	1.0	0.0
N**	2 400	170	178	44	35	3	815	96	6
données manquantes	656	95	64	14	11	3	225	32	19

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T15.2a Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2015), hommes

	Patient-e-s: problème principal			
	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif
Fréquence d'apparition au cours des 30 derniers jours (%)*				
chaque jour	9.1	54.5	71.4	45.0
4 à 6 jours par semaine	12.1	12.1	0.0	5.0
2 à 3 jours par semaine	16.7	6.1	14.3	25.0
1 jour par semaine ou moins	24.2	9.1	0.0	25.0
aucune manifestation	37.9	18.2	14.3	0.0
N**	66	33	7	20
<i>données manquantes</i>	44	61	3	11

T15.2b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2015), femmes

Fréquence d'apparition au cours des 30 derniers jours (%)*				
chaque jour	30.8	50.0	56.6	33.3
4 à 6 jours par semaine	0.0	50.0	15.1	20.0
2 à 3 jours par semaine	7.7	0.0	15.1	6.7
1 jour par semaine ou moins	23.1	0.0	9.4	26.7
aucune manifestation	38.5	0.0	3.8	13.3
N**	13	2	53	15
<i>données manquantes</i>	4	3	19	6

T15.2c Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2015), hommes et femmes

Fréquence d'apparition au cours des 30 derniers jours (%)*				
chaque jour	12.7	54.3	58.3	40.0
4 à 6 jours par semaine	10.1	14.3	13.3	11.4
2 à 3 jours par semaine	15.2	5.7	15.0	17.1
1 jour par semaine ou moins	24.1	8.6	8.3	25.7
aucune manifestation	38.0	17.1	5.0	5.7
N**	79	35	60	35
<i>données manquantes</i>	48	64	22	17

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T16.1a Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2015), hommes

Patients: principale substance posant problème									
Hommes	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Age lors de la première consommation									
moyenne	16.2	22.2	22.4	21.6	26.2	17.0	15.2	16.8	25.8
écart-type	3.9	7.3	7.1	10.6	9.5	1.4	2.5	6.2	5.3
1er quartile	15.0	18.0	18.0	16.0	20.0	16.0	14.0	13.0	22.5
valeur médiane	16.0	20.0	20.0	18.0	25.5	17.0	15.0	15.0	26.0
3e quartile	17.0	25.0	25.0	20.0	30.5	18.0	16.0	18.0	29.0
N*	957	90	118	25	16	2	530	36	4
données manquantes	1 175	120	81	16	12	3	350	40	16
Age lors du début de la consommation régulière									
moyenne	22.2	24.4	24.8	19.9	18.5	17.0	16.5	20.0	-
écart-type	8.1	8.9	7.0	8.4	5.0	1.4	3.4	7.4	-
1er quartile	17.0	19.0	19.0	15.0	15.0	16.0	15.0	16.0	-
valeur médiane	20.0	20.0	23.0	17.0	18.5	17.0	16.0	19.0	-
3e quartile	25.0	29.0	29.0	20.0	22.0	18.0	17.0	22.0	-
N*	674	35	33	9	2	2	239	26	0
données manquantes	1 458	175	166	32	26	3	641	50	20
Age lors du début de la consommation problématique									
moyenne	31.2	24.9	26.6	24.0	30.7	21.5	18.0	22.6	24.7
écart-type	11.9	8.1	7.4	11.4	10.0	5.0	5.7	11.3	4.9
1er quartile	21.0	19.0	21.0	16.0	26.0	18.0	15.0	15.0	22.0
valeur médiane	29.0	23.0	25.5	19.0	30.0	21.5	16.0	18.5	24.0
3e quartile	40.0	29.0	31.0	27.0	40.0	25.0	18.0	23.5	26.0
N*	913	70	102	20	15	2	486	28	6
données manquantes	1 219	140	97	21	13	3	394	48	14
Période de latence (en années)**									
moyenne	25.6	8.4	10.7	5.8	13.8	3.4	6.1	21.6	4.8
écart-type	13.4	6.4	7.7	4.6	10.7	2.0	7.0	18.2	4.6
1er quartile	14.4	2.7	3.3	2.4	6.7	2.0	1.6	3.0	1.5
valeur médiane	25.0	7.3	9.7	3.9	12.2	3.4	3.0	18.1	4.8
3e quartile	35.6	15.5	16.0	7.4	19.4	4.8	7.7	40.1	8.0
N*	468	18	59	13	6	2	375	30	2
données manquantes	505	15	20	8	2	0	171	15	13

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première consommation de la substance posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.1b Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2015), femmes

Patientes: principale substance posant problème										
Femmes	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances	
Age lors de la première consommation										
moyenne	17.9	26.8	22.8	16.8	33.5	-	15.4	15.7	21.0	
écart-type	5.7	15.3	9.5	2.3	5.1	-	4.7	4.2	-	
1er quartile	15.0	17.0	17.0	15.0	29.0	-	14.0	13.0	21.0	
valeur médiane	17.0	20.0	20.0	17.0	34.5	-	15.0	15.0	21.0	
3e quartile	19.0	30.0	24.0	18.0	38.0	-	16.0	18.0	21.0	
N*	371	25	21	9	6	0	87	29	1	
données manquantes	553	30	22	8	12	1	73	23	4	
Age lors du début de la consommation régulière										
moyenne	26.8	22.6	26.5	16.5	45.0	-	16.2	19.2	-	
écart-type	11.2	6.3	6.0	1.3	8.9	-	2.4	6.5	-	
1er quartile	19.0	19.0	23.0	15.5	38.0	-	15.0	14.0	-	
valeur médiane	23.5	20.0	27.5	16.5	42.0	-	16.0	18.0	-	
3e quartile	30.0	24.0	30.0	17.5	55.0	-	16.0	22.0	-	
N*	270	11	10	4	3	0	45	23	0	
données manquantes	654	44	33	13	15	1	115	29	5	
Age lors du début de la consommation problématique										
moyenne	34.8	32.3	25.1	19.0	37.4	-	18.0	21.7	21.0	
écart-type	12.4	17.3	9.2	2.8	11.0	-	5.7	10.3	-	
1er quartile	25.0	21.0	20.0	17.0	29.0	-	15.0	15.0	21.0	
valeur médiane	33.5	23.0	23.0	19.0	35.0	-	16.0	18.0	21.0	
3e quartile	43.0	41.5	30.0	20.0	40.0	-	19.0	25.0	21.0	
N*	426	16	22	11	5	0	87	27	1	
données manquantes	498	39	21	6	13	1	73	25	4	
Période de latence (en années)**										
moyenne	26.6	5.4	6.4	2.8	10.1	-	6.0	24.1	-	
écart-type	14.3	4.1	5.3	1.4	5.5	-	7.1	17.9	-	
1er quartile	15.9	3.0	2.1	1.9	6.2	-	1.8	2.6	-	
valeur médiane	26.0	3.5	3.9	2.4	10.1	-	3.1	29.2	-	
3e quartile	37.4	10.5	10.2	3.3	13.9	-	7.8	37.6	-	
N*	157	6	9	5	2	0	58	16	0	
données manquantes	181	2	5	4	3	0	32	9	2	

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première consommation de la substance posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.1c Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2015), hommes et femmes

Patient-e-s: principale substance posant problème									
Hommes & femmes	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Âge lors de la première consommation									
moyenne	16.6	23.2	22.5	20.3	28.2	17.0	15.2	16.3	24.8
écart-type	4.5	9.7	7.5	9.3	9.0	1.4	2.9	5.4	5.1
1er quartile	15.0	18.0	18.0	15.0	20.0	16.0	14.0	13.0	21.0
valeur médiane	16.0	20.0	20.0	18.0	27.5	17.0	15.0	15.0	26.0
3e quartile	18.0	25.0	25.0	20.0	35.0	18.0	16.0	18.0	26.0
N*	1 328	115	139	34	22	2	617	65	5
données manquantes	1 728	150	103	24	24	4	423	63	20
Âge lors du début de la consommation régulière									
moyenne	23.6	24.0	25.2	18.9	34.4	17	16.4	19.7	-
écart-type	9.3	8.4	6.8	7.1	16.0	1.4	3.3	6.9	-
1er quartile	18.0	19.0	19.0	15.0	22.0	16	15.0	15.0	-
valeur médiane	20.0	20.0	24.0	17.0	38.0	17	16.0	18.0	-
3e quartile	27.0	27.0	30.0	18.0	42.0	18	17.0	22.0	-
N*	944	46	43	13	5	2	284	49	0
données manquantes	2 112	219	199	45	41	4	756	79	25
Âge lors du début de la consommation problématique									
moyenne	32.4	26.3	26.3	22.2	32.4	21.5	18.0	22.2	24.1
écart-type	12.2	10.7	7.7	9.5	10.4	5.0	5.7	10.7	4.7
1er quartile	22.0	19.0	20.5	16.0	26.0	18.0	15.0	15.0	21.0
valeur médiane	30.0	23.0	25.0	19.0	30.5	21.5	16.0	18.0	22.0
3e quartile	40.0	30.0	31.0	24.0	40.0	25.0	18.0	25.0	26.0
N*	1 339	86	124	31	20	2	573	55	7
données manquantes	1 717	179	118	27	26	4	467	73	18
Période de latence (en années)**									
moyenne	25.8	7.7	10.1	4.9	12.9	3.4	6.1	22.5	4.8
écart-type	13.6	6.0	7.6	4.2	9.4	2.0	7.0	17.9	4.6
1er quartile	14.9	2.8	2.8	2.4	6.4	2.0	1.6	2.7	1.5
valeur médiane	25.2	5.6	9.6	3.3	12.2	3.4	3.0	21.6	4.8
3e quartile	35.8	12.1	15.1	5.7	16.6	4.8	7.7	38.7	8.0
N*	625	24	68	18	8	2	433	46	2
données manquantes	686	17	25	12	5	0	203	24	15

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première consommation de la substance posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.2a Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2015), hommes

Patients: problème principal				
Hommes	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif
Age lors de la première apparition				
moyenne	24.0	15.8	18.0	26.2
écart-type	8.1	6.7	8.5	14.8
1er quartile	18.0	11.5	10.0	15.0
valeur médiane	20.0	14.0	17.0	20.0
3e quartile	30.0	18.0	27.0	37.0
N*	42	40	3	14
données manquantes	68	54	7	17
Age lors du début de l'apparition régulière				
moyenne	27.1	15.8	14.7	32.4
écart-type	7.6	4.4	10.8	16.5
1er quartile	22.0	14.0	7.0	20.0
valeur médiane	26.0	14.5	10.0	33.0
3e quartile	30.0	18.0	27.0	35.0
N*	18	36	3	5
données manquantes	92	58	7	26
Age lors du début de l'apparition problématique				
moyenne	28.7	18.8	22.6	33.6
écart-type	8.2	7.3	17.5	14.1
1er quartile	22.0	14.0	10.0	22.0
valeur médiane	29.0	16.0	17.0	33.0
3e quartile	33.0	21.0	29.0	40.0
N*	55	46	5	17
données manquantes	55	48	5	14
Période de latence (en années)**				
moyenne	10.9	6.7	2.8	11.7
écart-type	7.8	6.5	2.5	10.2
1er quartile	5.3	2.3	0.0	3.1
valeur médiane	9.5	5.4	3.4	8.9
3e quartile	14.5	8.4	5.0	18.2
N*	30	28	3	12
données manquantes	35	28	5	12

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première apparition du comportement posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.2b Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2015), femmes

Patientes: problème principal					
Femmes	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif	
Age lors de la première apparition					
moyenne	44.3	29.0	18.2	22.4	
écart-type	23.9	15.0	9.2	12.1	
1er quartile	21.0	14.0	14.0	17.0	
valeur médiane	45.0	29.0	16.0	19.0	
3e quartile	62.0	44.0	18.0	28.0	
N*	7	3	35	5	
<i>données manquantes</i>	10	2	37	16	
Age lors du début de l'apparition régulière					
moyenne	21.0	14.0	20.3	21.7	
écart-type	-	-	12.1	5.7	
1er quartile	21.0	14.0	15.0	17.0	
valeur médiane	21.0	14.0	16.5	20.0	
3e quartile	21.0	14.0	18.0	28.0	
N*	1	1	18	3	
<i>données manquantes</i>	16	4	54	18	
Age lors du début de l'apparition problématique					
moyenne	51.3	29.0	21.1	29.6	
écart-type	18.7	15.0	9.9	9.9	
1er quartile	43.0	14.0	15.0	20.0	
valeur médiane	49.0	29.0	18.0	28.0	
3e quartile	62.0	44.0	21.0	40.0	
N*	6	3	35	11	
<i>données manquantes</i>	11	2	37	10	
Période de latence (en années)**					
moyenne	11.8	1.8	7.3	2.8	
écart-type	16.1	2.3	9.4	2.2	
1er quartile	1.8	0.2	1.7	1.3	
valeur médiane	5.4	1.8	3.3	2.4	
3e quartile	21.7	3.4	9.7	4.4	
N*	4	2	21	4	
<i>données manquantes</i>	6	2	23	8	

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première apparition du comportement posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.2c Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2015), hommes et femmes

Patient-e-s: problème principal				
<i>Hommes et femmes</i>	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif
Age lors de la première apparition				
moyenne	26.9	16.7	18.2	25.2
écart-type	13.4	8.0	9.1	13.9
1er quartile	18.0	12.0	14.0	15.0
valeur médiane	21.0	14.0	16.0	20.0
3e quartile	33.0	18.0	18.0	37.0
N*	49	43	38	19
<i>données manquantes</i>	78	56	44	33
Age lors du début de l'apparition régulière				
moyenne	26.8	15.8	19.5	28.4
écart-type	7.5	4.3	11.9	14.0
1er quartile	21.0	14.0	15.0	18.5
valeur médiane	25.0	14.0	16.0	24.0
3e quartile	30.0	18.0	18.0	34.0
N*	19	37	21	8
<i>données manquantes</i>	108	62	61	44
Age lors du début de l'apparition problématique				
moyenne	30.9	19.4	21.3	32.0
écart-type	11.7	8.1	10.8	12.6
1er quartile	23.0	14.0	15.0	21.0
valeur médiane	30.0	16.0	18.0	32.5
3e quartile	35.0	21.0	21.0	40.0
N*	61	49	40	28
<i>données manquantes</i>	66	50	42	24
Période de latence (en années)**				
moyenne	11.0	6.3	6.7	9.5
écart-type	8.7	6.4	8.9	9.7
1er quartile	5.1	1.8	1.3	2.3
valeur médiane	8.6	5.2	3.4	6.2
3e quartile	14.5	7.8	9.6	13.0
N*	34	30	24	16
<i>données manquantes</i>	41	30	28	20

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première apparition du comportement posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T17 Mode d'administration prédominant de la principale substance posant problème avant l'admission (2015)

Patient-e-s: principale substance posant problème																
Mode d'administration*	Héroïne			Cocaïne			Amphétamines			Cannabis			Benzodiazépines			
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
injection	21.8	19.0	21.2	3.5	10.0	4.6	0.0	0.0	0.0	1.0	0.8	1.0	0.0	0.0	0.0	
fumée/inhalation	44.9	52.4	46.5	15.4	16.7	15.6	5.9	0.0	4.2	97.9	98.4	97.9	0.0	0.0	0.0	
ingestion (manger/boire)	6.4	14.3	8.1	1.4	3.3	1.7	17.6	0.0	12.5	0.7	0.8	0.7	80.0	100.0	86.2	
sniff	26.9	14.3	24.2	79.0	70.0	77.5	76.5	100.0	83.3	0.3	0.0	0.2	20.0	0.0	13.8	
autre	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	
N**	78	21	99	143	30	173	17	7	24	701	127	828	20	9	29	
<i>données manquantes</i>	108	24	132	55	12	67	7	3	10	179	33	212	0	2	2	

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T18.1 Prévalence à vie, sur les 30 derniers jours et sur les 12 derniers mois avant l'admission des injections et échange de matériel d'injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2015)

	Patient-e-s: principale substance posant problème												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
Injections au cours de la vie*																
oui	4.0	3.1	3.7	45.7	50.0	46.6	7.1	17.4	8.7	1.6	0.9	1.5	5.7	4.6	5.4	202
non	94.2	95.1	94.5	50.0	50.0	50.0	90.5	78.3	88.6	97.5	99.1	97.7	92.7	93.9	93.0	3 486
ne veut pas répondre	1.8	1.7	1.8	4.3	0.0	3.4	2.4	4.3	2.7	0.9	0.0	0.8	1.6	1.5	1.6	59
N**	1 537	699	2 236	140	34	174	126	23	149	636	112	748	2 725	1 022	3 747	3 747
données manquantes	595	225	820	70	21	91	73	20	93	244	48	292	1 111	368	1 479	1 479
Injections au cours des 12 derniers mois*																
oui	0.7	0.3	0.6	21.8	25.9	22.6	3.3	5.3	3.5	0.3	0.9	0.4	1.6	1.1	1.5	53
non	99.3	99.7	99.4	78.2	74.1	77.4	96.7	94.7	96.5	99.7	99.1	99.6	98.4	98.9	98.5	3 550
N**	1 482	673	2 155	110	27	137	122	19	141	628	112	740	2 621	982	3 603	3 603
données manquantes	650	251	901	100	28	128	77	24	101	252	48	300	1 215	408	1 623	1 623
Injections au cours des 30 derniers jours*																
oui	0.5	0.1	0.4	17.9	20.7	18.5	2.4	5.3	2.8	0.2	0.9	0.3	1.3	0.9	1.2	43
non	99.5	99.9	99.6	82.1	79.3	81.5	97.6	94.7	97.2	99.8	99.1	99.7	98.7	99.1	98.8	3 596
N**	1 497	681	2 178	117	29	146	123	19	142	628	112	740	2 647	992	3 639	3 639
données manquantes	635	243	878	93	26	119	76	24	100	252	48	300	1 189	398	1 587	1 587
Echange de matériel d'injection au cours de la vie***																
oui	44.4	50.0	46.2	9.1	75.0	26.7	33.3	100.0	50.0	33.3	0.0	33.3	28.6	60.0	36.8	14
non	55.6	50.0	53.8	90.9	0.0	66.7	66.7	0.0	50.0	66.7	0.0	66.7	71.4	30.0	60.5	23
ne veut pas répondre	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	2.6	1
N**	9	4	13	11	4	15	3	1	4	3	0	3	28	10	38	38
données manquantes	45	17	62	39	9	48	6	2	8	6	0	6	103	30	133	133
Echange de matériel d'injection au cours des 12 derniers mois****																
oui	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	1.7	1
non	100.0	100.0	100.0	100.0	83.3	95.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	94.1	98.3	57
N**	18	10	28	14	6	20	1	1	2	3	0	3	41	17	58	58
données manquantes	36	11	47	36	7	43	8	2	10	6	0	6	90	23	113	113
Echange de matériel d'injection au cours des 30 derniers jours*****																
oui	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
non	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	8
N**	0	0	0	5	2	7	0	1	1	0	0	0	5	3	8	8
données manquantes	54	21	75	45	11	56	9	2	11	9	0	9	126	37	163	163

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours de leur vie. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours des 12 derniers mois. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

***** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours des 30 derniers jours. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T18.2 Âge lors de la première injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2015)

	Patient-e-s: principale substance posant problème												Tous patient-e-s			N
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Age lors de la première injection*																
jusqu'à 14 ans	6.3	0.0	5.0	8.8	11.1	9.3	33.3	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	7.5	9.5	7.9	8
de 15 à 16 ans	6.3	12.5	7.5	5.9	11.1	7.0	33.3	0.0	25.0	20.0	0.0	16.7	10.0	9.5	9.9	10
de 17 à 18 ans	34.4	25.0	32.5	26.5	22.2	25.6	0.0	100.0	25.0	40.0	0.0	33.3	28.8	23.8	27.7	28
de 19 à 20 ans	18.8	12.5	17.5	11.8	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0	20.0	100.0	33.3	16.3	9.5	14.9	15
de 21 à 25 ans	21.9	25.0	22.5	35.3	33.3	34.9	33.3	0.0	25.0	20.0	0.0	16.7	26.3	23.8	25.7	26
de 26 à 30 ans	12.5	12.5	12.5	5.9	11.1	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	14.3	8.9	9
de 31 à 39 ans	0.0	12.5	2.5	5.9	11.1	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	9.5	5.0	5
dès 40 ans	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
N**	32	8	40	34	9	43	3	1	4	5	1	6	80	21	101	101
<i>données manquantes</i>	29	14	43	30	8	38	6	3	9	5	0	5	75	26	101	101

* Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours de leur vie. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T19.1a Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2015), hommes
Hommes

	Patients: principale substance posant problème								
	Alcool	Opioïdes	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Autres problèmes*									
alcool	-	24.5	31.7	25.0	22.2	25.0	11.4	20.0	10.0
héroïne	1.1	3.6	4.8	2.8	7.4	0.0	0.4	0.0	5.0
méthadone	0.3	12.5	0.5	0.0	3.7	0.0	0.1	0.0	0.0
buprénorphine	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres opioïdes	0.1	2.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
cocaïne en poudre	3.5	20.8	0.0	22.2	18.5	25.0	4.5	1.4	5.0
crack	0.1	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autre forme de cocaïne	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
amphétamines	1.1	4.2	5.4	5.6	3.7	25.0	3.3	1.4	5.0
méthamphétamines	0.0	2.1	1.1	2.8	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.7	1.6	3.8	8.3	3.7	25.0	2.9	0.0	0.0
cathinones synthétiques	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	1.4	0.0
autres stimulants	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
barbituriques	0.3	0.5	1.6	2.8	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
benzodiazépines	1.2	15.1	1.6	5.6	3.7	0.0	0.8	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.1	1.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
LSD	0.5	3.6	2.7	5.6	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0
kétamine	0.1	0.5	0.0	0.0	3.7	25.0	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.3	1.0	0.5	2.8	0.0	25.0	0.3	1.4	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
cannabis	5.7	22.9	21.5	33.3	11.1	25.0	-	14.3	5.0
tabac	12.0	17.7	17.7	25.0	14.8	50.0	12.8	-	5.0
autre substance	0.5	0.5	1.1	0.0	0.0	0.0	0.4	4.3	0.0
jeu pathologique	0.2	1.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.4	0.0	0.0
dépendances aux ordinateurs/Internet	0.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
troubles alimentaires	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	25.0	0.1	0.0	0.0
autre comportement de type addictif	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
aucun autre problème addictif	83.1	45.8	53.2	44.4	63.0	50.0	76.3	72.9	80.0
N**	1 969	192	186	36	27	4	797	70	20
<i>données manquantes</i>	163	18	13	5	1	1	83	6	0

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.1b Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2015), femmes

Femmes

Patientes: principale substance posant problème									
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Autres problèmes*									
alcool	-	23.1	16.7	23.5	31.3	0.0	11.4	6.1	0.0
héroïne	1.0	1.9	7.1	5.9	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0
méthadone	0.4	19.2	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
buprénorphine	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres opioïdes	0.7	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaïne en poudre	2.9	15.4	0.0	5.9	6.3	0.0	5.0	0.0	0.0
crack	0.0	1.9	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autre forme de cocaïne	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0
amphétamines	0.7	0.0	7.1	17.6	0.0	0.0	5.0	2.0	0.0
méthamphétamines	0.0	1.9	2.4	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.6	0.0	4.8	23.5	0.0	100.0	4.3	0.0	0.0
cathinones synthétiques	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.2	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	2.0	0.0
benzodiazépines	2.8	17.3	4.8	0.0	12.5	0.0	1.4	0.0	25.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0
LSD	0.4	0.0	2.4	5.9	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0
kétamine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.1	1.9	0.0	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cannabis	3.5	15.4	16.7	41.2	12.5	100.0	-	0.0	0.0
tabac	9.1	19.2	11.9	17.6	18.8	0.0	13.6	-	25.0
autre substance	0.5	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.7	2.0	0.0
jeu pathologique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
dépendances aux ordinateurs/Internet	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	2.0	0.0
troubles alimentaires	1.0	1.9	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autre comportement de type addictif	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
aucun autre problème addictif	84.9	51.9	57.1	35.3	62.5	0.0	78.6	91.8	50.0
N**	832	52	42	17	16	1	140	49	4
données manquantes	92	3	1	0	2	0	20	3	1

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.1c Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2015), hommes et femmes
Hommes et femmes

	Patient-e-s: principale substance posant problème								
	Alcool	Opioïdes	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Autres problèmes*									
alcool	-	24.2	28.9	24.5	25.6	20.0	11.4	14.3	8.3
héroïne	1.1	3.3	5.3	3.8	9.3	0.0	0.3	0.0	4.2
méthadone	0.3	13.9	0.9	0.0	2.3	0.0	0.1	0.0	0.0
buprénorphine	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres opioïdes	0.3	2.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
cocaïne en poudre	3.3	19.7	0.0	17.0	14.0	20.0	4.6	0.8	4.2
crack	0.1	1.2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autre forme de cocaïne	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
amphétamines	1.0	3.3	5.7	9.4	2.3	20.0	3.5	1.7	4.2
méthamphétamines	0.0	2.0	1.3	5.7	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.7	1.2	3.9	13.2	2.3	40.0	3.1	0.0	0.0
cathinones synthétiques	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.8	0.0
autres stimulants	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
barbituriques	0.2	0.4	1.3	1.9	2.3	0.0	0.3	0.8	0.0
benzodiazépines	1.7	15.6	2.2	3.8	7.0	0.0	0.9	0.0	4.2
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.1	0.8	0.0	1.9	0.0	0.0	0.1	0.0	4.2
LSD	0.5	2.9	2.6	5.7	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0
kétamine	0.1	0.4	0.0	0.0	2.3	20.0	0.1	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.2	1.2	0.4	5.7	0.0	20.0	0.2	0.8	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
cannabis	5.0	21.3	20.6	35.8	11.6	40.0	-	8.4	4.2
tabac	11.1	18.0	16.7	22.6	16.3	40.0	12.9	-	8.3
autre substance	0.5	0.4	1.3	0.0	0.0	0.0	0.4	3.4	0.0
jeu pathologique	0.1	0.8	0.0	0.0	0.0	20.0	0.3	0.0	0.0
dépendances aux ordinateurs/Internet	0.1	0.0	0.9	0.0	2.3	0.0	0.9	0.8	0.0
troubles alimentaires	0.3	0.4	0.0	3.8	0.0	20.0	0.1	0.0	0.0
autre comportement de type addictif	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
aucun autre problème addictif	83.6	47.1	53.9	41.5	62.8	40.0	76.6	80.7	75.0
N**	2 801	244	228	53	43	5	937	119	24
<i>données manquantes</i>	255	21	14	5	3	1	103	9	1

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.2a Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2015), hommes

Hommes

Patients: problème principal				
	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif
	%		%	%
Autres problèmes*				
alcool	2.2	0.0	0.0	8.3
héroïne	0.0	0.0	0.0	0.0
méthadone	0.0	0.0	0.0	0.0
buprénorphine	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0
autres opioïdes	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaïne en poudre	1.1	0.0	0.0	4.2
crack	0.0	0.0	0.0	0.0
autre forme de cocaïne	0.0	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.0	0.0	0.0	0.0
méthamphétamines	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.0	0.0	0.0	4.2
cathinones synthétiques	0.0	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	0.0	0.0	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
kétamine	0.0	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.0
cannabis	4.3	1.1	0.0	0.0
tabac	5.4	1.1	0.0	0.0
autre substance	0.0	1.1	0.0	0.0
jeu pathologique	-	0.0	0.0	0.0
dépendances aux ordinateurs/Internet	2.2	-	0.0	16.7
troubles alimentaires	0.0	0.0	-	0.0
autre comportement de type addictif	0.0	43.7	0.0	0.0
aucun autre problème addictif	88.2	52.9	100.0	75.0
N**	93	87	7	24
données manquantes	17	7	3	7

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.2b Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2015), femmes
Femmes

Patientes: problème principal				
	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif
	%		%	%
Autres problèmes*				
alcool	6.7	0.0	0.0	0.0
héroïne	0.0	0.0	0.0	0.0
méthadone	0.0	0.0	0.0	0.0
buprénorphine	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0
autres opioïdes	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaïne en poudre	0.0	0.0	0.0	0.0
crack	0.0	0.0	0.0	0.0
autre forme de cocaïne	0.0	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.0	0.0	0.0	0.0
méthamphétamines	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.0	0.0	0.0	0.0
cathinones synthétiques	0.0	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	0.0	0.0	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
kétamine	0.0	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.0
cannabis	0.0	0.0	0.0	0.0
tabac	0.0	0.0	0.0	0.0
autre substance	0.0	0.0	0.0	0.0
jeu pathologique	-	0.0	0.0	0.0
dépendances aux ordinateurs/Internet	6.7	-	0.0	0.0
troubles alimentaires	0.0	0.0	-	0.0
autre comportement de type addictif	0.0	50.0	0.0	0.0
aucun autre problème addictif	86.7	50.0	100.0	100.0
N**	15	4	56	17
<i>données manquantes</i>	2	1	16	4

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.2c Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2015), hommes et femmes

Hommes et femmes

	Patient-e-s: problème principal			
	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	autre comportement de type addictif
	%		%	%
Autres problèmes*				
alcool	2.8	0.0	0.0	4.9
héroïne	0.0	0.0	0.0	0.0
méthadone	0.0	0.0	0.0	0.0
buprénorphine	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0
autres opioïdes	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaïne en poudre	0.9	0.0	0.0	2.4
crack	0.0	0.0	0.0	0.0
autre forme de cocaïne	0.0	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.0	0.0	0.0	0.0
méthamphétamines	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.0	0.0	0.0	2.4
cathinones synthétiques	0.0	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	0.0	0.0	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
kétamine	0.0	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.0
cannabis	3.7	1.1	0.0	0.0
tabac	4.6	1.1	0.0	0.0
autre substance	0.0	1.1	0.0	0.0
jeu pathologique	-	0.0	0.0	0.0
dépendances aux ordinateurs/Internet	2.8	-	0.0	9.8
troubles alimentaires	0.0	0.0	-	0.0
autre comportement de type addictif	0.0	44.0	0.0	0.0
aucun autre problème addictif	88.0	52.7	100.0	85.4
N**	108	91	63	41
<i>données manquantes</i>	19	8	19	11

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T20a Fréquence de consommation des substances secondaires selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2015)

	Patient-e-s: problème principal												Tous problèmes principaux						
	Hommes			Femmes			Total			Hommes			Femmes			Total			N
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Alcool*	Opiïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hypnotiques/sédatifs			comportement addictif						
chaque jour	35.5	50.0	38.5	13.5	20.0	14.0	14.9	23.1	16.1	40.0	20.0	30.0	0.0	0.0	0.0	17.5	24.3	18.6	42
4 à 6 jours par semaine	9.7	0.0	7.7	17.3	0.0	15.8	4.1	15.4	5.7	20.0	20.0	20.0	25.0	0.0	20.0	10.6	10.8	10.6	24
2 à 3 jours par semaine	9.7	25.0	12.8	30.8	40.0	31.6	31.1	7.7	27.6	0.0	20.0	10.0	25.0	0.0	20.0	26.5	21.6	25.7	58
1 jour par semaine ou moins	22.6	12.5	20.5	19.2	20.0	19.3	37.8	38.5	37.9	20.0	0.0	10.0	0.0	100.0	20.0	28.6	27.0	28.3	64
aucune consomm.	22.6	12.5	20.5	19.2	20.0	19.3	12.2	15.4	12.6	20.0	40.0	30.0	50.0	0.0	40.0	16.9	16.2	16.8	38
N**	31	8	39	52	5	57	74	13	87	5	5	10	4	1	5	189	37	226	226
données manquantes	179	47	226	147	38	185	806	147	953	23	13	36	241	114	355	3 854	2 061	5 915	5 915
Opiïdes*	Alcool			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hypnotiques/sédatifs			comportement addictif						
chaque jour	14.3	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	15.4	0.0	11.1	4
4 à 6 jours par semaine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
2 à 3 jours par semaine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
1 jour par semaine ou moins	28.6	0.0	19.0	50.0	0.0	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.9	0.0	19.4	7
aucune consomm.	57.1	100.0	71.4	50.0	100.0	57.1	100.0	0.0	100.0	0.0	100.0	50.0	0.0	0.0	0.0	57.7	100.0	69.4	25
N**	14	7	21	6	1	7	3	0	3	1	1	2	0	0	0	26	10	36	36
données manquantes	2 118	917	3 035	193	42	235	877	160	1 037	27	17	44	245	115	360	4 017	2 088	6 105	6 105
Cocaïne et dérivés*	Alcool			Opiïdes			Cannabis			Hypnotiques/sédatifs			comportement addictif						
chaque jour	3.6	5.3	4.0	5.0	0.0	4.2	6.5	0.0	5.6	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	4.9	3.4	4.6	7
4 à 6 jours par semaine	3.6	5.3	4.0	5.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	3.4	2.6	4
2 à 3 jours par semaine	19.6	15.8	18.7	20.0	25.0	20.8	9.7	0.0	8.3	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	16.4	13.8	15.9	24
1 jour par semaine ou moins	26.8	10.5	22.7	45.0	0.0	37.5	35.5	40.0	36.1	33.3	0.0	33.3	50.0	0.0	50.0	33.6	17.2	30.5	46
aucune consomm.	46.4	63.2	50.7	25.0	75.0	33.3	48.4	60.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	42.6	62.1	46.4	70
N**	56	19	75	20	4	24	31	5	36	3	0	3	2	0	2	122	29	151	151
données manquantes	2 076	905	2 981	190	51	241	849	155	1 004	25	18	43	243	115	358	3 921	2 069	5 990	5 990
Cannabis*	Alcool			Opiïdes			Cocaïne et dérivés			Hypnotiques/sédatifs			comportement addictif						
chaque jour	32.6	40.9	34.2	30.8	66.7	37.5	51.4	25.0	48.7	33.3	50.0	40.0	80.0	0.0	80.0	38.4	47.5	40.0	90
4 à 6 jours par semaine	7.6	9.1	7.9	0.0	0.0	0.0	11.4	25.0	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	7.5	7.6	17
2 à 3 jours par semaine	14.1	18.2	14.9	7.7	16.7	9.4	8.6	0.0	7.7	66.7	50.0	60.0	0.0	0.0	0.0	11.4	17.5	12.4	28
1 jour par semaine ou moins	15.2	13.6	14.9	34.6	16.7	31.3	8.6	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8	10.0	15.6	35
aucune consomm.	30.4	18.2	28.1	26.9	0.0	21.9	20.0	50.0	23.1	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	25.9	17.5	24.4	55
N**	92	22	114	26	6	32	35	4	39	3	2	5	5	0	5	185	40	225	225
données manquantes	2 040	902	2 942	184	49	233	164	39	203	25	16	41	240	115	355	3 858	2 058	5 916	5 916

* En tant que problème secondaire; pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T20b Fréquence de consommation des substances secondaires selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2015)

	Patient-e-s: problème principal															Tous problèmes principaux			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			comportement de type addictif			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
Autres stimulants*																			
chaque jour	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	2.7	2
4 à 6 jours par semaine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.4	1
2 à 3 jours par semaine	13.3	20.0	15.0	0.0	0.0	0.0	33.3	33.3	33.3	12.5	0.0	9.7	0.0	0.0	0.0	15.8	12.5	15.1	11
1 jour par semaine ou moins	33.3	20.0	30.0	60.0	0.0	60.0	22.2	66.7	33.3	29.2	28.6	29.0	0.0	0.0	0.0	33.3	37.5	34.2	25
aucune consomm.	53.3	60.0	55.0	40.0	0.0	40.0	33.3	0.0	25.0	50.0	71.4	54.8	0.0	0.0	0.0	45.6	50.0	46.6	34
N**	15	5	20	5	0	5	9	3	12	24	7	31	0	0	0	57	16	73	73
données manquantes	2 117	919	3 036	205	55	260	190	40	230	856	153	1 009	245	115	360	3 986	2 082	6 068	6 068
Hypnotiques/sédatifs*																			
chaque jour	0.0	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	8.3	1
4 à 6 jours par semaine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
2 à 3 jours par semaine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	8.3	1
1 jour par semaine ou moins	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	22.2	33.3	25.0	3
aucune consomm.	100.0	50.0	75.0	100.0	0.0	100.0	50.0	0.0	50.0	66.7	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	66.7	33.3	58.3	7
N**	2	2	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0	9	3	12	12
données manquantes	2 130	922	3 052	209	55	264	197	43	240	877	160	1 037	245	115	360	4 034	2 095	6 129	6 129
Hallucinogènes*																			
chaque jour	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
4 à 6 jours par semaine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
2 à 3 jours par semaine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	3.2	1
1 jour par semaine ou moins	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	40.0	33.3	0.0	33.3	20.0	100.0	27.3	0.0	0.0	0.0	25.0	33.3	25.8	8
aucune consomm.	100.0	100.0	100.0	60.0	0.0	60.0	33.3	0.0	33.3	80.0	0.0	72.7	0.0	0.0	0.0	71.4	66.7	71.0	22
N**	8	2	10	5	0	5	3	0	3	10	1	11	0	0	0	28	3	31	31
données manquantes	2 124	922	3 046	205	55	260	196	43	239	870	159	1 029	245	115	360	4 015	2 095	6 110	6 110
Autres substances*																			
chaque jour	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	1
4 à 6 jours par semaine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
2 à 3 jours par semaine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
1 jour par semaine ou moins	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
aucune consomm.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
N**	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
données manquantes	2 132	923	3 055	210	55	265	199	43	242	880	160	1 040	245	115	360	4 043	2 097	6 140	6 140

* En tant que problème secondaire; pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T21 Fréquence de la consommation d'alcool, nombre de boissons standards par jour et fréquence de fortes consommations d'alcool avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2015)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Fréquence de la consommation d'alcool*																
jamais	11.8	7.9	10.5	13.3	28.6	16.2	8.6	0.0	7.0	12.5	20.5	13.6	12.9	10.6	12.2	224
1 fois par mois ou moins	4.6	4.9	4.7	13.3	0.0	10.8	8.6	0.0	7.0	23.0	30.8	24.0	9.6	8.9	9.4	172
2 à 4 fois par mois	6.6	6.7	6.7	26.7	28.6	27.0	31.4	25.0	30.2	43.5	35.9	42.5	16.0	10.0	14.2	261
2 à 3 fois par semaine	16.2	18.0	16.8	20.0	28.6	21.6	31.4	62.5	37.2	15.7	10.3	15.0	16.6	18.4	17.1	314
4 fois ou plus par semaine	60.7	62.5	61.3	26.7	14.3	24.3	20.0	12.5	18.6	5.2	2.6	4.9	45.0	52.1	47.1	865
N**	906	445	1 351	30	7	37	35	8	43	248	39	287	1 297	539	1 836	1 836
données manquantes	1 226	479	1 705	180	48	228	164	35	199	632	121	753	2 539	851	3 390	3 390
Nbre de boissons standards par jour***																
1 ou 2	6.0	5.9	6.0	47.6	20.0	42.3	48.1	14.3	41.2	55.3	69.0	57.1	18.9	13.9	17.4	260
3 ou 4	18.0	17.1	17.7	38.1	60.0	42.3	18.5	28.6	20.6	32.4	17.2	30.4	21.5	17.9	20.4	305
5 ou 6	21.7	22.2	21.9	4.8	0.0	3.8	14.8	28.6	17.6	7.4	10.3	7.8	18.2	20.5	18.9	282
7 à 9	21.1	31.5	24.6	0.0	0.0	0.0	11.1	14.3	11.8	3.2	0.0	2.8	16.3	27.2	19.6	293
10 ou plus	33.2	23.3	29.9	9.5	20.0	11.5	7.4	14.3	8.8	1.6	3.4	1.8	25.0	20.5	23.6	353
N**	755	387	1 142	21	5	26	27	7	34	188	29	217	1 040	453	1 493	1 493
données manquantes	1 377	537	1 914	189	50	239	172	36	208	692	131	823	2 796	937	3 733	3 733
Fréquence de fortes consom. d'alcool***																
jamais	14.3	11.8	13.5	57.1	42.9	53.6	28.0	0.0	21.9	54.5	65.6	56.2	25.6	20.1	23.9	375
moins d'une fois par mois	9.5	11.0	10.0	9.5	14.3	10.7	36.0	14.3	31.3	31.0	25.0	30.1	14.3	12.8	13.8	217
1 fois par mois	11.7	10.0	11.1	9.5	14.3	10.7	12.0	28.6	15.6	9.1	3.1	8.2	10.9	9.2	10.4	163
1 fois par semaine	24.7	24.1	24.5	19.0	14.3	17.9	12.0	42.9	18.8	4.8	3.1	4.6	19.7	21.3	20.2	317
presque chaque jour	39.8	43.1	40.9	4.8	14.3	7.1	12.0	14.3	12.5	0.5	3.1	0.9	29.5	36.6	31.7	497
N**	789	399	1 188	21	7	28	25	7	32	187	32	219	1 091	478	1 569	1 569
données manquantes	1 343	525	1 868	189	48	237	174	36	210	693	128	821	2 745	912	3 657	3 657

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une consommation d'alcool. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T22 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 derniers jours avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2015)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Fréquence de la consommation de tabac*																
jamais	31.5	43.6	35.5	8.3	14.3	9.7	17.9	10.0	15.8	24.0	28.0	24.6	28.9	40.0	32.2	494
1 jour par semaine ou moins	0.5	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	2.0	4.4	1.5	1.3	1.4	22
2 à 3 jours par semaine	0.6	1.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	6.0	6.2	2.0	2.0	2.0	31
4 à 6 jours par semaine	0.6	1.3	0.8	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	5.3	1.1	0.0	0.9	0.8	1.1	0.9	14
1 fois par jour	0.5	0.6	0.5	4.2	0.0	3.2	0.0	10.0	2.6	3.3	2.0	3.1	1.3	0.9	1.2	18
plusieurs fois par jour	66.3	52.9	61.9	87.5	85.7	87.1	75.0	80.0	76.3	60.5	62.0	60.7	65.4	54.7	62.2	953
N**	632	312	944	24	7	31	28	10	38	271	50	321	1 075	457	1 532	1 532
<i>données manquantes</i>	1 500	612	2 112	186	48	234	171	33	204	609	110	719	2 761	933	3 694	3 694
Nombre de cigarettes par jour***																
0 à 10	15.2	25.3	18.1	26.3	20.0	25.0	38.1	25.0	34.5	53.2	77.4	56.6	27.5	33.8	29.1	271
11 à 20	49.9	54.0	51.0	57.9	40.0	54.2	42.9	37.5	41.4	36.8	16.1	33.9	46.7	42.9	45.7	426
21 à 30	23.3	19.3	22.2	10.5	20.0	12.5	19.0	12.5	17.2	8.9	6.5	8.6	17.5	19.2	17.9	167
31 ou plus	11.6	1.3	8.8	5.3	20.0	8.3	0.0	25.0	6.9	1.1	0.0	0.9	8.4	4.2	7.3	68
N**	387	150	537	19	5	24	21	8	29	190	31	221	692	240	932	932
<i>données manquantes</i>	46	26	72	3	1	4	2	1	3	16	5	21	72	34	106	106

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une consommation de tabac. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T23a Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2015), hommes

Patient-e-s: principale substance posant problème									
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Objectif de consommation*									
abstinence définitive	27.2	87.5	83.3	100.0	0.0	0.0	40.0	16.7	0.0
abstinence limitée dans le temps	27.8	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	13.3	16.7	0.0
consommation contrôlée	28.9	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	20.0	33.3	0.0
aucune limitation envisagée	2.4	6.3	4.2	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0
pas déterminé pour l'instant	13.3	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	20.0	33.3	0.0
autre	0.4	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0
N**	460	16	24	2	0	0	60	6	0
données manquantes	1 672	194	175	39	28	5	820	70	20

T23b Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2015), femmes

Objectif de consommation*									
abstinence définitive	28.5	100.0	60.0	100.0	0.0	0.0	66.7	0.0	0.0
abstinence limitée dans le temps	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0
consommation contrôlée	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
aucune limitation envisagée	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pas déterminé pour l'instant	18.5	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0
autre	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N**	200	1	5	1	0	0	12	0	0
données manquantes	724	54	38	16	18	1	148	52	5

T23c Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2015), hommes et femmes

Objectif de consommation*									
abstinence définitive	27.6	88.2	79.3	100.0	0.0	0.0	44.4	16.7	0.0
abstinence limitée dans le temps	25.8	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	13.9	16.7	0.0
consommation contrôlée	29.5	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	16.7	33.3	0.0
aucune limitation envisagée	2.0	5.9	3.4	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0
pas déterminé pour l'instant	14.8	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0	19.4	33.3	0.0
autres	0.3	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0
N**	660	17	29	3	0	0	72	6	0
données manquantes	2 396	248	213	55	46	6	968	122	25

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T24a Problèmes psychiques au cours de la vie (2015), hommes

Hommes

Patients: problème principal									
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problèmes psychiques*									
autodévalorisation/sentiment de culpabilité	30.9	41.9	17.6	37.5	66.7	100.0	19.1	0.0	50.0
états anxieux/tension nerv. importants	26.9	34.9	26.5	12.5	66.7	100.0	21.3	25.0	50.0
diffic. compréhension/mémoire	12.3	11.6	8.8	25.0	33.3	100.0	10.6	16.7	66.7
altération de l'attention ou hyperactivité	10.1	14.0	8.8	25.0	0.0	100.0	13.8	16.7	66.7
pensées obsessionnelles/actions compulsives	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0
réaction aiguë au stress sévère/troubles adaptation	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	8.3	0.0
hallucinations	1.2	4.7	2.9	12.5	33.3	0.0	2.1	0.0	33.3
diffic. à contrôler comportement violent	8.9	16.3	14.7	25.0	33.3	0.0	5.3	0.0	16.7
problèmes psychiques traités avec médic.	22.2	23.3	14.7	25.0	100.0	0.0	21.3	16.7	16.7
pensées suicidaires sérieuses	7.9	9.3	2.9	12.5	0.0	100.0	9.6	0.0	16.7
tentatives de suicide	1.2	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0
autre(s) problème(s) psychique(s)	2.2	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	8.3	0.0
aucun	43.0	37.2	64.7	37.5	0.0	0.0	55.3	66.7	33.3
N**	495	43	34	8	3	1	94	12	6
données manquantes	1 637	167	165	33	25	4	786	64	14

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T24b Problèmes psychiques au cours de la vie (2015), femmes

Femmes

Patientes: problème principal									
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problèmes psychiques*									
autodévalorisation/sentiment de culpabilité	43.5	50.0	50.0	0.0	75.0	0.0	40.0	0.0	100.0
états anxieux/tension nerv. importants	47.3	50.0	25.0	0.0	50.0	0.0	45.0	50.0	0.0
diffic. compréhension/mémoire	8.6	25.0	0.0	0.0	25.0	0.0	10.0	0.0	0.0
altération de l'attention ou hyperactivité	8.6	25.0	0.0	0.0	25.0	0.0	10.0	0.0	0.0
pensées obsessionnelles/actions compulsives	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0
hallucinations	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0
diffic. à contrôler comportement violent	7.5	16.7	25.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0
problèmes psychiques traités avec médic.	38.7	58.3	0.0	0.0	100.0	0.0	35.0	100.0	100.0
pensées suicidaires sérieuses	8.1	25.0	0.0	0.0	25.0	0.0	45.0	0.0	0.0
tentatives de suicide	5.4	16.7	0.0	0.0	25.0	0.0	15.0	0.0	0.0
autre(s) problème(s) psychique(s)	4.3	0.0	25.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
aucun	21.5	16.7	25.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	0.0
N**	186	12	4	1	4	0	20	2	2
<i>données manquantes</i>	738	43	39	16	14	1	140	50	3

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T24c Problèmes psychiques au cours de la vie (2015), hommes et femmes

Hommes & femmes

	Patient-e-s: problème principal								
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problèmes psychiques*									
autodévalorisation/sentiment de culpabilité	34.4	43.6	21.1	33.3	71.4	100.0	22.8	0.0	62.5
états anxieux/tension nerv. importants	32.5	38.2	26.3	11.1	57.1	100.0	25.4	28.6	37.5
diffic. compréhension/mémoire	11.3	14.5	7.9	22.2	28.6	100.0	10.5	14.3	50.0
altération de l'attention ou hyperactivité	9.7	16.4	7.9	22.2	14.3	100.0	13.2	14.3	50.0
pensées obsessionnelles/actions compulsives	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0
réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	7.1	0.0
hallucinations	0.9	3.6	2.6	11.1	14.3	0.0	2.6	0.0	25.0
diffic. à contrôler comportement violent	8.5	16.4	15.8	22.2	14.3	0.0	5.3	0.0	12.5
problèmes psychiques traités avec médic.	26.7	30.9	13.2	22.2	100.0	0.0	23.7	28.6	37.5
pensées suicidaires sérieuses	7.9	12.7	2.6	11.1	14.3	100.0	15.8	0.0	12.5
tentatives de suicide	2.3	7.3	0.0	0.0	14.3	0.0	3.5	0.0	0.0
autre(s) problème(s) psychique(s)	2.8	1.8	2.6	11.1	0.0	0.0	1.8	7.1	0.0
aucun	37.2	32.7	60.5	33.3	0.0	0.0	50.9	57.1	25.0
N**	681	55	38	9	7	1	114	14	8
données manquantes	2 375	210	204	49	39	5	926	114	17

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T25 Proches: lien entre le client/la cliente et la tierce personne (2015)

Proches				
	Hommes	Femmes	Total	
	%	%	%	N
Lien avec la tierce personne*				
mère/père	36.9	32.7	33.6	285
filles/fils	21.9	12.3	14.4	122
sœur/frère	4.3	4.8	4.7	40
conjoint-e/partenaire	30.5	43.1	40.3	342
autre proche/parent-e	2.7	2.3	2.4	20
collègue/ami-e	1.1	2.3	2.0	17
employeur/se, enseignant-e	0.5	0.3	0.4	3
tuteur/trice, curateur/trice	0.0	0.0	0.0	0
autre	2.1	2.3	2.2	19
N**	187	661	848	848
<i>données manquantes</i>	20	47	67	67

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T26 Proches: problème principal de la tierce personne (2015)

Proches		
	Total	
	%	N
Problème principal de la tierce personne*		
alcool	57.2	298
héroïne	4.6	24
méthadone	0.2	1
buprénorphine	0.2	1
fentanyl	0.0	0
autres opioïdes	0.2	1
cocaïne en poudre	5.0	26
crack	0.4	2
autre forme de cocaïne	0.2	1
amphétamines	1.0	5
méthamphétamines	0.2	1
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.2	1
cathinones synthétiques	0.0	0
autres stimulants	0.0	0
barbituriques	0.0	0
benzodiazépines	0.4	2
GHB/GBL	0.0	0
autres somnifères et tranquillisants	0.2	1
LSD	0.0	0
kétamine	0.0	0
autres hallucinogènes	0.0	0
substances volatiles	0.0	0
cannabis	20.2	105
tabac	0.6	3
autre substance	0.0	0
jeu pathologique	2.9	15
dépendances aux ordinateurs/Internet	4.0	21
troubles alimentaires	0.8	4
autre comportement de type addictif	1.7	9
N**	521	521
<i>données manquantes</i>	394	394

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T27 Sexe et âge, selon le problème principal¹ et chez les proches (2015)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N	
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total								
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Sexe*																				
hommes																			63.6	3 939
femmes																			36.4	2 258
sexe pas connu																			0.0	0
N**	2 215	1 029	3 244	180	64	244	175	38	213	760	151	911	207	758	965	3 939	2 258	6 197	6 197	
Age (en années)*																				
jusqu'à 14	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	4.6	3.4	2.0	1.1	1.3	1.1	0.8	1.0	62	
15-19	1.9	1.8	1.9	1.1	1.6	1.2	1.7	5.3	2.3	55.9	57.0	56.1	3.5	2.0	2.3	13.6	6.7	11.1	685	
20-24	2.6	3.0	2.7	5.0	12.5	7.0	13.1	18.4	14.1	12.8	8.6	12.1	4.5	4.1	4.2	6.2	5.2	5.8	360	
25-29	6.5	4.4	5.8	12.2	17.2	13.5	16.0	26.3	17.8	9.5	10.6	9.7	3.0	7.2	6.3	8.4	7.3	8.0	497	
30-34	11.5	7.8	10.3	15.0	21.9	16.8	22.9	26.3	23.5	8.3	7.9	8.3	4.5	10.0	8.8	11.4	9.1	10.6	655	
35-39	10.1	11.0	10.4	21.1	14.1	19.3	22.3	13.2	20.7	5.1	2.0	4.6	5.9	9.5	8.7	10.1	10.1	10.1	625	
40-44	11.9	10.6	11.5	18.9	10.9	16.8	10.9	5.3	9.9	2.4	4.0	2.6	10.9	11.0	10.9	9.6	9.9	9.7	601	
45-49	14.8	15.8	15.1	15.6	15.6	15.6	9.1	2.6	8.0	1.7	2.6	1.9	15.3	15.4	15.4	11.3	14.3	12.4	766	
50-54	15.6	13.5	15.0	7.2	4.7	6.6	2.9	0.0	2.3	0.7	2.0	0.9	16.8	15.6	15.9	11.0	12.2	11.4	706	
55-59	9.8	11.8	10.4	2.2	0.0	1.6	0.6	2.6	0.9	0.4	0.7	0.4	11.9	9.6	10.1	6.8	9.1	7.7	474	
60-64	7.4	9.2	8.0	1.1	0.0	0.8	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	8.4	5.6	6.2	5.0	6.5	5.5	342	
65-69	4.7	5.5	4.9	0.6	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	3.9	4.0	3.0	4.1	3.4	210	
70-74	1.9	3.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	3.2	3.7	1.4	2.8	1.9	118	
75 et plus	1.5	2.2	1.7	0.0	1.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	1.7	2.1	1.0	1.6	1.2	77	
N**	2 215	1 028	3 243	180	64	244	175	38	213	758	151	909	202	748	950	3 932	2 246	6 178	6 178	
données manquantes	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	5	10	15	7	12	19	19	
Age (valeurs centrales)																				
moyenne	46.4	48.4	47.0	39.1	35.8	38.2	34.7	31.1	34.1	22.7	23.1	22.8	48.8	45.7	46.4	39.8	44.1	41.4		
écart-type	13.1	13.6	13.3	9.2	10.7	9.7	8.6	8.2	8.6	8.4	9.6	8.6	15.5	13.9	14.3	15.4	15.2	15.5		
1er quartile	36.4	38.4	37.0	31.9	27.2	30.7	28.7	26.2	27.2	17.2	16.9	17.2	40.7	35.2	36.1	27.5	32.9	29.4		
valeur médiane	47.0	48.7	47.7	38.8	32.8	37.6	34.2	29.7	33.9	18.5	18.3	18.5	50.0	47.1	47.7	39.7	45.2	42.1		
3e quartile	55.1	58.0	56.1	45.7	43.7	45.2	39.9	34.6	39.2	26.0	28.4	26.2	57.8	54.8	55.1	51.4	54.7	52.6		
N**	2 215	1 028	3 243	180	64	244	175	38	213	758	151	909	202	748	950	3 932	2 246	6 178	6 178	
données manquantes	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	5	10	15	7	12	19		

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T28 État civil et degré d'urbanisation du domicile à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2015)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
État civil*																			
célibataire	40.9	32.5	38.2	70.8	73.1	71.4	63.6	60.0	62.9	93.2	94.3	93.3	27.0	24.6	25.1	54.2	39.1	49.0	1 765
marié-e	32.3	27.9	30.9	13.9	3.8	11.2	23.4	25.0	23.7	4.6	1.1	4.1	58.4	47.3	49.8	26.7	29.4	27.6	996
séparé-e	4.8	5.3	4.9	5.6	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	0.9	2.3	1.1	2.2	3.2	3.0	3.4	4.0	3.6	131
divorcé-e	20.1	28.7	22.8	9.7	23.1	13.3	13.0	15.0	13.4	1.3	2.3	1.5	10.1	20.5	18.2	14.4	23.2	17.4	628
veuf/veuve	1.8	4.9	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	4.4	3.7	1.2	3.9	2.1	77
partenariat enregistré	0.1	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.2	0.1	0.4	0.2	8
N**	1 427	656	2 083	72	26	98	77	20	97	454	87	541	89	317	406	2 348	1 257	3 605	3 605
données manquantes	788	373	1 161	108	38	146	98	18	116	306	64	370	118	441	559	1 591	1 001	2 592	2 592
Degré d'urbanisation*																			
grands centres urbains	10.5	13.4	11.4	2.4	3.1	2.6	1.0	7.7	2.3	1.1	0.0	0.9	13.0	14.4	14.1	7.2	10.9	8.5	362
périphérie des grands centre:	13.7	14.3	13.9	5.9	9.4	6.8	19.4	30.8	21.7	12.0	9.0	11.5	5.6	5.3	5.4	12.5	10.5	11.8	502
villes de moyenne importanc	15.6	18.2	16.4	8.2	15.6	10.3	20.4	19.2	20.2	26.2	19.8	25.2	19.4	17.9	18.2	18.4	19.9	19.0	806
petites villes	33.7	32.1	33.2	50.6	46.9	49.6	48.5	26.9	44.2	32.2	41.4	33.7	35.2	34.9	35.0	35.0	34.2	34.7	1 477
campagne	26.4	22.0	25.0	32.9	25.0	30.8	10.7	15.4	11.6	28.5	29.7	28.7	26.9	27.5	27.3	26.8	24.5	26.0	1 106
N**	1 669	769	2 438	85	32	117	103	26	129	541	111	652	108	375	483	2 773	1 480	4 253	4 253
données manquantes	546	260	806	95	32	127	72	12	84	219	40	259	99	383	482	1 166	778	1 944	1 944

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T29 Type de ménage, situation de domicile et type de relation de couple à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2015)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Type de ménage*																			
seul-e en ménage	38.4	42.5	39.8	45.9	18.4	38.8	34.2	31.6	33.8	12.7	12.4	12.7	7.0	19.1	16.5	31.0	32.6	31.5	1 280
avec famille d'origine	5.7	3.6	5.0	11.0	7.9	10.2	15.3	15.8	15.4	66.3	60.0	65.3	10.5	5.5	6.6	21.2	10.1	17.4	708
avec partenaire et/ou avec enfant(s)	47.2	48.0	47.5	22.0	60.5	32.0	37.8	26.3	36.2	9.9	8.6	9.7	79.1	72.8	74.2	37.9	50.3	42.2	1 713
avec des amis ou d'autres personnes	2.7	1.7	2.4	2.8	5.3	3.4	3.6	10.5	4.6	3.0	1.9	2.9	0.0	1.6	1.3	2.7	1.9	2.4	98
en prison	0.2	0.0	0.1	2.8	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	7
institution/foyer	2.0	0.9	1.7	7.3	0.0	5.4	2.7	5.3	3.1	3.8	2.9	3.6	2.3	1.0	1.3	2.8	1.2	2.2	90
hôpital/clinique	0.4	0.1	0.3	0.9	0.0	0.7	0.0	5.3	0.8	0.2	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.3	11
autre	3.4	3.1	3.3	7.3	7.9	7.5	6.3	5.3	6.2	3.9	13.3	5.4	1.2	0.0	0.3	3.9	3.7	3.8	156
N**	1 529	750	2 279	109	38	147	111	19	130	558	105	663	86	309	395	2 672	1 391	4 063	4 063
données manquantes	686	279	965	71	26	97	64	19	83	202	46	248	121	449	570	1 267	867	2 134	2 134
Situation de domicile*																			
logement stable	94.7	95.3	94.9	83.0	97.5	86.8	89.6	76.9	87.4	92.9	90.5	92.5	97.0	96.3	96.5	93.7	95.0	94.2	4 253
logement instable/SDF	3.1	3.2	3.1	5.4	0.0	3.9	7.2	15.4	8.6	3.2	2.6	3.1	1.0	2.8	2.4	3.2	3.0	3.1	142
en prison	0.5	0.1	0.4	4.5	2.5	3.9	0.8	0.0	0.7	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.4	17
institution/foyer/hôpital/autre	1.7	1.5	1.7	7.1	0.0	5.3	2.4	7.7	3.3	3.7	6.9	4.2	2.0	0.8	1.1	2.5	1.9	2.3	105
N**	1 723	822	2 545	112	40	152	125	26	151	617	116	733	99	355	454	2 983	1 534	4 517	4 517
données manquantes	492	207	699	68	24	92	50	12	62	143	35	178	108	403	511	956	724	1 680	1 680
Type de relation de couple*																			
sans partenaire, seul-e	37.7	45.0	40.1	61.8	42.9	56.6	36.9	46.7	38.8	72.3	61.5	70.3	19.5	25.7	24.4	44.3	40.7	43.0	1 210
relations temporaires	3.5	3.5	3.5	5.5	0.0	3.9	3.1	13.3	5.0	3.8	0.0	3.1	0.0	1.8	1.4	3.2	3.2	3.2	90
partenaire fixe, vivant séparé	8.3	12.1	9.5	3.6	14.3	6.6	12.3	13.3	12.5	11.0	30.8	14.6	3.9	11.2	9.6	8.5	13.0	10.2	286
partenaire fixe, ménage commun	50.5	39.5	46.9	29.1	42.9	32.9	47.7	26.7	43.8	13.0	7.7	12.0	76.6	61.2	64.6	44.0	43.1	43.7	1 230
N**	1 111	547	1 658	55	21	76	65	15	80	292	65	357	77	276	353	1 775	1 041	2 816	2 816
données manquantes	1 104	482	1 586	125	43	168	110	23	133	468	86	554	130	482	612	2 164	1 217	3 381	3 381

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T30 Source de revenu principale et taux d'activité principal à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2015)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Source de revenu principale*																			
salaire	57.9	41.2	52.4	37.3	34.6	36.6	66.7	54.5	64.2	29.9	22.9	28.7	75.3	66.2	68.3	51.9	46.8	50.1	1 760
économies, épargne	0.9	1.2	1.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.9	0.0	1.0	0.2	1.1	0.0	0.2	0.9	0.8	0.9	31
rente (AVS, AI ou autre)	17.5	26.8	20.6	6.0	19.2	9.7	6.0	9.1	6.6	3.6	2.1	3.4	15.1	14.6	14.7	13.0	20.6	15.7	553
aide sociale	13.6	12.9	13.4	38.8	30.8	36.6	13.1	27.3	16.0	8.3	18.8	10.1	1.1	3.8	3.2	12.3	11.0	11.9	417
assurance-chômage	4.8	3.4	4.3	13.4	3.8	10.8	6.0	0.0	4.7	1.9	6.3	2.6	0.0	1.9	1.5	4.1	3.0	3.7	130
soutien du/de la partenaire	1.7	10.5	4.6	1.5	3.8	2.2	3.6	0.0	2.8	1.3	2.1	1.4	3.2	8.9	7.6	1.8	8.9	4.3	151
soutien parents/proches/amis	2.0	3.2	2.4	0.0	7.7	2.2	3.6	4.5	3.8	54.1	46.9	52.9	4.3	4.1	4.2	14.6	8.2	12.3	433
deal, petit trafic	0.1	0.0	0.1	3.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	4
autres revenus illégaux	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
prostitution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1
assurance indemnités journalières	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	5
autre	1.3	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	0.0	0.3	0.2	1.0	0.4	0.8	28
N**	1 317	650	1 967	67	26	93	84	22	106	471	96	567	93	314	407	2 263	1 250	3 513	3 513
données manquantes	898	379	1 277	113	38	151	91	16	107	289	55	344	114	444	558	1 676	1 008	2 684	2 684
Taux d'activité principal*																			
activ. à plein temps (dès 70%)	52.8	30.8	45.7	37.3	28.6	35.0	63.9	40.0	59.8	19.1	15.5	18.4	72.3	46.4	52.3	45.7	34.1	41.6	1 240
activité à temps partiel	6.0	18.3	10.0	3.4	9.5	5.0	4.2	26.7	8.0	4.2	4.8	4.3	7.2	28.2	23.4	5.3	20.0	10.5	313
jobs occasionnels	1.9	1.1	1.6	5.1	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	1.3	0.8	1.1	33.0
en formation	2.8	4.1	3.2	3.4	9.5	5.0	2.8	0.0	2.3	60.9	56.0	60.0	4.8	4.6	4.7	17.0	10.4	14.7	438
sans travail, en quête d'emploi	8.6	6.2	7.8	15.3	19.0	16.3	6.9	6.7	6.9	3.2	10.7	4.5	0.0	2.9	2.2	7.2	5.7	6.7	199
sans travail, sans recherche d'emploi	3.7	5.6	4.3	10.2	4.8	8.8	8.3	6.7	8.0	4.0	4.8	4.1	1.2	0.7	0.8	4.4	4.1	4.3	128
rentier/rentière	10.2	17.2	12.5	0.0	4.8	1.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	13.3	9.6	10.5	6.8	11.9	8.6	257
incapacité de travail	5.4	6.7	5.8	5.1	9.5	6.3	2.8	13.3	4.6	2.2	1.2	2.0	0.0	2.5	1.9	4.3	5.2	4.6	138
femme/homme au foyer	0.4	3.2	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	1.7	0.2	2.3	0.9	28
autre	8.3	6.7	7.8	20.3	14.3	18.8	11.1	6.7	10.3	6.2	7.1	6.4	1.2	2.5	2.2	7.7	5.7	7.0	208
N**	1 111	535	1 646	59	21	80	72	15	87	404	84	488	83	280	363	1 925	1 057	2 982	2 982
données manquantes	1 104	494	1 598	121	43	164	103	23	126	356	67	423	124	478	602	2 014	1 201	3 215	3 215

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T31 Statut professionnel et revenu mensuel net à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2015)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Statut professionnel*																			
sans activité professionnelle	29.6	40.8	33.3	38.5	53.8	43.6	19.5	22.2	20.0	20.3	29.6	21.8	33.3	14.8	16.7	27.4	38.5	30.8	423
apprenti-e, stagiaire	2.6	2.5	2.6	3.8	0.0	2.6	7.3	0.0	6.0	26.8	29.6	27.3	0.0	3.7	3.3	6.8	4.0	6.0	82
manœuv re, aide	2.0	3.1	2.4	7.7	0.0	5.1	2.4	0.0	2.0	3.6	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.4	2.4	33
ouvrier/ère formé-e sur le tas	6.3	5.0	5.8	7.7	0.0	5.1	9.8	0.0	8.0	2.2	3.7	2.4	0.0	7.4	6.7	5.9	4.5	5.5	75
ouvrier/ère formé-e (CFC)	12.2	5.0	9.8	23.1	0.0	15.4	26.8	33.3	28.0	8.7	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0	12.9	5.0	10.4	143
contremaître-sse	2.1	0.3	1.5	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.0	2.2	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	2.0	0.2	1.5	20
employé-e non qualifié-e	17.6	23.7	19.6	11.5	23.1	15.4	12.2	44.4	18.0	8.0	11.1	8.5	66.7	40.7	43.3	15.3	23.6	17.9	245
empl. qualifié-e, cadre moyen	12.7	7.2	10.9	0.0	7.7	2.6	9.8	0.0	8.0	2.9	0.0	2.4	0.0	18.5	16.7	10.3	7.8	9.5	131
employé-e, cadre supérieur	4.3	2.2	3.6	3.8	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	0.0	3.7	3.3	3.3	1.9	2.8	39
indépendant-e	8.9	6.9	8.2	3.8	7.7	5.1	7.3	0.0	6.0	2.9	0.0	2.4	0.0	11.1	10.0	7.4	6.9	7.2	99
écolier/ère, étudiant-e	1.1	1.2	1.1	0.0	7.7	2.6	0.0	0.0	0.0	21.0	25.9	21.8	0.0	0.0	0.0	5.3	3.1	4.6	63
autre statut	0.8	2.2	1.2	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.0	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	1.1	2.1	1.4	19
N**	655	321	976	26	13	39	41	9	50	138	27	165	3	27	30	949	423	1 372	1 372
données manquantes	1 560	708	2 268	154	51	205	134	29	163	622	124	746	204	731	935	2 990	1 835	4 825	4 825

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T32a Raison principale de la fin du traitement/de la prise en charge, selon le problème principal¹ et chez les proches (2015)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Raison principale*																			
fin régulière sans transfert	52.4	51.1	52.0	22.2	28.6	23.9	39.4	26.3	37.1	63.8	58.9	63.0	66.2	68.0	67.6	53.5	58.0	55.1	3 406
fin régulière avec transfert	4.4	6.7	5.1	12.2	0.0	9.1	5.1	7.9	5.6	2.6	2.6	2.6	3.9	1.6	2.1	4.6	4.4	4.5	281
changement de domicile	1.8	1.9	1.8	7.8	9.5	8.2	5.1	7.9	5.6	2.0	1.3	1.9	0.0	0.7	0.5	2.1	1.7	1.9	120
hospitalisation	0.5	1.3	0.8	1.1	0.0	0.8	1.1	2.6	1.4	0.4	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	0.6	38
détention	0.4	0.0	0.2	2.2	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	16
perte de contact	24.7	26.4	25.2	36.1	42.9	37.9	33.7	47.4	36.2	21.3	20.5	21.1	21.3	20.8	20.9	25.0	24.1	24.6	1 522
rupture explicite	12.5	9.2	11.4	12.8	12.7	12.8	13.1	5.3	11.7	6.7	13.9	7.9	7.2	6.9	7.0	10.8	8.1	9.9	609
décès	1.9	1.7	1.8	2.8	6.3	3.7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.2	0.0	0.1	0.1	1.3	1.2	1.2	76
autre raison	1.5	1.8	1.6	2.8	0.0	2.1	2.3	2.6	2.3	2.5	1.3	2.3	1.4	1.9	1.8	1.7	1.8	1.8	109
N**	2 207	1 026	3 233	180	63	243	175	38	213	757	151	908	207	753	960	3 928	2 249	6 177	6 177
données manquantes	8	3	11	0	1	1	0	0	0	3	0	3	0	5	5	11	9	20	20

T32b Destination des transferts, selon le problème principal¹ et chez les proches (2015)

Destination des transferts***	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%							
traitement résidentiel	31.8	31.6	31.7	20.0	0.0	20.0	33.3	33.3	33.3	14.3	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	23.7	24.1	23.8	45
structure/clinique de jour	3.0	2.6	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.9	1.6	3
prise en charge ambulatoire	45.5	47.4	46.2	45.0	0.0	45.0	66.7	66.7	66.7	64.3	50.0	62.5	40.0	0.0	25.0	53.3	50.0	52.4	99
appartement protégé	0.0	2.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.5	1
autre institution spécialisée	19.7	15.8	18.3	35.0	0.0	35.0	0.0	0.0	0.0	21.4	50.0	25.0	60.0	100.0	75.0	21.5	22.2	21.7	41
N**	66	38	104	20	0	20	9	3	12	14	2	16	5	3	8	135	54	189	189
données manquantes	31	31	62	2	0	2	0	0	0	6	2	8	3	9	12	47	45	92	92

T32c Cause de décès, selon le problème principal¹ et chez les proches (2015)

Cause de décès****	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%							
suicide	13.8	7.7	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	12.1	10.0	11.3	6
accident	3.4	23.1	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	15.0	7.5	4
maladie	62.1	53.8	59.5	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.6	55.0	60.4	32
surdose ou intoxication aiguë	10.3	15.4	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	15.0	13.2	7
autre cause de décès	10.3	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	9.1	5.0	7.5	4.0
N**	29	13	42	2	2	4	0	0	0	0	1	1	0	1	1	33	20	53	53
données manquantes	12	4	16	3	2	5	0	0	0	1	0	1	0	0	0	17	6	23	23

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s transféré-e-s. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s décédé-e-s durant la prise en charge. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T33 Durée de la prise en charge, selon le problème principal¹ et chez les proches (2015)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
Durée de la prise en charge* (%)																			
1 semaine ou moins	5.3	5.9	5.5	6.1	4.7	5.8	2.9	7.9	3.8	3.8	5.4	4.1	15.1	11.4	12.2	5.3	7.5	6.1	378
> 1 semaine à 1 mois	4.7	4.5	4.6	3.4	6.3	4.1	3.4	0.0	2.8	10.1	6.7	9.6	5.4	4.2	4.5	5.4	4.3	5.0	311
> 1 à 2 mois	3.5	3.3	3.4	3.4	0.0	2.5	2.9	2.6	2.8	7.9	12.1	8.6	4.9	4.2	4.4	4.6	4.0	4.4	272
>2 à 3 mois	3.2	2.7	3.0	6.1	1.6	4.9	4.0	10.5	5.2	6.7	8.7	7.0	6.3	4.1	4.6	4.4	3.9	4.2	261
>3 à 6 mois	9.9	11.2	10.3	9.5	3.1	7.8	10.9	21.1	12.7	15.7	14.1	15.4	12.7	14.5	14.1	11.5	13.0	12.0	744
>6 mois à 1 an	24.5	25.8	24.9	17.3	35.9	22.2	34.3	21.1	31.9	34.1	28.9	33.2	34.1	31.4	32.0	28.7	29.1	28.9	1 783
>1 à 2 ans	19.1	22.4	20.1	23.5	20.3	22.6	28.0	21.1	26.8	15.0	16.1	15.2	15.1	18.0	17.4	18.5	20.4	19.2	1 186
>2 à 3 ans	9.9	9.1	9.7	12.3	10.9	11.9	5.1	5.3	5.2	5.3	6.7	5.5	3.9	5.0	4.8	8.1	7.3	7.8	485
>3 à 5 ans	11.7	9.2	10.9	8.9	9.4	9.1	2.9	5.3	3.3	0.8	1.3	0.9	1.5	4.4	3.8	7.7	6.4	7.2	446
>5 à 10 ans	7.7	5.4	7.0	8.9	7.8	8.6	4.6	5.3	4.7	0.7	0.0	0.6	1.0	2.7	2.3	5.2	3.9	4.8	294
plus de 10 ans	0.5	0.4	0.5	0.6	0.0	0.4	1.1	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.3	19
N**	2 207	1 029	3 236	179	64	243	175	38	213	760	149	909	205	754	959	3 927	2 252	6 179	6 179
<i>données manquantes</i>	8	0	8	1	0	1	0	0	0	0	2	2	2	4	6	12	6	18	18
Durée (en semaines)																			
moyenne	91.7	79.3	87.8	98.1	94.0	97.0	73.0	64.6	71.5	37.9	38.7	38.0	38.1	52.6	49.5	73.4	65.3	70.5	
écart-type	108.6	93.0	104.0	114.5	109.4	113.0	95.6	83.5	93.4	45.1	42.0	44.5	54.7	71.0	68.1	94.9	82.0	90.5	
1er quartile	22.0	22.0	22.0	21.0	31.9	24.0	24.7	16.4	21.1	10.1	9.0	9.6	7.7	12.9	11.1	17.1	16.3	16.7	
valeur médiane	50.7	48.0	49.3	55.7	50.9	55.0	42.3	34.7	41.0	28.0	28.1	28.0	26.6	31.5	30.6	39.7	39.0	39.3	
3e quartile	128.4	101.4	118.1	128.9	116.1	124.9	86.0	78.7	85.6	47.8	50.9	48.1	48.1	60.4	56.7	89.1	77.1	84.4	
N**	2 207	1 029	3 236	179	64	243	175	38	213	760	149	909	205	754	959	3 927	2 252	6 179	
<i>données manquantes</i>	8	0	8	1	0	1	0	0	0	0	2	2	2	4	6	12	6	18	

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T34 Substitution pendant et immédiatement après la prise en charge, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2015)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Substitution pendant la prise en charge*																
non	98.8	99.1	98.9	74.6	82.1	76.8	96.6	95.5	96.4	99.6	99.0	99.5	98.1	98.5	98.2	3 075
oui	1.2	0.9	1.1	25.4	17.9	23.2	3.4	4.5	3.6	0.4	1.0	0.5	1.9	1.5	1.8	56
N**	1 314	665	1 979	71	28	99	89	22	111	473	98	571	2 167	964	3 131	3 131
données manquantes	901	364	1 265	109	36	145	86	16	102	287	53	340	1 565	536	2 101	2 101
Type de substitution***																
héroïne	7.1	0.0	5.0	7.1	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	4.5	2
méthadone	78.6	100.0	85.0	78.6	100.0	83.3	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	73.5	100.0	79.5	35
autres opioïdes	14.3	0.0	10.0	7.1	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	6.8	3
autres substances	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	5.6	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	11.8	0.0	9.1	4
N**	14	6	20	14	4	18	2	0	2	2	0	2	34	10	44	44
données manquantes	2	0	2	4	1	5	1	1	2	0	1	1	8	4	12	12
Substitution après la prise en charge*																
non	99.3	99.3	99.3	83.1	91.3	85.4	98.6	94.1	97.7	99.8	100.0	99.8	98.9	99.2	99.0	2 787
oui	0.7	0.7	0.7	16.9	8.7	14.6	1.4	5.9	2.3	0.3	0.0	0.2	1.1	0.8	1.0	29
N**	1 209	614	1 823	59	23	82	70	17	87	400	82	482	1 936	880	2 816	2 816
données manquantes	1 006	415	1 421	121	41	162	105	21	126	360	69	429	1 796	620	2 416	2 416
Type de substitution***																
prescription d'héroïne	33.3	0.0	23.1	10.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	0.0	13.8	4
traitement de substitution	66.7	100.0	76.9	90.0	100.0	91.7	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	81.8	100.0	86.2	25
N**	9	4	13	10	2	12	1	1	2	1	0	1	22	7	29	29
données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s substitué-e-s durant la prise en charge. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T35 Postcure prévue et mise en place, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2015)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Postcure prévue et mise en place*																
non	92.8	85.2	90.5	84.1	88.2	85.2	93.2	100.0	94.3	93.2	90.0	92.7	92.7	85.6	90.7	1 410
oui	7.2	14.8	9.5	15.9	11.8	14.8	6.8	0.0	5.7	6.8	10.0	7.3	7.3	14.4	9.3	145
N**	806	357	1 163	44	17	61	44	9	53	147	30	177	1 116	439	1 555	1 555
<i>données manquantes</i>	1 409	672	2 081	136	47	183	131	29	160	613	121	734	2 616	1 061	3 677	3 677
Type de la postcure prévue***																
appartement protégé de l'institution	0.0	2.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	7.7	1.3	1.6	1.4	2
service de postcure de l'institution	0.0	2.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.7	1
appartement protégé extérieur	1.8	5.9	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	4.9	2.8	4
service de postcure extérieur	19.6	27.5	23.4	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	15.0	23.0	18.4	26
centre de consultation pour problèmes liés à l'alcool	25.0	7.8	16.8	28.6	50.0	33.3	0.0	0.0	0.0	30.0	33.3	30.8	27.5	13.1	21.3	30
centre de consultation pour problèmes liés aux drogues	3.6	0.0	1.9	28.6	50.0	33.3	33.3	0.0	33.3	20.0	33.3	23.1	8.8	3.3	6.4	9
autre centre de consultation	8.9	11.8	10.3	14.3	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	15.4	10.0	9.8	9.9	14
groupe d'entraide	10.7	2.0	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	3.3	5.7	8
groupe d'ancien-ne-s client-e-s de l'institution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
autre	32.1	45.1	38.3	28.6	0.0	22.2	33.3	0.0	33.3	20.0	66.7	30.8	30.0	44.3	36.2	51
N**	56	51	107	7	2	9	3	0	3	10	3	13	80	61	141	141
<i>données manquantes</i>	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	4

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s pour lesquels une postcure est prévue. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles)

T36 Problèmes addictifs à la sortie, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2015)

Problèmes addictifs à la sortie*	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			N
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
alcool	75.5	78.3	76.5	25.6	2.6	20.0	22.6	33.3	24.5	12.5	9.2	11.9	50.2	57.0	52.2	1 950
héroïne	1.0	0.3	0.8	61.2	53.8	59.4	7.0	8.3	7.2	0.7	0.0	0.6	4.0	2.3	3.5	131
méthadone	0.1	0.1	0.1	15.7	10.3	14.4	2.6	0.0	2.2	0.2	0.0	0.1	1.0	0.5	0.9	32
buprénorphine	0.0	0.1	0.0	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	2
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
autres opioïdes	0.0	0.0	0.0	2.5	2.6	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	5
cocaïne en poudre	1.6	0.7	1.3	16.5	5.1	13.8	64.3	75.0	66.2	1.4	2.8	1.6	5.2	2.7	4.5	167
crack	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.6	5.2	0.0	4.3	0.2	0.0	0.1	0.3	0.1	0.2	8
autre forme de cocaïne	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
amphétamines	0.4	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.4	1.1	1.8	1.2	0.8	0.7	0.8	30
méthamphétamines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	0.3	0.2	0.2	0.2	6
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.4	0.9	0.0	0.7	0.8	0.8	0.8	29
cathinones synthétiques	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1
autres stimulants	0.1	0.1	0.1	1.7	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	6
barbituriques	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	4
benzodiazépines	1.0	1.7	1.3	12.4	10.3	11.9	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	1.6	2.1	1.7	65
GHB/GBL	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	2
autres somnifères et tranquillisants	0.2	0.0	0.1	0.8	0.0	0.6	0.9	4.2	1.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.3	13
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.4	0.9	0.0	0.7	0.3	0.2	0.3	11
kétamine	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
autres hallucinogènes	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.1	0.0	0.1	3
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
cannabis	4.7	2.8	4.0	16.5	12.8	15.6	11.3	12.5	11.5	68.4	67.0	68.1	19.5	9.9	16.7	624
tabac	10.7	9.4	10.3	14.9	7.7	13.1	7.8	4.2	7.2	11.1	14.7	11.7	11.4	11.0	11.3	421
autre substance	0.1	0.1	0.1	3.3	0.0	2.5	1.7	0.0	1.4	0.0	0.9	0.1	0.6	0.5	0.6	22
jeu pathologique	0.1	0.0	0.0	0.8	0.0	0.6	1.7	4.2	2.2	0.2	0.0	0.1	2.8	0.9	2.2	83
dépendances aux ordinateurs/Internet	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.4	0.9	0.0	0.7	2.6	0.2	1.9	72
troubles alimentaires	0.1	1.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.1	0.5	4.7	1.7	63
autre comportement de type addictif	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0	0.6	21
aucun	21.1	19.3	20.5	9.9	30.8	15.0	15.7	8.3	14.4	28.5	29.4	28.6	21.6	21.8	21.7	810
N**	1 545	757	2 302	121	39	160	115	24	139	569	109	678	2 643	1 095	3 738	3 738
données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T37 Fréquence des rechutes et substance ou comportement impliqué pendant la prise en charge, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2015)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Fréquence des rechutes*																
aucune	56.5	48.0	53.7	40.0	33.3	38.5	48.4	33.3	45.9	67.9	70.6	68.4	57.3	48.7	54.7	487
une fois	8.2	11.1	9.2	5.0	0.0	3.8	12.9	0.0	10.8	9.9	0.0	8.2	8.7	10.1	9.1	81
deux fois	8.4	6.2	7.7	5.0	0.0	3.8	9.7	0.0	8.1	6.2	11.8	7.1	7.7	6.4	7.3	65
trois ou quatre fois	12.6	13.3	12.9	20.0	16.7	19.2	9.7	0.0	8.1	4.9	5.9	5.1	11.7	12.4	11.9	106
cinq fois ou plus	14.2	21.3	16.6	30.0	50.0	34.6	19.4	66.7	27.0	11.1	11.8	11.2	14.6	22.5	17.0	151
N**	451	225	676	20	6	26	31	6	37	81	17	98	623	267	890	890
données manquantes	1 764	804	2 568	160	58	218	144	32	176	679	134	813	3 109	1 233	4 342	4 342
Substance/comportement addictif lors des rechutes***																
alcool	98.4	100.0	99.0	57.1	0.0	40.0	28.6	50.0	33.3	44.0	40.0	43.3	85.3	92.2	87.7	328
opioïdes	1.6	0.0	1.0	57.1	100.0	70.0	21.4	0.0	16.7	8.0	0.0	6.7	4.9	2.3	4.0	15
cocaïne et dérivés	1.6	0.0	1.0	28.6	66.7	40.0	78.6	100.0	83.3	0.0	40.0	6.7	7.3	6.2	7.0	26
autres stimulants	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	5.6	0.0	20.0	3.3	0.8	0.8	0.8	3
somnifères/tranquillisants	1.1	2.7	1.7	14.3	0.0	10.0	7.1	0.0	5.6	8.0	0.0	6.7	2.4	2.3	2.4	9
hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	1
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
cannabis	3.2	0.9	2.3	57.1	0.0	40.0	21.4	0.0	16.7	84.0	100.0	86.7	15.1	6.2	12.0	45
tabac	2.1	2.7	2.3	14.3	0.0	10.0	7.1	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	2.9	3.1	2.9	11
autres substances	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
jeu pathologique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	1
dépendances aux ordinateurs/Internet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	5.6	4.0	0.0	3.3	2.0	0.0	1.3	5
troubles alimentaires	0.0	1.8	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.8	3
autre comportement de type addictif	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	1
N**	187	112	299	7	3	10	14	4	18	25	5	30	245	129	374	374
données manquantes	9	5	14	5	1	6	2	0	2	1	0	1	21	8	29	29

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une ou plusieurs rechutes. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

T38 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 jours précédant la sortie, selon le problème principal¹ (selement patient-e-s) (2015)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			N
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
Fréquence de la consommation de tabac*																
jamais	37.9	50.0	42.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	37.5	17.1	33.4	49.1	38.9	177
1 jour par semaine ou moins	0.8	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	5.7	1.0	1.3	1.1	5
2 à 3 jours par semaine	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	2.9	0.7	0.0	0.4	2
4 à 6 jours par semaine	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	1
une fois par jour	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.4	2
plusieurs fois par jour	60.1	50.0	56.4	100.0	100.0	100.0	90.0	100.0	92.3	85.2	37.5	74.3	63.9	49.7	58.9	268
N**	248	142	390	6	2	8	10	3	13	27	8	35	296	159	455	455
<i>données manquantes</i>	1 967	887	2 854	174	62	236	165	35	200	733	143	876	3 436	1 341	4 777	4 777
Nombre de cigarettes par jour***																
0 à 10 cigarettes par jour	21.3	21.3	21.3	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	18.2	30.0	50.0	33.3	22.5	21.4	22.2	51
11 à 20 cigarettes par jour	46.5	57.4	50.0	66.7	100.0	80.0	62.5	66.7	63.6	50.0	25.0	45.8	48.1	57.1	50.9	117
21 à 30 cigarettes par jour	20.5	16.4	19.1	0.0	0.0	0.0	12.5	33.3	18.2	5.0	25.0	8.3	17.5	17.1	17.4	40
31 cigarettes par jour ou plus	11.8	4.9	9.6	33.3	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	12.5	11.9	4.3	9.6	22
N**	127	61	188	3	2	5	8	3	11	20	4	24	160	70	230	230
<i>données manquantes</i>	27	10	37	3	0	3	2	0	2	4	1	5	37	11	48	48

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une consommation de tabac. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T39 Objectif de consommation à la sortie et pronostic, selon la principale substance posant problème¹ (seulement patient-e-s) (2015)

	Patient-e-s: principale substance posant problème ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Objectif de consommation*																
abstinence définitive	33.4	35.8	34.3	66.7	100.0	72.7	60.0	33.3	55.6	37.8	70.0	44.7	35.6	38.2	36.5	251
abstinence limitée dans le temps	17.1	10.6	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	20.0	6.4	14.7	10.5	13.2	91
consommation contrôlée	33.7	38.1	35.3	11.1	0.0	9.1	20.0	33.3	22.2	40.5	10.0	34.0	33.0	36.6	34.2	235
aucune limitation envisagée	3.7	1.4	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	5.6	2.7	0.0	2.1	3.3	1.7	2.8	19
pas déterminé pour l'instant	11.3	13.3	12.0	22.2	0.0	18.2	20.0	0.0	16.7	16.2	0.0	12.8	12.5	12.2	12.4	85
autre	0.8	0.9	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.8	0.9	6
N**	380	218	598	9	2	11	15	3	18	37	10	47	449	238	687	687
données manquantes	1 835	811	2 646	171	62	233	160	35	195	723	141	864	3 283	1 262	4 545	4 545
Pronostic*																
très bon pronostic	10.5	12.7	11.3	0.0	50.0	9.1	12.5	0.0	10.5	9.1	30.0	13.0	10.2	13.8	11.3	82
bon pronostic	44.6	45.3	44.8	33.3	50.0	36.4	50.0	33.3	47.4	50.0	60.0	51.9	44.8	46.1	45.2	327
plutôt mauvais pronostic	31.4	30.7	31.1	55.6	0.0	45.5	37.5	66.7	42.1	34.1	10.0	29.6	32.8	29.7	31.8	230
mauvais pronostic	13.5	11.3	12.7	11.1	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0	5.6	12.2	10.3	11.6	84
N**	408	212	620	9	2	11	16	3	19	44	10	54	491	232	723	723
données manquantes	1 807	817	2 624	171	62	233	159	35	194	716	141	857	3 241	1 268	4 509	4 509

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

ANNEXE

A1 Données de base d'institutions non participantes: sexe et âge à l'admission, selon le problème principal (2015)

	Patient-e-s: problème principal												Toutes prises en charge***			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Sexe*																
hommes			66.7			66.7			77.9			84.9			70.3	1161
femmes			33.3			33.3			22.1			15.1			29.7	490
sexe pas connu			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	0
N**	562	280	842	106	53	159	81	23	104	231	41	272	1 161	490	1 651	1 651
Age (en années)*																
jusqu'à 14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.4	0.3	0.4	0.4	6
15-19	2.7	0.4	1.9	2.8	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	27.2	24.4	26.8	8.3	4.3	7.2	117
20-24	5.4	2.9	4.6	9.4	13.2	10.7	12.5	13.6	12.7	22.8	22.0	22.7	10.3	7.8	9.6	157
25-29	8.1	4.7	7.0	16.0	26.4	19.5	16.3	18.2	16.7	19.7	19.5	19.7	12.3	10.3	11.7	192
30-34	11.3	9.4	10.7	12.3	11.3	11.9	31.3	27.3	30.4	12.7	12.2	12.6	14.1	12.3	13.6	222
35-39	11.0	11.6	11.2	19.8	18.9	19.5	21.3	18.2	20.6	6.6	4.9	6.3	12.5	11.3	12.2	199
40-44	10.1	10.1	10.1	19.8	13.2	17.6	11.3	9.1	10.8	2.2	4.9	2.6	9.0	9.5	9.2	150
45-49	13.5	13.4	13.4	9.4	11.3	10.1	5.0	4.5	4.9	3.9	7.3	4.5	10.4	12.3	11.0	180
50-54	13.3	17.3	14.6	6.6	3.8	5.7	1.3	9.1	2.9	4.4	2.4	4.1	8.8	11.7	9.7	158
55-59	9.7	12.6	10.7	0.0	1.9	0.6	1.3	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	5.3	7.8	6.1	99
60-64	7.7	5.8	7.1	3.8	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	4.3	4.4	72
65-69	3.1	5.1	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	3.3	2.2	36
70-74	2.5	3.2	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	1.4	2.1	1.6	26
75 et plus	1.6	3.6	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.5	1.3	22
N**	556	277	833	106	53	159	80	22	102	228	41	269	1 150	486	1 636	1 636
données manquantes	6	3	9	0	0	0	1	1	2	3	0	3	11	4	15	15
Age (valeurs centrales)																
moyenne	45.0	48.6	46.2	37.2	35.1	36.5	34.1	34.7	34.2	27.3	27.5	27.4	40.1	42.5	40.8	
écart-type	14.0	13.5	14.0	10.2	9.4	9.9	7.7	8.6	7.9	10.1	10.0	10.1	54.4	14.9	46.3	
1er quartile	33.9	38.3	35.4	28.8	27.0	28.1	28.7	29.3	29.0	19.8	19.8	19.8	27.8	30.9	28.6	
valeur médiane	45.6	48.4	46.5	38.7	35.0	36.7	34.0	32.9	33.8	25.1	27.3	25.1	36.5	41.6	38.3	
3e quartile	54.9	57.3	55.4	43.3	42.3	43.0	38.44	40.0	38.8	31.8	33.5	32.0	49.0	52.4	50.1	
N**	556	277	833	106	53	159	80	22	102	228	41	269	1 150	486	1 636	
données manquantes	6	3	9	0	0	0	1	1	2	3	0	3	11	4	15	

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Plusieurs institutions ne définissent pas le problème principal selon les directives d'act-info et répertorient notamment la "consommation multiple". Ainsi, la distribution résultante n'est pas directement comparable avec celle des institutions participantes

A2 Données de base d'institutions non participantes: problème principal à l'admission (2015)

Tous patients et patientes				
	Hommes	Femmes	Total	
	%	%	%	N
Problème principal*				
alcool	48.4	57.1	51.0	842
opioïdes	9.1	10.8	9.6	159
cocaïne	7.0	4.7	6.3	104
autres stimulants	1.2	0.8	1.1	18
hypnotiques/sedatives	1.5	4.3	2.3	38
hallucinogènes	0.0	0.2	0.1	1
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0
cannabis	19.9	8.4	16.5	272
tabac	0.3	0.8	0.4	7
autre substance	0.0	0.0	0.0	0
consommation multiple**	8.0	8.4	8.1	134
non lié à une substance	4.7	4.3	4.5	75
N***	1 161	490	1 651	1 651
<i>données manquantes</i>	0	0	0	0

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Plusieurs institutions ne définissent pas le problème principal selon les directives d'act-info et répertorient notamment la "consommation multiple". Ainsi, la distribution résultante n'est pas directement comparable avec celle des institutions participantes

*** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu